



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





600050106G

G. 121. J. 10.



E. BIBL. RADCL.

~~19. B. 9~~ ~~14~~  
~~7. 4~~ ~~C~~ ~~3~~ C  
~~4~~ ~~24~~


165222 e. 158  $\frac{1}{4}$











# I n h a l t.

<b>Sechstes Buch. Eingeweidelehre .</b>	<b>Seite 1 — 677</b>
<b>Erstes Hauptstück. Von den Sinnwerkzeugen</b>	<b>4 — 147</b>
<b>Erster Abschnitt. Vom Gehörorgan</b>	<b>7 — 56</b>
<b>Erste Abtheilung. Gehörorgan im regelmäßigen Zustande</b>	<b>8 — 52</b>
<b>Erste Unterabtheilung. Vollkommener Zustand.</b>	<b>8 — 42</b>
<b>I. Aeußeres Ohr</b>	<b>8 — 16</b>
A. Ohrknorpel	9 — 12
B. Muskeln des äußern Ohres	12 — 16
1. Muskeln, welche das ganze äußere Ohr bewegen	12 — 14
a. Heber des Ohres	13
b. Rückwärtszieher des Ohres	13
c. Vorwärtszieher des Ohres	14
2. Muskeln, welche einzelne Theile des Ohres bewegen	14 — 16
a. Muskel der Ecke	14 — 15
b. Muskel der Gegendes	15
c. Großer Leistenmuskel	15
d. Kleiner Leistenmuskel	15 — 16
e. Querer Ohrmuskel	16
<b>II. Inneres Ohr</b>	<b>16 — 42</b>
A. Aeußerer Theil	17 — 19
1. Knöcherner Gehörgang	17
2. Paukenfell	18 — 19
B. Mittlerer Theil	19 — 29
1. Paukenhöhle	19 — 23
2. Eustachische Trompete	22 — 23
3. Gehörknöchelchen	23 — 27
a. Hammer	24 — 25
b. Ambos	25 — 26
c. Kienbein	26
d. Steigbügel	26 — 27

4. Muskeln der Gehörknöchelchen . . . . .	Seite 27—29
a. Muskeln des Hammer . . . . .	27—29
α. Spanner des Paukenfelles . . . . .	28
β. Größerer Erschlaffer des Paukenfelles . . . . .	28
γ. Kleinerer Erschlaffer des Paukenfelles . . . . .	29
b. Steigbügelmuskel . . . . .	29
C. Innerster Theil oder Labyrinth . . . . .	30—42
1. Vom knöchernen Labyrinth . . . . .	30—37
a. Vorhof . . . . .	31—32
b. Wölgengänge . . . . .	32—33
c. Schnecke . . . . .	34—35
d. Wasserleitungen . . . . .	35—37
2. Häutiges Labyrinth . . . . .	37—38
3. Hörnerv . . . . .	38—42
<b>Zweite Unterabtheilung. Entwicklungsverschie-</b>	
<b>denheiten . . . . .</b>	<b>42—52</b>
I. Äußeres Ohr . . . . .	42—44
II. Inneres Ohr . . . . .	44—52
<b>Zweite Abtheilung. Abweichende Zustände des</b>	
<b>Gehörorgans . . . . .</b>	<b>52—56</b>
1. Äußeres Ohr . . . . .	53
2. Inneres Ohr . . . . .	54—56
A. Paukenhöhle . . . . .	54
B. Labyrinth . . . . .	54—55
C. Gehörnerv . . . . .	55—56
<b>Zweiter Abschnitt. Vom Sehorgan oder dem</b>	
<b>Auge . . . . .</b>	<b>57—135</b>
<b>Erste Abtheilung. Sehorgan im regelmäßigen Zu-</b>	
<b>stande . . . . .</b>	<b>58—118</b>
<b>Erste Unterabtheilung. Vollkommener Zustand.</b>	<b>58—111</b>
1. Schutzmittel oder Hüllen des Auges. . . . .	58—70
1. Augenlider . . . . .	58—65
a. Augenwimpern . . . . .	60
b. Talgdrüsen . . . . .	61
c. Augenlidknorpel . . . . .	61—62
d. Muskeln der Augenlider . . . . .	62—65
α. Augenlidsciefer . . . . .	62—63
β. Augenlidheber . . . . .	63—65
2. Augens . . . . .	



# I n h a l t.

v

2. Augenbrauen	Seite 65 — 68
Augenbrauenrunzler	66
3. Thränenorgane	66 — 70
a. Thränenbrüsen	67 — 68
b. Thränenkanälchen oder Thränenpunkte	68 — 69
c. Thränenack	69 — 70
II. Der Augapfel	70 — 96
A. Äußere Hhäute des Augapfels	71 — 76
a. Harte Haut des Augapfels	71 — 74
b. Hornhaut	74 — 76
B. Aderhaut und Blendung	76 — 92
a. Aderhaut	76 — 77
b. Strahlenkörper	78 — 82
c. Blendung	82 — 90
d. Pigment	90 — 92
C. Von der Netzhaut	92 — 96
III. Von den Flüssigkeiten des Auges	96 — 104
1. Glasfeuchtigkeit	96 — 98
2. Linse	98 — 104
3. Wässerige Feuchtigkeit	104
IV. Von den Muskeln des Augapfels	104 — 111
1. Gerade Augenmuskeln	105 — 108
a. Oberer gerader Augenmuskel	105
b. Gemeinschaftliche Sehne der drei übrigen geraden Augenmuskeln	106
c. Äußerer gerader Augenmuskel	106
d. Unterer gerader Augenmuskel	107
e. Innerer gerader Augenmuskel	107 — 108
2. Schiefe Augenmuskeln	108 — 111
a. Oberer schiefer Augenmuskel	108 — 109
b. Unterer schiefer Augenmuskel	109 — 111
Zweite Unterabtheilung. Periodische Verschie-	
denheiten	111 — 118
Zweite Abtheilung. Sehorgan im regelwidrigen	
Zustande	118 — 135
Erste Unterabtheilung. Formfehler	
A. Ursprüngliche Bildungsabweichungen	119 — 121
B. Erworbene Formfehler	121 — 127
Zweite Unterabtheilung. Fehler der Mischung	
und des Gewebes	127 — 135

B. Regelwidriger Zustand der Munddrüsen	Seite 196 — 197
E. Zähne	198 — 232
I. Regelmäßiger Zustand	199 — 232
1. Vollkommener Zustand	199 — 211
2. Periodische Verschiedenheiten	211 — 232
a. Allgemeine Betrachtung	211 — 221
β. Besondere Betrachtung	222 — 232
A. Wechselzähne	222 — 225
B. Bleibende Zähne	226 — 232
II. Regelwidriger Zustand	232 — 241
A. Abweichungen der Form	233 — 240
B. Abweichungen des Gewebes	240 — 243
<b>Zweite Unterabtheilung. Hals- und Brusttheil</b>	
der Verdauungswerkzeuge	241 — 255
I. Regelmäßiger Zustand	242 — 251
A. Schlundkopf	242 — 247
1. Unterer Schlundkopfschnürr	244
2. Mittlerer Schlundkopfschnürr	244 — 245
3. Oberer Schlundkopfschnürr	245
4. Der Griffelschlundkopfschnürr	246
B. Speiseröhre	247 — 251
II. Regelwidriger Zustand	251 — 255
1. Formfehler	251 — 253
2. Fehler des Gewebes	253 — 255
<b>Zweite Abtheilung. Mittlerer und Endtheil</b>	255 — 377
<b>Erste Unterabtheilung. Speisefanal</b>	257 — 331
I. Regelmäßige Beschaffenheit	257 — 311
1. Vollkommener Zustand	257 — 294
A. Der Magen.	258 — 269
a. Lage.	258
b. Gestalt.	259 — 261
c. Dimensionen	261
d. Befestigung	261 — 262
e. Häute des Magens	262 — 265
f. Pförtnerklappe	266 — 267
g. Vorübergehende Veränderungen der Gestalt und Lage des Magens	267 — 268
h. Berrichtung des Magens	268 — 269
i. Geschlechtsverschiedenheiten	269
B. Dünner Darm	270 — 281
1. Zwölffingerdarm	271 — 272
2. 11c	

# I n h a l t.

ix

2. Niedriger Theil des dünnen Darmes	Seite 272 — 281
a. Häute des dünnen Darmes	272 — 280
α. Klappen	274 — 276
β. Sotten	276 — 278
γ. Drüsen	278 — 280
b. Verrichtungen des dünnen Darmes	280 — 281
C. Dicker Darm	281 — 294
1. Lage und Befestigung	281 — 282
2. Abtheilung des dicken Darmes	282 — 289
a. Uebergangsstelle des dünnen Darmes in den dicken. Dickdarmsklappe	282 — 284
b. Blinddarm und Wurmfortsatz	284 — 286
c. Aufsteigender dicker Darm	286
d. Querer Grimmdarm	286 — 287
e. Absteigender Grimmdarm	287
f. Mastdarm	287 — 289
3. Äußere Gestalt	289
4. Länge und Weite	289
5. Anordnung der Häute	290 — 292
a. Hautschicht	290
b. Muskelschicht	290 — 291
c. Schleimhaut	291 — 292
6. Muskeln des After	292 — 294
Schließer des After	293 — 294
a. Innerer Schließer	293
b. Äußerer Schließer	293 — 294
7. Verrichtungen des dicken Darmes	294
3. Periodische Verschiedenheiten	294 — 311
a: Entstehungsweise	295 — 307
b. Lage	307 — 308
c. Größe	308 — 310
d. Gestalt	310 — 311
II. Regelwidriger Zustand	311 — 331
I. Formabweichungen	312 — 325
A. Ursprüngliche Bildungsfehler	312 — 321
1. Allgemeine	312 — 315
2. Besondere	315 — 321
B. Erworbene Formabweichungen	321 — 325
II. Texturabweichungen	325 — 331
Zweite Unterabtheilung. Drüsige Organe des Unterleibstheiles des Verdauungssystems	331 — 377

## Zweite Unterabtheilung. Von den Nebennieren S. 503 — 510

1. Regelmäßiger Zustand	503 — 509
1. Vollkommener Zustand im Allgemeinen	503 — 506
a. Lage	503
b. Gestalt und Größe	503 — 504
c. Gewicht	504
d. Consistenz	504
e. Bau	504 — 506
2. Nachverschiedenheiten	506
3. Periodische Verschiedenheiten	506 — 507
4. Function	507 — 509
II. Regelwidriger Zustand	509 — 510

## Fünfte Abtheilung. Von den Geschlechtstheilen S. 510 — 639

## Erste Unterabtheilung. Regelmäßige Beschaffenheit

A. Eigentliche Zeugungstheile	512 — 574
1. Vollkommener Zustand	512 — 583
1. Weibliche Zeugungstheile	514 — 540
a. Bildende Theile	514 — 531
1. Die Eierstöcke	515 — 516
a. Gestalt, Lage, Größe und Gewicht	515
b. Zusammensetzung	515 — 516
2. Die Trompeten	516 — 518
3. Die Gebärmutter	518 — 531
a. Äußere Gestalt	519 — 521
b. Größe	522
c. Gewicht	522
d. Lage	522 — 523
e. Verbindungen	523 — 525
f. Gewebe	525 — 531
α. Fasern	526 — 530
β. Schleimfläche	530 — 531
b. Begattungstheile	531 — 538
1. Scheide	531 — 533
a. Äußere Gestalt und Größe	531 — 532
b. Lage und Richtung	532
c. Bau	532 — 533
2. Scheidenklappe	533 — 534
3. Kitzler	534 — 536
a. Kitzler an sich	534 — 535
b. Eiglein, Zellförpermuskeln	535 — 536

# I n h a l t.

ix

2. Uebrig <sup>er</sup> Theil des dünnen Darmes	Seite 272 — 281
a. Häute des dünnen Darmes	272 — 280
α. Klappen	274 — 276
β. Sotten	276 — 278
γ. Drüsen	278 — 280
b. Verrichtungen des dünnen Darmes	280 — 281
C. Dicker Darm	281 — 294
1. Lage und Befestigung	281 — 282
2. Abtheilung des dicken Darmes	282 — 289
a. Uebergangsstelle des dünnen Darmes in den dicken. Dickdarmsklappe	282 — 284
b. Blinddarm und Wurmfortsatz	284 — 286
c. Aufsteigender dicker Darm	286
d. Querer Grimmdarm	286 — 287
e. Absteigender Grimmdarm	287
f. Mastdarm	287 — 289
3. Aeußere Gestalt	289
4. Länge und Weite	289
5. Anordnung der Häute	290 — 292
a. Bauchfellhaut	290
b. Muskelhaut	290 — 291
c. Schleimhaut	291 — 292
6. Muskeln des Afters	292 — 294
Schließer des Afters	293 — 294
a. Innerer Schließer	293
b. Aeußerer Schließer	293 — 294
7. Verrichtungen des dicken Darmes	294
3. Periodische Verschiedenheiten	294 — 311
a. Entstehungsweise	295 — 307
b. Lage	307 — 308
c. Größe	308 — 310
d. Gestalt	310 — 311
II. Regelwidriger Zustand	311 — 331
I. Formabweichungen	312 — 325
A. Ursprüngliche Bildungsfehler	312 — 321
1. Allgemeine	312 — 315
2. Besondere	315 — 321
B. Erworbne Formabweichungen	321 — 325
II. Texturabweichungen	325 — 331
Zweite Unterabtheilung. Drüsige Organe des Unterleibstheiles des Verdauungssystems	
a 6	331 — 377
	I. Lez

2. Gemeinschaftliche Muskeln der Geschlechtstheile, des Mastdarms und der Harnwerkzeuge . . . . .	Seite 564 — 567
a. Quere Mittelfleischmuskeln . . . . .	564 — 566
a. Hinterer Mittelfleischmuskel . . . . .	565
b. Vorderer Mittelfleischmuskel . . . . .	565 — 566
β. Heber des After . . . . .	566
3. Kräfte und Verrichtungen der männlichen Zeugungstheile . . . . .	567 — 574
B. Die Brüste . . . . .	575 — 583
a. Zahl . . . . .	576
b. Lage und äußere Gestalt . . . . .	576 — 577
c. Bau . . . . .	577 — 583
d. Verrichtung . . . . .	583
II. Periodische Verschiedenheiten . . . . .	584 — 612
A. Weibliche Zeugungstheile . . . . .	586 — 599
1. Eierstöcke . . . . .	587 — 589
2. Trompeten, Gebärmutter und Scheide . . . . .	589 — 597
a. Trompeten . . . . .	589 — 591
b. Gebärmutter . . . . .	591 — 595
c. Scheide . . . . .	595 — 596
d. Scheidenklappe . . . . .	597
3. Kitzler . . . . .	597 — 599
B. Männliche Zeugungstheile . . . . .	599 — 611
1. Hoden . . . . .	599 — 610
2. Ruthe . . . . .	610 — 611
C. Brüste . . . . .	611 — 612
III. Racenverschiedenheiten . . . . .	612
IV. Gleichung zwischen den weiblichen und männlichen Zeugungstheilen . . . . .	613 — 614
Zweite Unterabtheilung. Regelwidriger Zustand der Geschlechtstheile . . . . .	615 — 639
A. Allgemeine Abweichungen . . . . .	615 — 617
B. Besondere Abweichungen . . . . .	617 — 639
1. Formabweichungen . . . . .	617 — 631
a. Zwitterbildungen . . . . .	617 — 620
b. Formabweichungen der einzelnen Zeugungstheile . . . . .	621 — 631
1. Weibliche Zeugungstheile . . . . .	621 — 627
2. Männliche Zeugungstheile . . . . .	627 — 630
3. Brüste . . . . .	630 — 631
2. Texturveränderungen . . . . .	631 — 639
A. Weibliche Zeugungstheile . . . . .	631 — 638
B. Männer . . . . .	



4. Innere Schamlippen . . . . .	Seite 536
5. Aeußere Schamlippen . . . . .	537
6. Schleimhöhlen der äußern Zeugungstheile . . . . .	537
7. Schamchnürer . . . . .	537 — 538
c. Gefäße und Nerven . . . . .	538
d. Kräfte und Verrichtungen . . . . .	538 — 540
2. Männliche Zeugungstheile . . . . .	540 — 574
a. Bildende Theile . . . . .	540 — 554
1. Die Hoden . . . . .	540 — 549
a. Aeußere Gestalt und Lage . . . . .	540 — 541
b. Größe und Gewicht . . . . .	541
c. Zusammensetzung . . . . .	541 — 549
a. Häute des Hoden . . . . .	541 — 548
α. Haut des Hodensackes . . . . .	542
β. Fleischhaut . . . . .	542 — 543
γ. Hodenmuskel . . . . .	543 — 548
δ. Gemeinschaftliche Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges . . . . .	545 — 546
ε. Eigene Scheidenhaut des Hoden . . . . .	546 — 547
θ. Faserhaut . . . . .	547 — 548
b. Substanz des Hoden . . . . .	548 — 549
2. Der Nebenhode . . . . .	549 — 550
3. Der Samenabführungsgang . . . . .	550 — 552
4. Die Samenblasen . . . . .	552 — 553
5. Vorsteherdrüse . . . . .	553 — 554
b. Begattungstheile oder männliche Ruthe . . . . .	554 — 567
1. Aeußere Gestalt und Lage . . . . .	554 — 557
α. Eichel . . . . .	555
β. Vorhaut . . . . .	556 — 557
2. Größe der Ruthe . . . . .	557
3. Zusammensetzung . . . . .	557 — 567
a. Ruthenzellkörper . . . . .	559 — 560
b. Harnröhre . . . . .	560 — 561
c. Cowper'sche Drüsen . . . . .	561 — 562
d. Muskeln des Mittelfleisches . . . . .	562 — 566
1. Eigene Muskeln der Ruthe . . . . .	562 — 564
α. Sitzbein ; Zellkörpermuskel . . . . .	562
β. Harnschneller . . . . .	563
γ. Zusammenschnürer der Harnröhre . . . . .	563 — 564
2. Gew.	564

I. Verdauungsorgane . . . . .	Seite 683 — 684
II. Harnorgane . . . . .	684 — 695
A. Eierkiste . . . . .	684 — 689
B. Trompeten . . . . .	689
C. Gebärmutter . . . . .	689 — 695
<b>Zweite Abtheilung. Entwicklung des neuen Organismus</b>	695 — 734
Von den Eihüllen des Fötus . . . . .	697 — 734
A. Mütterliche Eihaut oder himnlische Haut . . . . .	699 — 703
B. Kindeseihaut . . . . .	703 — 734
1. Befruchtung . . . . .	703 — 705
2. Innerste Haut des Fötus oder Eihaut . . . . .	705 — 711
3. Mutterkuchen und Nabelstrang . . . . .	711 — 721
a. Mutterkuchen . . . . .	711 — 714
b. Nabelstrang . . . . .	714 — 721
4. Nabelblase und Harnhaut . . . . .	721 — 734
a. Nabelblase . . . . .	722 — 736
1. Anwesenheit . . . . .	722 — 723
2. Größe . . . . .	723
3. Lage . . . . .	724
4. Zeit der Entstehung und Dauer . . . . .	724
5. Bau . . . . .	725
6. Verbindung mit dem Embryo . . . . .	725
7. Verrichtung . . . . .	725 — 726
b. Harnhaut . . . . .	726 — 734
Zeit der Entstehung des Eies und Ordnung, in welcher die Theile desselben sich bilden . . . . .	733 — 734
<b>Dritte Abtheilung. Fötus</b>	734 — 764
1. Erstes Sichtbarwerden . . . . .	734 — 736
2. Art der Entstehung . . . . .	736 — 738
3. Gestalt . . . . .	738 — 741
4. Wachsthum . . . . .	741 — 742
5. Lebenserscheinungen des Fötus . . . . .	742 — 761
6. Dauer des Fötuszustandes und Geburt . . . . .	761 — 764
<b>Zweiter Abschnitt. Regelwidrige Bedingungen</b>	765
I. Zeugungstheile . . . . .	765 — 766
II. Neuentstehender Organismus . . . . .	766 — 775
Namenregister . . . . .	776 — 789
Fachregister . . . . .	780 — 820

---

# Besondere Anatomie.

---

## Sechstes Buch.

### Eingeweidlehre<sup>1)</sup>.

S. 1900.

Die Eingeweidlehre oder die Lehre von den Apparaten, (Th. 1. S. 11.) begreift die Beschreibung der zusammengefügtesten Theile des Organismus, welche mehr oder weniger durch das Zusammentreten einzelner Abschnitte der einfachen Organe oder Systeme entstehen. Sie können nicht als Theile von diesen angesehen werden, weil sie zu sehr von ihnen und unter einander verschieden sind, ungesachtet sie sich wesentlich zuletzt auf das Haut- und Drüsen-System zurückführen lassen.

Sie zerfallen in Bezug auf ihre Function wesentlich in zwei Klassen, von welchen die eine zwischen dem Organismus und

---

1) Versuch einer systematischen Darstellung der Splanchnologie für Aerzte, Wundärzte und Naturforscher. Magdeburg 1799. handelt, doch nur sehr kurz und compilirend, die ganze Splanchnologie ab.

H. Gavard Traité de Splanchnologie. Paris, 1809, 8.

Weszel's Anat. 4. Th.

I. Begattungsorgane	Seite 683 — 684
II. Bildungsorgane	684 — 695
A. Eierstöcke	684 — 689
B. Trompeten	689
C. Gebärmutter	689 — 695
<b>Zweite Abtheilung, Entwicklung des neuen Or-</b>	
<b>ganismus</b>	695 — 734
Von den Eihüllen des Fötus	697 — 734
A. Mütterliche Eihaut oder hinfallige Haut	699 — 703
B. Kindeseihäute	703 — 734
1. Gefäßhaut	703 — 705
2. Innerste Haut des Fötus oder Schafhaut	705 — 711
3. Mutterkuchen und Nabelstrang	711 — 721
a. Mutterkuchen	711 — 714
b. Nabelstrang	714 — 721
4. Nabelblase und Harnhaut	721 — 734
a. Nabelblase	722 — 726
1. Anwesenheit	722 — 723
2. Größe	723
3. Lage	724
4. Zeit der Entstehung und Dauer	724
5. Bau	725
6. Verbindung mit dem Embryo	725
7. Verrichtung	725 — 726
b. Harnhaut	726 — 734
Zeit der Entstehung des Eies und Ordnung,	
in welcher die Theile desselben sich bilden	733 — 734
<b>Dritte Abtheilung, Fötus</b>	734 — 764
1. Erstes Sichtbarwerden	734 — 736
2. Art der Entstehung	736 — 738
3. Gestalt	738 — 741
4. Wachsthum	741 — 742
5. Lebenserscheinungen des Fötus	742 — 761
6. Dauer des Fötuszustandes und Geburt	761 — 764
<b>Vielter Abschnitt, Regelwidrige Bedingungen</b>	765
1. Zeugungstheile	765 — 766
II. Neuentstehender Organismus	766 — 775
Namenregister	776 — 780
Sachregister	780 — 820

---

# Besondere Anatomie.

---

## Sechstes Buch.

### Eingeweidlehre<sup>1)</sup>.

S. 1900.

Die Eingeweidlehre oder die Lehre von den Apparaten, (Th. 1. S. II.) begreift die Beschreibung der zusammengesetztesten Theile des Organismus, welche mehr oder weniger durch das Zusammentreten einzelner Abschnitte der einfachen Organe oder Systeme entstehen. Sie können nicht als Theile von diesen angesehen werden, weil sie zu sehr von ihnen und unter einander verschieden sind, ungesachtet sie sich wesentlich zuletzt auf das Haut- und Drüsen-system zurückführen lassen.

Sie zerfallen in Bezug auf ihre Function wesentlich in zwei Klassen, von welchen die eine zwischen dem Organismus und

---

1) Versuch einer systematischen Darstellung der Splanchnologie für Aerzte, Wundärzte und Naturforscher. Magdeburg 1799. handelt, doch nur sehr kurz und compilirend, die ganze Splanchnologie ab.

H. Gavard *Traité de Splanchnologie*. Paris, 1809. 2.

Meckel's Anat. 4. Th.

und der Außenwelt vorzugsweise eine geistige, die andre eine körperliche Beziehung vermittelt. Die erstern sind die Sinnorgane, die letztern die eigentlich sogenannten Eingeweide.

Die erstern nehmen thätig die Eindrücke der Eigenschaften des eignen Körpers und der Außendinge auf, empfinden sie und veranlassen durch die, mittelst ihrer Nerven zum Gehirn fortgepflanzten Eindrücke, Vorstellungen, Veränderungen des geistigen Princip's, dessen unmittelbares Organ jenes ist.

Die letztern nehmen theils fremde Substanzen von außen auf, theils entfernen sie entweder durch den Lebensproceß unbrauchbar gewordne, oder zur Hervorbringung neuer gleichartiger Organismen, mithin der Erhaltung der Art nothwendige, aus dem Organismus. Einige dieser Organe stehen, wie Darmkanal und Lunge, beiden Functionen zugleich vor, andre, wie die Nieren und Zeugungstheile, nur der Auswurf'sfunction. Alle haben das gemeinsame Geschäft, neue Substanz zu bilden, und dadurch den normalen Zustand des Individuums fortdauernd zu erhalten. Die durch die Zeugungstheile gebildete Substanz bewirkt außerdem und vorzugsweise das Bestehen der Art.

So verschieden auch die Resultate und die Wirkungsweise der Sinnorgane und der eigentlichen Bildungsapparate sind, so sind doch jene dem Geiste dasselbe, was diese dem Leibe. Auch machen die niedern Sinne, der des Geruches, des Geschmacks, und des Gefühles, in welchem alle wurzeln, von den höhern, denen des Gesichtes und des Gehöres, einen unmerklichen Uebergang zu den eigentlichen Eingeweiden, sowohl der Form und Lage als der Wirkungsweise nach.



nach. Ferner kann man festsetzen, daß den Sinnwerkzeugen und den eigentlichen Eingeweiden folgende gemeinsame Merkmale zukommen:

- 1) Sie sind Entwicklungen des Hautsystems.
- 2) Sie liegen ganz oder größtentheils in mehr oder weniger vollständigen knöchernen Höhlen.
- 3) Sie sind außerdem von klappenähnlichen Hautfalten, welche mit einfachen Drüsen und Haaren besetzt sind, geschüßt.
- 4) Sie sind in einfacher, oder höchstens doppelter Zahl vorhanden, liegen unter ersterer Bedingung so, daß die beiden Hälften durch die Mittellinie geschieden werden, unter letzterer auf der rechten und linken Seite.

Da das unmittelbare Organ des geistigen Princip's zuletzt betrachtet wurde, so ist es am zweckmäßigsten, zuerst das Organ des geistigen Sinnes, des Gehörs, hierauf das des Gesichtes folgen zu lassen. An dieses schließt sich das Organ des Geruches, auf welches zuletzt das Geschmacksorgan, schon ein Theil des Verdauungsapparates, folgt. Dadurch ist schon der Anfang der Beschreibung des letztern gemacht. Auf ihn folgt zunächst die Darstellung der Werkzeuge des Athmens und der Stimme, dann die der Harnorgane, zuletzt die der Zeugungstheile und der Embryobildung.

und der Außenwelt vorzugsweise eine geistige, die andre eine körperliche Beziehung vermittelt. Die erstern sind die Sinnorgane, die letztern die eigentlich sogenannten Eingeweide.

Die erstern nehmen thätig die Eindrücke der Eigenschaften des eignen Körpers und der Außendinge auf, empfinden sie und veranlassen durch die, mittelst ihrer Nerven zum Gehirn fortgepflanzten Eindrücke, Vorstellungen, Veränderungen des geistigen Princip, dessen unmittelbares Organ jenes ist.

Die letztern nehmen theils fremde Substanzen von außen auf, theils entfernen sie entweder durch den Lebensproceß unbrauchbar gewordne, oder zur Hervorbringung neuer gleichartiger Organismen, mithin der Erhaltung der Art nothwendige, aus dem Organismus. Einige dieser Organe stehen, wie Darmkanal und Lunge, beiden Functionen zugleich vor, andre, wie die Nieren und Zeugungstheile, nur der Auswurffunction. Alle haben das gemeinsame Geschäft, neue Substanz zu bilden, und dadurch den normalen Zustand des Individuums fortdauernd zu erhalten. Die durch die Zeugungstheile gebildete Substanz bewirkt außerdem und vorzugsweise das Bestehen der Art.

So verschieden auch die Resultate und die Wirkungsweise der Sinnorgane und der eigentlichen Bildungsapparate sind, so sind doch jene dem Geiste dasselbe, was diese dem Leibe. Auch machen die niedern Sinne, der des Geruches, des Geschmacks, und des Gefühls, in welchem alle wurzeln, von den höhern, denen des Gesichtes und des Gehöres, einen unmerklichen Uebergang zu den eigentlichen Eingeweiden, sowohl der Form und Lage als der Wirkungsweise nach.

nach. Ferner kann man festsetzen, daß den Sinnwerkzeugen und den eigentlichen Eingeweiden folgende gemeinsame Merkmale zukommen:

- 1) Sie sind Entwicklungen des Hautsystems.
- 2) Sie liegen ganz oder größtentheils in mehr oder weniger vollständigen knöchernen Höhlen.
- 3) Sie sind außerdem von klappenähnlichen Hautfalten, welche mit einfachen Drüsen und Haaren besetzt sind, geschüßt.
- 4) Sie sind in einfacher, oder höchstens doppelter Zahl vorhanden, liegen unter ersterer Bedingung so, daß die beiden Hälften durch die Mittellinie, geschieden werden, unter letzterer auf der rechten und linken Seite.

Da das unmittelbare Organ des geistigen Princips zuletzt betrachtet wurde, so ist es am zweckmäßigsten, zuerst das Organ des geistigen Sinnes, des Gehörs, hierauf das des Gesichtes folgen zu lassen. An dieses schließt sich das Organ des Geruches, auf welches zuletzt das Geschmackorgan, schon ein Theil des Verdauungsapparates, folgt. Dadurch ist schon der Anfang der Beschreibung des letztern gemacht. Auf ihn folgt zunächst die Darstellung der Werkzeuge des Athmens und der Stimme, dann die der Harnorgane, zuletzt die der Zeugungstheile und der Embryobildung.

## Erstes Hauptstück.

Von den Sinnwerkzeugen<sup>1)</sup>.

S. 1901.

Alle Sinnwerkzeuge kommen, durch folgende Bedingungen mit einander überein:

1) Alle liegen am Kopfe. Am weitesten nach hinten und ganz am Schädel befindet sich das Gehörorgan, so, daß die beiden Seitenhälften völlig von einander getrennt sind, und am meisten auf der Seite liegen. Die Höhle, welche das Gehörorgan einnimmt, wird zum Theil durch Knochen des Schädels; größtentheils aber des Antlitzes, gebildet. Die des Geruchsorgans besteht noch mehr, fast ganz, aus Antlitzknochen, indem das Riechbein in der That mehr dem Antlitz als dem Schädel angehört. Die Höhle der Zunge wird ganz aus Antlitzknochen zusammengesetzt. Zugleich nähern sich von dem

1) Jul. Cafferii Macantini *Pentaelesihejor* h. e. de quinque sensibus liber, organorum fabricam, usum et actionem continens. Venet. 1609 fol. Mehrere Ausgaben unter verschiedenen Titeln.

A. de Haller de sensibus in genere Gotting. 1742.

Le Cat traité des sens. Avec figures en taille douce. à Amsterdam. 1744.

E. Th. Sommerring Abbildungen der menschlichen Sinnorgane. Frankfurt a. Main. 1809.

Andere Schriften, die mehrere Sinnorgane zugleich betrachten, werden bei demjenigen, welches zuerst beschrieben wird, angeführt werden.

Gehörorgan bis zum Organ des Geschmacks allmählich die rechte und linke Hälfte, bis sie zuletzt in der Zunge völlig zu einem Ganzen zusammenfließen.

2) Alle stehen mit dem Gehirn durch starke und kurze Nerven im Zusammenhange. Der Gehörnerv ist der kürzeste und verhältnißmäßig stärkste, und steht mit dem Innersten des Gehirns, aus der Kautengrube, wie aus einer eignen Höhle, entspringend, im nächsten Zusammenhange.

3) Alle erhalten ihre Nerven wenigstens aus zwei Paaren. Der eine, stärkere, von diesen Nerven führt den Namen des Sinnesnerven, der andre, schwächere, den des Hülfsnerven. Der Sinnesnerv ist bei dem Organ des Gehörs, des Gesichtes, des Geruches ein eignes Paar, der Hörnerv, Sehnerv und Riechnerv bei dem Geschmacksorgan ein Zweig des dreigetheilten Nerven. Die gemeinschaftliche Quelle der Hülfsnerven ist der dreigetheilte Nerv; außerdem aber auch der Zungenbewegende Nerv, der Zungenschlundkopfnerv; der Antlignerv, die drei Augenbewegenden Nerven, und der Gangliennerv. Schon die Namen mehrerer dieser Nerven beweisen, daß die Hauptfunction der Hülfsnerven Bewegung des Sinnorganes ist. Nur das Geruchsorgan macht hiebon zum Theil eine Ausnahme, indem seine eigenthümlichen Hülfsnerven sich, wie sein Sinnesnerv, in der Schleimhaut der Nase verbreiten. Zwischen den Sinnesnerven und den Hülfsnerven findet nicht nothwendig Verbindung Statt. Sie fehlt in den Organen des Gehörs und des Gesichtes, ist schwach und wahr-

scheinlich unbeständig in dem Organ des Geruchs, und nur deutlich entwickelt in der, dem allgemeinen Gefühlsorgan ähnlichsten Zunge.

4) Die eigentlichen Sinnesnerven breiten sich mehr oder weniger deutlich als eine weiche Membran aus, welche zunächst durch eine Feuchtigkeit, über dieser durch ein, der Oberhaut ähnliches, Gewebe bedeckt wird.

5) Alle stehen durch engere oder weitere Verbindungsgänge, Fortsätze der Schleimhaut, welche einen Theil von ihnen ausmacht und desto mehr ihre Grundlage bildet, je niedriger sie sind, in Verbindung. Je ähnlicher sie, wie das Organ des Geruches und des Geschmacks, einander sind, desto freier ist diese Verbindung, so daß beide in frühen Lebensperioden, wo der Gaumen sich noch nicht als Scheidewand zwischen ihnen gebildet hat, völlig ein Ganzes bilden, und auch der Zusammenhang zwischen ihnen und den übrigen desto größer ist, je näher sich der Embryo seinem Ursprunge befindet.

In der That ist mehr oder weniger deutlich das Hautsystem<sup>1)</sup> der Prototyp aller Sinnorgane und das äußere der Sitz des Gefühls, so wie Hand und Fuß<sup>2)</sup>, vorzüglich aber die erstere, der besondern Abänderung des Gefühls, welche den Namen des Tactens erhält.

Erster

1) S. Bd. 1. S. 569 — 626.

2) S. die Topographie dieser Theile in den betreffenden Abschnitten der Knochen-, Bänder-, Muskel-, Gefäß- und Nervenlehre. Bd. 2 und 3.



Erster Abschnitt.

Vom Gehörorgan<sup>1)</sup>.

§. 1902.

Das Gehörorgan oder das Ohr, befindet sich an dem mittlern Theile der Seitenfläche und der Grundfläche des Schädels, in und an dem Schlafbein (Th. 2. S. 107.), gehört also, als Organ des edelsten und geistigsten Sinnes, auch räumlich ganz dem Schädel an, steht mit dem Gehirn in nächster Verbindung, und ist unter allen am meisten geschützt.

Es besteht aus einer ansehnlichen Menge durch Gewebe und äußere Gestalt sehr verschiedner Theile, welche man am Allgemeinsten in das äußere und innere Ohr (Auris externa et interna) theilt.

Erste

1) Schriftsteller:

G. Fallopi in dessen Observ. anatom. Venet. 1561. 8. Opp. omn. Tom. I. Tract. II.

B. Eustachius de auditus organo. In opusc. anat. Venet. 1564. 4.

H. Fabricius ab Aquapendente de visione, voce et auditu. Venet. 1688. fol.

J. Mery description exacte de l'oreille. Paris. 1677. 12.

G. du Verney traité de l'organe de l'ouïe contenant la structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille. à Paris. 1685. 8. Uebersetz von Nischel, Berlin 1732.

G. C. Schellhammer de auditu liber unus. Lugd. Bat. 1684. 8.

## Besondere Anatomie.

### Erste Abtheilung.

#### Gehörorgan im regelmäßigen Zustande.

#### Erste Unterabtheilung.

#### W o l l k o m m e n e r    Z u s t a n d.

#### I. Äußeres Ohr<sup>\*)</sup>.

§. 1903.

Das äußere Ohr wird durch den mit den allgemeinen Bedeckungen genau bekleideten Ohrknorpel, den knorpeligen Gehörgang und mehrere Muskeln gebildet, welche sich an verschiedene Theile des erstern heften.

#### A. Ohr.

A. M. Valsalva Tractatus de aure humana. Bonon. 1704. 4.

R. Vieussens traité de la structure de l'oreille. Toulouse, 1714. 4.

J. F. Cassebohm Tractatus quatuor de aure humana, c. Fig. Halae. 1734.

Ejusdem Tractatus quintus et sextus de aure humana. c. Fig. Halae. 1735.

J. B. Morgagni Epist. anatom. Ep. IV. V. VII. XII. XIII.

Geoffroy dissertations sur l'organe de l'ouïe, 1) de l'homme; 2) des reptiles; 3) des poissons. à Amsterdam. 1788. 8.

C. F. C. Wildberg Versuch einer anatomisch, physiologisch, pathologischen Abhandlung über die Gehörwerkzeuge des Menschen. Jena. 1795.

J. Cunningham Saunders the anatomy of the human ear, illustrated by a Series of Engravings, of the natural size with a treatise on the diseases of that organ, the causes of deafness and their proper treatment. 1806. 2. Edit. posth. 1817.

\*) D. Santorini de aure exteriore. Observat. anatom. Venet. 1724. Cap. II.

## Sechstes Buch. Eingeweiðlehre.

9

### A. Ohrknorpel <sup>1)</sup>.

§. 1904.

Der Ohrknorpel (*Cartilago auris*) hat im ganzen die Gestalt eines kurzen, mit einer weiten, ovalen, von oben nach unten beträchtlich mehr langen als von vorn nach hinten breiten Mündung versehenen Trichters, welcher nach außen gegen diese Mündung hin, durch mehrere Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich wird.

1) Die äußerste, alle übrigen größtentheils umgebende Erhabenheit ist die Ohrleiste (*Helix*).

Diese nimmt in der Mitte des vordern Randes ihren Anfang, steigt anfangs bis zum obern Ende des Ohrknorpels nach oben, wendet sich dann nach hinten, hierauf nach unten und hört gegen das untere Ende des Ohres allmählich auf.

2) Eine zweite, von der vorigen eingeschlossene, Erhabenheit, die Gegenleiste (*Anthelix*), steigt unten und hinten, nahe vor dem untern Ende der Leiste, nach oben und vorn, entfernt sich etwas von dieser, und spaltet sich gegen ihr oberes, vorderes Ende in zwei Schenkel, einen obern und einen untern, welche bis gegen den aufsteigenden Theil der Leiste verlaufen, wo sie sich allmählich endigen.

3) Eine dritte viereckige Erhabenheit befindet sich dem Anfange der Leiste gegenüber, und bildet den vordern und untern Theil des Ohrknorpels, die Gasse (*Tragus*).

4) Ihr gegenüber nach hinten liegt eine ähnliche, durch einen Einschnitt von ihr getrennte, die Gegengasse, (*Antitragus*) in welche die Leiste und Gegenleiste auslaufen.

¶ 5

§. 1905.

---

1) B. S. Albinus de cartilagine auriculae. Ann. acad. Lib. VI. Cap. VII. Tab. IV.

## §. 1905.

Die zwischen diesen, nach außen vorspringenden, Erhabenheiten befindlichen Vertiefungen sind:

1) Die zwischen dem hintern Theile der Leiste und der Gegenleiste verlaufende, nach vorn concave, nach hinten gewölbte kahnförmige Grube (*Fossa scaphoidea*).

2) Die zwischen den beiden Schenkeln der Gegenleiste liegende ungenannte, oder dreieckige, oder eiförmige Grube (*F. anonyma* *l. triangularis* *l. ovalis*).

3) Der zwischen der Leiste, der Eck- und Gegenecke liegende Eingang zum knorpeligen Gehörgang, oder die Ohrmuschel (*Concha auris*).

4) Der zwischen der Leiste und Eck- befindliche Einschnitt des Ohres (*Incisura auris*).

## §. 1906.

Der untere Theil des äußern Gehörs, oder das Ohrläppchen (*Auricula* *l. lobulus auris*) hat keine knorpelige Grundlage, sondern ist bloß ein häutiger, mit Fett und Schleimgewebe angefüllter Fortsatz.

Der Ohrknorpel selbst ist in seinem untern Theile in einen nach oben offenen Halbkanal, den knorpeligen Gehörgang (*Meatus auditorius cartilagineus*) ausgezogen, welcher im vordern Theile der Ohrmuschel seinen Anfang nimmt, hier von der Eck- mehr oder weniger flappenartig verborgen wird, anfangs in querrer Richtung von außen nach innen, oder selbst anfänglich etwas von unten nach oben, dann in seinem größern Theile von oben und vorn nach unten und hinten absteigt, in dem obern Theile seines Umfangs durch die lange hintere

tre Wurzel des Fortsatzes des Schlasbeins, und unter dieser durch Fasergewebe vervollständigt wird.

Der Knorpel des Gehörganges selbst, der nur eine Fortsetzung des Ohrknorpels ist, wird gewöhnlich an mehreren Stellen seines Umfangs unterbrochen.

Die vorzüglichste Lücke findet sich da, wo der Gehörgang seine Richtung auf die angegebne Weise verändert. Hier hängen der innere und äußere Theil des Gehörgangsknorpels nur vorn und oben durch einen schmalen Streifen unter einander zusammen.

Eine kleinere, auf entgegengesetzte Weise vom obern Rande durch den vordern Theil des Umfangs des Knorpels verlaufende findet sich meistens im äußern Theile des Knorpels.

Der knorpelige Gehörgang ist von vorn nach hinten beträchtlich kürzer als von oben nach unten, ungefähr einen Zoll lang, vier Linien hoch, drei breit, und erstreckt sich in dem untern Theile seines Umfangs einige Linien weiter nach innen und unten als im obern.

Er wird durch ein kurzes, festes Schleimgewebe an die benachbarten Theile des Schlasbeins, und namentlich an seiner innern Mündung an die rauhe, äußere Oeffnung des k n d s h e r n e n G e h ö r g a n g e s , der eine Fortsetzung von ihm ist, geheftet.

#### §. 1907.

Der ganze Ohrknorpel wird an seiner äußern und innern Fläche durch die Haut, welche sich genau an die Ungleichheiten desselben heftet, bekleidet. Von außen nach innen wird sie allmählich dünner, feuchter, schleimhautähnlicher. Der Eingang

gang des Gehörgangs ist gewöhnlich mit zarten, dicht stehenden Härchen besetzt. Die Haut desselben enthält an ihrer innern Fläche eine beträchtliche Menge ansehnlicher, runder Oeffnungen, welche zu einer dicken, röthlichen, sie umgebenden Drüsenhaut, führen, die das *Ohrschmalz* (*Cerumen aurium*), eine dicke, gelbliche, fleischige, sehr brennbare, aus einem fetten Oele, einer eiweißartigen, eigenartigen Substanz und einem Farbstoff bestehende, Flüssigkeit absondern.

### B. Muskeln des äußern Ohrs \*).

#### §. 1908.

Der Ohrknorpel erhält eine ansehnliche Menge von, meistens kleinen und dünnen, Muskeln, welche in zwei Klassen zerfallen können. Von diesen begreift die erste die, welche das ganze äußere Ohr bewegen, und dadurch die Lage und Richtung desselben verändern, die zweite die, welche, durch Bewegung einzelner Gegenden desselben, mehr oder weniger beträchtliche Abänderungen seiner Gestalt hervorbringt.

#### I. Muskeln, welche das ganze äußere Ohr bewegen.

#### §. 1909.

Diese sind a) der Heber des Ohrs; b) die Rückwärtszieher; c) der Vorwärtszieher des Ohrs.

##### a. Heber

1) D. Santorini observat. anat. Cap. I. Tab. I. ejusdem Tab. posth. Tab. I.

A. F. Walther Anatomie teneriorum musculorum c. h. repetita. Mit der Santorinischen Tafel.

## a. Heber des Ohres.

## §. 1910.

Der Heber des Ohres (*Attollens auriculae*), der ansehnlichste unter allen Ohrmuskeln, kommt dünn, dreieckig, von dem mittlern Theile der Sehnenhaube des Kopfes und der Sehnenausbreitung des Schläf Muskels, zieht sich von vorn nach hinten zusammen, und heftet sich an die Erhabenheit des Ohrknorpels, welche der dreieckigen Vertiefung zwischen beiden Schenkeln der Gegenleiste entspricht.

Er zieht das Ohr in die Höhe, vorzüglich, wenn zugleich der Schädelmuskel (Th. 2. S. 479.) von dessen mittlern Sehne er entspringt, wirkt.

## b. Rückwärtszieher des Ohres.

## §. 1911.

Es finden sich gewöhnlich drei, bisweilen auch nur zwei, seltner vier, wovon der untere sehr dünn ist, immer von oben nach unten über einander liegende Rückwärtszieher, (*Retrahentes auriculae*) die als sehr kleine, dünne, längliche Muskeln vom Zigenfortsatz entspringen, und sich mit kurzen Sehnen an den mittlern Theil der äußern Fläche des Ohres, der Erhabenheit, welche hier dem Eingange zum Gehörorgan entspricht, gegenüber, anheften.

Oft sind sie an ihrem hintern Ende mit dem Hinterhauptsmuskel, oder dem durchflochtenen oder Kopfnicker verwebt.

Sie ziehen das Ohr nach hinten und öffnen die Muschel etwas.

## a. Vornwärtszieher des Ohres.

§. 1912.

Der Vornwärtszieher des Ohres (*Attrahens auricularae*) gleichfalls sehr klein, doch meistens etwas größer als die Rückwärtszieher, entspringt über dem Jochbogen von der Sehnenhaube, geht nach hinten und etwas nach unten, zieht sich allmählich zusammen, und heftet sich, zusammengezogen, durch eine kurze Sehne an den untern und vordern queren Anfang der Leiste.

## 2. Muskeln, welche einzelne Theile des Ohres bewegen.

§. 1913.

Die Muskeln, welche einzelne Theile des Ohres bewegen, sind äußerst klein und schwach, vorzüglich im Kulturzustande, wo sie wenig oder gar nicht geübt werden, wenig im Stande, Bewegungen hervorzubringen und nur Andeutungen der Muskeln, welche bei Säugthieren weit höher entwickelt sind. Alle sind dünn und mit ihrer ganzen innern Fläche an den Theil des Ohres geheftet, welchen sie bewegen.

Sie sind der Muskel der Ecke, der Gegenecke, der größere und kleinere Muskel der Leiste und der Quermuskel des Ohres.

## a. Muskel der Ecke.

§. 1914.

Der Muskel der Ecke (*M. tragicus*) ist länglich vierseitig, entsteht von dem untern und vordern Theile der Ohrmuschel, dicht unter der Ecke, bedeckt diese von außen, und wendet sich mit seinem obern Rande dicht unter dem untern Ende derselben



derselben, über welche hinaus er selten bis zum untern Ende des vordern Randes der Leiste reicht, und sich dann selbst mit dem großen Leistenmuskel verbindet.

Er wendet die Ecke nach außen, und verdeckt dadurch den Eingang der Ohrmuschel.

#### b. Muskel der Gegenecke.

§. 1915.

Der Muskel der Gegenecke (*M. antitragicus*) entsteht vom obern Ende der äußern Fläche der Gegenecke, und heftet sich an das untere Ende der Gegenleiste.

Zieht beide gegeneinander, wendet die Gegenecke etwas nach hinten und außen.

#### c. Großer Leistenmuskel.

§. 1916.

Der große Leistenmuskel (*M. helcis major*), ein länglicher Muskel, entsteht vom untern Ende des Umfangs der Leiste, steigt an der äußern und vordern Fläche derselben herauf, und heftet sich an diese, dicht über der Stelle, wo sich das Ohr vom Kopfe entfernt.

Er zieht den vordern Theil der Ohrmuschel etwas nach hinten und unten.

#### d. Kleiner Leistenmuskel.

§. 1917.

Der kleine Leistenmuskel (*M. helcis minor*), unter allen der kleinste, entsteht, weiter nach hinten und unten als der vorige, gleichfalls an der äußern Fläche der Leiste liegend, von dieser da, wo sie aus der Ohrmuschel tritt, und heftet

heftet sich einige Linien höher an den aufsteigenden Theil derselben, in der Gegend des hintern Randes.

Zieht den vordern Theil der Leiste etwas herab.

#### e. Querer Ohrmuskel.

1918.

Der quere Ohrmuskel (*Transversus auriculae*), liegt an der innern, dem Kopfe zugewandten Fläche der Ohrmuschel, ist größer, aber aus weniger zusammenhängenden, meistens auch weniger deutlich fleischigen Faserbündeln gebildet als die vorigen, und erstreckt sich in größtentheils querrer Richtung von der Gegenleiste in die kahnförmige Grube.

Wendet die kahnförmige Grube und die Leiste nach außen, und erweitert dadurch den Eingang des Ohrs.

## II. Inneres Ohr 1).

§. 1919.

Das innere Ohr wird 1) durch einen ansehnlichen Theil des Schläfbeines, namentlich den Felsen- und Zügentheil desselben; 2) durch die drei Gehörknöchelchen, welche nur mit denselben beweglich verbunden sind; 3) durch sie bewegende Muskeln; 4) durch einen knorpeligen Gang, welcher es mit der Mundhöhle in Verbindung setzt;

1) C. Folii nova auris internae delineatio. Venet. 1645. rec. in Halleri coll. diss. T. IV. p. 365. seqq. e. icone.

B. S. Albinus de aure humana interiore, Annot. acad. Lib. IV. Cap. II.

A. Comparetti observationes anatomicae de aure interna comparata. Patavii 1789.

A. Monro on the brain, the eye and the ear. Edinb. 1797.

tre Wurzel des Fortsatzes des Schlasbeins, und unter dieser durch Fasergewebe vervollständigt wird.

Der Knorpel des Gehörganges selbst, der nur eine Fortsetzung des Ohrknorpels ist, wird gewöhnlich an mehreren Stellen seines Umfangs unterbrochen.

Die vorzüglichste Lücke findet sich da, wo der Gehörgang seine Richtung auf die angegebne Weise verändert. Hier hängen der innere und äußere Theil des Gehörgangsknorpels nur vorn und oben durch einen schmalen Streifen unter einander zusammen.

Eine kleinere, auf entgegengesetzte Weise vom obern Rande durch den vordern Theil des Umfangs des Knorpels verlaufende findet sich meistens im äußern Theile des Knorpels.

Der knorplige Gehörgang ist von vorn nach hinten beträchtlich kürzer als von oben nach unten, ungefähr einen Zoll lang, vier Linien hoch, drei breit, und erstreckt sich in dem untern Theile seines Umfangs einige Linien weiter nach innen und unten als im obern.

Er wird durch ein kurzes, festes Schlinggewebe an die benachbarten Theile des Schlasbeins, und namentlich an seiner innern Mündung an die rauhe, äußere Oeffnung des Fndsherren Gehörganges, der eine Fortsetzung von ihm ist, geheftet.

§. 1907.

Der ganze Ohrknorpel wird an seiner äußern und innern Fläche durch die Haut, welche sich genau an die Ungleichheiten desselben heftet, bekleidet. Von außen nach innen wird sie allmählich dünner, feuchter, schleimhautähnlicher. Der Eingang

## 2. Paukenfell 1).

## §. 1921.

Das in der innern Mündung des Gehörganges ausgespannte Trommel- oder Paukenfell (*Membrana tympani*), sondert den Gehörgang von dem darauf folgenden Theile des innern Ohres, der Pauke, ab.

Es ist eine elliptische, dünne, etwas schief von oben, außen und hinten, nach unten, innen und vorn gerichtete Haut, welche im normalen Zustande, ungeachtet diese Meinung verschiedentlich vorgetragen wurde, durchaus keine Oeffnung enthält, also die Paukenhöhle und das Labyrinth von dem knöchernen Gehörgange und dem äußern Ohre vollständig abgränzt. Indem es etwas größer als die Oeffnung ist, die es verschließt, ist es verschiedene Gestalten anzunehmen fähig, welche mit den verschiedenen Graden seiner Anspannung und Erschlaffung im Zusammenhange stehen, und daher zum Theil durch die Muskeln der Gehörknöchelchen bewirkt werden. Es ist in den Hals, der sich in dem innern Ende des knöchernen Gehörganges, anfangs dem Ringe, befindet, genau eingepaßt.

Die Zusammensetzung des Paukenfelles wird nicht von allen Anatomen gleichmäßig angegeben. Am richtigsten nimmt man eine eigne, mittlere, und eine äußere, durch die Haut des knöchernen Gehörganges, eine innere, durch die Schleimhaut der

1) A. F. Walther de membrana tympani. *Lipl. rec. in Halleri coll. diss. anat. T. IV.*

Brugnone. *Observations anatomiques sur la structure de la membrane du tympan et de celle de la caisse. In Mém. de Turin. An VII. p. I — II.*

E. Home über das Trommelfell. *Phil. Tr. 1804. daraus übersetzt in Gilbert's Annalen 1809.*

der Pauke gebildete Schicht an, welche die erste einschließen und in die häutige Bekleidung jener Theile ununterbrochen übergehen, also blinde Verlängerungen des äußern und innern Hautsystems an diesen Stellen sind, wogegen die mittlere Schicht für sich besteht, und von dem knöchernen Gehörgange entspringt.

Diese eigne Haut des Trommelfelles enthält deutliche, vom Umfange zu ihrem Mittelpunkte zusammenstrahlende Fasern, welche vorzüglich an der innern Seite sichtbar, und, nach der Analogie größerer Thiere, namentlich des Elephanten, höchst wahrscheinlich muskelähnlich sind. Auch weisen gut gelungene Einspritzungen eine ansehnliche Menge von Blutgefäßen nach, die vorzüglich aus zwei kreisförmigen Stämmen, einem äußern und einem innern, kommen, und vielfach mit einander zusammenmünden.

Von den beiden oberflächlichen Schichten läßt sich vorzüglich die äußere leicht, die innere, sowohl ihrer größern Feinheit als genauern Befestigung wegen, schwerer von der mittlern absondern.

## B. Mittlerer Theil.

### 1. Paukenhöhle <sup>1)</sup>.

§. 1922.

Die Pauke, Trommel, Paukenhöhle (Tympanum s. *cavitas tympani*), eine enge, rundliche, im Allgemeinen nach innen gewölbte, nach außen durch eine weite, vom Trommelfell verschlossene Oeffnung in den knöchernen Gehörgang, nach vorn durch eine enger in die Trompete übergehende Höhle, bildet den mittlern Theil des innern

B 2

Ohrres,

1) D. Santorini Opp. posthum. Tab. V.

Ohr, und wird von einigen auch im Gegensatze zum Labyrinth und allen nach außen von ihr liegenden Theilen mit dem Namen des mittlern Ohrs belegt. Sie nimmt den äußern und hintern Theil des Felsenbeins ein, hängt nach vorn durch eine Oeffnung mit der Mundhöhle, nach hinten mit den Zellen des Eigenthums zusammen, ist an ihrer innern Fläche durch eine Menge von Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich, welche mit dem Labyrinth in Beziehung stehen, und enthält die Gehörknöchelchen und die Paukensehne.

Sie ist, wenn der Knochen allein betrachtet wird, nach vorn, hinten und unten offen, in ihrem ganzen Umfange durch eine zarte Schleimhaut, die Fortsetzung der Rachenhaut, bekleidet.

#### §. 1923.

An der innern Fläche der eigentlichen Pauke findet sich vorn und unten, ungefähr in der Mitte von vorn nach hinten, ein ansehnlicher Vorsprung, das Vorgebürg (Promontorium), welcher durch den Anfang der, indessen von Knochensubstanz bedeckten, Schnecke des Labyrinths gebildet wird.

An seinem untern und hintern Theile zeigt sich eine rundlich dreieckige, längliche, mehr hohe als breite, nach hinten und außen gewandte Oeffnung, das runde Fenster (Fenestra rotunda)<sup>1)</sup>, die Paukenöffnung der Schnecke, welche aber nicht offen, sondern durch die, die ganze Paukenhöhle bekleidende Schleimhaut verschlossen ist.

Ueber dem Vorgebürg liegt, etwas über der Mitte der Pauke, eine zweite, weit ansehnlichere Oeffnung, das eiförmige,

1) A. Scarpa de structure fenestrae rotundae auris et de tympano secundario anatomicae observationes. Mutinae 1772.

nige, richtiger halbeiförmige Fenster (*Fenestra ovalis* l. *lemiovalis*) von oben und vorn nach unten und hinten mit dem längsten Durchmesser gerichtet, beträchtlich mehr lang als breit, mit einem hintern gewölbten, einem vordern geraden Rande versehen, und nach außen von einem kleinen Falt umgeben.

An der hintern Wand der Paukenhöhle steigt, dem untern Ende des halb ovalen Fensters gegenüber, weiter nach hinten und beträchtlich weiter nach außen, die kleine dreieckige Erhabenheit (*Eminentia pyramidalis*) hervor, welche sich vorn mit einer deutlichen Oeffnung endigt, hohl ist, mit dem Gallopischen Gange (Th. 2. S. 109.) zusammenhängt, und von deren vordern Ende nach innen oft eine kleine subserne Brücke zum obern Ende des Vorgebürges, unter dem ovalen Fenster verläuft.

Weiter nach unten und hinten befindet sich eine zweite Oeffnung, durch welche die Paukensaite aus dem Gallopischen Gange in die Paukenhöhle tritt, die Paukensaitenöffnung (*Apertura chordae*).

Der, zwischen der dreieckigen Erhabenheit, dem Vorgebürge und dem ovalen Fenster befindliche Raum bildet eine beträchtliche Vertiefung (*Sinus tympani*).

Oben und in der Mitte ist die Paukenhöhle zur Aufnahme des obern Theiles der beiden größern Gehörknöchelchen ausgezogen.

Oben und hinten hängt sie durch eine oder mehrere ansehnliche Oeffnungen mit dem Innern des Zigenfortsatzes zusammen, der also in der That nur die nach hinten verlängerte Paukenhöhle ist, und durch eine Menge von Fächern in Zellen abgetheilt wird, welche sich gegen seinen Umfang beträchtlich

vergrößern und durch dieselbe Schleimhaut bekleidet werden, welche die innere Fläche der Paukenhöhle überzieht.

Im vordern Theile enthält die innere Wand der Paukenhöhle eine Rinne, welche zu einer knöchernen, nach vorn gerichteten Verlängerung, der knöchernen Ohrtrompete (Tuba Eustachii ossea) führt; über dieser eine kleinere, zu einer zweiten, oft von dieser nur unvollkommen abgegränzten Rinne führende, welche den Spanner des Trommelfelles aufnimmt.

Unter dem hintern Ende von dieser befindet sich eine kleine Oeffnung, welche nach oben zur oberflächlichen Felsenfurche, nach unten zu einer, über das Vorgebürge herabsteigenden, Rinne führt. Diese verwandelt sich unten in einen Kanal, welcher sich an der untern Fläche der Pyramide zwischen dem Kanal der Kopfpulsader und der Halsblutaderfurche nach außen öffnet.

Dies ist der Weg eines Verbindungsnerven zwischen dem zweiten Aste des dreigetheilten, dem Zungenschlundnerven und dem Gangliennerven, der als ein feiner Zweig vom oberflächlichen Felsennerven in der Paukenhöhle mit einem aus dem Karotidenkanal tretenden Zweige vom Gangliennerven, unterhalb derselben mit dem Knoten des Zungenschlundnerven zusammenfließt <sup>1)</sup>.

## 2. Eustachische Trompete.

§. 1924.

Die Eustachische Trompete, Ohrtrompete (Tuba Eustachii) ist ein, in seinem hintern Theil knöcherner, in seinem

1) Jacobson *supplementa ad Otoiatricam*. Act. Hafn. Vol. V. 1818. p. 292 ff.



seinem vordern aus Faserknorpel und Fasergewebe gebildeter, beinahe zwei Zoll langer Gang, der aus der Paukenhöhle schief von oben, außen und hinten nach unten, innen und vorn in den obern Theil des Schlundkopfes führt.

Der kürzere knöcherne Theil, die knöcherne Ohrtrumpete, liegt über dem Kopspulsaderkanal, verengt sich von hinten nach vorn, der knorpelige, die knorpelige Ohrtrumpete, welcher dicht unter der Schädelgrundfläche verläuft, erweitert sich dagegen in derselben Richtung, ist in seinem ganzen Verlauf von innen nach außen zusammengedrückt, elliptisch, besteht nur in dem inneren, bisweilen, aber nicht immer, auch in dem obern Theile des äußern Abschnittes seines Umfangs aus Faserknorpel, in dem übrigen aus, von der Reinhaut des untern Keilbeinflügels stammendem, Fasergewebe.

Die ganze Ohrtrumpete wird inwendig durch eine zarte Schleimhaut, welche durch sie aus der Mundhöhle in die Paukenhöhle dringt, bekleidet. Diese schwillt, zum Theil durch starke Entwicklung von Schleimdrüsen, an der Mundöffnung der Ohrtrumpete beträchtlich an, und bildet dadurch einen Wulst, der diese Oeffnung in eine enge Längenspalte verwandelt, und eine Art von Klappe bildet.

### 3. Gehörknöchelchen <sup>1)</sup>.

§. 1925.

Die in dem obern Theile der Paukenhöhle liegenden Gehörknöchelchen (*Officula auditus*), die kleinsten im Körper, bilden eine, aus beweglich verbundenen Gliedern zusammengesetzte

B 4

setze

1) H. F. Teichmeyer diff. medica solennis fistens vindictam quorundam iuventorum anatomicorum etc. Lips. 1727.

setzte Kette, welche von dem Trommelfelle an zum ovalen Fenster, mithin dem Labyrinth, reicht, und die Veränderungen, welche das Trommelfell erleidet, dem innersten Theile des innern Ohres mittheilt.

Es finden sich drei, der Hammer, Ambos und Steigbügel, in frühern Perioden ein vierter, der Einsenknochen.

#### a. Hammer.

§. 1926.

Der Hammer (Malleus) liegt am meisten nach vorn und außen, und wird in Kopf, Hals, Griff oder Handhabe und Fortsätze eingetheilt.

Der Kopf ist der oberste, länglich rundliche Theil, vorn gewölbt, glatt, hinten vertieft und etwas rauh. Diese längliche, hintere Fläche ist von einem erhabnen Rändchen umgeben, und wird durch eine quere Erhabenheit in eine obere und untere Fläche abgetheilt.

Er liegt über dem untern Rande des Trommelfelles in dem vordern Theile der obern Verlängerung der Paukenhöhle.

Der kurze Hals ist von allen Seiten zusammengezogen, besonders von außen nach innen etwas plattgedrückt.

An seinem untern Ende ist er in drei Zacken, die Handhabe und die beiden Fortsätze gespalten.

Die Handhabe (Manubrium), die untere, etwas nach innen und vorn absteigende, unten mit einem Knöpfchen gegenständige Zacke, liegt zwischen den Blättern des Paukenfelles.

Der äußere, oder kurze, kumpfe Fortsatz (Processus externus, obliquus s. brevis) ragt am obern Ende der Handhabe, vom Kopfe durch einen tiefen Einschnitt, in welchen  
der

der obere Umfang des innern Endes des Gehörganges paßt, getrennt, mehr oder weniger stark unter einem rechten Winkel nach außen vor.

Der vordere, lange, Stachelfortsatz (Processus anterior l. longus l. spinosus) ist dünner, aber beträchtlich länger; nach vorn zugespitzt, nach oben gerodt, nach unten ausgehöhlt, und wird von einer breiten, flachen, in der innern Fläche des obern Endes des Trommelfellringes befindlichen Rinne aufgenommen.

Der Hammer verbindet sich mit dem Paukensehle und dem Amboss.

#### b. A m b o s s.

##### §. 1927.

Der Amboss (Incus), hat ungefähr die Gestalt eines Winkelmaasses, oder eines mit zwei Wurzeln versehenen Backzahnes, und besteht aus zwei Schenkeln und einem mittlern Theile, den man den Körper nennen kann.

Dieser ist ungefähr viereckig, plattgedrückt, vorn mit einer vertieften Gelenkfläche versehen, wodurch sich der Amboss mit der Gelenkfläche am Kopfe des Hammers (§. 1926.) verbindet, und liegt über dem Paukensehle.

Der obere, hintere, kürzere, von innen nach außen plattgedrückte, stumpfzugespitzte, gleichfalls über dem Paukensehle liegende Schenkel, verläuft horizontal von vorn nach hinten, und ist hier frei geendigt.

Der vordere, ziemlich gerade, von oben nach unten, und von hinten nach vorn absteigende, längere oder kleinere

rundliche, weiter nach innen gelegene, mit einer kleinen, knospenartigen Anschwellung gewandigte Schenkel, liegt hinter der Handhabe des Hammers, etwas weiter nach außen.

Der Amboss verbindet sich durch seinen Körper oben und vorn mit dem Kopfe des Hammers, unten durch den langen Schenkel mit dem Steigbügel, ringsum mit dem Trommelfelle.

#### c. Einfenkels.

§. 1928.

Das Einfenkel (Os lenticulare [Sylv]), ein äußerst kleiner, an der innern Fläche dieses unteren Endes des langen Schenkels des Ambosses liegender, plattenförmiger Knochen, verknüpft gewöhnlich schon sehr früh, oft schon in dem letzten Monate des Fötallebens, mit demselben, und bildet dann eben nach innen ragenden Fortsatz desselben.

#### d. Steigbügel.

§. 1929.

Der Steigbügel (Stapes), einer der wenigen Theile, welche durch Vergleichung mit andern Körpern eine glückliche Benennung erhalten, liegt am meisten nach innen, und nicht, wie die beiden größern Knochen, senkrecht, sondern horizontal, besteht aus dem Köpfchen, zwei Schenkeln, und der Querfläche oder dem Tritte.

Das von oben nach unten zusammengebrückte, länglich rundliche Köpfchen, ist an seinem obern, nach außen gewandten Ende zur Aufnahme des Einfenkels (§. 1928.) stark vertieft, und nur selten durch einen eingeschnitzten Hals von den beiden Schenkeln getrennt.

Von

Von diesen ist der vordere immer kürzer, meistens auch gerader als der hintere, beide sind an ihren innern, gegen einander gewandten Flächen mit einer Furche versehen, in welcher eine Membran, eine Fortsetzung der Paukenhaut, ausgespannt ist.

Die Grundfläche hat ganz die Gestalt des eiförmigen Fensters, mit welchem sie durch die Schleimhaut der Paukenhöhle beweglich verbunden wird, ist aber etwas kleiner, und kann daher durch diese Oeffnung in und aus dem Vorhofe treten.

Ihre innere, dem Fenster zugewandte Fläche, ist gerade, die äußere vertieft, und von aufgeworfnen Rändern umgeben.

#### 4. Muskeln der Gehörknöchelchen.

##### §. 1930.

Die Gehörknöchelchen werden durch vier Muskeln, die, wie die Knochen, an welche sie sich heften, die kleinsten des Körpers sind, bewegt. Drei von diesen setzen sich an den Hammer, einer an den Steigbügel. Zwei von den Hammermuskeln liegen vor, einer über der Paukenhöhle, der Steigbügelmuskel hinter derselben. Der Amboss erhält keinen Muskel, und bildet bloß das Mittelglied zwischen dem Hammer und Steigbügel.

##### a. Muskeln des Hammers.

##### §. 1931.

Die drei Muskeln des Hammers bewirken, wegen der Verbindung dieses Knochens mit dem Paukenfelle, Veränderungen in dem Grade der Spannung des Paukenfelles, und sind der Spanner, der äußere und der innere Erschlaffer des Paukenfelles.

##### a. Span-

## a. Spanner des Paukenfelles.

§. 1932.

Der Spanner des Paukenfelles, innerer Hammermuskel (*Tenfor tympani* l. *M. mallei internus*), ein länglicher Muskel, entspringt vom obern Umfange der knorpeligen Ohrtrompete in der Nähe des Keilbeins, gewöhnlich auch vom großen Flügel des Keilbeins, und verläuft in seinem, über der knöchernen Trompete befindlichem Kanal (S. 22.) des Felsenbeins nach hinten, in die Paukenhöhle. Hier verändert seine Sehne ihre Richtung, wendet sich, indem sie die innere Wand der Paukenhöhle verläßt, nach außen, und heftet sich an das obere Ende der innern Fläche des Hammers, dicht unter dem langen Fortsatze desselben.

Er zieht den Hammer nach innen, spannt dadurch das ihm folgende Paukenfell, und bringt die Reihe der Gehörknöchelchen von außen nach innen, so daß der Steigbügel in das runde Fenster gedrängt wird.

## b. Größerer Erschlaffer des Paukenfelles.

§. 1933.

Der größere Erschlaffer des Paukenfelles, größerer äußerer Hammermuskel (*Laxator tympani* l. *M. mallei externus major*), entspringt von dem Rachenfortsatze des großen Keilbeinflügels, wendet sich von vorn und außen nach hinten und innen, tritt sehnig durch die Glasersche Spalte, und heftet sich an den langen Fortsatz des Hammers.

Er zieht den Hammer nach vorn und außen, und erschlafft dadurch das Paukenfell.

## 7. Kleinerer Erschlaffer des Paukenfelles.

§. 1934.

Der kleinere Erschlaffer des Paukenfelles, kleinerer äußerer Hammermuskel (*M. laxator tympani minor* s. *mallei externus minor*), der bei weitem kleinste, entspringt vom obern Rande des knöchernen Gehörganges, tritt zwischen die Blätter des Paukenfelles, steigt nach vorn und innen herab, und heftet sich höher oder tiefer an den Griff und den äußern Fortsatz des Hammers.

Zieht den Hammer nach oben, hinten und außen, und erschlafft dadurch das Paukenfell.

## b. Steigbügelmuskel.

§. 1935.

Der Steigbügelmuskel (*M. stapedius*), ein länglich dreieckiger Muskel, entspringt am Grunde der pyramidenförmigen Erhabenheit, wendet sich nach vorn und oben, tritt mit seiner Sehne aus der vordern Öffnung der Pyramide von hinten in die Paukenhöhle, und heftet sich an den hinteren Theil des Umfangs des Steigbügelköpfchens.

Er zieht den Steigbügel so nach hinten, daß der hintere Theil seines Trittes in das eirunde Fenster gestossen wird, und zugleich die Reihe der Gehörknöchelchen so nach innen, daß dadurch das Paukenfell gespannt wird.

Wirkt wahrscheinlich immer mit dem Paukenfellspanner zusammen.

C. Inner.

## C. Innerster Theil oder Labyrinth 1).

§. 1936.

Das Labyrinth (Labyrinthus), der innerste Theil des Gehörorgans, folgt von außen nach innen auf die Paukenhöhle, und ist eine doppelte, im Felsenbeine enthaltne, von der äußerst festen Substanz desselben genau umgebne, aus mehrern getwundenen Abtheilungen gebildete, sehr zusammengesetzte Höhle, welche in den mittlern Theil oder den Vorhof, den hintern, oder die Bogengänge, den vordern, oder die Schnecke, und die seitlichen, die Wasserleitungen, zerfällt.

Von diesen beiden Höhlen umgiebt die eine die andre überall genau und ahmt ihre Gestalt nach.

Jene ist das knöcherne, diese das häutige Labyrinth.

## I. Vom knöchernen Labyrinth.

§. 1937.

Das knöcherne Labyrinth ist beim Erwachsenen gar nicht als ein eigener, von der sehr harten zellenlosen Substanz des Felsenbeines, verschiedner Theil vorhanden, sondern nur der innerste, festeste und härteste, das häutige Labyrinth umgebende Theil desselben, in frühern Lebensperioden dagegen, aus einer festen, harten, brüchigen Knochen

1) A. Scarpa disquis. anatomicae de auditu et olfactu. Ticin. 1789. Fol.

A. Monro am oben (S. 16.) angef. Orte.

Brugnone observations anatomico-physiologiques sur le labyrinthe de l'oreille. In Mém. de Turin. 1805 — 1808. p. 167 — 177.



chemsubstanz gebildet, und von der äußern Substanz des Felsenbeins durch lockeres Knochengewebe getrennt. Seine innere Fläche ist mit einer hellen, serösen Flüssigkeit vollkommen angefüllt, welche den Raum zwischen ihm und dem häutigen Labyrinth einnimmt<sup>2)</sup>.

In frühen Lebensperioden findet sich zwischen beiden eine Haut, die, ungeachtet sie gewöhnlich dafür angesehen wird, nicht Membran des Labyrinthes, sondern seröschleimig ist, wie ihr Gefäßreichthum, ihre Absonderungsthätigkeit, ihr Zusammenhang mit der Haut der Paukenhöhle beweist.

#### a. B o r h o f.

§. 1938.

Der Borhof (Vestibulum), der mittlere Theil des knöchernen Labyrinthes, der nach innen und hinten vor der Paukenhöhle liegt, ist eine länglich rundliche, ungefähr in der Mitte ihrer vordern Wand durch das eirunde Fenster (S. 21.) durchbrochene Vertiefung, welche vorzüglich zwei kleinere, flache Vertiefungen oder Grübchen, eine obere, hintere und äußere, größere, eiförmige (Fovea f. cavitas ovalis f. elliptica f. semielliptica), und eine untere, vordere, kleinere, halbkreisförmige (F. hemisphaerica f. orbicularis) zeigt, von welchen die erstere sich an der hintern und untern, die letztere an der obern und äußern Wand befindet, und die durch eine von oben nach unten sich erstreckende scharfe Leiste von einander getrennt sind.

Die

2) S. Cotunni diss. citat. §. XXIX.

F. F. Th. Meckel de labyrinthi auris contentis. Argentorati 1777.

Die eiförmige Grube geht nach unten in eine andre, kleinere Vertiefung, die furchenförmige (F. sulciformis) über.

§. 1939.

Im Umfange des Vorhofes befinden sich sechs größere Oeffnungen und eine sehr kleine rundliche.

Von den größern führt eine, welche den vordern und untern Theil des Vorhofes einnimmt, zur obern Treppe oder Gänge der Schnecke; die fünf übrigen, ansehnlichen, welche sich im hintern Theile des Vorhofes befinden, zu dem hintern Theile des Labyrinthes, oder den Bogengängen; die kleine, am hintern und innern Theile des Vorhofes, in der furchenförmigen Grube liegende, zur Wasserleitung des Vorhofes.

#### b. B o g e n g ä n g e.

§. 1940.

Die Bogengänge, halbkreisförmigen Gänge (Canales semicirculares) bilden den hintern und ansehnlichsten Theil des Labyrinthes.

Es finden sich drei, welche zusammen einen viereckigen Raum bilden, der obere oder vordere, hintere, innere oder untere, und der äußere. Die beiden erstern stehen senkrecht, der letztere liegt wagerecht.

Alle bilden mehr als die Hälfte eines Halbkreises, sind an ihrem einen Ende beträchtlich stärker angeschwollen als am andern und in ihrem ganzen übrigen Verlauf, stellen dort eine rundliche Blase (Ampulla) dar, und sind sowohl in ihrem äußern als innern Umfange nicht völlig rund, sondern  
etwas

etwas plattgedrückt, elliptisch. Der Durchmesser ihrer Höhle beträgt ungefähr eine halbe Linie.

Ihre Mündungen sind etwas weiter als ihr übriger Verlauf.

Der obere Bogengang liegt schief von außen und vorn nach innen und hinten, und bildet die höchste Stelle des Labyrinthes. Seine beiden Schenkel sind am weitesten von einander entfernt. Seine vordere, äußere, über dem eirunden Fenster liegende Mündung bildet eine ansehnliche Blase, die an der hintern, innern fehlt, durch welche er mit der obern Mündung des innern zusammenfließt.

Der untere, hintere oder innere, steht gleichfalls senkrecht, aber mit seiner Wölbung nach hinten, der Ausbuchtung nach vorn gewandt, fängt oben durch einen, ihm mit dem innern Ende des obern gemeinschaftlichen kurzen Gang an, und endigt sich mit einer blasigen Anschwellung, unten und innen in den Vorhof.

Er ist der längste, und seine Schenkel liegen einander am nächsten.

Der äußere, wagerechte, mittlere entsteht mit einer, wenig merklichen, blasigen Anschwellung unter der äußeren Mündung des obern, und endigt sich nach außen und unten von der gemeinschaftlichen Mündung des obern und untern mit seiner innern Mündung in den Vorhof.

Er ist der kürzeste, aber weiteste der drei Bogengänge.

Es finden sich daher, wegen der angegebenen Vereinigung zwischen dem obern und untern Bogengänge, nicht sechs, sondern nur fünf Oeffnungen der Bogengänge in dem Vorhof.

## c. S c h n e c k e 1).

## §. 1941.

Die Schnecke (Cochlea), der bei weitem zusammenge-  
setzte, vordere Theil des Labyrinthes, bildet gewisser-  
maßen eine Wiederholung der Bogengänge, und  
kommt genau mit der Bildung der Schnecken-  
schale überein.

Sie ist ein, um sich selbst gewundner, von ihrem Anfange  
bis zum Ende allmählich beträchtlich enger werdender Kanal,  
der sich um einen mittlern wagerechten Theil, die Spindel,  
(Modiolus), welche gleichfalls allmählich dünner wird, schlingt,  
und zwei und eine halbe Windung bildet.

Die erste Windung ist beträchtlich größer als die übrigen,  
und umschließt sie, doch überragen sie diese beträchtlich nach  
außen.

## §. 1942.

Die Schnecke wird durch eine, von dem innern Theile  
ihres Umfangs entspringende, wagerechte, knöcherne Platte,  
das Spiralsblatt (Lamina spiralis) in zwei über einan-  
der liegende Gänge, die Treppen (Scalae), getheilt.

Das Spiralsblatt ist an der untern Fläche durch Furchen,  
welche gegen die Spindel gewandt sind, beträchtlich ungleich,  
an der oberen glatter.

Es besteht aus einem doppelten Blatte, einem obern und  
einem untern.

Die untere Treppe, welche beträchtlich weiter als die  
obere ist, endigt sich mit dem runden Fenster nach hinten und  
außen,

1) G. Brendel de auditu in apice cochleae Progr. I. II. Gotting.  
1747. 8. rec. in ejusdem Opus. P. I. 117 seqq. II. etiam  
Halleri diss. anat. T. IV.

J. G. Zinn observationes de vasis subtilioribus oculi et cochleae  
auris internae. Gottingae. 1753. 4.

außen, gegen die Pauke, und erhält daher den Namen der Paukentreppe (*Scala tympani*). Sie ist hier durch das gegen die Pauke vertiefte Nebentrommelfell (*Tympanum secundarium*) verschlossen.

Die obere, weit engere, führt durch die vordere Oeffnung des Vorhofes in diesen, und erhält daher den Namen der Vorhofstreppe (*Scala vestibuli*).

Diese Scheidung setzt sich indessen nicht durch die ganze Länge der Schnecke fort, sondern das Spiralblatt hört ungefähr in der Mitte der zweiten Windung als ein scharfer Haken (*Hamulus cochleae*) auf.

Indem hier die beiden Gänge der Schnecke zusammenfließen, entsteht eine Becher- oder Trichterförmige, mit dem Grunde nach oben, der Spitze nach unten gegen das Dach (*Cupula*) der Schnecke gewandte Vertiefung (*Scyphus*).

Diese bildet den am stärksten vorspringenden Theil.

Die Spindel welche sich wie die Schneckenstiegen windet, ist hohl. Ein größerer Kanal verläuft durch ihre Aze, von ihrer Grundfläche an bis zur Spitze, und außerdem ist sie durch eine Menge kleinerer, von der Grundfläche zur Spitze allmählich feiner werdenden Oeffnungen durchlöchert, welche zu kleinen Gängen führen, die sich auf dem Spiralblatte endigen.

#### d. Wasserleitungen.).

§. 1943.

Die Wasserleitungen, Wasserbehälter (*Aqueductus, Diverticula*) des Labyrinthes, sind enge, kurze, in

E 2

der

1) D. Cotunnii de aquaeductibus auris humanae internae anatomica dissertatio. Neapoli. 1761.

P. F. Meckel de labyrinthi auris contentis. Argent. 1777.

der Substanz des Felsenbeines von der Höhle des Labyrinthes nach unten verlaufende Gänge, welche sich auf ihrem Wege allmählich erweitern. Es finden sich zwei, die Wasserleitung des Vorhofes, (Aquaeductus vestibuli), und die Wasserleitung der Schnecke (Aquaeductus cochleae).

Die erstere nimmt mit einer sehr engen Oeffnung in der innern Wand des Vorhofes, vor der gemeinschaftlichen Oeffnung der beiden senkrechten Bogengänge in der furchenähnlichen Vertiefung des Vorhofes, welche in der That ihre wahre innere Mündung bildet (S. 32.), ihren Anfang, wendet sich anfangs in der Mitte des Felsenbeines in einer kleinen Strecke nach innen und etwas nach oben, hierauf nach unten, erweitert sich allmählich von dieser Umbeugungsstelle an, und endigt sich, nachdem sie eine Strecke von ungefähr vier Linien durchlaufen hat, etwas hinter der Mitte der innern Fläche des Felsenbeines (Th. 2. S. 109.) in der Nähe der Grube für den innern Halsvenenwulst, mit welcher sie immer durch eine kurze Furche verbunden ist.

Die Wasserleitung der Schnecke fängt mit einer etwas weiteren Oeffnung in der Paukentreppe der Schnecke, dicht vor dem runden Fenster, an, steigt von oben und vorn nach unten und hinten herab, erweitert sich, und endigt sich mit einer dreieckigen Oeffnung ungefähr in der Mitte des untern Felsenbeinwinkels. (Th. 2. S. 109.)

Durch diese Gänge dringt das häutige Labyrinth nach außen, und bildet zwischen dem Knochen und der harten Hirnhaut deutlich hervorstechende blinde Säcke.

Sie sind zugleich die Wege von Puls- und Blutadern, welche in das Labyrinth und aus demselben treten, außerdem auch von Saugadern, welche die regelwidrige Anhäufung der

Flüssigkeit

nichtigkeiten im Labyrinth hindern. Die Blutadern, vielleicht zum Theil auch die Saugadern, senken sich in die innere Halsblutader, und Quecksilber und andre Flüssigkeiten bringen aber durch diese Gänge aus dem Labyrinth in die letztere, nachdem vorher im frischen Zustande dadurch die sackförmigen Fortsätze des häutigen Labyrinthes ausgedehnt worden sind.

## 2. Häutiges Labyrinth \*).

§. 1944.

Das häutige Labyrinth ist in dem knöchernen enthalten, und entspricht ihm durch seine Gestalt sehr genau, wenn es gleich weit kleiner ist.

Es besteht aus einer dünnen, weißlichen Haut, die ganz an der, die innere Fläche des knöchernen Labyrinthes im frischen Zustande bekleidenden verschieden ist, deren äußere Fläche durch lockeres Zellgewebe an die innere des knöchernen Labyrinthes befestigt ist, und enthält in seiner Höhle eine seröse Flüssigkeit, als Wasser des häutigen Labyrinthes (*Aquula Labyrinthi membranacei*). An seiner äußern Fläche verbreiten sich zahlreiche Gefäße.

Den größern, obern und hintern Theil des knöchernen Vorhofes nimmt ein länglich rundlicher, häutiger Sack ein, von welchem zu welchem die häutigen Bogengänge gehen, welche an den Stellen, die den Anschwellungen der knöchernen entsprechen, gleichfalls anschwellen. Vor ihm befindet sich ein kleiner, überall geschlossener, mithin von dem übrigen häutigen

§ 3

Labyr

\*) *Scarpa a. a. O.*

*Brugnone Observat. anatomico-physiologiques sur le labyrinthe de l'oreille. In Mém. de Turin. 1805 — 1808. p. 167 — 176.*

Laborinth völlig getrennter, weit kleinerer, zum Theil in der halbkreisförmigen Grube (S. 31.) enthaltenen, gleichfalls mit einer serösen Flüssigkeit angefüllter Sack. Beide sind an ihrer hintern Wand an das knöcherne Labrynth geheftet, mit der vordern, gegen die vordere Wand von diesem und das eirunde Loch gewandten Theile ihres Umfanges frei, und von dem Wasser des knöchernen Labrynthes umgeben. Die Bogengänge verhalten sich besonders genau wie die knöchernen Bogengänge.

Die häutige Schnecke wird durch ein knorpelighäutiges Blatt, das häutige Spiralblatt, gebildet, welches sich um den äußern, freien Rand des knöchernen Spiralblattes legt, und, nach außen dünner und weicher werdend, sich mit seinem äußern Rande an den äußern Theil des Umfanges der knöchernen Schnecke heftet. Es reicht weiter als das knöcherne Spiralblatt, bis in die Spitze der Schnecke, ist in diesem Theile seines Verlaufes an seinem innern Rande frei, am äußern dagegen, wie überall, angeheftet, und endigt sich kegelförmig.

### 3. § 8: 2000.

§. 1945.

Der Hörner, dessen Ursprung und mit dem Nerven gemeinschaftlicher Verlauf bis zum innern Gehörgang schon oben (Bd. 3. S. 696.) angegeben wurde, theilt sich, sobald er in diesen gelangt ist, in mehrere Äste, welche in das Labrynth dringen, und die auch schon im Knochen angedrückt sind.

Das

---

1) Hörner und Nerven z. B. nach S.



Das innere Hörloch nämlich wird in der Tiefe, wo sich nach vorn die innere, durchbohrte Fläche der Spindel befindet, durch eine, von vorn nach hinten verlaufende, anfangs wenig merkliche, im vollkommenen Zustande scharfe Leiste, in eine kleinere obere, und eine untere größere Hälfte getheilt. Diese gehört ganz, jene nur ihrem vordern kleinern Theile nach, dem Antlignerven an, und man kann daher nicht wohl sagen, daß die obere Furche den Antlignerven, die untere den Hörnerven aufnehme. Die obere ist abermals durch einen kleinen, schwächern, longitudinalen Vorsprung in eine vordere und eine hintere Hälfte getheilt, von welchen jene der Anfang des Fallopischen Ganges ist, diese den obern Ast des Hörnerven aufnimmt.

§. 1946.

Der Hörnerz verbreitet sich auf dem häutigen Labyrinth. Die ersten Äste gehen zu den Bogengängen und dem Vorhofstheile desselben. Der erste, stärkste, tritt durch die hinter dem Anfange des Fallopischen Ganges befindliche Vertiefung an die Blase des obern Bogenganges, der zweite an die ovale Vertiefung des Vorhofes, der dritte, kleinere, an die Blase des hintern Bogenganges.

Nachdem der erste Ast eingedrungen ist, spaltet er sich in zwei Zweige, die sich fächerförmig ausbreiten, und deren einer dem großen oder gemeinschaftlichen Saft der Bogengänge, der andre der Blase des obern und des äußern Bogenganges angehört.

Alle diese Zweige sind an der äußern Fläche der Blasen deutlich faserig und verflochten, an der innern Fläche aber erscheinen sie nur als ein ungeformter Schleim. Sie breiten

Es tritt über den ganzen Verhof und die Bogengänge, sonst durch die Klaffen aus.

Der Nerve tritt nach vorn in die vertiefte Spindel der Schnecke, folgt genau ihren Windungen, und sendet eine große Anzahl Nerven von Gäden ab, welche durch die Oeffnungen, durch welche die Spindel durchläuft ist, nach innen treten.

Die nach außen stehenden Gäden sind dicker, die darauf folgenden werden immer feiner, und stehen näher an einander gedrängt.

Der Nerve endet sich der Nerve in der Spitze der Spindel mit einem Fortsatze, in die Oeffnung, welche sich in ihrer Mitte befindet. In gewissen Gäden, der alle übrigen an Größe beträchtlich übertrifft.

Die Nerven dieser Gäden dringen durch die in spirals förmigen Windungen der Spindel befindlichen Oeffnungen der Spindel nach innen, verlassen sie durch die knöchernen Gänge, zu welchen der Nerve ganz eben liegt, ganz spiralförmig, bilden längs des Nerven der Nerven ein äußerst feines Gefäß, und endigen sich frei liegend auf dem dünnen Spiralsblatte.

Nach Scarpa<sup>1)</sup> verlaufen sie nicht zwischen den Blättern des Spiralsblattes, allein in der That bedecken sie außer dem die obere und untere Fläche des Spiralsblattes von außen<sup>2)</sup>, in die, vorzüglich die, welche die untere Fläche bedecken, sind die der weitem ansehnlichsten. Einige, aber viel kleinere und weniger zahlreiche Gäden dringen durch Oeffnungen, welche sich in den Windungen der Schnecke, zunächst an der Spindel befinden, nicht an das Spiralsblatt, sondern an den Theil der äußeren Schnecke, welcher den äußeren Umfang derselben bildet.

<sup>1)</sup> De org. aud. et olf. p. 55. 56. f. XI.

<sup>2)</sup> Monro on the ear pag. 177—199. Tab. III. IV.

det. Alle vereinigen sich im äußern Theile des Umfangs der Schnecke.

Auch in der Schnecke sind die Nervenfasern anfänglich weiß, undurchsichtig und deutlich gefasert, ihre letzte Ausbreitung dagegen halbdurchsichtig, schleimähnlich, und mehr grau.

§. 1947.

In den Ausbreitungen des Gehörnerven auf dem häutigen Labyrinth geschehen die Veränderungen, welche, durch ihn zum Gehirn fortgepflanzt, hier die Vorstellungen des Gehörs veranlassen. Diese Veränderungen werden unstreitig durch vorangehende in dem Drucke des Labyrinthwassers auf die Nervenausbreitungen bewirkt, und diese haben wieder ihren Grund in dem veränderten Zustande der nach außen vom Labyrinth liegenden Theile, namentlich der Gehörknöchelchen und ihrer Muskeln, indem nothwendig, je nachdem die Grundfläche des Steigbügels mehr oder weniger tief, ganz, oder nur mit einem Theile ihres Umfangs, in das eirunde Fenster eingedrückt wird, der Druck des Labyrinthwassers verschiedentlich, sowohl in Hinsicht auf Stärke, als auf die Stelle des häutigen Labyrinthes, besdingt wird. Das äußere Ohr und das Paukenfell dienen vorzüglich zum Auffangen der Schallstrahlen und zur Verstärkung des Schalles, eine Bestimmung, welche die Pauke und die Zellen des Zigenfortsatzes theilen. Unter den Gehörknöchelchen und ihren Muskeln hat der Hammer außer der angegebenen Verrichtung unstreitig auch die, den Grad der Spannung des Paukenfelles abzuändern, so, daß bei sehr lauten, starken Tönen, die Spannung gemindert, bei schwachen, leisen, vermehrt wird. Die Trompete dient theils zum Abflusse der in der Paukenhöhle abgesonderten Flüssigkeiten, außerdem

sich nicht über den ganzen Vorhof und die Bogengänge, sondern deutlich nur über die Blasen aus.

Hierauf tritt der Nerv nach vorn in die vertiefte Spindel der Schnecke, folgt genau ihren Windungen, und sendet eine ansehnliche Menge von Fäden ab, welche durch die Oeffnungen, von welchen die Spindel durchbohrt ist, nach innen treten.

Die zuerst abgehenden Fäden sind dicker, die darauf folgenden werden feiner, und stehen näher an einander gedrängt.

Zuletzt endigt sich der Nerv in der Spitze der Spindel mit einem, ansehnlichen, in die Oeffnung, welche sich in ihrer Höhe befindet, dringenden Faden, der alle übrigen an Größe beträchtlich übertrifft.

Die innersten dieser Fäden dringen durch die in spiralförmigen Windungen stehenden Oeffnungen der Spindel nach innen, schlagen sich durch die knöchernen Gänge, zu welchen diese Oeffnungen führen, zum Spiralblatte, bilden längs dessen beider Platten ein äußerst feines Geflecht, und endigen sich frei liegend auf dem häutigen Spiralblatte.

Nach Scarpa<sup>1)</sup> verlaufen sie bloß zwischen den Platten des Spiralblattes, allein in der That bedecken sie außerdem die obere und untere Fläche des Spiralblattes von außen<sup>2)</sup>; ja diese, vorzüglich die, welche die untere Fläche bedecken, sind die bei weitem ansehnlichsten. Einige, aber viel kleinere und weniger zahlreiche Fäden dringen durch Oeffnungen, welche sich in den Windungen der Schnecke, zunächst an der Spindel befinden, nicht an das Spiralblatt, sondern an den Theil der häutigen Schnecke, welcher den äußern Umfang derselben bildet.

1) De org. aud. et olf. p. 55. 56. §. XI.

2) Monro on the ear pag. 197—199. Tab. III. IV.

det. Alle vereinigen sich im äußern Theile des Umfangs der Schnecke.

Auch in der Schnecke sind die Nervenfäden anfänglich weiß, undurchsichtig und deutlich gefasert, ihre letzte Ausbreitung dagegen halbdurchsichtig, schleimhaltig, und mehr grau.

§. 1947.

In den Ausbreitungen des Gehörnerven auf dem häutigen Labyrinth geschehen die Veränderungen, welche, durch ihn zum Gehirn fortgepflanzt, hier die Vorstellungen des Gehörs veranlassen. Diese Veränderungen werden unstreitig durch vorangehende in dem Drucke des Labyrinthwassers auf die Nervenausbreitungen bewirkt, und diese haben wieder ihren Grund in dem veränderten Zustande der nach außen vom Labyrinth liegenden Theile, namentlich der Gehörknöchelchen und ihrer Muskeln, indem nothwendig, je nachdem die Grundfläche des Steigbügels mehr oder weniger tief, ganz, oder nur mit einem Theile ihres Umfangs, in das eirunde Fenster eingedrückt wird, der Druck des Labyrinthwassers verschiedentlich, sowohl in Hinsicht auf Stärke, als auf die Stelle des häutigen Labyrinthes, bedingt wird. Das äußere Ohr und das Paukenfell dienen vorzüglich zum Auffangen der Schallstrahlen und zur Verstärkung des Schalles, eine Bestimmung, welche die Pauke und die Zellen des Zigenfortsatzes theilen. Unter den Gehörknöchelchen und ihren Muskeln hat der Hammer außer der angegebenen Verrichtung unstreitig auch die, den Grad der Spannung des Paukenfelles abzuändern, so, daß bei sehr lauten, starken Tönen, die Spannung gemindert, bei schwachen, leisen, vermehrt wird. Die Trompete dient theils zum Abflusse der in der Paukenhöhle abgesonderten Flüssigkeiten, außerdem

mäßig zu seiner Länge und weicher als bei vollkommener Ausbildung ist, weicher als nachher absteht, und sich so unter das Trommelfell legt, das dieses in der Luft seine eigene Schwingung erhält. Die Haut des äußeren Gehörganges ist beim Fetus weicher und dicker als beim Erwachsenen.

## II. Innere Ohre.

§. 1942.

1. Die Paukenhöhle ist in den frühesten Lebensperioden verhältnismäßig kleiner und enger als im spätern, vorzüglich weil der Zwerchring noch klein ist, und seine Faser nicht ausgebreitet sind. Sie ist beim Fetus mit einer dicken, gallertartigen Flüssigkeit angefüllt. Der Zusammenhang mit der Rachenhöhle ist desto unmittelbarer, je jünger der Embryo ist, indem in demselben Verhältniß die Eustachische Trompete kürzer und weicher ist. Bis um die Mitte der Schwangerschaft ist die knorpelige Trompete bloß häutig, noch beim reifen Fetus die knorpelige in dem oberen Theile ihres Umfangs höchstens noch innen von dem Canal des Paukenfellhammers durch ein Knochenblatt geschieden, eine Bildung, die indessen in den meisten Fällen das ganze Leben hindurch besteht, so daß selbst die Schilddrüse auch den äußern Umfang erreicht. Der Trommelfellring, und mit ihm das Paukenfell ist verhältnismäßig zum äußern Ohre und zum ganzen Kopfe und Körper desto größer, je jünger der Embryo ist; noch bis zum fünften Monate haben beide einen größern Umfang als die Ohrmuschel. Zugleich liegt das Trommelfell anfänglich, weil der äußere Gehörgang noch nicht gebildet ist, der äußern Oberfläche

det. Alle vereinigen sich im äußern Theile des Umfangs der Schnecke.

Auch in der Schnecke sind die Nervenfasern anfänglich weiß, undurchsichtig und deutlich gefasert, ihre letzte Ausbreitung dagegen halbdurchsichtig, schleimähnlich, und mehr grau.

§. 1947.

In den Ausbreitungen des Gehörnerven auf dem häutigen Labyrinth geschehen die Veränderungen, welche, durch ihn zum Gehirn fortgepflanzt, hier die Vorstellungen des Gehörs veranlassen. Diese Veränderungen werden unstreitig durch vorangehende in dem Drucke des Labyrinthwassers auf die Nervenausbreitungen bewirkt, und diese haben wieder ihren Grund in dem veränderten Zustande der nach außen vom Labyrinth liegenden Theile, namentlich der Gehörknöchelchen und ihrer Muskeln, indem nothwendig, je nachdem die Grundfläche des Steigbügels mehr oder weniger tief, ganz, oder nur mit einem Theile ihres Umfangs, in das eirunde Fenster eingedrückt wird, der Druck des Labyrinthwassers verschiedentlich, sowohl in Hinsicht auf Stärke, als auf die Stelle des häutigen Labyrinthes, bedingt wird. Das äußere Ohr und das Paukenfell dienen vorzüglich zum Auffangen der Schallstrahlen und zur Verstärkung des Schalles, eine Bestimmung, welche die Pauke und die Zellen des Zigenfortsatzes theilen. Unter den Gehörknöchelchen und ihren Muskeln hat der Hammer außer der angegebenen Verrichtung unstreitig auch die, den Grad der Spannung des Paukenfelles abzuändern, so, daß bei sehr lauten, starken Tönen, die Spannung gemindert, bei schwachen, leisen, vermehrt wird. Die Trompete dient theils zum Abflusse der in der Paukenhöhle abgesonderten Flüssigkeiten, außerdem

3. Häutiges Labyrinth. Das häutige Labyrinth ist lange vor dem knöchernen vorhanden. Schon im dritten Monat finde ich es sehr vollkommen ausgebildet in der noch völlig knorpligen Masse, welche sich später in Knochen umwandelt. Es ist sogar in den früheren Lebensperioden deutlicher, und besteht aus härteren, festeren Häuten als in späteren. Anfangs ist es sehr deutlich aus zwei Häuten, einer äußern und einer innern gebildet, die beide nur in einander geschoben sind, ohne mit einander zusammenzuhängen.

Die innere ist weiß, durchsichtig, dünner, aber härter und elastischer als die äußere. Diese hängt mit dem sie umgebenden Knorpel eben so wenig als mit dem Knochen, der sich später bildet, zusammen.

Die äußere ist an ihrer innern Fläche glatt, die innere an ihrer äußern rauh. Allmählich verschwindet die äußere so, daß im siebenten Monat keine Spur mehr von ihr wahrgenommen wird, nachdem sie nach und nach beträchtlich dünn geworden ist, und zugleich wird die innere verhältnißmäßig enger, aber härter. In den frühesten Perioden scheint sie genauer als in spätern an die innere Fläche des umgebenden Knorpels geheftet zu seyn.

Bis jetzt war ich nicht im Stande auszumitteln, ob das häutige Labyrinth vielleicht anfangs, wenigstens zum Theil, unbedeckt in der Schädelhöhle liege, auch sein Bau vielleicht einfacher sey als in spätern Perioden. Im dritten Fötusmonat ist es überall mit Knorpelmasse umgeben, und so zusammengesetzt als späterhin. Nur ist es, wie der dasselbe umgebende Knorpel, anfangs  
mehr



flache weit näher als späterhin, so daß sein oberer Theil unmittelbar an den Eingang des knorpiligen Gehörganges stößt, und daher hier beinahe ganz frei liegt, was, als Amphibiensähnlichkeit, sehr merkwürdig ist. Auch die Richtung beider ist verschieden, in frühen Lebensperioden der horizontalen weit näher als in spätern, indem anfangs das Paukenfell weit mehr schräg von oben und außen nach innen und unten gerichtet ist.

2. Die Gehörknöchelchen unterscheiden sich von allen übrigen Knochen durch die außerordentliche Frühzeitigkeit ihrer Entstehung und Ausbildung.

Sie sind schon im Anfange des dritten Embryomonates, wenn gleich jetzt noch ganz knorpelig, und der Steigbügel vom Ambos nicht deutlich zu unterscheiden, sichtbar und verhältnißmäßig außerordentlich groß. Die Höhe des Hammers z. B. beträgt beim viermonatlichen Embryo drei Linien, so daß also seine Länge zu der des Körpers, vom Scheitel bis Schwanzbein, welche vier Zoll mißt, jetzt wie 1:16 ist, während beim Erwachsenen, wo der Hammer vier Linien lang, jene Entfernung zwei und einen halben Fuß beträgt, dasselbe Verhältniß wie 1:90 ist. Beim reifen Fötus sind sie so groß als beim Erwachsenen.

Auch die Verknöcherung nimmt sehr früh, schon vor dem Ende des dritten Monates, ihren Anfang. Nach Cassabohm <sup>1)</sup> verknöchern der Steigbügel und Ambos früher als der Hammer, der Knochenkern des Ambos erscheint in dessen vordem Schenkel, der des Steigbügels im Kopfe, von hier aus breitet sich die Verknöcherung durch die beiden Schenkel in die

Grunde

1) A. a. O. S. 56.

3. Häutiges Labyrinth. Das häutige Labyrinth ist lange vor dem knorpeligen vorhanden. Schon im dritten Monat finde wir es sehr vollkommen ausgebildet in der noch völlig knorpeligen Blase, welche sich später in Knochen umwandelt. Es ist sogar in den früheren Lebensperioden den deutlich, und besteht aus dünnen, feinen Häuten als in späteren. Anfangs ist es sehr deutlich aus zwei Häuten, einer äußern und einer innern gebildet, die beide nur in einander gehoben sind, ohne mit einander zusammenzuhängen.

Die innere ist weich, durchsichtig, dünner, aber härter und elastischer als die äußere. Diese hängt mit dem sie umgebenden Knorpel eben so wenig als mit dem Knochen, der sich später bildet, zusammen.

Die äußere ist an ihrer innern Fläche glatt, die innere an ihrer äußern rauh. Allmählich verschwindet die äußere so, daß im sechsten Monat keine Spur mehr von ihr wahrgenommen wird, nachdem sie nach und nach beträchtlich dünn geworden ist, und zugleich wird die innere verhältnismäßig enger, aber härter. In den frühesten Perioden scheint sie genauer als in spätern an die innere Fläche des umgebenden Knorpels geheftet zu seyn.

Bis jetzt war ich nicht im Stande auszumitteln, ob das häutige Labyrinth vielleicht anfangs, wenigstens zum Theil, unbedeckt in der Schädelhöhle liege, auch sein Bau vielleicht einfacher sey als in spätern Perioden. Im dritten Fötusmonat ist es überall mit Knorpelmasse umgeben, und so zusammengesetzt als späterhin. Nur ist es, wie der dasselbe umgebende Knorpel, anfangs weicher

mehr von außen nach innen zusammengedrückt, verhältnißmäßig höher, unstreitig wohl, wenigstens zum Theil, wegen der stärkern Entwicklung des Gehirns.

Schon im dritten Monate finde ich die häutige Schnecke eben so zusammengesetzt gebildet als in spätern Perioden, und während späterhin ihr Umfang bloß durch das knöcherne Labyrinth gebildet zu werden scheint, besteht sie jetzt aus einer sehr dicken, mit dem übrigen Theile des häutigen Labyrinthes zusammenhängenden Membran. Ueber ihre frühere Form konnte ich mich bis jetzt noch nicht hinlänglich unterrichten.

Das Nebentrommelfell und runde Loch liegen anfangs mehr nach außen, mit dem Trommelfell parallel, später wenn sie sich nach hinten, vorzüglich, weil sich mehr Knochenmasse in ihrem Umfange anlegt.

4. Knöchernes Labyrinth. In der Untersuchung der Bildung des knöchernen Labyrinthes ist die Entstehung der Knochensubstanz des Felsenbeines sehr genau von der Bildung der feinigen zu unterscheiden. Die erstere fängt früher als die letztere, nach dem gewöhnlichen Typus der Knochenbildung, durch Entstehung von einem lockeren, weichen, nezförmigen Gewebe in dem vorher vorhandnen einförmigen Knorpel an, und breitet sich von vorn nach hinten aus. Namentlich verknöchert zuerst der Umfang des runden Fensters, um das Ende des dritten Monates, was wegen der Analogie des runden Fensters mit dem Paukenringe merkwürdig ist. Die Verknöcherung fängt oben an, steigt hinten herab, und erstreckt sich, nachdem auf diese Weise ein Ring gebildet worden ist, nach vorn. Zugleich entsteht ein eigner, völlig von diesem getrennter Knochenkern an dem äußern Ende des obersten senkrechten Bogenganges. Hierauf entsteht eine dritte, kleine

rinth und von ihm immer getrennt; allein ich habe mich durch mehrfache Untersuchungen überzeugt, daß diese Membran in dem Maasse als sich das knöcherne Labyrinth um sie bildet, fester, derber, trockner, hornartig wird, so daß höchst wahrscheinlich beide Bildungsweisen Statt finden, anfänglich diese Membran das Labyrinth ausscheidet, dann durch Secretion derselben Substanz in ihrem Innern und Vereinigung mit der zuerst gebildeten Lage selbst in seine Zusammensetzung eingetht, und zu seinem innern Blatte wird. Hiernach käme die Entstehungsweise des knöchernen Labyrinthes mit der Zahnbildung überein.

## Zweite Abtheilung.

### Abweichende Zustände des Gehörorgans <sup>1)</sup>.

#### §. 1950.

Das Gehörorgan bietet, als ein sehr zusammengesetztes Organ, viele und ihrem Wesen nach sehr verschiedene Abweichungen vom Normalzustande dar, deren Folge hauptsächlich ein mehr oder weniger schweres Gehör ist.

#### §. 1951.

I. Formabweichungen. A. Die ursprünglichen haben hier, wie überall, in physiologischer Hinsicht das meiste Interesse.

Eben

---

<sup>1)</sup> E. außer den oben angeführten Werken von Düberney, Wildberg und Saunders, welche zugleich die Krankheiten des Ohres abhandeln, J. A. Rivinus de auditus vitiis. Lips. 1717. rec. in Halleri coll. diss. Tom. IV. p. 308 seqq.

Eben so sind sie meistens mehr oder weniger deutlich Hemmungen auf frühern Bildungsstufen<sup>1)</sup> und Wiederholung niedrigerer Thierbildungen.

Bisweilen ist das ganze Gehörorgan in seiner Entwicklung gehemmt<sup>2)</sup>.

## I. Aeußeres Ohr.

§. 1952.

a) Quantitative Bildungsabweichungen. Das äußere Ohr erscheint bisweilen durch gänzlichen Mangel auf der frühesten Bildungsstufe gehemmt.

Etwas weniger von der vollkommenen Entwicklung entfernt ist die Verschiebung desselben, die verschiedene Grade hat, und durch Kürze und Enge des äußern Gehörganges in die normale Bildung übergeht.

Der Mangel oder die Verwachsung des Ohres Tappchens mit der Haut des Kopfes ist die geringste Abweichung vom Normal, die auch in einer frühern Periode Regel ist.

Die oft ungeheure Größe der Ohren kann man als einen entgegengesetzten Bildungsfehler ansehen.

b) Qualitative Bildungsabweichungen sind Umstülpungen des Ohres über die Oeffnung des äußern Gehörganges, wodurch dasselbe mehr oder weniger verschlossen wird<sup>3)</sup>.

D 3

2. In

1) E. über die Hemmungsbildungen des Gehörorgans  
Meckels Handb. der pathol. Anat. Bd. I. S. 400 — 406.

2) Röderer descr. foetus parasit. Comm. soc. Gott. T. IV.

3) Walther Fetthautgeschwülste, Landshut 1814. S. 33.

## 2. Inneres Ohr.

J. 1953.

## A. Paukenhöhle.

a) Quantitative Bildungsabweichungen. Die Paukenhöhle ist zuweilen nicht gehörig ausgehöhlt, zuweilen nach außen verschlossen, wie bei den Fischen. Bisweilen fehlen einer oder mehrere Gehörknöchelchen oder sind zu klein. Auf entgegengesetzte Weise übertreffen sie zuweilen die gewöhnliche Größe beträchtlich, wo sie dann nach dem Fötustypus fortgewachsen sind. Sehr selten finden sich überzählige, doch sehr kleine Gehörknöchelchen, namentlich 1) zwischen Hammer und Ambos; 2) am Halse des Steigbügels.

b) Qualitative Bildungsabweichungen. Die Gehörknöchelchen sind bisweilen nach einem abweichenden Typus und dann mehr oder weniger thierähnlich gebildet.

So fand Comparetti <sup>1)</sup> bei einem Manne auf beiden Seiten den Steigbügel nicht nur klein, sondern nur aus einem Schenkel mit einer kleinen, das sehr enge eirunde Loch verschließenden, Platte gebildet.

## B. Labyrinth.

Bei sehr unvollkommener Bildung des Labyrinthes ist nur eine einfache, nicht in Schnecke, Vorhof und Kanäle abgetheilte, nicht mit der Pauke zusammenhängende, nach außen verschlossene Höhle <sup>2)</sup> vorhanden, gerade die Form des Gehörorgans der Krustenthiere und Cepien, welche vielleicht auch den frühesten Embryoperioden des Menschen regelmäßig zukommt.

Bei

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 24.

<sup>2)</sup> Abderer a. a. D. Medel path. Anat. Bd. I. S. 406.

Bei etwas höherer Entwicklung hat die Schnecke weniger Windungen als gewöhnlich <sup>1)</sup>, so wie sie bei den Reptilien und noch bei den Vögeln nur als eine nicht gewundene, blinde Verlängerung erscheint. Dies ist, nach dem Vorigen, offenbar Fötusbildung.

Die Verknöcherung des Labyrinthes geschieht bisweilen sehr unvollkommen, so daß ein Theil des häutigen frei liegt <sup>2)</sup>.

#### C. Gehörnerv.

Der Gehörnerv ist bisweilen mit Taubstummheit zu klein, nur halb so groß als gewöhnlich <sup>3)</sup>.

#### §. 1954.

B. Später entstehende Formabweichungen sind entweder die gewöhnlichen, durch mechanische Einwirkungen herbeigeführt, oder Folgen von Texturveränderungen. Beim Wasserkopf findet man oft die beiden äußern Gehörknöchelchen nach außen gedrängt und vom Steigbügel getrennt, bisweilen auch diesen aus dem eirunden Fenster gehoben <sup>4)</sup>.

#### §. 1955.

II. Texturveränderungen des Gehörorgans sind hauptsächlich Entzündung und ihre Folgen, vorzüglich Verwachsung und Vereiterung, welche sowohl das äußere als das innere Ohr nicht selten treffen. Vorzüglich werden die Rachendöffnung der Trompete oft in Folge von Entzündungen des Rachens verschlossen, die Pauke und die Gehörknöchel-

2 4

chen

1) Mundini Anat. surdi nati. Comm. Bonon. T. VII.  
Meckels Handbuch der path. Anat. Bd. I. S. 403.

2) Mundini a. a. D.

3) Haighton mem. of the medical society. Vol. III. p. 1.

4) Blumenbach Geschichte der Knochen, S. 140.

den werden durch Nervenästere gezeit. Ganz aber typische Verkümmung des Paukenröhres gehört hierzu, auch noch mehr die regelmäßige Verknöcherung der Trommelfläche des Gehörknöchelchens, die man bei langen Schiefhalsen bemerken darf, ist, fast nicht 1).

Diese Veränderungen des Schierröhres entwickeln sich am gewöhnlichsten metastatisch in ihm, entstehen aber bisweilen, doch meist später, in Folge von Verkümmungen im Innern des Schädels und namentlich im Gehirn.

Diese Störungen sind 1) die regelmäßige Knochenverknöcherung, welche die Verwachsung der Schierröhrenknochen unter einander, die Verkümmung des runden Fensters durch Knochenbildung 2), (wobei es merkwürdig ist, daß jedoch die Schierröhrenknochen, besonders der Stängel, derselb so groß als gewöhnlich waren), die Verwachsung des Stängels mit dem ovalen Fenster 3) und Knochenverknöcherung im Trommelfell 4) folgen sind; 2) unregelmäßige Häute oder Häutknorpelbildung, welche meistens im Geleite von Eiterschüben am Schierröhren verstanden werden 5).

Ganz regelmäßige Füllungen sind Schwämme und Polypen, welche sich besonders in der Schleimhaut des Gehörknöchelchens entwickeln.

1) Haighton a. a. O. Cline bei Saunders a. a. O. S. 88.

2) Gerson a. a. O. S. 72 p. 51.

3) Valsalva de aere human. Cap. II. §. X.

4) Gellertsch Tr. III. p. 35. Löffke obl. anat. p. 25. Siefert Beitr. der federisch. Präpar. S. 148.

5) Sandifort obl. anat. pathol. L. I. C. 9.



## Zweiter Abschnitt.

Vom Sehorgan oder dem Auge <sup>1)</sup>.

§. 1956.

Das Sehorgan oder das Auge nimmt den obern Theil der vordern Fläche des Antlitzes ein, und liegt auf beiden Seiten neben und über der Nasenwurzel in der Augenhöhle (Th. 2. S. 157.) und im Umfange derselben. Man kann es am besten in das eigentliche Auge, oder den Augapfel (Bulbus oculi) nebst den ihn bewegenden Muskeln, und die Schutzmittel desselben zerfallen.

D 5

Erste

## 1) Schriftsteller:

H. Fabricius ab Aquapendente de visione, voce et auditu. Venet. 1606. fol.

V. F. Plempii ophthalmographia s. tractatio de oculo. Amst. 1652. 4. Lovan. 1648. fol.

G. Briggs Ophthalmographia s. oculi ejusque partium descriptio anatomica. Londini. 1685.

J. Taylor nouveau traité d'anatomie du globe de l'oeil avec l'usage de ses différentes parties, et de celles qui lui sont contigues. à Paris. 1738. 8.

A. Bertrandi Diss. II. de hepate et oculo. Taur. 1748. 8.

J. G. Zinn descriptio anatomica oculi humani. Gotting. 1753. 4. rec. c. Wrisberg ib. 1780.

W. Porterfield treatise on the eyes, the manner and phenomena of vision. Edinb. 1759. 8. 2 Bde.

M. Horrebow de oculo humano ejusque morbis. Hafn. 1792. 8.

A. Mon-

chen werden durch Rachengeschwüre zerstört. Ganze oder theilweise Zerstörung des Paukenfelles gehört hieher, auch höchst wahrscheinlich die regelwidrige Beschaffenheit der Feuchtigkeits des Labyrinthes, die man bei langen Gehörfehlern bisweilen dick, fest, hart findet<sup>1)</sup>.

Diese Veränderungen des Gehörorgans entwickeln sich am gewöhnlichsten metastatisch in ihm, entstehen aber bisweilen, doch weit seltner, in Folge von Zerstörungen im Innern des Schädels und namentlich im Gehirn.

Neue Bildungen sind 1) die regelwidrige Knochen-erzeugung, wovon die Verwachsung der Gehörknöchelchen unter einander, die Verschließung des runden Fensters durch Knochen-substanz<sup>2)</sup>, (wobei es merkwürdig ist, daß zugleich die Gehörknöchelchen, besonders der Steigbügel, doppelt so groß als gewöhnlich waren), die Verwachsung des Steigbügels mit dem ovalen Fenster<sup>3)</sup> und Knochen-erzeugung im Trommelfell<sup>4)</sup> Folgen sind; 2) regelwidrige Faser- oder Faserknorpelbildung, welche bisweilen in Gestalt von Geschwülsten am Gehörnerve beobachtet wurde<sup>5)</sup>.

Ganz regelwidrige Bildungen sind Schwämme und Polypen, welche sich besonders in der Schleimhaut des Gehörganges entwickeln.

1) Haighton a. a. O. Cline bei S. - Jones a.

2) Coruani a. a. O. §. 72. p. 61.

3) Valsalva de aure humana.

4) Cassebohm Tr. III. p. 10.

Köhler Besch. der Lohr.

5) Sandifort obl. anat.

Zweiter Abschnitt.

Dem Sehen gehörig.

Das Sehen geschieht durch das Licht, welches von dem Gegenstande ausgeht, und durch die Netzhaut in das Auge fällt. Das Licht wird durch die Hornhaut, die Aqueous humor, die Linse, und den Vitreous humor geleitet, und fällt endlich auf die Netzhaut. Die Netzhaut ist eine feine, durchsichtige Membran, die die innere Fläche des Auges auskleidet. Sie ist mit einem feinen Gefäßnetze versehen, welches die Nerven des Sehes enthält. Die Netzhaut ist in zwei Theile getheilt, in einen vordern und einen hintern Theil. Der vordere Theil ist diejenige, auf welche das Licht fällt, und der hintere Theil ist diejenige, die die Nerven des Sehes enthält.

Einige Figuren.

1. Ein Querschnitt des Auges, welcher die Hornhaut, die Aqueous humor, die Linse, und den Vitreous humor zeigt.
2. Ein Querschnitt des Auges, welcher die Netzhaut, die Choroidea, und die Sklera zeigt.
3. Ein Querschnitt des Auges, welcher die Nerven des Sehes zeigt.
4. Ein Querschnitt des Auges, welcher die Nerven des Sehes zeigt.
5. Ein Querschnitt des Auges, welcher die Nerven des Sehes zeigt.

Das Sehen geschieht durch das Licht, welches von dem Gegenstande ausgeht, und durch die Netzhaut in das Auge fällt. Das Licht wird durch die Hornhaut, die Aqueous humor, die Linse, und den Vitreous humor geleitet, und fällt endlich auf die Netzhaut. Die Netzhaut ist eine feine, durchsichtige Membran, die die innere Fläche des Auges auskleidet. Sie ist mit einem feinen Gefäßnetze versehen, welches die Nerven des Sehes enthält. Die Netzhaut ist in zwei Theile getheilt, in einen vordern und einen hintern Theil. Der vordere Theil ist diejenige, auf welche das Licht fällt, und der hintere Theil ist diejenige, die die Nerven des Sehes enthält.

Man

mit einer sehr kurzen Sehne im Grunde der Augenhöhle von der Weinhaut, welche den obern Theil des Umfangs des Sehlöches bekleidet, wo er mit den Sehnen des innern und des obern geraden Augenmuskels zusammenhängt, geht hierauf, allmählich breiter und dünner werdend, dicht unter dem Dache der Augenhöhle, den obern geraden Augenmuskel in seinem innern Theile, vorn ganz bedeckend, nach vorn, und geht in eine sehr dünne, oft kaum merkliche Sehnenausbreitung über, welche sich theils an den obern Rand des obern Augenlidknorpels heftet, theils zwischen diesem und dem Augenlidscbließer bis zu seinem untern Rande reicht, an welchem sie sich endigt.

Zieht das obere Augenlid in die Höhe.

§. 1965.

Außer dem obern und untern Augenlide befindet sich im innern Augenwinkel noch ein drittes, weit kleineres und unvollkommneres.

Die beiden Augenlidwinkel unterscheiden sich durch ihre Gestalt, sofern der äußere spitzer als der innere ist, und dieser als eine kleine, engere Verlängerung der Augenlidspalte gegen die Nase hin erscheint, deren Abgränzung von dem übrigen, größern Theile der Augenlidspalte sehr bestimmt durch die Thränenpunkte angedeutet wird, und die sich nach innen durch einen rundlichen Rand endigt.

In diesem Raume nun befindet sich das dritte Augenlid.

Es hat eine dreieckige Gestalt, ist mit der Spitze nach innen, mit dem halbmondförmigen freien Rande nach außen gewandt, und wird durch eine Verdopplung der Weinhaut, einen kleinen, gegen den freien Rand derselben befindlichen Augenlidknorpel, und eine ansehnliche Menge,

senfacke und Thränengänge. Gewissermaßen kann man auch hieher die Bindehaut zählen, sofern sie mit den Ausführungsgängen der Thränendrüse und den Thränenkanälen ein ununterbrochnes Ganzes bildet, und in der That nur eine sehr erweiterte Stelle des abführenden Theiles des Thränenorgans ist.

#### a. Thränendrüsen<sup>1)</sup>.

§. 1969.

Gewöhnlich nimmt man nur eine Thränendrüse an, in dessen finden sich in der That zwei, gewöhnlich eine obere und eine untere. Beide sind zusammengeschäufte Drüsen, welche beide hinter dem obern Augenlide, dicht unter dem Dache der Augenhöhle, liegen.

Die obere Thränendrüse (*Glandula lacrymalis superior* l. *innominata Galeni*), ist beträchtlich größer, liegt in der Grube des Stirnbeins, welche ihren Namen führt, und hat eine dreieckige, von oben nach unten plattgedrückte Gestalt. Die untere (*glandulae congregatae Monroi*<sup>2)</sup>), kleinere, berührt den vordern Theil der obern mit ihrem hintern Ende, und reicht bis zum äußern Theile des obern Randes des Knorpels des obern Augenlides. Ihre Läppchen sind kleiner und weiter von einander entfernt als die der obern Thränendrüse.

§ 2

Aus

1) Nic. Stenonis de glandulis oculorum novisque eorum vasibus observationes anatomicae quibus veri lacrymarum fontes deteguntur. In ejus Obs. anat. Lib. B. 1662.

A. Monro on the lachrymal glands and ducts. In dessen anatomical and physiological observations. Edinb. 1758. p. 74 — 80. Tab. II.

2) A. a. D. C. 77.

Aus beiden Thränendrüsen entspringen sechs bis sieben äußerst freie Gänge, welche von hinten, außen und unten nach vorn, innen und unten verlaufen, und sich von außen nach innen neben einander, in der Nähe des äußern Augenwinkels an der innern Fläche des obren Augenlides öffnen.

#### b. Thränenkanälchen und Thränenpunkte.

§. 1970.

An dem obren und untern Augenlide befindet sich an der Stelle, wo der innere Winkel seinen Anfang nimmt, und die Oeffnungen der Augenliddrüsen aufhören, eine, etwas weiter nach hinten gerichtete, sich durch weit beträchtlichere Größe und kegelförmigen Vorsprung leicht von den Oeffnungen der Augenliddrüsen und Wimpern unterscheidende Oeffnung, der obere und untere Thränenpunkt (*Puncta lacrymalia, Superius et inferius*), von welchen der obere nach unten, der untere nach oben gerichtet ist.

Der untere ist gewöhnlich merklich größer als der obere.

Diese sind die Anfänge der Thränenkanälchen (*Cannaliculi lacrymales* *l. cornua limacum*), welche sich von ihnen bis zum Thränensacke erstrecken.

Sie verlaufen dicht über den Augenlidrändern, vorn von dem Kreisemuskel bedeckt, und so eng mit ihm verwachsen, daß sie kaum von seinen Fasern getrennt werden können, hinten nur durch die innere Platte der Augenlider bedeckt.

Zuerst steigt der obere etwas nach außen und oben, der untere nach außen und unten, in welchem Theile ihres Verlaufs sie äußerst enge sind. Hierauf wenden sie sich, nachdem sie eine kleine Anschwellung gebildet haben, der obere nach unten und unten, der untere nach oben, und convergiren beträcht-

nensacke und Thränengänge. Gewissermaßen kann man auch hieher die Bindehaut zählen, sofern sie mit den Ausführungsgängen der Thränendrüse und den Thränenkanälchen ein ununterbrochenes Ganzes bildet, und in der That nur eine sehr erweiterte Stelle des abführenden Theiles des Thränenorgans ist.

#### a. Thränendrüsen<sup>1)</sup>.

§. 1969.

Gewöhnlich nimmt man nur eine Thränendrüse an, in dessen finden sich in der That zwei, gewöhnlich eine obere und eine untere. Beide sind zusammengehäufte Drüsen, welche beide hinter dem obern Augenlide, dicht unter dem Dache der Augenhöhle, liegen.

Die obere Thränendrüse (*Glandula lacrymalis superior* f. *innominata Galeni*), ist beträchtlich größer, liegt in der Grube des Stirnbeins, welche ihren Namen führt, und hat eine dreieckige, von oben nach unten plattgedrückte Gestalt. Die untere (*glandulae congregatae Monroi*<sup>2)</sup>), kleinere, berührt den vordern Theil der obern mit ihrem hintern Ende, und reicht bis zum äußern Theile des obern Randes des Knorpels des obern Augenlides. Ihre Läppchen sind kleiner und weiter von einander entfernt als die der obern Thränendrüse.

§ 2

Aus

1) Nic. Stenonis de glandulis oculorum novisque eorum valis observationes anatomicae quibus veri lacrymarum fontes designantur. In ejus Obs. anat. Lib. B. 1662.

A. Monro on the lachrymal glands and ducts. In dessen anatomical and physiological observations. Edinb. 1758. p. 74 — 80. Tab. II.

2) H. a. D. C. 77.

Aus beiden Thränendrüsen entspringen sechs bis sieben äußerst freie Gänge, welche von hinten, außen und unten nach vorn, innen und unten verlaufen, und sich von außen nach innen neben einander, in der Nähe des äußern Augenwinkels an der innern Fläche des obern Augenlides öffnen.

b. Thränenkanälchen und Thränenpunkte.

§. 1970.

An dem obern und untern Augenlide befindet sich an der Stelle, wo der innere Winkel seinen Anfang nimmt, und die Oeffnungen der Augenliddrüsen aufhören, eine, etwas weiter nach hinten gerichtete, sich durch weit beträchtlichere Größe und kegelförmigen Vorsprung leicht von den Oeffnungen der Augenliddrüsen und Wimpern unterscheidende Oeffnung, der obere und untere Thränenpunkt (*Puncta lacrymalia, superius et inferius*), von welchen der obere nach unten, der untere nach oben gerichtet ist.

Der untere ist gewöhnlich merklich größer als der obere.

Diese sind die Anfänge der Thränenkanälchen (*Canaliculi lacrymales* s. *cornualimacum*), welche sich von ihnen bis zum Thränensacke erstrecken.

Sie verlaufen dicht über den Augenlidrändern, vorn von dem Kreismuskel bedeckt, und so eng mit ihm verwachsen, daß sie kaum von seinen Fasern getrennt werden können, hinten nur durch die innere Platte der Augenlider bedeckt.

Zuerst steigt der obere etwas nach außen und oben, der untere nach außen und unten, in welchem Theile ihres Verlaufs sie äußerst enge sind. Hierauf wenden sie sich, nachdem sie eine kleine Anschwellung gebildet haben, der obere nach innen und unten, der untere nach oben, und convergiren beträcht-



die Beschaffenheit der Flüssigkeiten sehr wohl in eine hintere größere, und eine vordere, weit kleinere Hälfte abgetheilt werden.

Die äußerste Haut ist die harte Haut oder die Hornhaut des Augapfels, deren hinterer Theil den Namen der undurchsichtigen oder weißen Haut erhält. Auf diese folgt die mittlere oder Aderhaut, deren vorderer Theil die Blendung ist; hierauf die Netzhaut, eine Fortsetzung des Sehnerven.

Diese umgibt zunächst die hinten, und in ansehnlichster Menge vorhandne Glasfeuchtigkeit, vor welcher sich die Krystall-Linse befindet, zwischen welcher und der Hornhaut, in einem Raume, der den Namen der Augenkammer führt, die wässerige Feuchtigkeit enthalten ist.

#### A. Äußere Häute des Augapfels.

§. 1973.

Die äußern Häute des Auges sind bei weitem härter und dicker als die übrigen, und bestimmen die Gestalt des Augapfels.

##### a. Harte Haut des Augapfels.

§. 1974.

Die harte oder weiße Haut des Augapfels, die undurchsichtige Hornhaut (Tunica sclerotica, s. albuginea s. cornea opaca), nimmt den bei weitem größern, hintern Theil des Umfangs des Augapfels, ungefähr fünf Sechstheile des Ganzen, ein. In dem hintern Theile ihres Umfangs ist sie, etwas weiter nach innen als in der Mitte, entweder mit einer rundlichen Oeffnung versehen, oder wenigstens beträchtlich verdünnt. Diese Stelle ist mit einer ansehnlichen Menge von feinen Oeffnungen siebartig durchbohrt, durch welche die Bündel des Sehnerven mit der Netzhaut zusammen-

hängen. Vorn endigt sich die harte Haut mit einer ansehnlichen runden Oeffnung, welche die Hornhaut aufnimmt.

Sie ist eine fibröse Haut (Th. I. S. 444 ff.), ist daher weiß, glänzend, faserig, beträchtlich fest und elastisch. Sie kann, jedoch nur künstlich, in mehrere Schichten, die aber durch viele Zwischenfäden unter einander verwebt sind, zerlegt werden.

Sowohl die äußere als innere Fläche ist glatt. An die äußere sind eine ansehnliche Menge von Blutgefäßen, die Stämmchen der Gefäße der innern Augentheile, genau geheftet, welche sie theils im hintern Theile ihres Umfangs, theils weiter nach vorn, gegen die Mitte, durchbohren, indem sie, nach Verhältniß ihrer Größe, in einer mehr oder weniger beträchtlichen Strecke in ihrer Substanz verlaufen.

Durch andre, in der hintern Hälfte befindliche, kleinere Oeffnungen, treten die Blendungsnerven zwischen sie und die Aderhaut von außen nach innen.

Die Dicke der harten Haut ist nicht überall dieselbe, sondern nimmt im Allgemeinen von hinten, wo sie ungefähr eine Linie beträgt, nach vorn bedeutend ab, so daß sie im Umfange der Hornhaut um die Hälfte dünner ist.

Vorzüglich wird sie an der Stelle der Einsenkung der Sehnen der geraden Augenmuskeln dünner, wo ihre Dicke immer geringer als in den Zwischenräumen, keinesweges aber beträchtlicher ist.

An der Stelle, wo der Sehnerv an den Augapfel tritt, ist die harte Haut sehr genau mit der von der harten Haut stammenden Hülle desselben verbunden, und, wenn sie gleich beträchtlich, acht bis zehnmal, dicker und zugleich stärker als

dick

Diese ist, doch um so mehr als ein mit derselben zusammenhängendes Ganzes anzusehen, da sie durch ihr Gewebe im Wesentlichen mit ihr übereinkommt.

§. 1975.

Von den über einander liegenden, vielfach verschlungenen Blättern der harten Augenhaut kann man mehr oder weniger deutlich, besonders in den frühern Lebensperioden leichter als in spätern, ein sehr dünnes Blatt, die Fortsetzung, nicht der Gefäßhaut, wie man seit Zinn<sup>1)</sup> annimmt, sondern der von der Spinnwebenhaut stammenden Hülle des Sehnerven, trennen.

Diese wirft sich, deutlich mit der letztern zusammenhängend, vom Umfange des Siebplättchens, durch welches der Sehnerv eintritt, indem sie hier einen kleinen, nach innen vorspringenden kreisförmigen Wulst bildet, an die innere Fläche der harten Haut, verschmilzt sehr genau mit ihr, und verläuft bis zum vordern Rande derselben.

Zwischen beiden findet also genau dasselbe Verhältniß, als zwischen der harten Haut und der Spinnwebenhaut in der Höhle des Schädels und der Wirbelsäule, und überhaupt zwischen den harten, von serösen Häuten bekleideten Substanzen, Knorpeln und saftern Organen, Statt.

Die innere Fläche dieses innern Blattes der harten Haut ist durch lockeres Schleimgewebe, und die, die harte Haut durchbohrenden Nerven und Gefäße ziemlich fest, doch so mit der Aderhaut verbunden, daß im frischen Zustande, noch besser aber einige Tage nach dem Tode die harte

1) H. a. D. S. 11.

Haut ohne Verletzung der Aderhaut durchschnitten und weggenommen werden kann.

b. Hornhaut<sup>1)</sup>.

§. 1976.

Die Hornhaut, durchsichtige Hornhaut (T. cornea l. cornea pellucida), welche den vordersten Theil des Augapfels umgiebt, unterscheidet sich von der harten Haut durch ihren Bau so sehr, daß beide durchaus nicht mit demselben Namen zu belegen sind.

Sie bildet den Abschnitt einer etwas kleinern Kugel als die, welche durch die harte Haut beschrieben wird, ist daher stärker gewölbt, und springt etwas über diese vor.

Sie ist immer etwas dicker als die harte Haut, an ihrem vordern Theile, gewöhnlich überall, mit Ausnahme ihres äußersten Umfangs, wo sie sich, aber nur in einer kleinen Strecke, beträchtlich verdünnt, gleichmäßig, bisweilen aber in der Mitte etwas dicker als in ihrem Umfange, immer an ihrer hintern Fläche in demselben Maße concav, als in der vordern gewölbt.

Ueber dem obern und untern Rand ihrer äußern Fläche setzt sich die Bindehaut in der Breite von ungefähr einer halben Linie deutlich fort, so daß sie daher hier an der äußern Fläche nicht völlig rund, sondern etwas elliptisch ist. Dagegen ist die hintere Fläche ganz rund. Diese endigt sich mit einer kreisförmigen Vertiefung, einem Falz, welcher einen vorspringenden Rand aufnimmt, der sich an der Gränze zwischen dem Strahlenbände und der Blendung befindet.

An

1) B. D. Mauchart resp. Georgii corneae oculi tunicae examen anatomico - physiologicum. Tubingae, 1745. 4. rec. in Halleri coll. diss. Tom. IV.

An ihrem äußern Rande, durch welchen sie sich mit der harten Haut verbindet, verdünnt sie sich immer beträchtlich, und endigt sich mit einem scharfen Rande.

Die Verbindung geschieht auf dreifache Weise.

Entweder nimmt die vordere Fläche allmählich ab, und die Hornhaut wird daher von der harten Haut zum Theil bedeckt.

Oder beide Flächen verkleinern sich allmählich, und die Hornhaut schiebt sich daher in einen, durch das Auseinanderweichen der harten Haut an ihrem vordern Rande gebildeten Falz.

Oder endlich die innere Fläche schwindet allmählich, und die Hornhaut legt sich daher etwas über den vordern Rand der harten Haut.

Die erste Anordnung ist die häufigste, die letzte die seltenste.

§. 1977.

Die Hornhaut besteht aus mehreren Blättern, die sich leichter als die in der harten Haut vorhandenen von einander trennen lassen, zwischen welchen sich eine helle, wässrige Feuchtigkeit befindet, und die durch lockeres Zellgewebe an einander geheftet werden.

Diese wässrige Flüssigkeit bringt nach dem Tode hervor, und enthält zum Theil den Grund der Verdunklung und des Zusammenfallens der todten Hornhaut.

Ihre hintere Fläche ist mit einer, durch Kochen oder leichte Maceration leicht von ihr zu trennenden, durchsichtigen, dünnen, homogenen, wenig ausdehnbaren, glatt zerreißen-

Mem-

Membran<sup>1)</sup> bekleidet, welche an dem Rande der Hornhaut aufhört, und sich, wenigstens nicht deutlich, über die Blendung fortsetzt. Sie erhält den wenig geeigneten Namen: Haut der wässerigen Feuchtigkeit (*Membrana humoris aquei*), da sie mit der Absonderung dieser Feuchtigkeit in keiner Beziehung zu stehen scheint.

### B. Aderhaut und Blendung<sup>2)</sup>.

#### §. 1978.

Unmittelbar auf die äußere oder harte Haut des Auges folgt eine zweite Schicht, welche mit ihr durch ihre Ausbreitung einigermaßen übereinkommt. Sie besteht gleichfalls aus zwei durch ihre Organisation verschiedenen Hälften, einer hinten größern, und einer weit kleinern vordern.

Die erste ist die Aderhaut oder Gefäßhaut (*Tunica vasculosa* L. *chorioides*), die zweite die Blendung (*Iris*).

#### a. Aderhaut.

#### §. 1979.

Die Aderhaut entspricht der undurchsichtigen Hornhaut, erstreckt sich vom Eintritte des Sehnerven an, wo sie, zum

---

1) B. Duddell *Treatise on the diseases of the horny coat in the eye*. London. 1729. 8.

J. Desce-met an sola lens crystallina cataractae sedes. Paris. 1758. Ders. in *Mém. des Savans étrangers*. Tom. I. - *De-mours Lettre à M. Petit*. Par. 1767. Den Streit beider um die Entdeckung s. auch im *Journ. de médecine*. 1769. 1770. 1771.

2) Ruysch *Epist. anat.* XIII.

L. Heister *diff. inauguralis de tunica chorioides*. rec. in *Fasc. diff. med.* L. B. 1445. 8.

B. S. Albinus *de tunica Ruyschiana et chorioides oculi*. In *annot. acad.* L. VII, Cap. IV.

Behuf des Durchtrittes desselben, wie jene, von einer rundlichen Oeffnung durchbohrt ist, überall, vorzüglich aber längs des Verlaufs der Blendungsnerven und der Gefäße, durch lockeres Schleimgewebe dicht an sie geheftet, so, daß der Zusammenhang nur Stellenweise, durch die zwischen ihnen von vorn nach hinten laufenden Blendungsnerven und die langen Blendungsgefäße unterbrochen wird, bis zu ihrem vordern Rande. Die innere Fläche der Aderhaut ist durchaus nicht mit der darunter liegenden Netzhaut verbunden, wenn sie dieselbe gleich unmittelbar berührt.

## §. 1980.

Gegen das vordere Ende der Aderhaut verdickt sich das Schleimgewebe an ihrer äußern Fläche beträchtlich, und bildet einen weißlichen, ungefähr eine Linie breiten Ring, das *Strahlenband* (*Ligamentum ciliare, orbiculus ciliaris, circulus ciliaris, plexus ciliaris*). Durch diesen wird die Aderhaut genauer als in ihrem übrigen Verlauf an die harte Haut geheftet, noch weit enger aber an die hier dünnere Aderhaut, so, daß zwar diese hier leicht von der harten Haut, nicht aber von dem Strahlenbände getrennt werden kann, das man wohl am richtigsten als einen Theil von ihr ansieht.

Der innere Umfang des Strahlenbandes wird von einem schmalen, aber deutlichen, weißen Vorsprunge begrenzt, welcher genau von einem kleinen, im äußersten Umfange der innern Fläche der durchsichtigen Hornhaut befindlichen Ratz aufgenommen wird.

Vor diesem Ringe, mit ihm genau verbunden, liegt die Blendung.

b. Strah:

## b. Strahlenkörper.)

§. 1981.

In dieser Stelle erleidet die innere Fläche der Aderhaut eine merkwürdige Veränderung, indem sie den Strahlens oder Faltenkranz oder Körper (Corona ciliaris l. orbiculus ciliaris, corpus ciliare, tunica ciliaris) bildet. Vom äußern Rande des Strahlenbandes an nämlich faltet sie sich in der Breite von ungefähr anderthalb Linien vielfach und fein nach innen, so, daß eine sehr ansehnliche Menge von niedrigen, nach innen zusammenstrebenden Strahlen entstehen. Auf diesen äußern, aus niedrigeren Strahlen gebildeten Kreis, folgt ein flacherer, innerer, der aus weit höhern, mit einem gewölbten innern Rande versehenen, von außen nach innen erst höher werdenden, dann rucklich gradigten Falten gebildet wird. Die Zahl dieser Falten (Processus ciliares) ist geringer, doch noch beträchtlich ansehnlich, ungefähr sechzig. Jederseits stehen sie weit weiter aus einander als die äußern. Ihr vordere Ende ist frei, mit dem vordern Theil ihres sichspitzenden Randes sind sie an den geßigen Ursprung der Linienkapsel geheftet. Der hintere Theil dieser ganzen Gegend der Aderhaut ist sehr eng an der äußern Fläche des Strahlenkranzes geheftet, indem die Falten von ihnen genau umschlossen, Befestigungen des letztern aufgenommen werden, so daß daher hier die innere Fläche der Aderhaut sehr genau an der darunter liegenden Optik geheftet ist, und im ganz frischen Zustande die

Ziem

1) I. G. Zinn de Ligamento ciliario programma. Götting. 1733. 4.

2) Döllinger über das Strahlenbüschel im menschlichen Auge. 1846.



Trennung beider von einander leicht mit Zerreiſung des Strahlenbündchens verknüpft iſt.

§. 1982.

Die Aderhaut iſt dünn, weich, aber feſt, nach Wegnahme des ſie bekleidenden Pigmentes, weißlich, etwas durchſichtig. Sie beſteht beinahe ganz aus Blutgefäßen, die man ſowohl an ihrer äußern als innern Fläche, beſonders aber an der erſtern, ſehr deutlich wahrnimmt.

Dieſe ſind theils Pulsadern, theils Blutadern, Gefäße der Aderhaut <sup>1)</sup>, vorzüglich aber haben die letztern ein bedeutendes Uebergewicht über die erſtern.

§. 1983.

Die, welche den Namen der Blendungsarterien (*Arteriae ciliares*) führen, ſind vorzüglich doppelter Art.

Die langen Blendungspulsadern (*A. ciliares longae*), ſind größer als die übrigen, und liegen oberflächlich. Gewöhnlich finden ſich nur zwei, eine äußere obere, und eine innere untere, einander mehr oder weniger gerade gegenüberſtehende, welche an der äußern Fläche der Aderhaut, nach dem ſie die harte Haut in dem hintern Theile ihres Umfangs durchbohrt haben, gerade, ohne einigermaßen bedeutende Zweige an ſie abzugeben, nach vorn zur Blendung verlaufen, in welcher ſie ſich verbreiten. Dieſe Pulsadern gehören daher in der That nicht zur Aderhaut.

Die kurzen, oder hintern Blendungspulsadern (*A. ciliares breves* ſ. *posteriores*) ſind weit kleiner,  
aber

1) J. E. Hebenſtreit de vasis sanguiferis oculi. Lipſ. 1742. 8.

J. G. Zinn de vasis subtilioribus oculi et cochleae auris internae. Gott. 1753.

aber zahlreicher als die langen, indem sich gewöhnlich zwanzig, selbst mehr finden, kommen in Hinsicht auf Größe nicht völlig unter einander überein, durchbohren die harte Haut weiter nach hinten und innen, in geringerer Entfernung vom Sehnerven, und treten sogleich an die Aderhaut. Sie spalten sich hier sehr bald unter spitzen Winkeln, vereinigen sich vielfach, vorzüglich im vordern Theile der Aderhaut, durch Zwischenäste unter einander, und bilden vorn, hinter dem äußern Rande des Strahlenkranzes, einen vielfach verschlungenen Kreis.

Die Zweige, welche durch die Spaltung entstehen, verlaufen parallel, dicht neben einander von hinten nach vorn. Im hintern Theile der Aderhaut liegen sie an der äußern Fläche derselben, von der Mitte des Augapfels an aber dringen sie an die innere Fläche, und werden daher hier deutlicher wahrgenommen.

#### §. 1984.

Die Blutadern der Aderhaut unterscheiden sich durch ansehnlichere Größe und Verlauf sehr deutlich von den Pulsadern derselben.

Ihre Zweige strahlen, dicht neben einander gedrängt, von vorn und hinten, von außen und innen, indem sie zugleich beträchtliche Bögen bilden, zu ungefähr zwölf bis vierzehn Stämmchen zusammen, welche die harte Haut ungefähr in der Mitte des Augapfels durchbohren, innerhalb derselben von vorn nach hinten in der Strecke einiger Linien verlaufen, und sich hier zu vier bis fünf größern Stämmchen vereinigen, welche an der hintern Hälfte des Auges hervortreten, und sich in die Augenvenen ergießen. Vier von diesen Stämmchen sind be-  
trächt-

istlich größer als die übrigen, von welchen einige auch nur rade von vorn nach hinten verlaufende, von der Blendung tspringende Zweige aufnehmen.

Wegen ihres gewundenen Verlaufes heißen diese Venen Wirbelgefäße (*Vasa vorticalia*). Sie liegen, vorzüglich im vordern Theile der Aderhaut mehr nach außen, oberflächlicher als die Pulsadern, und bilden die äußere Schicht der Aderhaut.

Außer ihnen verlaufen die langen Blendungsblutadern (*Venae ciliares longae* s. *anteriorae*), als Begleiterinnen der langen Blendungspulsadern, ohne bedeutende Aeste an die Aderhaut abzugeben, zur Blendung <sup>1)</sup>.

§. 1985.

Außer den Blutgefäßen und dem sie zusammenhaltenden Bindegewebe nimmt man keine Spuren von organischer Bildung, namentlich keine, von vorn nach hinten verlaufenden Fasern, die von mehreren Anatomen angenommen wurden, in der Aderhaut wahr, auch der Strahlenkranz erscheint bloß als ein vielfach verschlungenes Gefäßgewebe.

§. 1986.

Die innere Fläche der Aderhaut erscheint schon dem bloßen Auge nicht völlig glatt, sondern, vorzüglich im injicirten Auge, so sie ganz durch die eingetriebene Masse gefärbt wird, vorzüglich aber unterm Mikroskop durch eine Menge kleiner, freihängender Flocken, sammetartig. Vorzüglich sind diese am Strahlenkranze sehr deutlich, und stärker entwickelt.

Diese Flocken werden größtentheils durch ein, vorzüglich im hintern Theile der Aderhaut sehr dichtes Netz von Gefäßen gebildet.

1) S. Abbild. der Gefäße der Aderhaut bei C. Th. Sömmerring über das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel. 1818.

gebildet, welche sie daher vorzüglich hier von Innen bedecken, nach vorn dagegen freier lassen.

§. 1987.

Die innere Fläche der Aderhaut kann nicht ganz mit Recht beim Menschen als eine eigne Membran, die nach Ruysch, welcher zuerst diese Meinung vortrug, durch seinen Sohn den Namen der Ruyschischen Haut (Tunica Ruyschiana) führt, angesehen werden, indem man die Aderhaut in der That nicht in zwei getrennte Blätter zerlegen kann. Eben so wenig kann man auch eine zweite, oder, in der Voraussetzung, daß die Ruyschische Haut wirklich eine eigne sey, eine dritte, nach außen von der eigentlichen Aderhaut liegende, zottig drüsig (T. villosa - glandulosa <sup>1)</sup>), oder Ober-Aderhaut (Membrana supra - chorioidea <sup>2)</sup>), die man für selbst hält <sup>3)</sup>, annehmen.

Noch unrichtiger wurde die Aderhaut in fünf Blätter zerlegt <sup>4)</sup>, die sich überdies, da das zweite, dritte und vierte die eigentliche Aderhaut bilden, leicht auf diese und die beiden eben betrachteten zurückführen lassen.

c. Blendung <sup>5)</sup>.

§. 1988.

Die Blendung (Iris) ist eine runde, in der Mitte mit einer ungefähr concentrischen, runden Oeffnung, dem Sehe-

loche

1) B. A. Stier de tunica quadam oculi novissime detecta. Halae. 1759. 4.

2) Montain im Journ. de méd. T. 57. Bull. de la soc. d'émulation. 1817. p. 330. Deutsches Archiv Bd. 4. S. 123.

3) Döllinger a. a. D. S. 6.

4) Hovius de circulari humorum motu. L. B. 1716. p. 29 ff.

5) Maunoir sur la structure de l'Iris. à Genève. Uebersetzt im London medical and physical journal. Vol. 17.

loch (Papilla) durchbohrte Haut, welche in dem innern, gegen die Nase gewandten Theile ihres Umfanges, eine etwas geringere Breite als in ihrer übrigen Ausbreitung hat<sup>1)</sup>, und mit ihrem äußern Rande sich an den vordern Rand der Aderhaut, namentlich des Strahlenbandes heftet, übrigens völlig frei in der Augenkammer so von oben nach unten, und von einer Seite zur andern ausgespannt ist, daß sie eine quere Scheidewand bildet, wodurch die Kammer in eine vordere und eine hintere, welche durch das Seesloch indessen mit einander zusammenhängen, abgetheilt wird.

Die Blendung bildet die hintere Wand der vordern Augenkammer, deren vordere die durchsichtige Hornhaut ist, dagegen die vordere Wand der hintern Augenkammer, deren hintere Wand durch die vordere Fläche der Krystallkapsel, und den vordern Rand des Strahlenkranzes zusammengesetzt wird.

Die hintere Wand der Blendung führt auch den Namen der Traubenhaut (Uvea).

Sie steht beim Menschen gerade, ist nicht nach vorn gebogen<sup>2)</sup>, der vordern Fläche der Linsenkapsel weit näher als der Hornhaut<sup>3)</sup>. Von jener ist sie selbst im äußern Umfange, wo die Entfernung am ansehnlichsten ist, nur eine halbe Linie, in ihrem mittlern Theile höchstens eine Viertelnie, von dieser

§ 2

in

1) Winslow observations sur la mécanique des muscles obliques de l'oeil, sur l'Iris u. s. w. in Mém. de Paris. 1721. p. 465 ff.

2) Petit. Mém. sur les yeux gelés, dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humeur aqueuse. In Mém. de Paris. 1725. p. 54 ff.

3) Ebenb. 1728. p. 295. und 408.

in der Mitte bis auf eine Linie entfernt, gegen den äußern Umfang dagegen beträchtlich näher.

Ihre Ausdehnung nach innen ist höchst veränderlich, indem sie sich nicht nur unter krankhaften Bedingungen so stark ausdehnt, daß das Sehloch fast ganz verschwindet, und auf der andern Seite so beträchtlich zusammenzieht, daß sie selbst gar nicht oder kaum wahrgenommen wird, sondern auch außerdem unter gewissen äußern und innern Bedingungen sich abwechselnd schnell bedeutend ausbreitet und zusammenzieht <sup>1)</sup>. Aus einer genauen Erwägung aller Umstände ergibt sich, daß ihre Ausdehnung Zustand der Thätigkeit, ihre Zusammenziehung Zustand der Erschlaffung ist.

§. 1989.

In ihrem bei weitem größern, äußern Theile ist die Membran beträchtlich dicker als in ihrem innern, wo sie plötzlich schräg von außen und vorn nach innen und hinten abgeschnitten erscheint, und sich mit einem dünnen Rande endigt. Jenen innersten Theil ausgenommen, ist sie beträchtlich, drei bis viermal, dicker als die Aderhaut.

1) J. G. Zinn de motu uveae. In Comm. Gott. T. I.

F. Fontana dei moti dell' iride. Lucca. 1765.

J. F. Blumenbach de oculis leucäthiopum et motu iridis. Gott. 1786.

F. Hildebrandt de motu iridis. Brunsv. 1786.

Dömling über die Ursache der Bewegungen der Regenbogenhaut. In Reils Archiv Bd. 5.

Caldani intorno ai movimenti dell' iride. In Mem. della società Italiana. T. XIV. p. 2. p. 101 — 114.

Litteton on the causes which influence the size of the pupil. In London med. and physical journal Vol. 56. 1816. p. 265. Deutsches Archiv für die Physiol. Bd. 4.

Ihr äußerer und innerer Rand sind dunkler als der zwischen ihnen befindliche Theil gefärbt, am dunkelsten ist eine kleine Strecke des innern Umfangs der Blendung, etwas außerhalb des innern Randes. Diese dunkle Stelle und der zwischen sie und dem SeheLoche befindliche Theil der Blendung ist der kleine oder innere Ring (Annulus minor), der übrige Theil derselben der große oder äußere Ring der Blendung (Annulus major s. externus).

Die vordere Fläche ist durchaus, die hintere nur an der vorgegebenen Stelle gefärbt, übrigens weißlich, doch von dem schwarzen Schleim (§. 1997.) bedeckt. Jene Fläche ist der Sitz der eigenthümlichen Farbe der Augen. Sie ist überall mit feinen, verschiedentlich gefärbten Flocken besetzt, die, in Verbindung mit dem, zwischen den sogleich zu beschreibenden Strahlen durchschimmernden Pigment, welches die hintere Fläche bekleidet, den Grund der verschiedenen Färbung der Augen enthalten.

#### §. 1990.

Sowohl an der vordern als an der hintern Fläche nimmt an kreisförmige und etwas geschlängelte, longitudinale, von ihnen nach innen zusammenstrahlende Fasern wahr. Die Fasern sind vorzüglich gegen den äußern und innern Umfang, die letztern an der vordern Fläche deutlich, im großen Ringe dichter und leichter zu sehen als im kleinen.

Es wechseln weißliche mit mehr grauen, weniger deutlichen, ab, und vorzüglich deutlich sieht man sich die erstern in ihrem Verlauf unter spitzen Winkeln mehrfach in eine ansehnliche Menge kleiner Zweige spalten, welche im äußern Umfange des kleinen Ringes, durch, mit der Wölbung nach vorn ge-

richtete Bögen zusammenfließen, und dadurch einen zusammen-  
gesetzten Kranz bilden, aus welchem kleinere, dichter gedrängte  
Längsstreifen treten, welche im innern Ringe bis zum Rande  
des Sehloches zusammenstrahlend verlaufen.

Immer sind die Strahlen heller als ihre Zwischenräume  
gefärbt, weil durch diese das dunkle Pigment schimmert.

#### §. 1991.

Die Blendung ist weich, schwammig und locker.

Sie besteht größtentheils aus Nerven und Gefäßen,  
dem sie zusammenhaltenden schleimigen Gewebe, und höchst  
wahrscheinlich aus Fasern, dem Sitze des vorher (§. 1988.) er-  
wähnten Ausdehnungs- und Zusammenziehungsvermögens.

#### §. 1992.

Die Nerven der Blendung, oder die Ciliarnerven  
(Nervi ciliares), welche vom ersten Aste des fünften  
Paares, dem dritten Hirnnerven und dem Gangliennerven  
entspringen, durchbohren, ungefähr zwanzig an der Zahl,  
die harte Haut etwas hinter der Mitte des größten Umfangs  
des Augapfels, verlaufen einige Linien weit in dieser, treten  
dann zwischen sie und die äußere Fläche der Aderhaut, verlau-  
fen, locker an beide geheftet, ohne Zweige an eine von ihnen  
abzugeben, nach vorn, und spalten sich dicht hinter dem äußern  
Rande des Strahlenbandes unter spigen Winkeln gewöhnlich  
in zwei Äste, welche an der vordern Fläche der Aderhaut,  
unter dem Strahlenbande nach vorn verlaufen, und an  
der vordern Fläche der Blendung erscheinen, wo sie die web-  
bern, zusammenstrahlenden Fasern derselben bilden, in deren  
Verlauf sich rundliche Anschwellungen, vielleicht Knoten  
befinden.

Die



Die Blendungsnerven sind verhältnißmäßig zu der Blendung außerordentlich groß, und sie ist einer der nervenreichsten, wo nicht der nervenreichste, Theile des Körpers.

§. 1993.

Die Gefäße der Blendung stammen vorzüglich von den langen oder vordern Blendungsgefäßen.

Jede der beiden langen Blendungspulsadern theilt sich unter dem Strahlenbunde in zwei Äste, welche den beiden entsprechenden des andern entgegen gehen, und mit ihnen im äußern Rande der Blendung einen, schwach nach vorn gewölbten, Kranz bilden, aus welchem eine ansehnliche Menge von Zweigen entspringen, die gegen den innern Umfang der Blendung zusammenstrahlen, indem sie sich zugleich abermals spalten, und hin und wieder durch quere Zweige zusammenwünden. Vorzüglich fließen sie im äußern Umfange des innern Ringes zusammen, so daß dadurch ein mehr oder weniger dem Rande des Geheloches concentrischer Kranz gebildet wird, aus welchem abermals strahlenförmige, zum Rande verlaufende Zweige entspringen, die aber auch außerdem als unmittelbare Zweige der Strahlen des größern Kreises vorkommen.

Außer den Pulsaderzweigen enthält die Blendung auch eine reichliche Menge von Blutaderzweigen, welche sich theils in die langen, theils in die wirbelförmigen Blutadern ergießen. Daß sie in geringerer Menge als die Pulsadern vorhanden zu seyn und keine Bögen zu bilden scheinen <sup>1)</sup>, rührt höchst wahrscheinlich nur von dem Umstande her, daß sie nur durch die Pulsadern eingespritzt werden können, oder daß, wenn sie von

1) Zinn a. a. O. S. 94.

den Blutaderstämmen aus eingespritzt werden, die Anfüllung natürlich weniger vollkommen als die der Pulsadern ist.

Die Gefäße liegen vorzüglich an der vordern Fläche der Blindung am deutlichsten zu Tage, und erscheinen nur locker auf sie geheftet.

Unstreitig führen die Gefäße der Blindung rothes Blut, indem die durchschnittne Blindung blutet, und bei leucäthiopischen Augen, deren Pigment durch einen Fehler der Urbildung ungefärbt ist, die mit rothem Blut angefüllten Gefäße derselben sehr deutlich wahrgenommen werden <sup>1)</sup>.

#### §. 1994.

Auch bei der glücklichsten Einspritzung erscheint ein großer Theil der Blindung aus mehr oder weniger deutlichen, gelblich-weißen Fasern gebildet, die man mit der größten Wahrscheinlichkeit für die Werkzeuge der Bewegungserscheinungen der Blindung hält.

Auch nehmen dies mehrere Anatomen, z. B. Drelincourt <sup>2)</sup>, Kupsch <sup>3)</sup>, Monro <sup>4)</sup>, entweder geradezu an, oder sind wenigstens, wie Zinn <sup>5)</sup>, äußerst geneigt dazu.

Die Fasern verlaufen nach den Angaben theils in strahliger, theils in kreisförmiger Richtung, die erstern vom äußern Ringe zum innern, wo sie sich, nach Kupsch's Angabe, sogar durch Sehnen anheften, die Kreisfasern bilden den größten Theil

1) Monro über den Bau der Fische etc. Leipzig 1787. S. 74.

2) Fraelud. anat. oper. omn. p. 195.

3) Respons. ad epist. anat. XIII. Theil. anat. II. p. 15—15.

4) A. a. D. S. 110—115.

5) A. a. D. S. 91. und 95.

Heil des innern Ringes der Blendung \*). Jene erweitern, diese verengen durch ihre Zusammenziehung das Schloch.

Außer den innern, von Kupsch und Monro übereinstimmend angegebenen Kreisfasern habe ich einigemal deutliche kreisförmige Bündel an der vordern Fläche der Blendung, gegen ihren äußern Umfang, bemerkt, welche mit andern, von Monro an derselben Stelle im Ochsenauge gesehenen<sup>2)</sup> übereinkommen. Dagegen scheint mir weder die anatomische Untersuchung, noch die Beobachtung der Lebenserscheinungen für die Anwesenheit von zusammenstrahlenden Längensfasern zu sprechen.

#### §. 1995.

Die Blendung kann beim Menschen nur künstlich und Stellenweise in eine vordere und eine hintere Schicht, die eigentliche Blendung und die Traubenhaut (M. uvea) zerlegt werden, und eben so ungewiß ist es, ob die vordere Fläche durch eine Fortsetzung der Demours'schen Haut bekleidet wird. Wenigstens muß diese hier viel feiner als auf der Hornhaut seyn und ihre Natur ändern.

#### §. 1996.

Ueber das Verhältniß der Blendung zur Aderhaut sind die Meinungen getheilt, indem sie von einigen für eine Fortsetzung derselben, von andern dagegen für eine Haut eignen Art gehalten wird.

Für die letztere Ansicht spricht in der That:

- 1) ihre weit größere Dicke;
- 2) ihre Nervenmenge, während die Aderhaut nervenlos ist;

§ 5

3) ihr

1) Vorzüglich bildet Monro die innern oder Kreisfasern ab (a. a. D. Taf. 3.)

2) A. a. D. Taf. II.

- 3) ihr geringerer Gefäßreichthum, die Verschiedenheit derselben in Hinsicht auf Anordnung und Ursprung;
- 4) die Verschiedenheit ihrer Lebens Eigenschaften, sofern die lebhafteste Contractilität der Blendung der Aderhaut völlig fehlt.

Hiezu kann man noch bemerken, daß die Blendung an ihrem äußern Rande sich ohne große Gewalt nach unbedeutender Maceration zu einer Zeit leicht trennen läßt, wo weder die Continuität der Aderhaut noch ihre eigne leicht aufgehoben wird.

#### d. P i g m e n t 1).

§. 1997.

Die äußere und innere Fläche der Aderhaut, und die hintere Fläche der Blendung oder die Traubenhaut, sind von einer im normalen Zustande dunkelbraun gefärbten Substanz, dem schwarzen Schleim, dem Pigment (*Pigmentum nigrum*) bekleidet; welche Stellenweise in einer größern oder geringern Ausbreitung, besonders in der hintern Fläche der Blendung, in Gestalt einer zusammenhängenden Membran von den Theilen abgelöst werden kann, und an einigen Stellen, namentlich der innern Fläche des Strahlenkranzes, vorzüglich zwischen den Falten und

1) Mondini de oculi pigmento. In Comm. Bonon. T. VII. p. 29.

Elkasser de pigmento oculi nigro etc. Tubing. 1800.

L. Gmelin Diff. inaug. chem. physiol. sistens indagacionem chemicam pigmenti nigri oculorum taurinorum et vitulinorum, adnexis quibusdam in id animadversionibus physiologicis. Gottingae. 1812.

Mondini (Fil.) sul nero pigmento dell. occhio. Opuscoli scientifici di Bologna. 1818. Fasc. VII. p. 15 — 27.

und der hintern Fläche der Blendung, im Allgemeinen also nach innen, in größerer Menge vorhanden, weit dunkler und fester mit den benachbarten Theilen verbunden ist. An der äußern Fläche der Aderhaut ist es in weit geringerer Menge als an der innern vorhanden, wenn gleich dadurch kein wesentlicher Unterschied zwischen dieser und den übrigen Gegenden begründet wird. Am hintern Theile der innern Fläche der Aderhaut, im Umfange der Oeffnung für den Sehnerven fehlt das Pigment ganz, und die Aderhaut ist daher hier weiß.

Es besteht aus einer eigenthümlichen schleimigen und der gefärbten Substanz, welche durch die erstere zu einer häufigen Ausbreitung zusammengehalten wird. In Hinsicht auf ihre mechanische Zusammensetzung wird die färbende Substanz aus Kügelchen gebildet, doch sind die Kügelchen nicht durchaus schwarz, sondern werden es nur durch mehrere dunkle Pünktchen. Sie sind unregelmäßig rund, an den Ciliarfortsätzen kleiner, aber in mehreren Schichten über einander gestellt, und gleichmäßiger schwarz gefärbt. In Hinsicht auf die chemische Mischung, besteht es vorzüglich aus Kohlenstoff, den es unter allen Theilen des Körpers in der größten Menge, beinahe zur Hälfte, enthält, und einer beträchtlichen Menge Eisen <sup>1)</sup>. Vom letztem rührt wohl ihre beträchtliche Schwere, nicht aber die Färbung her, da man im Malpighischen Schleim des Negers wenig, selbst weniger Eisen als in dem des Kaufasiens fand <sup>2)</sup>.

Das Pigment kommt in seinen wesentlichen Bedingungen so sehr mit dem Malpighischen Schleim überein, daß man es  
als

1) Berzelius med. chir. transact. III. p. 255.

Coli bei Mondini II. a. a. D. S. 17.

2) Coli a. a. D. S. 26.

als diesem identisch, und daher nicht als eine abgeforderte flüssige, sondern als eine eigne, geformte, feste Substanz anzusehen hat.

### C. Von der Netzhaut <sup>1)</sup>.

#### §. 1998.

Die dritte eigne Haut des Augapfels ist die Netzhaut (T. retina s. nervea). Sie ist die Ausbreitung des Sehnerven. Dieser zieht sich an seinem vordern Ende auf dem Wege durch die harte Haut des Auges beträchtlich zusammen, der innere Theil seines Umfangs mehr allmählich als der äußere, so daß er also hier einen weit beträchtlicheren Bogen beschreibt als dort.

Vor dem vordern Ende des Sehnerven befindet sich in der harten Haut des Auges eine rundliche, mit einer ansehnlichen Menge kleiner Oeffnungen versehene Stelle, durch welche die Stränge desselben nach innen treten. Jenseit dieser durchbohrten Platte bildet das vordere Ende des Sehnerven einen kleinen warzenförmigen Vorsprung, von welchem sich die Netzhaut nach vorn ausbreitet. Hier endigt sie sich am hintern Ende des Strahlenkranzes mit einem mehr oder weniger deutlich angeschwollenen, geraden Rande, ohne sich an die Kapfel der Krystalllinse zu heften <sup>2)</sup>.

#### §. 1999.

1) J. H. Müller de tunica nervea et nervo optico. Halae. 1749.

B. S. Albinus de tunica quam vocant retinam. In Annot. acad. Lib. III. Cap. XIV. ann. 1756.

2) Zwar haben nicht nur ältere Anatomen, namentlich Winslow, Cassebohm, Ferrein, Lieutaud, Haller, welche Binn (a. a. D. S. 114.) zusammengestellt hat, sondern auch neuer

§. 1999.

Sie ist weiß, weich, dünn, einförmig, nicht faserig, überall, eine einzige Stelle an ihrem hintern Umfange ausgenommen, von gleicher Dicke. Sie besteht gewissermaßen aus einem doppelten Blatte, einer äußern Markschicht, und einer innern aus Zellgewebe und Gefäßen gebildeten, so daß also die Markschicht durch jene Schicht von dem Glaskörper trennt wird. Indessen kann man diese beiden Schichten nicht von einander trennen, daß die markige als eine eigne zusammenhängende häutige Ausbreitung übrig bliebe, wenn sich nach Zerstörung derselben durch Fäulniß die innere zellig-säbtreiche Schicht als solche erhält. Man darf daher in dieser Hinsicht die Netzhaut nicht als zwei eigne, abgesonderte Häute ansehen; dagegen findet sich wirklich an der äußern Fläche derselben eine sehr zarte, mit den serösen Häuten sehr übereinkommende

Mem-

neuerlich *Monro* (a. a. O. S. 96. ff.) behauptet, daß sich die Netzhaut unter dem Strahlenfranze bis zum größten Umfange der Krystkalkapsel erstrecke und an dieselbe heste, allein ich finde mich durch genaue Untersuchungen veranlaßt, der Angabe von *Monro*, *Gagni*, *Pinn* und mehreren ältern Anatomen beizutreten. *Monro* behauptet, man sehe die Fortsetzung der Netzhaut zur Krystkalkapsel auf doppelte Weise deutlich; 1) wenn man das Auge auf die Hornhaut lege, und einen Querschnitt durch alle Häute und die Glasfeuchtigkeit führe; 2) wenn man den Strahlenfranz aufhebe und das Pigment durch einen Pinsel vorsichtig wegnehme; allein unter beiden Bedingungen habe ich immer die Netzhaut mit einem scharfen Rande an der im Text angegebenen Stelle geendigt, und selbst das noch zum Theil mit dem Pigment bedeckte Blatt, welches sich von der Haut der Glasfeuchtigkeit zur Krystkalkapsel erstreckt, durchsichtiger als die Netzhaut gefunden. Besonders eignen sich Fötusaugen zum bestimmten Erweise der Unrichtigkeit jener Meinung, weil die Netzhaut hier undurchsichtiger und die äußere Wand des Petitschen Kanals dünner ist als in spätern Perioden.

Membran<sup>1)</sup>), welche mir der Sitz der Verknöcherungen zwischen der Ader- und Netzhaut zu seyn scheint.

§. 2000.

Die Netzhaut ist überall glatt über die Glasfeuchtigkeit ausgespannt, nur eine kleine Stelle am hintern Theile ihres Umfangs ausgenommen. Diese befindet sich in einiger Entfernung vom Eintritte des Sehnerven, nach außen. Hier bildet die Netzhaut eine nach innen gerichtete Falte, enthält einen gelben Fleck und eine rundliche, beträchtlich dünne Stelle<sup>2)</sup>).

Die

1) Jacob's (zu Dublin) newly discovered Membrane in the Eye. In Thomson's Annals of philosophy. July 1818 p. 74. Deutsches Archiv für die Physiol. Bd. 4.

2) Buzzi in opusc. sulle scienze e sulle arti. Milano. Vol. V. 1784. und Vol. VII. 1784.

Sümmerring de foramine centrali limbo luteo cincto retinae humanae. In comm. soc. Gott. Tom. XIII. ad ann. 1795—1798.

P. H. Michalix. Ueber einen gelben Fleck und ein Loch in der Nervenhaut des menschl. Auges. Im Journal der Erfindung. St. 15. S. 1—17. 1796. und St. 17. S. 133.

J. E. Keil. Die Falte, der gelbe Fleck und die durchsichtige Stelle in der Netzhaut des Auges. Im Archiv f. die Physiol. Bd. 2. S. 468 ff. 1797.

E. Home an account of the orifice in the retina of the human eye. In Phil. transact. 1798. P. II. Uebersetzt in Keil's Archiv Bd. 4. S. 440—447.

Exposé des résultats de plusieurs recherches sur la tache jaune, le pli et le trou central de la rétine d'après deux mémoires communiqués par Marc et Lévillé. In Mém. de la soc. d'émulation. Vol. I. 1802. p. 364—97.

J. M.



Die Falte verläuft in querrer Richtung von innen nach außen, nimmt in geringer Entfernung vom äußern Umfange des Eintrittes des Sehnerven, oder dicht neben demselben, mit einer feinen Spitze ihren Anfang, endigt sich mit einem stumpfen Ende, und hat im Allgemeinen die Länge von  $1\frac{1}{2}$  — 2 Linien. Gewöhnlich ist sie einfach, bisweilen gespalten, bisweilen dagegen fehlt sie<sup>1)</sup>. Nach Home soll sie sogar immer nur künstlich gebildet werden, und ihre Entstehung in der an dieser Stelle vorzüglich genauen Verbindung der Netzhaut mit der Glashaut begründet seyn, allein dagegen spricht der Umstand, daß sie auch da, wo der Zusammenhang beider Häute durchaus gar nicht gestört wird, erscheint, und in der Jugend bedeutend stärker als in spätern Lebensperioden ist.

An derselben Stelle enthält die Netzhaut zugleich einen ovalen gelben Fleck von derselben Größe, der in der Mitte dunkler als im Umfange ist, und auf  $1\frac{1}{2}$  — 2 Linien Breite im Allgemeinen eine Linie Höhe hat, aber nicht überall denselben Umfang und denselben Grad der Färbung besitzt, jedes ohne nothwendige Beziehung zum Sehvermögen.

An dieser Stelle ist die Netzhaut beträchtlich dünner als in ihrer übrigen Ausbreitung, vorzüglich in der Mitte des gelben Flecks, wo sich nach einigen eine Oeffnung, nach andern, und, meinen Untersuchungen nach, richtiger, eine fast ganz marklose Stelle findet, die gleichfalls oval und von scharfen, glatten Rändern begrenzt ist.

Diesse

---

J. W. Wangel über die Homeschen Entdeckungen, das Loch, die Falte und den gelben Fleck im Mittelpunkt der Netzhaut betr. treffend. In Rosenmüllers und Jenseflamms Beiträgen f. die Zergliederungskunst. Leipzig. 1800. Bd. 1. Hft. 2. S. 204.

1) Keil a. a. O. S. 470.

Diese Stelle erscheint erst deutlich, wenn durch einen Druck auf das Gehirn die Falte nach außen gedrängt und verstreut wird.

### III. Von den Flüssigkeiten des Auges.

#### I. Glasfeuchtigkeit.

§. 2001.

Den bei weitem größten, hintern Theil des Auges nimmt die Glasfeuchtigkeit, der Glaskörper (*Humor treus* s. *corpus vitreum*) ein, welcher durch seine Lage zwischen der Aderhaut und der Netzhaut entspricht.

Sie ist eine völlig durchsichtige, dünne, beinahe ganz aus Wasser, einer geringen Menge von salzsauren und kohlensauren Salzen, noch weit weniger Eiweiß und Natron \*) bestehende Flüssigkeit, welche in einer eignen, sie überall umgebenden, sehr dünnen, parren und durchsichtigen Haut, der Glashaut (*Tunica hyaloidea*), enthalten ist, von welcher aus nach unten sich eine Menge von Gefäßen begeben, in denen sich die Nerven oder Sehnerven befinden.

Beide vereinigen bilden eigentlich den Glaskörper.

Dieser ist an seiner vordern Fläche etwas vertieft, an der hintern, und hier mit der hintern Wand der Kapsel des Auges verbunden.

\*) Nach Berzelius (*Animal fluids in anal. chim.* 1828)

1. 255

aus Wasser	98,40
— Eiweiß	0,16
— kohl. u. salz. Salzen	1,44
— Natron u. kohlens., nur in Wasser	0,00
— kohl. u. salz. Salzen	0,00

100,00

Kalkflase, deren hinterer Theil in dieser Vertiefung liegt, unter normalen Bedingungen so fest verbunden, daß Trennung leider, wenigstens im ganz frischen Zustande, ohne Verletzung der Glashaut unmöglich ist.

## §. 2002.

Zwischen dem größten Umfange der Linsenkapsel und dem vordern Theile der Glashaut, nicht weit hinter dem vordern Rande derselben, ist ein zartes Plättchen, das Strahlenplättchen (*Lamina ciliaris*, *Zonula Zinnii*) ausgespannt, welches brückenartig über den vordersten Theil des Glaskörpers verläuft, und mit diesem eine dreieckige Lücke begränzt, deren Grundfläche durch den hintern Theil des Umfanges der Kapsel, die beiden Schenkel durch das Plättchen und den vordersten Theil des Glaskörpers gebildet werden. Diese Lücke, welche kreisförmig um die Linse und den Glaskörper verläuft, erhält den Namen des Petitschen Kanals oder Kreises (*Canalis* f. *Circulus Petiti*), und wird leicht durch Einblasen von Luft deutlich gemacht.

Das Strahlenplättchen ist vielfach von vorn und innen nach außen und hinten gefurcht, indem es genau der innern Fläche des, mit ihm sehr genau verbundenen Strahlenkörpers entspricht, dessen Falten in seine Vertiefungen dringen. Die äußere Fläche des Plättchens erscheint daher auch immer nach Wegnahme des Strahlenkranzes schwärzlich, indem der schwarze Schleim auf ihm haftet. Durch Einblasen von Luft hebt sich das Plättchen in die Höhe, die Furchen werden beträchtlich flacher, und seine äußere Fläche erscheint aus neben einander liegenden, schwach gewölbten, rundlich dreieckigen Erhabenheiten gebildet.

Die Abtheilungen der Linse in der Richtung der Dicke und ihr blättriges Gefüge sind in dem äußern, der faserige Bau dagegen in dem innern Theile derselben deutlicher.

## §. 2005.

Die Linse ist, mit Ausnahme einer geringen Menge durchsichtiger, häutiger Substanz in Wasser fast ganz auflöslich.

Sie besteht aus Wasser 58,0.

Eigenthümlicher Substanz 35,9.

Salzsauren, milchsauren Salzen, und thierischer Substanz, die alle in Alkohol auflöslich sind 2,4.

Thierischer, nur in Wasser auflöslicher Substanz, nebst einigen phosphorsauren Salzen 1,3.

Uebrig bleibender häutiger Substanz 2,4.

---

100,0.

Besonders merkwürdig ist, daß die eigenthümliche Substanz der Linse, welche durch die Siedehitze gerinnt, die Farbe ausgenommen, durch ihre Mischung sehr genau mit dem Blutfarbstoff übereinkommt. Sie enthält etwas Eisen, das Pigment viel Kohle und Eisen, und das Blut scheint sich daher im Auge so zu zersetzen, daß die wässerige und Glasfeuchtigkeit fast nur aus dem wässerigen Bestandtheil bestehen, und deshalb auch nicht gerinnen <sup>1)</sup>.

## §. 2006.

---

<sup>1)</sup> Berzelius a. a. O. S. 254.

gewöhnlich doppelt so breit und hoch als dick, und dessen hintere Fläche stärker als die vordere gewölbt ist. Wenigstens findet nur äußerst selten das entgegengesetzte Verhältniß, etwas weniger selten Gleichheit beider Flächen Statt. Gewöhnlich ist die hintere Fläche der Abschnitt einer Kugel, deren Durchmesser ungefähr 6 — 9 Linien beträgt. Der Durchmesser des Kreises, woron die vordere ein Abschnitt ist, beträgt dagegen ungefähr 5 Linien.

Die Dicke und die Wölbung der Krystalllinse stehen nicht immer in demselben Verhältniß, und eben so wenig findet sich ein beständiges gerades Verhältniß zwischen diesen beiden Bestimmungen und der Breite und Höhe der Linse.

Die Linsen beider Augen desselben Menschen haben bisweilen eine sehr verschiedne Gestalt.

Sie liegt vor der Glasfeuchtigkeit, deren vordere, ausgehöhlte Fläche ihre hintere aufnimmt, unter dem Strahlenkranze, dessen innere Fläche sich zum Theil an ihren größten Umfang heftet, und hinter der Blendung, mit welcher sie indessen nirgends im Zusammenhange steht.

Indessen befindet sie sich nicht frei, sondern ist von einer dünnen, aber festen, und die Glasfeuchtigkeit beträchtlich an Dichte übertreffenden, durchsichtigen Hülle, der Linsen kapsel (Capsula lentis) eng umgeben<sup>1)</sup>, welche natürlich die angemessnen Verbindungen der Linse vermittelt.

§ 2

Mit

Petit mémoire sur le crvstallin de l'oeil de l'homme, des animaux à quatre pieds, des oiseaux et des poissons. in Mém. de l'ac. des sc. de Paris. 1730. p. 4 — 33.

8. G. Sattig de lentis crvstallinae structura fibrosa. Halae, 1794. 8.

1) Petit de la capsule du crvstallin. in Mém. de l'ac. des sc. de Paris. 1730. p. 622 — 643.

Mit dieser Kapsel ist die Linse höchstens durch äußerst zarte Gefäße, welche von jener zu ihr dringen, verbunden, außer dem frei.

Zwischen beiden befindet sich eine gleichfalls durchsichtige, dünne Flüssigkeit, die Morgagnische Flüssigkeit (Liquor Morgagnii).

§. 2004.

Die Linse besteht aus einer äußern, weichen, und einer innern, härtern Substanz, welche allmählich in einander übergehen, und von welchen jene die Rinde, diese der Kern derselben ist. Die erstere kann man leicht zerdrücken und von der letztern trennen.

Diese Anordnung erkennt man leicht, ohne Anwendung irgend eines Hülfsmittels.

Außerdem aber erscheint die Linse noch auf doppelte Weise zusammengesetzt, und in mehrere Abtheilungen auf eine vollständige Weise zerlegbar<sup>1)</sup>.

Durch Anwendung der Maceration nämlich, und von Säuren zerfällt dieser Körper.

1) in

1) A. Leeuwenhoek de formatione humoris crystallini in variis animalibus, de substantia fibrosa, quas in oculo apparet. etc. in Arcan. naturae detect. Delphis. 1695. p. 70 seqq.

B. Morgagni in Ep. anat. A. 30. 51. 52. 53,

Sattig (Reil) de lentis crystallinae structura fibrosa. Halae. 1793. Uebersetzt in Gren's Journal für die Physik. Bd. 3. S. 325 — 357.

Young Beobachtungen über das Sehen a. d. phil. transact. 1793. in Gren's Journal Bd. 3. S. 415 ff.

Monro on the structure of the body of the crystalline lens and whether the fibres which enter into its composition, are muscular. a. a. D. S. 85 ff.

1) In ihrer ganzen Dicke von vorn nach hinten in mehrere dreieckige Abschnitte, deren Spitzen nach innen, die Grundflächen nach außen gerichtet sind, und welche daher in der Mitte der Linse zusammentreten;

2) erscheint jeder dieser dreieckigen Abschnitte, mithin die ganze Linse, abeymals in eine außerordentlich große Menge feiner Blättchen, welche von außen nach innen, wie die Blätter einer Zwiebel, über einander liegen, zerfallen.

Diese Blättchen schlagen sich am äußern Umfange der Linse von vorn nach hinten um, und endigen sich daher mit einer vordern und einer hintern Spitze in der Mitte der Linse. Indessen sondert sich oft die vordere Hälfte derselben von der hintern ab, und die ganze Linse erscheint daher durch eine von dem Umfange zum Mittelpunkte verlaufende Spalte in eine vordere und eine hintere Hälfte mehr oder weniger deutlich gespalten.

Die Blättchen, woraus die Linse besteht, werden durch zwischen ihnen verlaufende Fasern zusammengeheftet, und bestehen selbst wieder aus Fasern, welche in dem Längendurchmesser der Blätter verlaufen, daher vorn in der Mitte der Linse anfangen, und sich über den Rand derselben nach hinten und innen umschlagen, wo sie sich endigen, aber, wo die Linse in eine vordere und hintere Hälfte zerfällt, sich gleichfalls am Umfange derselben theilen.

Das Gefüge der Linse ist daher blätterig faserig.

Zwischen den Blättchen befindet sich, nach außen reichlicher als nach innen, eine durchsichtige Flüssigkeit, welche mit der zwischen der Linse und der Kapsel enthaltenen übereinzukommen scheint.

Die Abtheilungen der Linse in der Richtung der Dicke und ihr blättriges Gefüge sind in dem äußern, der faserige Theil dagegen in dem innern Theile derselben deutlicher.

## §. 2005.

Die Linse ist, mit Ausnahme einer geringen Menge durchsichtiger, häutiger Substanz in Wasser fast ganz auflöslich.

Sie besteht aus Wasser 58,0.

Eigenthümlicher Substanz 35,9.

Salzsauren, milchsauren Salzen, und thierischer Substanz, die alle in Alkohol auflöslich sind 2,4.

Thierischer, nur in Wasser auflöslicher Substanz, nebst einigen phosphorsauren Salzen 1,3.

Uebrig bleibender häutiger Substanz 2,4.

---

100,0.

Besonders merkwürdig ist, daß die eigenthümliche Substanz der Linse, welche durch die Siedehitze gerinnt, die Farbe ausgenommen, durch ihre Mischung sehr genau mit dem Blutfarbestoff übereinkommt. Sie enthält etwas Eisen, das Pigment viel Kohle und Eisen, und das Blut scheint sich daher im Auge so zu versetzen, daß die wässerige und Glasfeuchtigkeit fast nur aus dem wässerigen Bestandtheil bestehen, und deshalb auch nicht gerinnen <sup>1)</sup>).

## §. 2006.

---

1) Berzelius a. a. O. S. 254.



1) In ihrer ganzen Dike von vorn nach hinten in mehrere dreieckige Abschnitte, deren Spitzen nach innen, die Grundflächen nach außen gerichtet sind, und welche daher in der Mitte der Linse zusammentreten;

2) erscheint jeder dieser dreieckigen Abschnitte, mithin die ganze Linse, abermals in eine außerordentlich große Menge feiner Blättchen, welche von außen nach innen, wie die Blätter einer Zwiebel, über einander liegen, zerfallen.

Diese Blättchen schlagen sich am äußern Umfange der Linse von vorn nach hinten um, und endigen sich daher mit einer vordern und einer hintern Spitze in der Mitte der Linse. Indessen sondert sich oft die vordere Hälfte derselben von der hintern ab, und die ganze Linse erscheint daher durch eine von dem Umfange zum Mittelpunkte verlaufende Spalte in eine vordere und eine hintere Hälfte mehr oder weniger deutlich gespalten.

Die Blättchen, woraus die Linse besteht, werden durch zwischen ihnen verlaufende Fasern zusammengeheftet, und bestehen selbst wieder aus Fasern, welche in dem Längendurchmesser der Blätter verlaufen, daher vorn in der Mitte der Linse anfangen, und sich über den Rand derselben nach hinten und innen umschlagen, wo sie sich endigen, aber, wo die Linse in eine vordere und hintere Hälfte zerfällt, sich gleichfalls am Umfange derselben theilen.

Das Gefüge der Linse ist daher blätterig faserig.

Zwischen den Blättchen befindet sich, nach außen reichlicher als nach innen, eine durchsichtige Flüssigkeit, welche mit der zwischen der Linse und der Kapsel enthaltenen übereinzukommen scheint.

## b. Gemeinschaftliche Sehne der drei übrigen geraden Augenmuskeln.

### §. 2011.

Die drei übrigen geraden Augenmuskeln entspringen zum Theil von einer gemeinschaftlichen Sehne oder einem Bande, welches sich von dem innern Ende der obern Keilbeinspalte zwei bis drei Linien weit nach vorn erstreckt.

## c. Äußerer gerader Augenmuskel.

### §. 2012.

Der äußere gerade Augenmuskel, Abzieher des Augapfels, Hornmuskel (*M. oculi rectus externus*, *f. abducens f. indignatorius*) entspringt mit zwei Köpfen. Der untere größere entsteht von der äußern Fläche der gemeinschaftlichen Sehne, wo er mit der Sehne des untern geraden Augenmuskels sehr eng verwachsen ist, der obere, weit kleinere, mit der Sehne des obern geraden Augenmuskels verwachsen, von dem zwischen dem Sehnervensehe und dem Anfange der obern Keilbeinspalte befindlichen Theile des Keilbeines, wendet sich, längs des mittlern Theiles der äußern Wand der Augenhöhle, dicht an die Beinhaut geheftet, in seinem mittlern Theile am breitesten, von außen nach innen beträchtlich platter und dünner als von oben nach unten, nach vorn, setzt sich durch eine dünne Sehne an den äußern Theil des Umfangs der harten Pant, einige Linien weit von dem Rande der Hornhaut entfernt.

Er ist bei weitem der größte und besonders der dickste gerade Augenmuskel, wenig kürzer und außerordentlich viel stärker als der obere schiefe.

Er bewirkt das Seitwärtssehen, indem er das Auge nach außen zieht.

d. U. n.

## §. 2006.

Die Linsenkapsel erhält ihre Pulsadern theils aus der Centralarterie der Nervenhaut, theils aus den Gefäßen des Strahlenkranzes <sup>1)</sup>.

Die erstere verbreitet sich größtentheils mit ihrem vordern Ende vorzüglich an der hintern Fläche, so, daß von dem vordern Rande des Glaskörpers sich die letzten Zweige zurückklagen und nach innen zusammenstrahlen, dringt aber auch mit mehreren kleinen Zweigen über den äußern Rand der Kapsel an die vordere. Die letztern begeben sich von dem vordern Rande des Strahlenkranzes bloß an die vordere Fläche der Linsenkapsel, anastomosiren hier mit den Zweigen der Centralarterie der Nervenhaut, und geben beim Fötus eine ansehnliche Menge kleinerer Gefäße nach vorn ab, welche sich an der hintern Fläche der Pupillarmembran verbreiten. Sowohl durch ihre Anordnung, als durch den Grad ihrer Entwicklung entsprechen einander die Gefäße der Linsenkapsel und der Pupillarmembran immer auf eine merkwürdige Weise <sup>2)</sup>. Die Gefäße der Linsenkapsel, besonders die von der Centralarterie der Netzhaut stammenden, schicken zuletzt mehrere, sehr feine Zweige an die Linse selbst, welche sich zwischen den Blättern derselben verbreiten, so, daß sie also wenigstens nicht ganz durch Einsaugung der sie umgebenden Flüssigkeit ernährt wird.

Die Blutadern der Krystalllinse sind noch nicht mit Bestimmtheit vollständig nachgewiesen, wenn gleich die an der hin-

§ 4

tern

1) J. G. Walter de venis oculi et arteria centrali retinae. Berol. 1778.

2) Hunter medical Commentar. London. 1762. p. 63. not.

nach so entgegengebrochen werden, daß dadurch im Grunde des Auges auf der Netzhaut die Bilder der Gegenstände entstehen. Die hiedurch bewirkte Empfindung pflanzt sich auf den Sehnerven, durch diesen zu dem Gehirn fort, und veranlaßt hier die Vorstellungen des Gesichtes.

Durchsichtigkeit der Mittel, woraus das Auge besteht, Empfänglichkeit der Netzhaut, und ungestörte Leitung durch den Sehnerven sind daher die vorzüglichsten Bedingungen des Sehens. Undurchsichtigkeit eines oder mehrerer der Mittel, welche in die Zusammensetzung des Auges eingehen, Lähmung der Netzhaut und des Sehnerven, Texturveränderungen desselben, regelwidrige Productionen, welche sich in seiner Substanz oder in seinem Umfange entwickeln, bringen daher Undeutlichkeit oder gänzliche Vernichtung des Sehvermögens hervor. Die Kugelgestalt begünstigt die Brechung der Lichtstrahlen. Die Gestalt des ganzen Auges und der einzelnen Theile desselben hat einen bedeutenden Einfluß auf die Entfernung, in welcher Gegenstände gesehen werden. Bei starker Wölbung werden, weil diese starke Brechung der Lichtstrahlen setzt, nur nahe Gegenstände, bei schwacher, aus entgegengesetztem Grunde, nur ferne deutlich gesehen (*Myopia et Presbyopia*); und der Kindheit und Jugend ist daher Kurzsichtigkeit, dem Alter Fernsichtigkeit im Allgemeinen eigen. Außerdem besißt das Auge das Vermögen, seine Gestalt, das Verhältniß der Theile des Augapfels, so wie die seiner Lage und Richtung zu verändern, ersteres, um in einer gewissen Breite in verschiedener Entfernung denselben Gegenstand deutlich zu sehen, letzteres, um, ohne Bewegung des Kopfes oder ganzen Körpers, gleichfalls innerhalb gewisser Gränzen, eine gewisse Sphäre zu überschauen. Das letztere wird durch die verschiedentlich abge-

aus

a. Hinterer gerader Augenmuskel.

§. 2013.

Der untere gerade Augenmuskel, Niederzieher des Augapfels, Demuthmuskel (*M. rectus oculi inferior*, s. *deprimens*, s. *humilis*), entsteht mit dem untern Kopfe des äußern geraden Augenmuskels und bym Einwärtszieher des Augapfels verwachsen, von der gemeinschaftlichen Sehne, nirgends von der Scheide des Sehnerven, wendet sich, unter dem Sehnerven gerade nach vorn und unten, und heftet sich an die harte Haut des Augapfels.

Er ist der Größe nach der dritte unter den geraden Augenmuskeln, aber dünner als der innere, der kürzer als er ist.

Das Auge wird durch ihn nach unten gewandt.

a. Innerer gerader Augenmuskel.

§. 2014.

Der innere gerade Augenmuskel, Anzieher, Einwärtszieher des Augapfels, Tränkmuskel (*M. rectus oculi internus* s. *adducens*, s. *amatorius* s. *bibitorius*), entsteht mit zwei Köpfen.

Der kleinere, untere, äußere entspringt vom obern und innern Theile der gemeinschaftlichen Sehne, der größere, obere, innere mit den Ursprüngen des obern geraden Augenmuskels und des Augenlidhebers verwachsene, von dem innern Theile der Scheide des Sehnerven.

Von hier an wendet sich der Muskel längs der innern Wand der Augenhöhle, durch eine Fettschicht von ihr getrennt, nach innen und vorn, wie der äußere von oben nach unten höher, als von innen nach außen, und heftet sich durch eine kurze dünne Sehne an den innern Theil des Umfangs der harten Haut.

Er

Jetzt liegt aber der Augapfel noch frei, indem die Augenlider anfänglich noch nicht gebildet sind, erst in der zehnten Woche als schmale Wülste erscheinen, welche sich allmählich vergrößern, dann aber, ungefähr von der zwölften Woche an, es, wegen der engen und festen gegenseitigen Berührung ihrer Ränder bis zur Geburt, wie im Schlafe, genau verschließen.

Die Thränenpunkte, und überhaupt das ganze Thränenorgan, so wie die Augenliderdrüsen, sind in den frühern Lebensperioden verhältnismäßig stärker als in den spätern entwickelt.

Der Augapfel ist früher verhältnismäßig größer als in spätern Lebensperioden.

Die beiden äußern Häute, die weiße Haut, besonders in ihrem hintern Theile, und die Hornhaut, sind verhältnismäßig dicker. Ganz besonders gilt dies für die Hornhaut, welche beim reifen Fötus, vorzüglich wegen reichlicher Anhäufung einer röthlichen, wässerigen Flüssigkeit zwischen ihren Blättern, noch einmal so dick als beim Erwachsenen, daher an ihrer hintern Fläche fast eben ist, und die vordere Fläche der Bindehaut berührt. Auch ist sie weniger durchsichtig als späterhin. Im Alter wird sie flacher, härter, fester, starrer. Zugleich bildet sich vom Umfange gegen die Mitte bei Greisen eine Erhebung (Gerontoxon s. Arcus senilis) aus, die unstreitig in dem weniger raschen Stoffwechsel und der größern Reizung zum Gerinnen begründet ist, und mit der Verknöcherung andrer Theile im Alter übereinkommt.

Die Aderhaut ist gleichfalls verhältnismäßig etwas dicker, weniger durch schwarzen Schleim gefärbt.

Dieser erscheint indessen sehr früh, schon in der vierten bis fünften Woche; doch ist er vor der Geburt weniger dunkel

und sich, ausgebreitet, nach innen von der Sehne des Augapfelhebbers, zum Theil von derselben bedeckt, an den innern und obern Theil der harten Haut des Augapfels heftet.

Er ist der längste, aber dünnste Muskel des Augapfels.

Zieht den Augapfel nach vorn, innen und oben.

Disweilen, aber selten, ist er mehr, oder weniger vollständig doppelt.

#### b. Unterer schiefer Augenmuskel.

##### §. 2017.

Der untere schiefe Augenmuskel (*M. oculi obliquus inferior*), unter allen bei weitem der kürzeste, unterscheidet sich zugleich von ihnen durch seinen Ursprung und Verlauf. Er entsteht mit einer kurzen Sehne vom innern Ende des Unteraugenhöhlenrandes, steigt nach oben und außen, und geht in eine kurze, breite Sehne über, welche unter dem vordern Theile des äußern geraden Augapfelmuskels, zwischen ihm und dem Augapfel aufsteigt, und sich weiter hinten als die Sehne der geraden Augenmuskeln, und zwischen der Sehne des obern und des äußern geraden Augenmuskels, an die harte Augenhaut heftet.

Er rollt das Auge erst nach außen, dann nach unten, zuletzt nach innen um seine Ase, zieht es zugleich etwas nach vorn.

##### §. 2018.

Das Auge entspricht einem dioptrischen Werkzeuge, das aus mehreren, von außen nach innen auf einander folgenden durchsichtigen Substanzen von verschiedner Dichtigkeit, die aber in allen größer als die der Luft ist, besteht, und in welchen die aus dieser eintretenden Lichtstrahlen einander nach und nach

Ueberhaupt verschwindet sie bei sehendgeborenen Thieren weit früher als bei blindgeborenen, bei welchen sie sich so lange erhält, als die Augenlider verschlossen bleiben<sup>1)</sup>. Sie verschwindet so, daß die Gefäße unverletzt bleiben. Diese treten von der Mitte gegen den Umfang, die Bögen, welche sie bilden, verkleinern sich, und ziehen sich zuletzt an den innern Rand der Blendung, wo sie den kleinen Pulsaderkreis derselben bilden, der fehlt, so lange die Sehelochshaut besteht<sup>2)</sup>.

Ungeachtet die Sehelochshaut die vordere und hintere Augenkammer vollkommen absondert, enthalten doch beständig beide, nicht bloß, nach der Angabe von Edwards<sup>3)</sup> und Ribes<sup>4)</sup> die hintere, wässerige Feuchtigkeit, wie ich schon früher<sup>5)</sup>, dann Cloquet<sup>6)</sup>, dargethan habe.

Eine merkwürdige periodische Verschiedenheit der Blendung ist auch die Unterbrechung ihres Kreises in den frühern Lebensperioden, welche bis um die siebente Woche an dem innern Theile derselben sehr deutlich ist.

321

Die

1) C. Meckel über die Dauer der Pupillarmembran. Im deutschen Archiv für die Physiologie Bd. 1 und 2.

2) Eine durch Cloquet (N. a. D. S. 17.) bestätigte Vermuthung des trefflichen Blumenbach: *Ejusque (m. p.) vasorum elliptici arcus sensim sensimque retrahuntur, unoquoque, mihi graviter fallor, anulum iridis interiorum efficiunt, cujus certe ante eum terminum nullum in foetuum oculis reliquum reperire potui.* Instit. physiol. 1787. p. 208.

3) N. a. D. S. 155.

4) Deutsches Archiv Bd. 4. S. 659.

5) Deutsches Archiv Bd. 2. S. 136.

6) Deutsches Archiv Bd. 4. S. 647.



Die Netzhaut ist in den frühern Lebensperioden beträchtlich dicker, als in spätern. Diese Dicke rührt nicht etwa von der stärkern Entwicklung ihres innern Blattes her, so daß sogar das Markblatt in dieser Periode verhältnismäßig dünner, des Markes weniger wäre <sup>1)</sup>, sondern ist in der That in ansehnlicherer Dicke des letztern begründet. Im höhern Alter wird die Netzhaut bedeutend dünn, auch fester.

Ihre Falte ist schon beim sechsmonatlichen Embryo deutlich, ja, verhältnismäßig beim reifen selbst absolut stärker als beim Erwachsenen. Die dünne Stelle ist deutlich; allein die Färbung erscheint erst einige Zeit nach der Geburt. Diese wird allmählich dunkler, im hohen Alter aber allmählich wieder blasser. Zugleich scheint sich sehr regelmäßig dann auch die Falte zu verkleinern, ja ganz zu verschwinden. Die geringere Entwicklung dieser Gegend im höhern Alter steht in einem ziemlich geraden Verhältniß mit der größern Trübheit der Hornhaut.

Die Glasfeuchtigkeit ist beim Fötus trübe, und wird erst in den ersten Wochen nach der Geburt ganz durchsichtig.

Die Linse ist auf sehr merkwürdige Weise beim Fötus und Kinde viel stärker gewölbt als späterhin. Anfangs ragt sie durch das Seheloch, die Blendungshaut vor sich her drängend, so stark nach vorn, daß sie nur durch diese von der Hornhaut getrennt, und in einer eignen Vertiefung derselben enthalten ist, alles Bedingungen, wodurch, so wie durch den anfänglichen Mangel der Augenlider, das Auge des Embryo mit dem der Fische übereinkommt.

<sup>1)</sup> Brandis Pathologie. Hamburg. 1808. S. 241.

Hiedurch, so wie durch die anfänglich beträchtliche Dicken der Hornhaut, ist die Augenkammer anfangs kleiner, und die wässerige Feuchtigkeit in weit geringerer Menge als späterhin vorhanden. Indessen sind in der Jugend alle Feuchtigkeiten des Auges, auch die wässerige, verhältnißmäßig reichlicher als in spätern Lebensperioden, daher das ganze Auge und namentlich die Hornhaut stärker gewölbt als in den spätern, wo das ganze Auge etwas zusammenfällt, und besonders die Hornhaut sich abplattet.

Mit zunehmendem Alter wird die Linse nicht nur härter, sondern auch von der Mitte aus gelblicher, so daß man sie im höhern Alter fast immer hier auf diese Weise gefärbt findet. Für die Morgagnische Feuchtigkeit gilt dasselbe. Zugleich ist sie und die wässerige Feuchtigkeit, bisweilen auch die Glasfeuchtigkeit, etwas trübe.

### Zweite Abtheilung.

#### Sehorgan im regelwidrigen Zustande 1).

§. 2020.

Das Auge weicht, zum Theil seiner freien Lage, wodurch es äußern Schädlichkeiten sehr ausgesetzt ist, zum Theil seiner hochgesteigerten Empfänglichkeit, welche leichtes Erkranken in Folge der Einwirkung dieser Schädlichkeit und Theilnahme des Auges an allgemeinen Leiden bewirkt, sehr häufig, und, seines

zu

- 
- 1) Außer den Werken über Augenkrankheiten, namentlich von Maitre Jean, Taylor, Janin, Kowley, Beer, Scarpa, Schmidt, Himly, und der schon oben angeführten Schriftsteller, welche zugleich den gesunden und kranken Zustand des Auges betrachten, handeln vorzüglich folgende die pathologische Anatomie des Auges ab:

J. C.

zusammengesetzten Baues wegen, auf sehr vielfache Weise von der Regel ab, und seiner freien Lage, so wie der Durchsichtigkeit mehrerer seiner Theile wegen sind diese Abweichungen schon im Leben deutlicher sichtbar als bei den meisten übrigen Organen.

## Erste Unterabtheilung.

## F o r m f e h l e r.

## §. 2021.

Unter den Formfehlern sind die ursprünglichen, wie überall, die wissenschaftlich merkwürdigsten.

## A. Ursprüngliche Bildungsabweichungen.

## §. 2022.

I. Die quantitativen, deren Wesen ein zu schwaches Wirken der bildenden Kraft ist, sind

1) Hemmungsbildungen. Hierher gehören

a) Mangel des Auges oder einzelner Theile desselben.

Die überall sind die Bedingungen hier nicht immer genau dieselben. In einem von *Macarney* beobachteten Falle

§ 4

fehlte

J. C. Sybel Diss. de quibusdam materiis et formae oculi aberrationibus a statu normali. Halae. 1798. 8. Uebersetzt in Reils Archiv Bd. 5.

J. Wardrop Essays on the morbid Anatomy of the human Eye. London, 1818. Mit Kupf.

A. Treatise on some practical points relating to the diseases of the eye by the late Cunningham Saunders. to which are added etc.; by J. R. Farre. London. 1816. Mit Kupf.

Demours maladies des yeux. Paris. 1818. Mit vielen Kupf.

Ferner die pathologische Anatomie des Thränenorgans, insbesondere J. A. Schmidt über die Krankheiten des Thränenorgans. Wien. 1807.

1) J. Siftemi. Padova. 1808. In *Himly's ophthalm. Bibl.* III. 3. S. 173.

fehlten die Sehhügel und Sehnerven, ferner die gemeinschaftlichen Augenbewegenden und obern Augenbewegenden Nerven, die Augapfel, ihre Muskeln, die Thränenkarunkel, die Sehnervenlöcher durchaus. An der Stelle des Augapfels befand sich eine harte Masse. Der Thränenapparat und die Augenlider waren vollständig.

In einem andern Falle <sup>7)</sup> fehlten der Augapfel, der Sehnerv bis zu den Hügel, das Sehnervelloch, dagegen waren die Hülsenerven und auch hier die Thränendrüse vorhanden.

b) Kleinheit;

c) Regelwidriges Beharren früher vorhandner Theile, namentlich der Sehhaut <sup>8)</sup>;

d) Verwachsung der Augenlider.

2) Verwachsung beider Augen zu einem. Sehr allgemeine Bedingung ist hier, daß das aus zweien zusammengesessene Auge genau in die Mitte rückt, und auch in Hinsicht auf seinen Bau symmetrisch angeordnet ist.

Entgegengesetzte quantitative Bildungsabweichungen, bei übrigens einfachem Körper und Kopfe wurden kaum je beobachtet.

II. Qualitative Bildungsabweichungen des Auges sind gleichfalls selten: Vorzüglich treffen sie die Gestalt der Blendung und die davon abhängige des Seheloches, die dann gewöhnlich weniger rund als gewöhnlich, und meistens senkrecht, seltner wagerecht ist, eine Abweichung, die oft in gewissen Familien einheimisch und erblich, immer als Thierähnlichkeit merkwürdig erscheint <sup>3)</sup>. Seltner ist die Blendung nach

1) Weideler Ebenas. St. 2. S. 170.

2) S. Fälle in meiner path. Anat. Bd. 1. S. 396.

3) S. Fälle in meiner path. Anat. Bd. 2. Abth. 1. S. 158.

nach außen so bedeutend breiter, daß die Pupille nicht in der Hg. des Auges, sondern zu weit nach innen liegt 1). Die Hornhaut weicht durch kegelförmige Gefaßt (Staphyloma conoides), wobei sie zugleich mehr oder weniger verdünnt ist, qualitativ von der Regel ab, ein Zustand, welcher den höchsten Grad der Wölbung derselben setzt, und daher die beträchtlichste Myopie verursacht.

Auf entgegengesetzte Weise ist die Hornhaut bisweilen zu flach, selbst ganz gerade.

### B. Erworbene Formfehler.

#### §. 2023.

Diese sind weit häufiger, verschiedenartiger, aber fast immer in vorangegangenen Mischungsabweichungen begründet, und zugleich ist das Gewebe der Theile daher mehr oder weniger verändert. Sie sind vorzüglich folgende:

1) Mangel. Vorzüglich gehört hieher das Ausfallen der Augenbrauen und Augenlider, welches in einer Zerstörung ihrer Wurzeln in Folge von Augenliderentzündungen und Geschwüren (Alopecia) begründet ist.

2) Fehler des Umfangs.

a) Kleinheit. Bei Blindheit schwindet sehr häufig das ganze Auge, oder wenigstens einige Theile, namentlich der Sehnerv und die Netzhaut.

Die letztere habe ich bei langer Erblindung mehrmals dünner und nicht gleichmäßig markig, sondern das Mark in einzelnen Pünktchen stehend gefunden.

1) Demours. Tab. 64. Fig. 1.

Bei mehr oder weniger gemindertem Sehvermögen sinkt auch die Färbung des gelben Fleckes auf die Stufe herab, auf welcher sie vor dem Einflusse des Lichtes stand, indem sie immer mehr oder weniger schwach ist. Zugleich ist auch die Falte mehr oder weniger deutlich geschwunden <sup>1)</sup>. Beim schwarzen Staar ist bisweilen die Netzhaut an dieser Stelle durch schwarze Flecke verdunkelt <sup>2)</sup>. Nur das erkrankete Auge erleidet diese Veränderung, dagegen sind Falte und Fleck des gesunden Auges unter dieser Bedingung bisweilen deutlicher <sup>3)</sup>; wie der Sehnerv des gesunden Auges dann bisweilen stärker als im Normalzustande ist <sup>4)</sup>.

Der Sehnerv wird meistens dünner und grau, hornartig.

Die Hornhaut wird bisweilen in Folge von langen Krankheiten, bedeutenden Ausleerungen, sehr platt.

Die von ihren Verbindungen getrennte Krystalllinse schwimmt, im Auge zurückgelassen, sehr bald ganz oder größtentheils, so, daß nach einigen Jahren kaum ein Theil von der Größe eines Stacheldornknopfes übrig ist <sup>5)</sup>.

b) Vergrößerung. Das ganze Auge wird bisweilen durch Wassersucht (Hydrophthalmus) bedeutend vergrößert, so daß es aus der Augenhöhle hervorbringt. Diese hat ursprünglich ihren Sitz vorzüglich im Glaskörper, kommt aber überall vor, so daß sich bisweilen selbst eine sehr bedeutende Menge.

1) Michális a. a. D. S. 8 ff. Keil a. a. D. S. 472. Le: veikis bei Wenzel de penit. cer. str. p. 167.

2) Wenzel bei Michális a. a. D. S. 9.

3) Michális a. a. D. S. 8.

4) Wenzel de penit. cer. struct. No. XI.

5) Scarpa Malatt. degli occhj Pavia. 1801. p. 185.

Menge Wasser zwischen der Linse und dem Glaskörper findet <sup>1)</sup>). Nach Scarpa ist bei der Wassersucht in der hintern Augenhälfte gewöhnlich wenigstens zugleich regelwidrig vermehrte Absonderung außerhalb des Glaskörpers selbst vorhanden, indem er mehrmals innerhalb der Aderhaut und der Netzhaut eine bedeutende Menge dünner Feuchtigkeit, und in dieser, von vorn nach hinten verlaufend, einen aus dem ausgearteten Glaskörper und Netzhaut, gebildeten Strang fand <sup>2)</sup>). Die Quelle würde dann höchstwahrscheinlich die von Jacob gefundene seröse Haut seyn.

Eine besonders häufige Vergrößerung eines einzelnen Theiles ist das Staphylom, eine mehr oder weniger beträchtliche Verdickung der Hornhaut, welche eine Hervorragung derselben nach außen veranlaßt, zugleich mit Verlust ihrer Durchsichtigkeit verbunden, und in einer vorangegangnen Entzündung derselben begründet ist. Meistens ist dabei zugleich die Hornhaut mit der Blendung verwachsen. Die Ausdehnung und Verdünnung der harten Haut, welche weit seltner ist, und den Namen des Staphyloms derselben fñhrt, kommt in Gestalt bläulicher Erhabenheiten, welche durch die Varicosität der Gefäße der Aderhaut gebildet werden, vorzüglich nach gichtischer Augenentzündung im Umfange der Hornhaut vor. Seltner wird sie im hintern Theile des Umfangs der harten Haut beobachtet <sup>3)</sup>).

In Folge von Entzündung der Thränenwege dehnt sich der Thränensack mehr oder weniger aus.

3) Seh-

1) Ribes im deutschen Archiv für die Physiologie Bd. 4. S. 631.

2) Malatt. degli oechj. p. 250.

3) Scarpa mal. degli oechj. T. II. F. 9. 10.

Demonrs a. a. D. Taf. 64. Fig. 3.

## 3) Fehler des Zusammenhanges.

## a) Regelwidrig vermehrter Zusammenhang.

Eine besonders häufig vorkommende Abnormität, die immer in vorangegangener Entzündung begründet ist.

So verwachsen nach heftiger, vernachlässigter Entzündung und Vereiterung der Bindehaut, die Augenlider mit der vordern Fläche des Augapfels (Symblepharon), oder unter einander (Ancyloblepharon), oder beide Bedingungen finden zugleich Statt. Die verwachsenen Theile liegen entweder nahe an einander, oder werden durch eine größere oder geringere Zahl längerer oder kürzerer Pseudomembranen verbunden. Bisweilen findet diese Verwachsung schon vor der Geburt Statt.

In Folge von Entzündungen der Blendung verwächst die Pupille (Synizelisis), oder die vordere Blendungsfläche mit der hintern der Hornhaut, die hintere mit der vordern der Linsenkapfel (Synechia), durch ausgeschwigten und geronnenen Eiweißstoff, der anfänglich bisweilen in Gestalt einer Membran von den übrigen Theilen getrennt ist.

Verwachsungen der Thränendrüsengänge entstehen in Folge von äußern, auf die äußere Augengegend wirkenden Schädlichkeiten, diese, so wie Verengerungen des Thränenabführenden Theiles, durch Entzündung und Verschwärung.

Auch die Verkleinerung (Myosis) und Starrheit der Pupille, die nach Augenentzündungen entsteht, ist wohl höchst wahrscheinlich Folge von, in ihre Substanz ergossenem Eiweißstoff.

b) Regelwidrig verminderter Zusammenhang. Selten wird der Zusammenhang der Theile des Auges ohne



nach außen so bedeutend breiter, daß die Pupille nicht in der H<sup>ö</sup>he des Auges, sondern zu weit nach innen liegt <sup>1)</sup>. Die Hornhaut weicht durch kegelförmige Gestalt (Staphyloma conoides), wobei sie zugleich mehr oder weniger verdünnt ist, qualitativ von der Kugel ab, ein Zustand, welcher den höchsten Grad der Wölbung derselben setzt, und daher die beträchtlichste Myopie verursacht.

Auf entgegengesetzte Weise ist die Hornhaut bisweilen zu flach, selbst ganz gerade.

### B. Erworbene Formfehler.

§. 2023.

Diese sind weit häufiger, verschiedenartiger, aber fast immer in vorangegangenen Mischungsabweichungen begründet, und zugleich ist das Gewebe der Theile daher mehr oder weniger verändert. Sie sind vorzüglich folgende:

1) Mangel. Vorzüglich gehört hieher das Ausfallen der Augenbrauen und Augenlider, welches in einer Zerstörung ihrer Wurzeln in Folge von Augenliderentzündungen und Geschwüren (Alopecia) begründet ist.

2) Fehler des Umfangs.

a) Kleinheit. Bei Blindheit schwindet sehr häufig das ganze Auge, oder wenigstens einige Theile, namentlich der Sehnerv und die Netzhaut.

Die letztere habe ich bei langer Erblindung mehrmals dünner und nicht gleichmäßig markig, sondern das Mark in einzelnen Pünktchen stehend gefunden.

1) Demours. Tab. 64. Fig. 1.

Mit Bestimmtheit entweder immer, oder doch in den meisten Fällen als Folge von Entzündungen anzusehende neue Bildungen sind vorzüglich folgende.

1) An den Augenlidern a) das Hagelforn (Grando) eine mehr oder weniger harte, rundliche Geschwulst an oder unter dem untern Rande, die ein nicht völlig verschwundener, und mit erhärtetem Eiweißstoff angefüllter Eiterhals, oder Gerstenkorn (Hordeolum) ist;

b) das Sarcom des Augenlides, welches roth, anfangs weich, dann härter, sich an der innern Fläche der Augenlider vorzüglich in schlaffen Körpern entwickelt.

Hierher gehört auch die Encantis, eine Geschwulst, welche in der Thränenkarunkel und dem dritten Augenlide ihren Sitz hat.

2) An der Bindehaut das Felt, eine mehr oder weniger beträchtliche Erhabenheit, welche sich zwischen der vordern Fläche der Horn- und Faserhaut und der sie bekleidenden Bindehaut bildet. Das Flügelfell<sup>1)</sup> (Pterygium), entsteht gewöhnlich im innern Augenwinkel; wächst von hier nach außen, bis an die vordere Fläche der Hornhaut, oder bis über die Mitte derselben. Nur äußerst selten findet sich im äußern Augenwinkel oder in einer andern Gegend ein zweites, selbst drittes. Es enthält eine größere oder geringere Menge von Blutgefäßen, und ist immer mit der Grundfläche nach dem

Ums

1) Zwar ist Beer (Augenkr. Bd. 2. S. 638.) gegen die Ansicht, dasselbe von einer Entzündung abzuleiten, indessen spricht theils selbst der von ihm angeführte Umstand, daß es gewöhnlich ähnelnden Dingen seine Entstehung verdankt (S. 640.), theils unter andern Larrey's Bemerkung, daß es eine gewöhnliche Folge der ägyptischen Augenentzündung war (Denkw. 1. S. 262.) dagegen.

ohne äußere Verletzung gestört; doch gehört hieher die, in Folge heftiger Kopfleiden, beobachtete Trennung der Krystalllinse und das Hervortreten derselben durch die Pupille in die vordere Augenkammer, welche häufiger durch Schläge und Stöße bewirkt wird <sup>1)</sup>.

Durch Geschwüre wird besonders die Continuität der Hornhaut, bisweilen auch der Blindung zerstört, wovon die Folge Ausfluß der wässerigen Feuchtigkeit und Vorfall der Blindung ist. Die Blindung trennt sich in Folge von Erschütterungen leicht in einer längern oder kürzern Strecke ihres Umfangs von der harten Haut, wodurch dann dem Anschein nach zwei Pupillen entstehen. Hieher gehört auch die regelwidrige Erweiterung von Oeffnungen, z. B. der Pupille (Mydriasis).

Zerreißungen oder anderweitige Verletzungen eines oder mehrerer Ausführungsgänge der Thränendrüse bringen die Thränensackgeschwulst (Dacryops), Anhäufung der Thränen zwischen der Bindehaut und dem Augapfel, oder Ausfließen der Thränen in zu reichlicher Menge hervor.

Beschwörung des Thränenschlauches veranlaßt häufig Zerstörung eines Theiles seines Umfangs und Oeffnung nach außen, die Thränenfistel (Fistula lacrymalis).

4) Fehler der Lage. Diese erstrecken sich entweder auf das ganze Auge oder einzelne Theile desselben. Der Augapfel kann durch Geschwülste, welche sich in der Augenhöhle entwickeln, hervorge drängt werden (Exophthalmus), oder in Folge von Verletzung oder Lähmung von Muskeln hervorfällen, (Oph-

---

1) Fribault obl. sur un crvstallin qui a passé par la pupille dans la chambre antérieure de l'oeil etc. Sédillot J. de méd. T. 59. p. 72 ff.

der Kapsel hervorbringt (Synecchia), dann Erzeugung von Eiter oder eiterähnlicher Feuchtigkeit an der Oberfläche der Blindung, welche das Eiterauge (Hypopyon), Anhäufung dieser Feuchtigkeit in der Augenkammer bewirkt. Nach Scarpa wird hier ein wahrer Eiter gebildet, indem sich kein Abscesse in der Blindung finden, nach deren Einreißen der Eiter ausfließt<sup>1)</sup>, auch spricht für diese Ansicht die serbse Natur der Blindungsflächen, allein Deers Autorität<sup>2)</sup> macht ihre Allgemeingültigkeit wenigstens zweifelhaft.

5) In der Linse und ihrer Kapsel sehr häufig der graue Star (Cataracta f. Sulfurio), dessen allgemeines Merkmal Verdunklung der im Normalzustande durchsichtigen Theile ist. Er unterscheidet sich 1) durch Sitz; 2) Consistenz; 3) Farbe.

Der Star ist am gewöhnlichsten eine Verdunklung der Linse (Linsenstar, Cat. lenticularis); seltner, vorzüglich im hintern Umfange der Kapsel (Kapselstar, Cat. capsularis); noch seltner der Morgagnischen Feuchtigkeit (Morgagnischer oder Milchstar, Cat. Morgagniana f. lactea) allein. Diese drei Arten setzen sich zur Bildung des Kapsel-Linsenstares (Cat. capsulo-lenticularis) zusammen.

Beim Linsenstar fängt die Verdunklung am gewöhnlichsten in der Mitte, und in der Tiefe, beim Kapselstar im Umfange an. Hier erscheint sie bisweilen nur an einzelnen Stellen, (Litterstar, C. fenestrata). Am gewöhnlichsten ist die Linse, vorzüglich, doch nicht immer, im Alter häuer, selbst

1) A. a. O. S. 149.

2) Augenkrankheiten Bd. I. S. 436.

Umfange, der Spitze nach der Mitte des Auges gewandt, unstreitig weil der Zusammenhang der Bindehaut mit der darunter liegenden Haut dort lockerer als hier ist, wo sie in der That mit der Hornhaut eins wird.

Das dicke Augenfell (Pannus) unterscheidet sich von dem Flügelfell vorzüglich dadurch, daß die Substanz der Bindehaut selbst, und oft zugleich die Hornhaut verdickt ist. Das Fettsell (Pinguecula) entsteht gewöhnlich im äußern Augenwinkel, wenigstens nach außen von der Hornhaut, ist selten größer als eine Linse, und wird durch die Bindehaut und das darunter liegende Zellgewebe gebildet.

3) In der Hornhaut sind vorzüglich die Verdunklung und Flecken (Obscuratio, maculae, nebula, albugo s. leucoma) Folgen der Entzündung, die sehr häufig bloß Erzeugnisse von Ausschwüzung in dem Gewebe der Hornhaut, oft Narben von Geschwüren derselben sind, und sowohl dem Grade der Undurchsichtigkeit als der Ausbreitung nach variiren. Unter der erstern Bedingung verhält sich die Oberfläche der Hornhaut an der Stelle des Fleckes nicht anders als in ihrer übrigen Ausbreitung, unter der letztern ist sie vertieft. Die Narbe ist zugleich immer hart, eben so auch der durch Ausschwüzung entstehende Fleck, wenn er alt ist, außerdem keine Veränderung des Gewebes an dieser Stelle zu bemerken <sup>1)</sup>).

4) An der Blendung Verwachsung der Pupille durch eine von der entzündeten Blendung ausgeschwügte undurchsichtige Pseudomembran (Atresia pupillae), welche zugleich Verwachsung, vorzüglich zwischen der hintern Fläche der Blendung und  
der

1) Wardrop a. a. D. S. 93.

Proceß vermittelt werden, doch nicht mit Bestimmtheit als Nachkrankheit einer Augenentzündung angesehen werden können, lassen sich, wie alle neue Bildungen in solche, die nur durch die Stelle, an welcher sie vorkommen, regelwidrig sind, und in völlig fremde eintheilen.

1) Von den, auch im normalen Zustande im Körper vorkommenden erzeugen sich im Auge; 1) außer dem Zellgewebe, welches als Pseudomembran die Verbindung ursprünglich getrennter Theile vermittelt und als Product der Entzündung in dieser Hinsicht schon oben an mehreren Stellen betrachtet wurde, 2) dem Gefäßgewebe, welches in den verschiedenen neuen Gebilden, und namentlich dem vorigen, auf dieselbe Weise entsteht; besonders folgende Gewebe außer der Regel.

a) Das seröse Gewebe in Bälgen, welche sich in den Augenlidern, namentlich dem obern, und hier besonders nach außen, in der Thränendrüse und außerhalb derselben, in der Augenhöhle<sup>1)</sup>, seltner zwischen der Ader- und Netzhaut<sup>2)</sup> entwickeln. Wahrscheinlich lassen sich hier am richtigsten die Bälge rechnen, welche sich um die, durch die durchbrochne Hornhaut vorgefallne Blendung bilden.

b) Das Fasergewebe entsteht weit seltner. In einem Falle war die Netzhaut in eine weiße, faserige, sehr feste, einer Aponeurose ganz ähnliche Membran verwandelt, die nach außen mit einer Knochenschicht zwischen ihr und der Aderhaut sehr genau zusammenhing<sup>3)</sup>.

c) Das

1) Beer's Augenkrankheiten Bd. 2. S. 589. Note.

2) Portal anat. méd. T. 4. p. 418.

3) Magendie bei Damours. Mal. des yeux. T. I. p. 78.

c) Das Knochengewebe. Am gewöhnlichsten entsteht es in Form mehr oder weniger unregelmäßiger, dünner Platten zwischen der Ader- und Netzhaut, wahrscheinlich als Umwandlung der serösen, die Netzhaut äußerlich bekleidenden Haut<sup>1)</sup>. Seltner kommt es in der Hornhaut vor<sup>2)</sup>, vielleicht ursprünglich hier in der Wasserhaut.

Bedeutende, selbst steinige Härte der verdunkelten Linse, Bildung steiniger Concremente an der Stelle des Glaskörpers, die aber wahrscheinlich, auch wenn sie eine beträchtliche Dichte haben, keine Umwandlung von diesem sind, sondern, zwischen der Ader- und Netzhaut entstanden, ihn nur verdrängen, da er zusammengedrückt und geschwunden in ihrer Mitte gefunden wurde<sup>3)</sup>, gehören wahrscheinlich hieher.

d) Vom Hautgewebe erzeugt sich wahrscheinlich nur das Haarsystem, wenn man nicht die oben (a) erwähnten Wölge um die vorgefallne Blendung hieher rechnen will, regelmäßig. Die Bindehaut scheint, wie überhaupt das Hautsystem, im Auge der einzige Boden zu seyn, worin Haare wurzeln. Sie entstehen entweder als Asterwimpern (Dyckialis) an dem innern Rande der obern Augenlidfläche in Folge von vernachlässigten Augenentzündungen, und unterscheiden sich außer der Stelle durch Dünne, Kürze, weißliche

1) E. oben S. 93.

2) Walter anat. Mus. 1. S. 139. Wardrop a. a. D. S. 72. Anderson ebend. S. 73.

3) Scarpa S. 269.

Farbe von den normalen Wimpern <sup>1)</sup>; oder sie bilden sich, selten, in der Bindehaut des Augapfels. Hier entstehen sie entweder, und, wie es scheint, am gewöhnlichsten, in der eigentlichen Bindehaut <sup>2)</sup>, oder auf der Hornhaut <sup>3)</sup>. In dem von Himly beobachteten Falle wurzelten die Haare in einem Fettgewächs, und überhaupt war auch in den übrigen, wenigstens den von Wardrop und Demours beschriebnen Fällen ein Fell vorhanden, mithin eine krankhafte Ausartung vorausgegangen. Himly und Wardrop sahen diese Bildung im äußern, Demours im innern Augwinkel. Hier erinnert sie daher an die von Albin <sup>4)</sup> beobachtete bedeutende Vergrößerung eines Haares der Thränenkarunkel. Sehr merkwürdig ist eine, in mehreren unter den wenigen, bisher bekannt gewordenen Fällen dieser Erscheinung vorhandne Beziehung zwischen den Pubertätserscheinungen und dem Hervorbrechen der Haare. In dem Wardropschen Falle brachen die Haare erst im sechzehnten Jahre mit dem Barte hervor, und im Himly'schen wurde die Geschwulst, die schon im zweiten Jahre vorhanden war, erst im zwanzigsten Jahre lästig, vermuthlich, weil jetzt erst die Haare hervorgebrochen waren.

2) Die völlig regelwidrigen neuen Gebilde sind a) felsenwarzenähnliche Auswüchse, welche an der Blindung bei syphilitischer Entzündung derselben entstehen;

b) der

1) Beer a. a. N. S. 119.

2) Himly ophth. Biblioth. Bd. 2. St. 1. S. 199. Ware on Entropion S. 7.; Wardrop morb. Anat. of the eye. p. 51. Demours mal. des yeux Tab. 64. Fig. 1.

3) Gazelles. J. de méd. T. 24.

4) Annot. acad. Lib. III. Cap. 8.



b) der *Blutschwamm*, der sich entweder im Augapfel, und, wie es scheint, im hintern Theile der Netzhaut entwickelt, und, alle Theile des Auges zerstörend, nach vorn dringt, oft eine beträchtliche Größe erreicht, oder außerhalb des Augapfels im Fette der Augenhöhle erzeugt, und den Kranken unter ähnlichen Erscheinungen tödtet. Hieher gehören vielleicht auch *Auswüchse*, die sich im Innern des Sehnerven bilden<sup>1)</sup>.

c) *Entozoen*. Wahrscheinlich gehören hieher, wenigstens bisweilen, frei liegende Wasserblasen, die sich in der Thränenendrüse erzeugten, und die man richtiger so, als aus Umwandlung des Zellgewebes erklärt<sup>2)</sup>. Der *Fadenwurm* kommt bisweilen unter der Bindehaut vor<sup>3)</sup>.

---

1) Gallereux bei Demours *Mal. des yeux*. T. I. p. 75r

2) Schmidt *Krankh. des Thränenorgans*. S. 75 ff.

3) Larrey's *Denkwürdigkeiten* Bd. 1. S. 67.

## Dritter Abschnitt.

Vom Geruchsorgan oder der Nase <sup>1)</sup>.

§. 2026.

Der Sinn des Gehörs und des Gesichtes, deren Organe bis jetzt betrachtet wurden, unterscheiden sich von den noch übrigen in Bezug auf ihr Verhältniß zu andern Organen vorzüglich durch größere Selbstständigkeit. Die Organe des Geruches und des Geschmacks sind vielmehr Theile andrer Organe, namentlich beide Abschnitte des Verdauungssystems, der erstere auch des Respirationssystems, und nicht unzweckmäßig kann man daher die Organe des Geruches, der Stimme und des Athmens, eben so die Organe des Geschmacks und der Verdauung als ein Ganzes betrachten. Wirklich läßt sich auch die Zunge, da sie in einer Höhle liegt, welche der Anfang des Verdauungssystems ist, in welcher die eingenommenen Nahrungsmittel die ersten und sehr wichtige Veränderungen erleiden, da sie sich hinter den Organen befindet, welche diese Veränderungen bewirken, nicht wohl anders als im Zusammenhange mit dem Darmkanal beschreiben. Dagegen betrachte ich das Geruchsorgan abgesondert, theils, weil es in der That mehr selbstständig ist, von den Fischen an von dem Respirationssystem völlig getrennt ist, und das letztere sich nicht bloß durch dieses Organ, sondern auch durch die Mundhöhle nach außen öffnet.

Erste

1) Santorini observationes anatomicae. Venet. 1724. Cap. V. de naso. p. 84 seqq.

Ziervogel (Aurivillius) de naribus internis. Upsal. 1760. rec. in Sandifortii Thes. diss. T. I.

Erste Abtheilung.

Geruchsorgan im regelmäßigen Zustande.

Erste Unterabtheilung.

Vollkommener Zustand.

§. 2027.

Das Geruchsorgan oder die Nase, besteht 1) aus einer knöchernen, vielfach abgetheilten Höhle, deren bei weitem größter, hinterer und oberer Theil aus Knochen gebildet wird, deshalb den Namen der knöchernen Nase (Nasus osseus) erhält, und schon oben (Th. 2. Knochenlehre S. 160 ff.) beschrieben worden ist;

2) einem vordern, kleinern, dreieckigen, knorpiligen, länglichen Theile, der knorpiligen Nase (N. cartilagineus);

3) Muskeln, welche diesen knorpiligen Theil bewegen;

4) der, die knöcherne und knorpelige Nase bekleidenden Schleimhaut der Nase;

5) den sich in derselben verbreitenden Nerven.

Außerlich unterscheidet man an der Nase den obern Theil, oder die Wurzel, den vordern Rand, oder den Rücken, und den untern Theil, oder die Spitze.

I. Knorpelige Nase.

§. 2028.

Die knorpelige Nase, das vordere Ende der knöchernen, besteht aus dem mittlern, senkrechten Theile, der knorpeligen Nasenscheidewand (Septum narium cartilagineum), den beiden Nasenflügeln (Pinnae s. alae nasales) und den länglichtrunken Nasenlöchern (Nares), durch welche sich die Nasenhöhle nach vorn öffnet, und die,

vorzüglich an den innern Theilen ihres Umfangs, mit den steifen **Nasenhaaren** (Vibrillae) besetzt sind.

Mehrere, gewöhnlich eiförmig, durch die äußere Haut äußerlich, die Nasenhaut nach innen unter einander und mit der knöchernen Nase zusammengehaltene, dünne Knorpel, gehen in ihre Zusammensetzung ein.

Der ansehnlichste ist der senkrecht herabsteigende, viereckige **Scheidewandknorpel**, welcher die knöcherne Nasenscheidewand nach vorn vervollständigt, und zwischen der senkrechten Platte des Riechbeins, dem Flügelhaar und der Mittelnath der Nasenbeine liegt. Der vordere, von vorn nach hinten absteigende Rand ist frei, und heftet sich an eine lange Hautverlängerung, die häutige Nasenscheidewand.

Mit diesem Knorpel ist der obere **Seitenknorpel**, ein viereckiger Knorpel, der sich an seinen oberen Rand, den untern des Nasenbeines und des aufsteigenden Oberkieferfortsatzes heftet, gewöhnlich so eng verwachsen, daß man alle drei in der That als einen Knorpel ansehen kann <sup>1)</sup>. Unter dem obern Seitenknorpel, und neben dem untern Theile des mittlern, liegt der untere **Seitenknorpel**, oder **Nasenflügelknorpel** (Cart. pinnae), welcher das Nasenloch umgiebt. Er ist niedrig und besteht aus einem innern und einem äußern Stücke, welche vorn unter einem spitzen Winkel in einander übergehen, hier häufig eine Oeffnung haben, bisweilen ganz von einander getrennt sind, und von welchen das äußere länger und höher als das innere ist. Auf das äußere folgen von vorn und außen nach hinten und innen mehrere weit kleinere, von vorn nach hinten kleiner werdende, viereckige Knorpel, welche das Nasenloch von hinten und außen ein-

schließen

1) Santorini a. a. D. S. 85.

fließen, und oft unter einander und mit dem vorigen verschmelzen. Zwei bis fünf noch kleinere, die Zwischennorpel (*C. Isamoidaeae*), liegen auf jeder Seite vorn zwischen dem mittlern und den beiden Seitenknorpeln.

## 2. Muskeln der Nase.

§. 2029.

Die knorpelige Nase wird von vier Muskeln bewegt. Von diesen sind ihr zwei mit den benachbarten Theilen gemeinschaftlich, zwei eigenthümlich.

- a. Gemeinschaftlicher Heber des Nasenflügels und der Oberlippe.

§. 2030.

Der gemeinschaftliche Heber des Nasenflügels und der Oberlippe (*Levator alae nasi labiiq. super. comm.*) oder Pyramidenmuskel (*M. pyramidalis*) entspringt vom Nasenfortsatze des Oberkiefers, hier gewöhnlich mit dem Stirnmuskel vermischt, steigt auf der Seite der Nase herab, und spaltet sich in einen kleinern vordern, untern Seitenknorpel, und einen weit größern, mit dem Mundschlesser und den obern Muskeln der Oberlippe zusammenfließenden Zipfel. Er hebt den Nasenflügel und die Oberlippe, öffnet das Nasenloch und bewirkt hiedurch das Nasenräumpfen.

- b. Verengerer des Nasenloches.

§. 2031.

Der Verengerer des Nasenloches (*Compressor narium*) ist dreieckig, unten dicker und schmäler, nach oben aus-

ges

- 1) Santorini obl. anat. Cap. I. de musculis faciei. p. 11 seqq. Id. Tabulae XVII. Tab. I.

A. F. Waltheri tener. musc. hum. corp. anat. repet. Lips. 1751.

Jensenflamm Abbild. und Beschreibung in dessen pract. Ann. über die Muskeln. Erlangen. 1778. S. 345 ff.

gebildet, steigt vom hintern Theile des Nasenflügels, hier mit dem vorigen verschmolzen, und zum Theil von ihm bedeckt, nach vorn und oben zum Nasenrücken empor, fließt in der Mitte, ohne Zwischenfäden, mit dem gleichnamigen zusammen, und schickt häufig einen Fortsatz nach oben, der mit dem Stirnmuskel zusammenfließt. Dies ist Santorini's *M. procerus* der untere Theil sein Quermuskel (*Transversus nalis*) verengt die Nasenlöcher, sowohl wenn er sich gegen die Scheidewand als wenn er sich nach unten zusammenzieht, und bewirkt nie Erweiterung derselben.

c. Der eigne Nasenflügelmuskel.

§. 2032.

Der eigne Nasenflügelmuskel (*M. pinnarum*), Seitenmuskel (*M. narium lateralis Sant.*), Erweiterer des Nasenloches (*Dilatator narium proprius L. inferior*) gewöhnlich Herabzieher des Nasenflügels (*Depressor narium*), kommt von dem Oberkiefer über dem Eckzahn und dem äußern Schneidezahn, und setzt sich, aus queren Fasern gebildet, fast an die ganze Länge der äußern Fläche des Nasenflügelsknorpels. Seine Hauptwirkung ist die Erweiterung des Nasenloches bei übrigens unbewegter Nase. Wegen seiner Befestigung am Oberkiefer kann er auch die Nase, und, da er sich mit seiner äußern Fläche an die Haut der Oberlippe heftet, diese herabziehen.

Bisweilen, doch nicht gewöhnlich, findet sich vor ihm ein weit kleinerer vorderer, eigner Erweiterer des Nasenloches; Santorini's myrtenförmiger Muskel, welcher bisweilen das Nasenloch als ein Schließer umgiebt.

a. Ries

2. Niederzieher der Nase.

§. 2033.

Der Niederzieher der Nase (*Depressor narium*), ein, auf jeder Seite dicht neben der Mittellinie von dem innern obern Theile des Mundschließers nach oben gehendes kleines Bündel, welches sich hinten und innen an den innern Schenkel des Nasenflügelknorpels heftet, und die knorpelige Nase nach unten und hinten krümmt, zugleich die Nasenlöcher verengt.

3. Schleimhaut.

§. 2034.

Die Schleimhaut, Riechhaut der Nase, oder die Schneider'sche Haut (*M. pituitaria* s. *Schneideriana*) ist nicht überall genau von derselben Beschaffenheit. Die in der eigentlichen Nase enthaltne ist beträchtlich, stellenweise über eine Linie, dick, stark geröthet, eng an die darunter liegenden Knochen, welche sie von allen Seiten umkleidet, geheftet, enthält eine beträchtliche Menge von Vertiefungen, Schleimhöhlen, und außerdem, besonders im untern und innern Theile der Nase, in ihrem Gewebe eigne, gelbliche, einfache Drüsen. Im vordern und untern Theile der Nase ist sie dünner, härter, trockner, doch auch mit Schleimhöhlen, besetzt. Mit Ausnahme dieses Theiles ist sie überall mit sehr kurzen Zotten bedeckt. An dem untern Rande der Scheidewand verläuft nicht selten von hinten nach vorn ein enger, hinten blinder Gang, der sich in geringer Entfernung hinter dem vordern Rande öffnet, offenbar über das Jacobson'sche Organ<sup>1)</sup>.

Die

1) Ruysch Thesaurus anat. III. Tab. IV. Fig. 5.  
Jacobson Ann. du Mus. T. 18. p. 412 ff.

Die Schleimhaut der Nebenhöhlen ist äußerst dünn, glatt, weißlichgelb und nur sehr locker mit der Fläche der Knochenhöhlen, welche sie bekleidet, verbunden, höchst wahrscheinlich, weil nicht, wie dort, durch die Knochensubstanz eine bedeutende Menge von Gefäßen und Nerven an sie treten.

#### 4. Nerven<sup>1)</sup>.

§. 2035.

Die Nase erhält ihre Nerven aus einer doppelten Quelle, vom Riechnerven (Vd. 3. S. 752.) und dem zweiten Aste des dreigetheilten. (Vd. 3. S. 717. 718. 723. 724. 726. 727.)

Der Riechnerv, unstreitig der eigenthümliche Sinnesnerv, indem Mangel und Druck desselben mit Geruchlosigkeit verbunden war, scheidet aus der untern Fläche seines Endknospiens eine äußere und eine innere Reihe von Fäden nach unten, welche der doppelten Reihe von Oeffnungen in der Siebplatte des Riechbeins, jedoch so entsprechen, daß oft zwei bis drei durch die Oeffnung treten, und deren Größe und Zahl, letztere von 4 — 12, so variiert, daß beide Bedingungen einander ersetzen. Die vordern wenden sich nach unten und vorn, die mittlern gerade nach unten, die hintern nach hinten und unten. Sie treten bald nach ihrem Abgange vom Riechnerven in Scheiden der harten Hirnhaut, in welchen besonders die hintern ziemlich weit verlaufen; die

1) J. Hunter a description of the nerves, which supply the organ of smelling. In Observ. on different parts of the animal oeconomy. p. 259. Tab. 17. 18.

A. Scarpa Anat. annot. L. II. De organo olfactus praecipue deque nervis nasalibus interioribus e quinto pari nervorum cerebri. Cap. 5 — 6.



durch die Oeffnungen treten. Zunächst werden sie von der Gefäßhaut, weiter nach außen von der Spinnwebenhaut, von einer locker und weniger weit, bekleidet. Zu äußerst umkleidet jeden ein ansehnlicher, tief herabsteigender, trichtersförmiger Fortsatz der harten Hirnhaut, wodurch diese Fäden weit dicker als bei ihrem Abgange vom Stamme erscheinen. Unterhalb der Siebplatte anastomosiren sie, und verlaufen zwischen dem Knochen und der Riechhaut, verästeln sich sehr schnell beträchtlich, und nähern sich allmählich der freien Oberfläche von dieser, dem sie sich verzweigen.

Die innere Reihe gehört der Scheidewand an, in deren ganzen Höhe sie zum Theil verlaufen. Die mittlern sind die längsten, die hintern die kürzesten.

Sie steigen neben einander, eine einfache Schicht bildend, auf.

Die äußere Reihe, welche sich in den Seitentheilen der Nase, namentlich der beiden obern Muscheln, vorzüglich der ersten verbreitet, bildet beträchtlichere Anastomosen, ist aber viel weniger dicht als die innere, dringt nicht in die Zellen des Riechbeins, und versieht auch die Schleimhaut der obern Muschel gar nicht, oder nur vorn durch einige wenige schwache Fäden.

Eben so wenig treten Fäden vom Riechnerven in die Schleimhaut der Nebenhöhlen.

Unter den Nerven vom fünften Paare oder den Hülsenerven der Nase, treten die obern nach hinten, die mittlern und obern Nasennerven und der Nasenscheidewandnerv, welcher mit Flügelgaumennerven entspringen, von hinten, der Riechnerv, vom Nasenaste kommend, von oben, am weitesten nach vorn, selbst vor dem Riechnerven in die Nase, und verbreit-

breiten sich in der Schleimhaut der eigentlichen Nase auf die oben angegebne Weise, indem sie die von den Nerven verfehene Fläche umgränzen, sich mit seinen hintern und äußersten Ästen, so wie die vom zweiten Aste des dreigetheilten Nerven kommenden mit dem Nerven zusammenfließen, so daß diese Hilfsnerven einen geschlossenen Kreis um die Ausbreitung des Nerven, auf ähnliche Weise wie die Blindnerven um die Netzhaut bilden. Ungeachtet diese Nerven in einer beträchtlichen Länge verlaufen, haben sie doch nur eine geringe Masse, und ihre Zweige breiten sich daher über einen weit geringern Raum aus als die des Nerven.

#### §. 2036.

Die Geruchsempfindungen werden durch den Nerven, zunächst durch die Nasenschleimhaut vermittelt. Vorzüglich scheint der in der eigentlichen Nase ausgebreitete Theil der sich derselben zu seyn, wenn es gleich nicht zu läugnen ist, daß auch die in den Nebenhöhlen befindliche Ausbreitung Theil an ihrer Entstehung hat.

#### Zweite Unterabtheilung.

#### Entwicklungsverschiedenheiten.

#### §. 2037.

Die vorzüglichsten Entwicklungsverschiedenheiten der äußern Nase sind schon oben (Vd. 2. S. 165. 166.) angegeben.

Das ganze Geruchsorgan ist lange äußerst unvollkommen. Von der äußern Nase nimmt man bis zur siebenten oder achten Woche des Embryonlebens keine Spur wahr. Jetzt erscheint durch eine verhältnißmäßig sehr breite Scheidewand von einem

entfernt, die äußern Nasenlöcher in Gestalt zweier sehr kleiner Oeffnungen, und etwas später fängt die äußere Nase, über den Mund hervorjuragen. Sie ist aber das ganze Ausleben hindurch verhältnismäßig klein, stumpf, und auch im Kinde macht eine stark vorspringende Nase, als dem Charakter dieser Lebensperiode fremd, einen störenden Eindruck.

Die knorplige Beschaffenheit der äußern Nase nimmt man erst am Ende des dritten Monats wahr.

Bis zum Ende des zweiten hängt die Nasenhöhle mit der Mundhöhle zusammen. Sie ist anfangs nicht nur von oben und unten, sondern auch von einer Seite zur andern, wegen verhältnismäßig beträchtlicher Breite der Scheidewand, weit genug.

Die Nasengänge werden schon am Ende des zweiten Monats durch die noch häutigen Vorsprünge der Muscheln getrennt.

## Zweite Abtheilung.

### Regelwidriger Zustand<sup>1)</sup>.

#### A. Eigentliche Nase.

##### §. 2038.

Die angeborenen Formfehler der eigentlichen Nase, sind a) gänzlicher Mangel, der sehr selten und dann gewöhnlich mit Verschmelzung beider Augen zu einem verbunden ist, und b) in die Verschmelzung beider Nasenhälften zu einem, hinter dem einfachen Auge liegenden Rüssel übergeht; c) mehr oder

1) Deschamps Abhandlung über die Krankheiten des Geruchsorgans und der Nebenhöhlen der Nase. N. d. F. 1804.

Meckel's Anat. 4. Th.

### Zweites Hauptstück.

#### Von den eigentlich sogenannten Eingeweiden oder den Bildungswerkzeugen <sup>1)</sup>.

§. 2040.

Die eigentlich sogenannten Eingeweide, die man auch, weil ihre wesentliche Function die Bildung neuer Substanz ist (S. 2.), Bildungswerkzeuge nennen kann, bieten vorzüglich folgende allgemeine Merkmale dar.

1) Sie nehmen vorzüglich den Stamm, nur zu einem kleinen Theile den untern Theil des Antlitzes ein, und befinden sich hier größtentheils in Höhlen, welche durch Knochen, Muskeln, und unter diesen durch seröse Häute gebildet werden, die daher einer bedeutenden Veränderung ihrer Capacität fähig sind, und zwischen welchen und ihnen ein wässriger Dampf enthalten ist.

2) Sie werden ganz, oder wenigstens größtentheils, und ihren wichtigsten Theilen nach, von serösen Häuten umgeben, und beinahe jeder Apparat befindet sich auf diese Weise von dem andern isolirt, so wie fast jeder eine eigne Abtheilung des Rumpfes einnimmt.

3) Ihrem bei weitem größten Theile nach, erhalten sie ihre Nerven vom Gangliensystem, und die Nervenmasse, welche an sie tritt, ist verhältnißmäßig, besonders im Vergleich mit der

Ner

---

<sup>1)</sup> R. C. de Garengot *Splanchnologie ou l'anatomie des viscères*. T. 1. 2. à Paris, 1742. Wo aber auch Herz und Gehirn abgehandelt sind.

Nervenmasse der Sinnorgane, nur unbedeutend, wenn man einzelne Theile, wie die Zunge und die äußern Geschlechtstheile, ausnimmt, welche sehr reichlich mit Nerven versehen, und dem zu Folge der Sitz einer sehr hoch gesteigerten und eigenthümlichen Empfindlichkeit, wirklich Sinnorgane sind. Die größte Masse der Eingeweide erhält ihre Nervensubstanz vom Gangliennerven, zunächst vom Zungenmagennerven. Außerdem verbreiten sich in dem Anfangstheile der Zungenbewegende Nerv, der Zungenschlundkopfnerv, der dreigetheilte Nerv; im Endtheile die untern Rückenmarksnerven.

Die Nerven verlaufen meistens eine beträchtliche Strecke, ehe sie die Organe erreichen, und im Allgemeinen wird jedes nur von einem Nervenpaare versehen, ja ein Nervenpaar tritt zum Theil an mehrere.

4) Dem bei weitem größten Theile ihrer Ausbreitung nach sind sie der Willkühr nicht unterworfen. Da dies nicht bloß für diejenigen unter diesen Organen gilt, welche ihre Nervenzweige von dem Gangliennerven erhalten, so folgt von selbst, daß diese Bedingung wenigstens nicht in der Natur dieses Nerven gegründet ist. Falsch ist, daß sie mit dem geistigen Princip auch insofern in keiner Beziehung stehen, als in ihnen vorgehende Veränderungen nicht empfunden würden, da dies in der That im krankhaften Zustande sehr wohl der Fall ist, und die sich auf sie beziehenden Gefühle nicht unbestimmter als die sind, welche überhaupt durch Organe veranlaßt werden, die nicht Gegenstände des Gesichtsinnes sind.

5) Nicht alle stehen, wenigstens im vollkommenen Zustande, unter einander durch Schleimhäute im Zusammenhange.

Das Respirations- und Verdauungssystem fließen zwar auf diese Weise am Halse, das Harnsystem und das Zeugungssystem am untern Ende des Stammes zusammen, die beiden letztern aber sind vom Verdauungssystem getrennt, oder wenigstens nur durch die Haut mit demselben verbunden.

6) Sie sind in Hinsicht auf Gestalt und Lage viel weniger symmetrisch als die Sinnorgane.

7) Ihr wichtigster Theil ist mehr oder weniger deutlich drüsenartig. Ohne Ausnahme vereinigen sich mehrere Drüsen, und das Resultat ihres gemeinsamen Wirkens ist die vollkommne Ausbildung der Feuchtigkeit, welche sie bilden. Vorzüglich deutlich ist die Nothwendigkeit der gemeinsamen Wirkung mehrerer Drüsen in dem zusammengesetztesten Apparat, dem der Verdauung. Ihm zunächst stehen die Zeugungstheile, namentlich die männlichen. Am undeutlichsten ist die Nothwendigkeit des Zusammenretens mehrerer Drüsen zur Bildung neuer Substanz in dem Harn- und Respirationssystem.

Ein zweiter Theil ist ein, aus mehrern über einander liegenden, verschiedenartigen, und durch Zellgewebe verbundenen Häuten gebildeter Kanal, in welchen sich die Drüse oder die Drüsen im Allgemeinen öffnen, und der, wie der Speisefanal, an beiden, oder, wie die übrigen, nur an einem Ende offen ist. Die Beschaffenheit der Wände dieses Kanals ist außerordentlich verschieden, doch bestehen sie immer wenigstens aus zwei über einander liegenden Schichten, deren innere eine Schleimhaut, die äußere verdichtetes Schleimgewebe ist. Entweder durchaus, wie im Darmkanal, oder wenigstens Stellenweise legt sich um die Schleimhaut eine Muskelschicht.

8) Diese

8) Diese Organe sind, mit Ausnahme der Zeugungstheile, nebst den Centraltheilen des Nerven- und Gefäßsystems die lebensnothwendigsten, wenn gleich Theile von ihnen ohne bedeutenden Nachtheil ursprünglich fehlen, oder auf irgend eine Weise zerstört werden können, und auch sehr bedeutende Alienationen erst spät tödlich werden.

### Erster Abschnitt.

#### Von den Verdauungswerkzeugen.

##### §. 2041.

Die Verdauungswerkzeuge werden durch einen, an beiden Enden offenen, ununterbrochen verlaufenden Kanal und mehrere Anhänge gebildet, welche sich mittelbar oder unmittelbar an verschiedenen Stellen in seine Höhle öffnen, und eine von ihnen bereitete Flüssigkeit in dieselbe ergießen. Der Kanal kann den Namen des Speisekanals (*Canalis l. ductus cibarius*) führen. Sein oberes Ende ist der Mund (*Os*), sein unteres der After (*Anus*), beide liegen einander ziemlich in gerader Linie gegenüber. Er zerfällt in mehrere, zum Theil durch klappenartige Vorsprünge unvollkommen von einander abgegränzte Theile, deren Benennungen theils von ihrer Function, theils von ihrer Gestalt entlehnt sind. Man kann vorzüglich drei Theile von einander zweckmäßig in Hinsicht auf Structur, Function und Lage absondern, welche Wiederholungen derselben Bildung sind, den Anfangstheil, den mittlern und den Endtheil. Der Anfangstheil befindet sich am Kopfe, dem Halse und der Brust, die übrigen, welche ihn dem bei weitem größten Theile nach bilden, füllen beinahe

die ganze Unterleibshöhle aus. Der Anfangstheil besteht aus der Mundhöhle (*Cavum oris*), dem engern Schlundkopfe (*Pharynx*), und der darauf folgenden noch engern Speiseröhre (*Gula* s. *oesophagus*), in welche dieser übergeht. Die Speiseröhre dehnt sich, unmittelbar nachdem sie durch das Zwerchfell getreten ist, zu einer zweiten Erweiterung, dem Magen (*Ventriculus*, *stomachus*), dem Anfange des mittleren Theiles, aus, welcher in eine zweite verengte Strecke, den dünnen Darm (*Intestinum tenue*) übergeht, der unwesentlicher Verschiedenheiten wegen in einen ersten, kleinsten Theil, den Zwölffingerdarm (*Intestinum duodenum*), den zweiten, mittlern, den Leerdarm (*Intestinum jejunum*), den dritten, letzten, den Krummdarm (*Intestinum ileon*) übergeht. Dieser setzt sich in den Endtheil des Darmkanals, den Grimms oder dicken Darm (*Intestinum colon* s. *crassum*) fort, welcher, der Lage und Richtung seiner verschiednen Stücke wegen, in den aufsteigenden (*C. ascendens*), queren oder mittlern (*C. transversum*), und den absteigenden (*C. descendens*) Grimmdarm getheilt wird. Dieser geht endlich in den Mastdarm (*Intestinum rectum*) über, der sich am unteren Ende der Wirbelsäule mit dem After endigt. Der dünne, dicke und Mastdarm zusammen genommen, führen den Namen des Darmkanals (*Ductus* s. *canalis intestinalis*).

Die Anhängen des Speisefkanals sind drüsige Organe aus der Gattung der zusammengehäuften Drüsen. Sie zerfallen in die Speicheldrüsen (*Glandulae salivales*), und die Leber (*Hepar*, *jecur*). Die Speicheldrüsen liegen theils im Umfange der Mundhöhle, in welche der von ihnen bereiteete Speichel fließt, theils in der Nähe des obern Dünndarmendes, also



8) Diese Organe sind, mit Ausnahme der Zeugungstheile, nebst den Centralthellen des Nerven- und Gefäßsystems die lebensnothwendigsten, wenn gleich Theile von ihnen ohne bedeutenden Nachtheil ursprünglich fehlen, oder auf irgend eine Weise zerstört werden können, und auch sehr bedeutende Alienationen erst spät tödtlich werden.

### Erster Abschnitt.

#### Von den Verdauungswerkzeugen.

##### §. 204I.

Die Verdauungswerkzeuge werden durch einen, an beiden Enden offenen, ununterbrochen verlaufenden Kanal und mehrere Anhänge gebildet, welche sich mittelbar oder unmittelbar an verschiedenen Stellen in seine Höhle öffnen, und eine von ihnen bereitete Flüssigkeit in dieselbe ergießen. Der Kanal kann den Namen des Speisefkanals (*Canalis s. ductus cibarius*) führen. Sein oberes Ende ist der Mund (*Os*), sein unteres der After (*Anus*), beide liegen einander ziemlich in gerader Linie gegenüber. Er zerfällt in mehrere, zum Theil durch klappenartige Vorsprünge unvollkommen von einander abgegränzte Theile, deren Benennungen theils von ihrer Function, theils von ihrer Gestalt entlehnt sind. Man kann vorzüglich drei Theile von einander zweckmäßig in Hinsicht auf Structur, Function und Lage absondern, welche Wiederholungen derselben Bildung sind, den Anfangstheil, den mittlern und den Endtheil. Der Anfangstheil befindet sich am Kopfe, dem Halse und der Brust, die übrigen, welche ihn dem bei weitem größten Theile nach bilden, füllen beinahe

dünnere, ausgehauchte Flüssigkeit feucht, steht mit den eingenommenen Substanzen in unmittelbarer Berührung, und durch die von ihr abgesonderten Flüssigkeiten in einer chemischen und dynamischen Beziehung, indem durch ihre Thätigkeit dieselben umgewandelt, in einen zur Ernährung tauglichen und einen untauglichen Theil oder Auswurfstoff, - wovon jenes der Speise- oder Milchsaft (Chylus), dieses der Koth (Faeces) ist, geschieden werden, und sie selbst durch den ersten so abgeändert wird, daß er in die in ihr befindlichen einsaugenden Gefäße eindringt.

Die Verschiedenheiten dieser Haut beziehen sich vorzüglich 1) auf Dicke, 2) Gefäßreichthum, 3) davon abhängige Färbung, 4) Festigkeit, 5) verhältnißmäßige Größe in Vergleichung mit den übrigen Häuten, mit welcher 6) der Mangel oder die Anwesenheit von größern und kleinern, nach innen ragenden Verlängerungen und Verdopplungen, von denen die ersten Falten, Klappen, die letztern Zotten, Flocken sind, im geraden Verhältniß steht, 7) Glätte oder Rauhigkeit ihrer Oberfläche, welche von denselben Bedingungen abhängen, 8) Zahl, 9) Größe, 10) Anordnung und Stellung der Schleimdrüsen.

Allgemeines Gesetz ist, daß die Entwicklung der Ungleichheiten an der innern Fläche mit der Ausbildung der Schleimhöhlen, also die Hervorragungen mit Vertiefungen, im entgegengesetzten Verhältnisse stehen, und daß jene desto ansehnlicher sind, je reicher an Nahrungstoff die in der Höhle des Darmkanals enthaltne Substanz, diese desto beträchtlicher, je mehr die im

Darm:

Darmkanal enthaltne Substanz bloß Auswurfsstoff ist.

Gemeinsames Merkmal dieser Haut, vom Anfange des Lagens an bis zum Ende des Darmkanals, ist, daß sie mit einer Menge von sehr feinen, dichtstehenden Oeffnungen, die Lündungen sehr kleiner, einfacher Drüsen besetzt ist \*).

Auf sie folgt die Nervenhaut, besser Zellhaut (*Tunica nervea, cellulosa*).

Diese besteht aus einem dichten, festen Schleimgewebe, in welchem sich die größern Zweige der Gefäße und Nerven verbreiten, ehe sie sich zu der innersten Haut begeben.

Sie hat vielen Antheil an der Bestimmung der Gestalt des Darmkanals und der Falten desselben.

Die äußerste ist die Muskelhaut (*Tunica musculosa*).

Diese besteht überall aus mehreren, wenigstens zwei, übereinander liegenden Schichten, welche dicht auf einander folgen, ob nur durch ein äußerst kurzes Schleimgewebe von einander trennt sind.

Allgemein ist die äußere Schicht aus Längenfaseru, welche der Ase des Darmkanals und des Körpers parallel laufen, gebildet, dünner, meistens auch weniger vollständig als die innere.

Diese besteht dagegen aus Kreisfasern, ist stärker als die äußere, und umgiebt überall das Rohr des Darms vollständig.

Die Verschiedenheiten dieser Muskelhaut in den verschiedenen Gegenden des Speisefkanals sind 1) in dem Verhältniß derselben

\*) Galeati de tunica intestinorum cribrosa. In Comm. Bonon. T. I.

Duverney oeuvres anatomiques. T. I. p. 480.

selben zum geistigen Princip, sofern sie willkürliche oder bloß unwillkürliche Bewegungen zu vollziehen fähig ist, begründet. In dem größten Theile seiner Länge sind die bloß unwillkürlich, nur an dem obern und untern Ende willkürlich.

2) Eine zweite Verschiedenheit bezieht sich auf den Grad von Dicke und Stärke derselben;

3) auf die größere oder geringere Zusammensetzung;

4) auf die Färbung;

5) auf die Befestigung, sofern sie entweder mit Knochen in Verbindung stehen, oder bloß durch Schleimgewebe an die benachbarten Theile geheftet sind.

Weniger allgemein als diese drei Schichten sind ein, die innerste Haut bekleidender, oberhautähnlicher Ueberzug, und eine die äußere umhüllende, von dem Bauchfelle stammende seröse Bekleidung.

Die allgemeinste Bedingung der drüsigen Anhänge des Speisefanals ist die, daß sie, die Milz ausgenommen, nach außen gedrungene Fortsätze der innern und der Zellhaut desselben sind, welche sich baumförmig verzweigen. Sie unterscheiden sich daher von den an der äußern Fläche der Zottenhaut befindlichen Schleimdrüsen nur durch vollendetere Individualisirung, Concentration an einzelnen Punkten des Speisefanals.

### Erste Abtheilung.

#### Anfangstheil des Speiserohrs.

§. 2043.

Der Anfangstheil des Speiserohres wird am besten in Kopf- und Halsstheil zerfällt.

Erste

## Erste Unterabtheilung.

## K o p f t h e i l.

## §. 2044.

Der Kopftheil begreift die Mundhöhle und die darin gehaltenen Theile,

## I. Mundhöhle überhaupt.

## A. Regelmäßiger Zustand.

## a. Vollkommener Zustand.

## §. 2045.

Die Mundhöhle, welche den untern Theil des Gesichts einnimmt, erstreckt sich vorn bis zu den Lippen (Labia), sie in die vordere Fläche des Gesichtes übergeht, hinten bis in den Rachen (Facies). Nach oben wird sie durch den Knochern (Palatum osseum, durum), nach hinten durch den weichen Gaumen, oder das Gaumensegel (Pal. molle L. velum lani) von der Nasenhöhle abgesondert. Auf ihrem Boden liegt sich die Zunge; zu ihren Seiten der Unterkiefer, die Kieferbögen, die Muskeln, welche sich theils an diese, theils an andere Knochen heften, oder sich zur Mundöffnung geben. Die Gestalt der Mundhöhle ist, sofern sie durch Muskeln und beweglich unter einander verbundene Knochen begrenzt wird, sehr veränderlich, im Ganzen aber länglich und. Sie wird durch den Zahnhöhletheil des Unter- und Oberkiefers, und die in demselben enthaltenen Zähne unvollkommen in zwei Hälften, eine vordere kleinere, den Vorhof der Mundhöhle, und eine hintere größere getheilt, von denen sie sich zwischen den Zahnhöhlenrändern und den Lippen, diese

diese sich hinter den Zahnhöhlenrändern befindet, und die bei höchster Annäherung der Kiefern durch die einander berührenden, und von vorn nach hinten bedeckenden Zahnreihen völlig von einander abgegränzt sind. Die hintere Hälfte enthält, im Zustande völliger Ruhe, die Zunge, und nimmt die Ausführungsgänge der untern Speicheldrüsen, die vordere die der obern auf. Die Mundhöhle wird zu äußerst durch die allgemeinen Bedeckungen, unter diesen durch Knochen und Muskeln, darauf durch die Mundhaut (*Membrana oris*), welche diese überall überzieht, bekleidet.

Diese nimmt in der That schon an dem obern Theile der äußern Flächen der Lippen ihren Anfang, indem hier die Haut plötzlich weicher, zarter und röther wird.

Sie überzieht alle, die Mundhöhle umgränzenden Theile, und verschließt daher die in dem knöchernen Gaumen befindlichen Oeffnungen, das vordere und das hintere Gaumenloch, durchaus. Im Umfange der Zahnhöhlen setzt sie sich in die, die Zahnhöhlen inwendig bekleidende Haut ununterbrochen fort. An mehreren Stellen bildet sie Falten. Vier von diesen liegen in der Mittellinie. Die zwei vordersten befinden sich zwischen der Mitte der vordern Fläche des Ober- und Unterkiefers und der Ober- und Unterlippe. Beide erhalten den Namen von *Lippenbändchen* (*Frenulum labii superioris und inferioris*). Von ihnen ist die obere weit deutlicher als die untere, welche meistens kaum merklich ist. Die dritte befindet sich zwischen der hintern Fläche des Unterkiefers und dem vordern Theile der untern Zungenfläche. Dies ist das *Lippenbändchen* (*Frenulum linguae*), dessen zu große oder zu geringe Länge dem Schlingen und Sprechen gleich nachtheilig ist. Die vierte begiebt sich vom hintern Ende der obern

Zun-

## Erste Unterabtheilung.

## K o p f t h e i l.

§. 2044.

Der Kopftheil begreift die Mundhöhle und die darin enthaltenen Theile,

## I. Mundhöhle überhaupt.

## A. Regelmäßiger Zustand.

## a. Vollkommener Zustand.

§. 2045.

Die Mundhöhle, welche den untern Theil des Gesichtes einnimmt, erstreckt sich vorn bis zu den Lippen (Labia), wo sie in die vordere Fläche des Gesichtes übergeht, hinten bis zum Rachen (Facies). Nach oben wird sie durch den Knochen (Palatum osseum, durum), nach hinten durch den weichen Gaumen, oder das Gaumensegel (Pal. molle L. velum palati) von der Nasenhöhle abgesondert. Auf ihrem Boden befindet sich die Zunge; zu ihren Seiten der Unterkiefer, bei Hochbogen, die Muskeln, welche sich theils an diese, theils an andere Knochen heften, oder sich zur Mundöffnung heben. Die Gestalt der Mundhöhle ist, sofern sie durch Muskeln und beweglich unter einander verbundene Knochen umgränzt wird, sehr veränderlich, im Ganzen aber länglich-rund. Sie wird durch den Zahnhöhletheil des Unter- und Oberkiefers, und die in demselben enthaltenen Zähne unvollkommen in zwei Hälften, eine vordere kleinere, den Vorhof der Mundhöhle, und eine hintere größere getheilt, von denen jene sich zwischen den Zahnhöhleträndern und den Lippen, diese

Höhle bildet, in deren obern Theil die verhältnißmäßig sehr große Zunge ragt. Diese wagerechte Scheidewand bildet sich allmählich von vorn nach hinten, indem die Gaumenfortsätze des Oberkiefers und des Gaumenbeines, und der weiche Gaumen von beiden Seiten einander entgegenwachsen und in der Mittellinie zusammenfließen. Dies geschieht selten vollständig vor dem Anfange des dritten Embryomonates. Der weiche Gaumen wird dadurch vervollständigt, daß, ehe sich noch seine beiden Seitenhälften in der Mittellinie in ihrem hintern Theile ganz vereinigt haben, der Zapfen als mittlerer, ganz von ihnen getrennter Theil zwischen ihnen herabwächst. Anfangs ist er beträchtlich breit, überragt sie nicht nach unten, und zerfällt zugleich fast in seiner ganzen Höhe gleich deutlich in zwei Seitenhälften, ist also gespalten. Diese Zapfenspalte verschwindet bald, zugleich rücken die beiden Seitenhälften des weichen Gaumens einander näher, und drängen dadurch den Zapfen etwas nach vorn, so daß er die noch bestehende kleine Spalte im weichen Gaumen von vorn bedeckt. Sein oberer Theil ist jetzt mit den Seitentheilen verwachsen, sein unterer springt nach unten etwas über diese hervor. Zuletzt verwachsen die beiden Seitentheile des weichen Gaumens unter einander und mit dem Zapfen völlig, und die Bildung wird durch die allmähliche Verlängerung des Zapfens vervollständigt. Die vollkommne Verwachsung des Zapfens mit dem weichen Gaumen fällt in die Mitte oder gegen das Ende des vierten Embryomonates. Doch ist noch bis zu Ende des fünften der Zapfen verhältnißmäßig zu dem, was beim Erwachsenen vorkommt, oft gespalten, wenn gleich auf beiden Seiten mit den Seitenhälften des weichen Gaumens verbunden, so daß vielleicht diese Entwicklungsstufe nicht selten über die gewöhnliche



Zeit hinaus besteht, allein dessen ungeachtet auch so noch vor dem Ende des Fötuslebens vorübergeht.

### B. Regelwidriger Zustand.

#### §. 2047.

Der merkwürdigste regelwidrige Zustand der Mundhöhle ist das Beharren derselben auf der frühern unmittelbaren Verbindung mit der vordern Antlitzfläche und der Nasenhöhle, wenn sich die anfänglichen Spalten nicht verschließen, und welcher in der Oberlippe den Namen der Hasenscharte, im Gaumen den des Wolfsrachen erhält <sup>1)</sup>. Der geringste Grad des letztern ist Spalte oder Mangel des Zappfens. Diese regelwidrigen Zustände sind einfach oder doppelt; auch unter der ersten Bedingung aber fällt die Spalte sehr allgemein weder in der Lippe noch im Gaumen, mit Ausnahme des Zappfens, in die Mittellinie, sondern auf eine von beiden Seiten, indem die anfänglich in die vordere Fläche des Antlitzes übergehenden Spalten der Lippen diese Stellen einnehmen. Auf dieselbe Weise ist auch bei der einfachen Gaumenspalte gewöhnlich der vordere, oder Zwischenkiefertheil des Oberkiefers der einen Seite von dem hintern getrennt, und mit dem der andern Seite auf diese hinübergezogen. (S. Bd. 2. S. 137.) Nur selten wenigstens fällt die Gaumenspalte unter dieser Bedingung in die Mitte, indem die Zwischenkieferbeine mit ihrem Oberkieferbeine verwachsen, und diese nebst den

Gau

1) Sandifort de labio leporino congenito, duplici et complicato. Obs. anat. path. Lib. 4. C. 5.

Tenon sur quelques vices de la voûte palatale. In dessen Mém. et obs. sur l'anatomie etc. Paris 1816. p. 295 ff.

Gaumenbeinen von einander und der Nasenschleimhaut symmetrisch getrennt sind <sup>1)</sup>. Weshalb der Zäpfen in der Mittellinie gespalten ist, ergibt sich aus der Entwicklungsweise desselben.

Merkwürdig ist, daß auch diese sehr bedeutende Bildungsabweichung bisweilen noch spät in den regelmäßigen Zustand übergeht, indem der knöcherne Gaumen allmählich entweder von selbst oder nach Heilung der Lippenpalte nachwächst, und die Lücke zwischen Mund und Nasenhöhle sich verschließt, eine Thatsache, welche die oben (§. 2046.) geäußerte Vermuthung, daß auch noch nach der gewöhnlichen Periode die beiden Zäpfenhälften beim Fötus verwachsen, bestätigt.

In der Mundhöhle kommen die, allen Schleimhäuten gewöhnlichen Texturveränderungen vor. Eine seltene Erscheinung sind *Paare*, welche sich in einem Falle auf einer Wangenschwulst im Rachen eines neugeborenen Kindes fanden <sup>2)</sup>. Auch auf der Zunge will man sie gesehen haben <sup>3)</sup>.

## II. Theile der Mundhöhle insbesondere.

§. 2048.

Die einzelnen Gegenden der Mundhöhle sind 1) die Lippen; 2) die Wangen; 3) der Gaumen. Diese Theile und 4) die Zunge; 5) die Zähne und 6) die mit der Mundhöhle verbundenen Speicheldrüsen sind jetzt zu beschreiben.

A. Lippen

1) Tenon a. a. O. Obf. I.

2) Ford. Med. communic. Vol. I. No. 51.

3) Amat. Lusit. Cur. med. Cent. VI. c. 68.

## A. Lippen und Wangen.

## 1. Äußere Beschreibung.

## §. 2049.

Die Lippen sind Klappen, welche sich von der vordern Fläche des Zahnhöhlenrandes der Kiefern, mit ihnen parallel laufend, wegbegeben. An ihrem freien Rande sind sie immer mehr oder weniger angeschwollen und umgeworfen, die untere mehr als die obere. Sie sind mit ihren freien Rändern einander entgegengewandt. Die zwischen ihnen befindliche Querspalte ist der Mund. Die obere ist länger und springt weiter vor als die untere. Äußerlich verläuft in der Mitte der obern eine senkrechte Vertiefung (Philtrum) von der Nasenscheidewand an bis zu der Stelle, wo die Haut beträchtlich verdünnt, welche wegen der ehemals hier Statt findenden Lücke zwischen den beiden Seitenhälften merkwürdig. An der untern findet sich nichts ähnliches; eine insofern achtungswerthe Verschiedenheit, als 1) von einer Spalte der Unterlippe so gut als kein Beispiel vorhanden ist, und dieselbe mit der viel bedeutenderen Größe des obern Lippenwuchses, und der, während des ganzen Lebens bestehenden Verwachsung der beiden Oberkieferbeine zusammenzuhängen scheint. Die Vereinigungsstellen beider Lippen führen den Namen der Mundwinkel (Anguli oris).

Auf beiden Seiten gehen die Lippen unmerklich in die Wangen über. Beide Gegenden werden durch eine Hautschicht, eine Muskelschicht und eine Schleimschicht gebildet.

## 2. Muskeln der Lippen.

## §. 2050.

Folgende Muskeln bewirken die mannichfachen Veränderungen der Gestalt der Mundhöhle, und nehmen die Lippen, Wangen- und Kinngegend ein.

## a. Der Schließer des Mundes.

## §. 2051.

Der Schließer oder Ringmuskel des Mundes (Sphincter oris, *M. annularis, orbicularis oris*) bildet vorzüglich die Fleischlage der Lippen, befindet sich zwischen der Haut und der Schleimhaut, und umgibt den Mund. Er ist eiförmig, dünn, platt, breit, und besteht aus concentrischen Fasern. Die äußern gehen in die seiner Antagonisten unmerklich über, oder sind Fortsetzungen der Fasern dieser verschiedenen Muskeln, die sich vielfach unter einander verflechten. Doch sind diesen äußeren Fasern eigenthümliche untergemischt. Ganz für sich bestehen die innern Fasern, welche gegen den freien innern Rand des Muskels und der Lippen liegen, sich aber unmerklich in die äußern verlieren.

Der Mundschließer ist mit der äußern Haut weit fester als mit der Mundhaut verbunden. Er verengt und verschließt den Mund und bewirkt das Zuspitzen desselben.

## b. Der Backenmuskel.

## §. 2052.

Der Backenmuskel, Trompetermuskel (*M. buccinator*), liegt zwischen dem Ober- und Unterkiefer und dem Mundschließer. Er ist viereckig, breit, platt und dünn. Seine Fasern haben im Ganzen eine quere Richtung, doch verlaufen die

die obern etwas schief von oben und hinten nach innen und unten, die untern in entgegengesetzter Richtung, die mittlern gerade. Seine festen Punkte sind der Ober- und Unterkiefer. Er entspringt von der äußern Fläche des Zahnhöhlenrandes beider Knochen so, daß seine Befestigung hinter dem letzten Backzahn anfängt, und ungefähr bis zum zweiten vordern reicht. Außerdem entsteht er mit seinem hintersten Theile von der Spitze des Hebers des Flügelfortsatzes und einem Bande, welches von diesem zum untern Zahnhöhlenrande geht. Vorn geht er in den Mundschließer über. In der Nähe seines vordern Endes durchbohrt ihn der Stenionsche Gang.

Er zieht 1) die Lippen und den ganzen Mund in gerader Richtung rückwärts; 2) verengt er durch seine Thätigkeit die Mundhöhle, und bewegt daher in dieser enthaltene Substanzen fort, wirkt also beim Blasen, Pfeifen, Ausspitzen von Flüssigkeiten aus dem Munde, Saugen, dem Bilden des Bissens auf der Zunge, dem Schlingen.

§. 2053.

Folgende Muskeln, welche beim Oeffnen des Mundes wirken, kann man in die obern und untern Mundmuskeln (M. orales) eintheilen.

Die obern sind, von außen nach innen betrachtet:

a. d. Jochmuskeln oder Wangenmuskeln.

§. 2054.

Die Jochmuskeln oder Wangenmuskeln (M. zygomatici) sind ein größerer und ein kleinerer (M. zygomaticus major und minor), beides längliche, dünne Muskeln, der große mehr abgerundet als der kleine. Der große liegt weiter nach außen und hinten. Beide entstehen von der äußern

## i. Niederzieher des Mundwinkels.

§. 2059.

Der Niederzieher des Mundwinkels (*Depressor anguli oris*), ein dreieckiger, starker Muskel, entspringt von dem vordern Theile des untern Randes und der vordern Fläche des Unterkiefers, und steigt, schmaler, aber dicker werdend, zum Mundwinkel empor, wo er in den Mundschließer und den großen Jochmuskel, vorzüglich aber in den Heber der Oberlippe so übergeht, daß er mit ihm eigentlich nur einen in der Mitte stark eingeschnürten, aber durch keine Sehne unterbrochenen Muskel bildet.

Wirkt der untere Theil dieses, aus dem Heber und Niederzieher des Mundwinkels gebildeten, Muskels allein, so wird der Mundwinkel und die ganze Unterlippe nach unten gezogen, wie beim Weinen. Auch verlängert er den Mund in querrer Richtung durch seine äußeren Fasern. Wirkt der ganze Muskel, so kann er zum Aufheben des Unterkiefers beitragen.

## k. Niederzieher der Unterlippe.

§. 2060.

Der Niederzieher der Unterlippe oder viereckige Kinnmuskel (*M. depressor labii inferioris* L. *quadratus menti*) viereckig, dünn, in seinem untern Theile von dem vorigen, im obern etwas von dem untern Theile des großen Jochmuskels bedeckt, entspringt weiter nach vorn, wenig höher als er, steigt schräg nach innen zur Unterlippe in die Höhe, verbindet und kreuzt sich seinem innern Theile nach oben mit dem gleichnamigen, und verliert sich in den Mundschließer.

Er zieht die Unterlippe schief nach unten und biegt sie um.

Dieser

Dieser so wie der vorige Muskel fließen gewöhnlich mit dem obern Theile des breiten Halsmuskels ununterbrochen zusammen.

1. Aufheber des Kinnes.

§. 2061.

Der Aufheber des Kinnes (*M. levator menti*), ein kleiner, dicker, halbmondförmiger, unpaarer Muskel, der auf beiden Seiten von der vordern Fläche des Unterkiefers, unter der Zelle des Eckzahns entspringt, den dreieckigen Raum zwischen den beiden Niederziehern der Lippe einnimmt, und sich in die Haut des Kinnes einsenkt.

Er zieht die Unterlippe und die Haut des Kinnes in die Höhe.

B. Der Gaumen.

1. Allgemeine Beschreibung.

§. 2062.

Der Gaumen (*Palatum*) bildet das Dach der Mundhöhle und sondert sie von der Nasenhöhle ab. Er zerfällt in einen vordern und einen hintern Theil, den knöchernen und den weichen Gaumen. Der knöcherne Gaumen besteht aus dem horizontalen oder Gaumentheile des Oberkiefers und des Gaumenbeines und der darüber ausgebreiteten Schleimhaut, die hier eine weit dickere und mehr zusammenhängende Lage von Schleimdrüsen enthält als in den vorher betrachteten Gegenden.

§. 2063.

Der weiche Gaumen, oder das Gaumensegel (*Palatum molle* f. *velum palatinum*) bildet einen, vom Hin-

## i. Niederzieher des Mundwinkels.

§. 2059.

Der Niederzieher des Mundwinkels (*Depressor anguli oris*), ein dreieckiger, starker Muskel, entspringt von dem vordern Theile des untern Randes und der vordern Fläche des Unterkiefers, und steigt, schmaler, aber dicker werdend, zum Mundwinkel empor, wo er in den Mundschließer und den großen Zochmuskel, vorzüglich aber in den Heber der Oberlippe so übergeht, daß er mit ihm eigentlich nur einen in der Mitte stark eingeschnürten, aber durch keine Sehne unterbrochenen Muskel bildet.

Wirkt der untere Theil dieses, aus dem Heber und Niederzieher des Mundwinkels gebildeten, Muskels allein, so zieht der Mundwinkel und die ganze Unterlippe nach unten gezogen, wie beim Weinen. Auch verlängert er den Mund in querrer Richtung durch seine äußeren Fasern. Wirkt der ganze Muskel, so kann er zum Aufheben des Unterkiefers beitragen.

## k. Niederzieher der Unterlippe.

§. 2060.

Der Niederzieher der Unterlippe oder viereckige Kinnmuskel (*M. depressor labii inferioris* L. *quadratus menti*) viereckig, dünn, in seinem untern Theile von dem vorigen, im obern etwas von dem untern Theile des großen Zochmuskels bedeckt, entspringt weiter nach vorn, wenig höher als er, steigt schräg nach innen zur Unterlippe in die Höhe, verbindet und kreuzt sich seinem innern Theile nach oben mit dem gleichnamigen, und verliert sich in den Mundschließer.

Er zieht die Unterlippe schief nach unten und biegt sie um.

Dieser



Dieser so wie der vorige Muskel fließen gewöhnlich mit dem obern Theile des breiten Halsmuskels ununterbrochen zusammen.

1. Aufheber des Kinnes.

§. 2061.

Der Aufheber des Kinnes (*M. levator menti*), ein kleiner, dicker, halbmondförmiger, unpaarer Muskel, der auf beiden Seiten von der vordern Fläche des Unterkiefers, unter der Zelle des Eckzahns entspringt, den dreieckigen Raum zwischen den beiden Niedergiechern der Lippe einnimmt, und sich in die Haut des Kinnes einsetzt.

Er zieht die Unterlippe und die Haut des Kinnes in die Höhe.

B. Der Gaumen.

1. Allgemeine Beschreibung.

§. 2062.

Der Gaumen (*Palatum*) bildet das Dach der Mundhöhle und sondert sie von der Nasenhöhle ab. Er zerfällt in einen vordern und einen hintern Theil, den knöchernen und den weichen Gaumen. Der knöcherne Gaumen besteht aus dem horizontalen oder Gaumentheile des Oberkiefers und des Gaumenbeines und der darüber ausgebreiteten Schleimhaut, die hier eine weit dickere und mehr zusammenhängende Lage von Schleimdrüsen enthält als in den vorher betrachteten Gegenden.

§. 2063.

Der weiche Gaumen, oder das Gaumensegel (*Palatum molle* s. *velum palatinum*) bildet einen, vom Kinn

## C. Die Zunge.

## A. Regelmäßiger Zustand.

§. 2072.

Die Zunge ist vorzüglichstes Organ des Schmeckens, zugleich aber auch der Sprache und des Schlindens.

Man kann sie als den untern, sehr stark entwickelten Theil des Umfangs der Mundhöhle, mithin des Speisefanals, ansehen, der, eben dieser starken Entwicklung wegen, einen Vorsprung in die übrige Höhle bildet.

Sie ist länglichviereckig, überall von abgerundeten Kanten umgeben, und wird von hinten nach vorn allmählich dünner.

Der hintere Theil ist die Wurzel, der vordere die Spitze der Zunge. Sie überragt nach den Seiten und vorn ihre Grundfläche bedeutend, ist also in diesem größten Theile ihres Umfangs frei. Ihre Bedeckungen gehen ununterbrochen in die Mundhaut über. Unter der Spitze legt sich diese zu einer Zungenfalte von festem Gewebe zusammen, welche sich an die Mitte der innern Fläche des Unterkiefers heftet, und dadurch

de

1) M. Malpighi de lingua. Bonon. 1665. 12.

C. Fracassati de lingua cum antec.

L. Bellini gustus organon novissime detectum. Bonon. 1665. 16.

L. Heister de lingua sana et aegrot. Altorf. 1716. 4.

A. F. Walther de lingua humana. Lips. 1724. 4.

J. Reverhorst de fabrica et usu linguae. L. B. 1739.

Royen de fabrica et usu linguae. L. B. 1742.

J. A. Rinder de linguae involucris. Argent. 1778. 4.

Zunge, hier genauer befestigt, dem Zungenbändchen *renulum linguae*).

Sie besteht vorzüglich aus Muskeln, wodurch sie Organ der Sprache und des Schluckens, und aus, diese bekleidenden, häutigen Schichten, wodurch sie Geschmacksorgan wird.

Ihre Grundlage wird hinten durch das Zungenbein bildet.

### 1. Muskeln der Zunge 1).

#### §. 2073.

Die Muskeln der Zunge zerfallen in die Muskeln des Zungenbeins und die eigenthümlichen Muskeln der Zunge.

#### a. Muskeln des Zungenbeins.

##### α. Querer Unterkiefermuskel.

#### §. 2074.

Der quere Unterkiefermuskel oder Kiefern Zungenbeinmuskel (*M. transversus mandibulae* s. *myoideus*) füllt den bei weitem größten vordern Theil des Raumes zwischen den beiden Hälften des Unterkiefers, namentlich den beiden Hälften des horizontalen Theiles, und dem Rande des Zungenbeines an, und ist in seinem mittlern Theile an dem vordern Bauche des zweibäuchigen Unterkiefermuskels deckt, in seinem größern, äußern, frei.

Er ist ein dünner, dreieckiger Muskel, der mit dem geraden, äußern Rande von einer rauhen Linie entspringt, die an der innern Fläche des horizontalen Theiles des Unterkiefers,

von

1) *Isenflamm de motu linguae. Erlang. 1798.*

von vorn und innen, nach oben und außen verläuft, wird von vorn nach hinten beträchtlich breiter, und geht, vorn aus queren, hinten aus von vorn und außen, nach hinten und innen verlaufenden, mit denen des gleichnamigen Muskels der andern Seite convergirenden Fasern gebildet, diesem entgegen, steigt auf diesem Wege von oben und außen nach innen und unten herab, fließt mit ihm in der Mittellinie zusammen, daß beide nur durch einen schmalen sehnigen Streif, der durch die Mitte des dadurch entstehenden einfachen Muskels von vorn nach hinten verläuft, getrennt werden, und heftet sich durch den innern Theil seines hintern Randes an den untern Theil der vordern Fläche des mittlern Zungenbeines.

Er unterstützt die über ihm liegenden Muskeln der Zunge, die Unterzungendrüse, drückt den Whartonschen Gang und die Ausführungsgänge der Zungendrüse, hebt diese Theile und das Zungenbein in die Höhe.

#### β. Kinnzungenbeinmuskel.

§. 2075.

Der Kinnzungenbeinmuskel (*M. geniohyoides*) liegt dicht über dem mittlern Theile der vorigen, neben dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite, und ist ein sehr länglichdreieckiger Muskel, welcher von dem obern Theile der vordern Fläche des Körpers des Zungenbeines entspringt, und von hinten und unten nach vorn und oben verläuft, wo er sich, allmählich dünner und rundlicher werdend, dicht über dem vorigen, an den untern Theil der innern Kinnleiste heftet. Seine vordere und hintere Anheftung geschieht durch kurze Sehnenfasern.

Er zieht das Zungenbein nach oben und vorn, und, wenn dieses durch seine Niederzieher befestigt ist, den Unterkiefer nach hinten und unten, wirkt also gemeinschaftlich mit dem zweibäuchigen Unterkiefermuskel.

Er fehlt bisweilen, oder, richtiger, ist nicht vollkommen ausgebildet, und wird durch einen kleinern Muskel ersetzt, der von der Mittelsehne des vorigen entspringt, und sich an den zweibäuchigen Unterkiefermuskel heftet <sup>1)</sup>.

#### 7. Griffelzungenbeinmuskel.

§. 2076.

Der Griffelzungenbeinmuskel, Aufwärtsglieder, Heber des Zungenbeins (*M. stylohyoideus* s. *levator ossis hyoidei*), ein dünner, länglich-rundlicher Muskel, entspringt mit einer kurzen Sehne ungefähr von der Mitte der äußern Fläche des Griffelfortsatzes, wendet sich nach vorn, unten und innen, ist gegen sein unteres Ende zum Durchtritt der Sehne des zweibäuchigen Unterkiefermuskels gespalten, dann wieder vereinigt, und heftet sich an die vordere Hälfte des äußern Randes des großen untern Zungenbeines, dem Schild- und Zungenbeinmuskel gegenüber.

Zieht das Zungenbein nach oben und hinten.

Er ist nicht selten doppelt, indem sich ein kleinerer Nebemuskel findet.

#### 8. Niederzieher des Zungenbeines.

§. 2077.

Der Niederzieher des Zungenbeines, Brust- und Zungenbeinmuskel (*M. depressor ossis hyoidei*).

1. ster.

1) Duille var. musc. Landsh. 1815. p. 5.

Meckel's Anat. 4. Bb.

f. sterno-hyoideus), ein länglicher, dünner Muskel, kommt von der innern Fläche des ersten Brustbeins, des ersten Rippenknorpels, bisweilen auch des innern Schlüsselbeinendes, steigt, schmaler und dicker werdend, und sich dem gleichnamigen nähernd, gerade auf, und heftet sich an den untern Rand des mittlern Zungenbeins, dicht neben der Mittellinie.

Er zieht das Zungenbein, und damit, wegen der Verbindung desselben mit dem Unterkiefer, wenn dieser nicht durch seine Aufhebemuskeln befestigt ist, auch diesen nach unten, wirkt also beim Oeffnen des Mundes.

Bisweilen geht er unten in den Niederzieher des Schlüsselknorpels über <sup>1)</sup>, oder entspringt von der Mitte des Schlüsselbeins <sup>2)</sup>.

#### e. Rückwärtszieher des Zungenbeines.

§. 2078.

Der Rückwärtszieher des Zungenbeins, Schulterzungenbeinmuskel (Retractor ossis hyoidis, Omohyoideus, Coracohyoideus), ein sehr länglicher, dünner, zweibäuchiger Muskel, entspringt mit seinem untern Bauche vom obern Rande des Schulterblattes, neben dem Einschnitt, bisweilen auch zugleich von dem kleinen eignen Bande über demselben, wendet sich nach oben und vorn, geht zwischen dem Kopfnicker und dem vordern Rippenhalter in die mittlere Sehne über, von welcher der zweite, obere Bauch entspringt, der sich nach außen von dem vorigen an das mittlere Zungenbein heftet, und mit dem Griffelzungenbeinmuskel mehr oder weniger verbindet.

Er

1) Albin hist. musc. p. 202.

2) Felsch Beitr. zur path. Anat. Berlin 1813. S. 32.

Er zieht das Zungenbein nach unten, hinten, und etwas zur Seite.

Dieser Muskel bietet besonders häufige Abweichungen dar. Den seltenen gänzlichen Mangel desselben beobachtete ich einmal, ohne Ersatz, auf der linken Seite. Häufigern Verschiedenheiten ist der Ursprung unterworfen. Bisweilen ist der untere Bauch breiter, so daß er bis zum obern Winkel des Schulterblattes reicht <sup>1)</sup>, in andern Fällen entspringt er vom Schlüsselbein <sup>2)</sup>, wo er dann um so viel kürzer ist. Bisweilen ist der untere Bauch in zwei Köpfe gespalten, wozu das Breiterwerden eine Annäherung bildet <sup>3)</sup>. Einer dieser Köpfe heftet sich dann bisweilen an das Schlüsselbein <sup>4)</sup>. Bisweilen vereinigt er sich mit dem Niederrzieher des Schildknorpels, entweder bloß durch seinen obern Bauch, oder einen eignen Kopf <sup>5)</sup>. Seltner setzt er sich nicht an das Zungenbein, sondern den Ausfortsatz des sechsten <sup>6)</sup>, oder zweiten <sup>7)</sup> Halswirbels.

#### b. Eigentliche Muskeln der Zunge.

##### a. Vorwärtszieher der Zunge.

§. 2079.

Der Vorwärtszieher der Zunge, Kinnzungenmuskel (M. expulso, Attrahens linguae, genioglossus),

M 2

der

1) Albin hist. musc. p. 200.

2) Albinus ebendaf. p. 201.

3) Duille de nonnull. musc. variet. Landsh. 1813. p. 11.

4) Kelch a. a. D. S. 31. Sels de musc. variet. Berol. 1815. p. 6.

5) Sels ebendaf. p. 5.

6) Kelch a. a. D. S. 32.

7) Sels ebendaf. p. 4. 5.

der bedeutend größte Zungenmuskel, entspringt fehnig, dicht über dem Kinnzungenmuskel, vom Unterkiefer, begiebt sich, den gleichnamigen immer berührend, indem er neben der Mittellinie verläuft, nach hinten, breitet sich beträchtlich fächerförmig aus, und bildet den größten, innern Theil der Zunge ihrer ganzen Länge nach, wendet sich aber durch äußere Fasern über die folgenden weg nach außen, scheidet mehrere Fasern an den obern Theil des Schlundkopfes, eine geringere Zahl an das obere seitliche Zungenbein und den Kehldeckel.

Er zieht die Zunge, das Zungenbein und den Schlundkopf nach vorn.

#### β. Niederzieher der Zunge.

§. 2080.

Der Niederzieher der Zunge, Zungen- Zungenbeinmuskel (M. Depressor linguae f. hyoglossus, Basio - Cerato - Chondroglossus), ein dünner, länglichviereckiger Muskel, steigt vom äußern Theile des mittlern, dem äußern Rande des großen, und der Spitze des kleinen seitlichen Zungenbeines nach oben an die Seite der Zunge, und breitet sich von vorn nach hinten aus, indem er in ihre Bildung eingeht.

Zieht die Zunge nach unten.

#### γ. Rückwärtszieher der Zunge.

§. 2081.

Der Rückwärtszieher der Zunge, Griffel- Zungenmuskel (M. Retractor linguae f. styloglossus), der kürzeste der kleinen, am Zungenbein entspringenden Muskeln, kommt dicht hinter der Spitze und von dem obern Theile des Umfangs des Griffelfortsatzes, und tritt an die Seite der Zunge.



entwurzelt, breitet sich von hier aus fächerförmig bis zur Spitze derselben aus, und verwebt sich mehr oder weniger mit dem Zungenbein: Zungenmuskel und Kinnzungenmuskel.

Er zieht die Zunge schief nach seiner Seite zurück, hebt sie, und breitet sie, mit dem der andern Seite gemeinschaftlich wirkend, aus.

Ich fand ihn etwamat auf beiden Seiten doppelt.

### 1. Eigener Zungenmuskel.

§. 2082.

Der eigene Zungenmuskel (*M. lingualis*), ein dünner, schmaler Muskel, der von vorn nach hinten seiner Länge nach verläuft, und sich vorzüglich mit dem Vorwärts- und Niederzieher verwebt.

Er verkürzt die Zunge und zieht ihre Spitze zurück.

### 2. Hüllen der Zunge \*).

§. 2083.

Die Schleimhaut, welche die Muskeln der Zunge bedeckt, zeichnet sich durch sehr starke Entwicklung des Warzengebirges und deutliche Trennbarkeit der Oberhaut von diesem aus.

Die Lederhaut ist mit der Muskelsubstanz genauer verbunden, als diese Schicht der Haut an irgend einer andern Stelle mit den darunter liegenden Theilen zusammenhängt.

An der obern Fläche ist sie beträchtlich uneben. Die hier befindlichen Ungleichheiten sind:

M. 3

L. 3a1

1) J. A. Rinder de linguae involucris. Argentor. 1778. 4.

1. **Falten.** Diese finden sich vorzüglich am hintern Theile und an den Seitenrändern der Zunge. Sie stehen hier meistens regelmäßig, so daß sie von außen und vorn nach innen und hinten convergiren, dicht neben einander, und haben die Höhe und Breite von ungefähr einer halben Linie. Die vordern sind in querer Richtung vielfach eingeschnitten, die hintern glatt, jene haben daher eine weit größere Oberfläche. Die am vordersten Theile der Zunge weniger beständig vorkommenden sind weniger regelmäßig. Oft verläuft eine mehr oder weniger deutliche Längenvorwölbung durch die Mitte des Zungenrückens.

2) **Warzen<sup>1)</sup>.** Diese bedecken dicht gedrängt fast den ganzen Rücken der Zunge, und sind nur an der Wurzel einzeln gestellt, dagegen hier größer.

Ihre Gestalt ist sehr verschieden, und sie zerfallen daher in mehrere Klassen.

Die meisten sind klein, dünn, dreieckig, stumpf oder scharf zugespitzt, und vorzüglich in der Mitte, vorn und an den Seitenrändern stark entwickelt.

Dies sind die fadenförmigen Warzen (*Papillae filiformes*).

Andre, weit ansehnlichere, mehr einzeln stehende, in viel geringerer Anzahl und auch nicht überall vorhandne, an ihrem freien Ende zu einem rundlichen Kopfe angeschwollne, sind die keul- oder schwammförmigen (*P. clavatae* s. *fungiformes*). Hier ist indessen zu bemerken, daß ihre Stelle häufig durch

1) Albinus de diversitate papillarum linguae humanae. In Annot. acad. Lib. I. C. XIV.

Sömmerring a. a. O. Taf. 1. Fig. 1 — 3.

durch bloß längere und größere, einzeln stehende fadenförmige Warzen vertreten wird.

Die schwammförmigen Warzen machen den Uebergang zu den größten Warzen, welche sich an der Zungenwurzel befinden, und, sehr bedeutend an Zahl und Größe verschieden, in Gestalt eines mit der Spitze nach hinten gerichteten V zusammengefaßt sind. Sie haben meistens, indessen auch nicht immer, eine keulförmige Gestalt, so daß sie von ihrer Grundfläche bis zu ihrem freien Ende beträchtlich anschwellen, und befinden sich in einer, durch einen aufgeworfenen Wulst in die Oberfläch der Zunge übergehenden Vertiefung.

Daher heißen sie zapfenförmige, abgestuzte, kopfförmige, eingezäumte Warzen (*P. truncatae, capitatae, circumvallatae*). Ihre Zahl variiert von drei bis zwanzig.

Meistentheils befindet sich in einer jeden Vertiefung nur eine, doch bisweilen auch drei, selbst vier, unbeschadet der Zahl und Größe derselben.

Sie stehen durchaus nicht symmetrisch, doch befindet sich eine unter ihnen gewöhnlich ziemlich genau in der Mitte, und bildet die Spitze des V.

Diese liegt in der beträchtlichsten Vertiefung, die den Rachen des blinden Loches der Zunge (*Foramen coecum*) führt, außer welcher bisweilen noch eine andre, hinter ihr liegende, keine Warze enthaltende an dieser Stelle vorhanden ist.

In diesem blinden Loch glaubte man verschiedentlich, jedoch irrig, den Ausführungsgang von Speicheldrüsen, oder der Schilddrüse <sup>1)</sup> gefunden zu haben.

W 4

§. 2084.

1) Coschwitz de ductu saliv. novo. Hal. 1724. 29.

Widerlegt von Duvernoy. de ductu salivali Coschw. Tub. 1725. 4. und Haller exp. et dub. circa duct. Coschw. L. B. 1727. Rec. in Opp. min. T. 1.

## §. 2084.

Die Zungenwärtchen erscheinen, mit nacktem Auge, und, wenn die Blutgefäße nicht angefüllt sind, häufig auch unterm Vergrößerungsglase betrachtet, überall glatt und einfach, unter der letztern Bedingung aber an der äußern Fläche durch eine Menge kleiner Hervorragungen ungleich, und aus mehreren an einander liegenden Bündeln oder Fäden zusammengesetzt. Vorzüglich ist in den vordern und größern dieser Warzen deutlicher entwickelt, als in den hintern und kleinern.

Jeder dieser Fäden enthält wenigstens ein Gefäß, und durch eine glückliche Einspritzung wird die ganze Oberfläche der Zunge geröthet. Diese Gefäße bilden an der Oberfläche der Wärtchen mannichfaltig verschlungne Netze und Bögen, indem sie unter einander vielfach zusammenhängen, und am freien Ende sich gegen sich umschlagen.

Außerdem besteht er aus einer weißlichen, weichen Substanz, welche wahrscheinlich Nervenmasse enthält.

Wenigstens kann man in die hintern Zungenwarzen deutlich Fäden aus dem Zungenschlundnerven und in die übrigen aus dem Zungenaste vom dreigetheilten verfolgen.

Die Anordnung der Gefäße erscheint in den vordern Zungenwärtchen deutlicher als in den hintern, indem in diesen sich eine verhältnißmäßig größere Menge von Schleimgewebe findet <sup>1)</sup>.

## §. 2085.

1) Albinus de fabrica papillarum linguae humanae in Annot. acad. L. II. c. XV. Tab. I.

Hewson exp. inguir. Vol. II. p. 186.

Sömmering a. a. O. Taf. I. Fig. 5—9.

durch bloß längere und größere, einzeln stehende fadenförmige Warzen vertreten wird.

Die schwammförmigen Warzen machen den Uebergang zu den größten Warzen, welche sich an der Zungenwurzel befinden, und, sehr bedeutend an Zahl und Größe verschieden, in Gestalt eines mit der Spitze nach hinten gerichteten V zusammengehusst sind. Sie haben meistens, indessen auch nicht immer, eine keulförmige Gestalt, so daß sie von ihrer Grundfläche bis zu ihrem freien Ende beträchtlich anschwellen, und befinden sich in einer, durch einen aufgeworfenen Wulst in die Oberfläche der Zunge übergehenden Vertiefung.

Daher heißen sie zapfenförmige, abgestutzte, kopfförmige, eingezäunte Warzen (*P. truncatae, capitatae, cuneovallatae*). Ihre Zahl variiert von drei bis zwanzig.

Meistentheils befindet sich in einer jeden Vertiefung nur eine, doch bisweilen auch drei, selbst vier, unbeschadet der Zahl und Größe derselben.

Sie stehen durchaus nicht symmetrisch, doch befindet sich eine unter ihnen gewöhnlich ziemlich genau in der Mitte, und bildet die Spitze des V.

Diese liegt in der beträchtlichsten Vertiefung, die den Namen des blinden Loches der Zunge (*Foramen coecum*) führt, außer welcher bisweilen noch eine andre, hinter ihr liegende, keine Warze enthaltende an dieser Stelle vorhanden ist.

In diesem blinden Loch glaubte man verschiedentlich, jedoch irrig, den Ausführungsgang von Speicheldrüsen, oder der Schilddrüse <sup>1)</sup> gefunden zu haben.

W 4

§. 2084.

1) Coschwitz de ductu saliv. novo. Hal. 1724. 29.

Widerlegt von Duvernoy. de ductu salivali Coschw. Tub. 1725. 4. und Haller exp. et dub. circa duct. Coschw. L. B. 1727. Rec. in Opp. min. T. 1.

derselben können daher, ohne daß allgemeine Nervenzusfälle entstehen, gequetscht, abgehunden werden.<sup>1)</sup>

§. 2088.

Die Zunge ist Hauptorgan des Geschmacks, zugleich beim Sprechen und den ersten Veränderungen, welche die Speisen in der Mundhöhle erleiden, thätig.

Geschmacksorgan ist sie vorzüglich durch ihre Spitze, dann die Ränder, endlich die Grundfläche, wenig oder gar nicht durch den mittlern Theil. Doch ist sie nicht alleiniges Geschmacksorgan, indem auch der weiche Gaumen, vorzüglich für bittere Geschmäcke, empfänglich ist, weshalb auch der Geschmack nicht nothwendig mit der Zunge ganz verloren geht.

Organ der Sprache ist sie vorzüglich, sofern mehrere Mitlaute, die deshalb den Namen der Zungenbuchstaben führen, ganz oder wenigstens deutlicher durch ihre Bewegungen nach verschiedenen Richtungen gebildet werden.

Zur Veränderung der Speise trägt die Zunge gleichfalls durch ihre Bewegungen bei, sofern dadurch theils die in den Mund gekommenen Substanzen nach allen Richtungen gewälzt, und vollständiger eingespeichelt werden, theils das Herabgleiten aus der Mundhöhle unterstützt wird.

Hievon, so wie vom Schlucken überhaupt umständlicher bei der Beschreibung des Schlundkopfes.

§. 2089.

Die Zunge bietet keine bedeutenden Entwicklungsverschiedenheiten dar. Sie ist anfänglich verhältnißmäßig größer als bei

1) E. Home observ. on the structure of the Tongue; illustrated by Cases in which a Portion of that Organ had been removed by Ligature. Phil. Tr. 1805. p. 205 — 214.

bei vollkommener Ausbildung, zugleich breiter, und in einer verhältnißmäßig geringern Strecke ihres Umfangs an den Wänden der Mundhöhle geheftet, was einigermaßen an die Anheftung der Batrachierzunge erinnert.

### B. Abweichender Zustand <sup>1)</sup>.

#### §. 2090.

Die Zunge fehlt bisweilen, entweder als Fehler der Bildung oder in Folge einer durch Geschwüre bewirkten Zerstörung. Nicht ganz selten ist das Bändchen zu fest, zu kurz oder zu lang. Sehr selten ist sie an ihrer Spitze gespalten.

Selten fehlen die großen Zungenwarzen fast ganz und werden bloß durch eine warzenlose Hautfalte ersetzt <sup>2)</sup>.

Dem Mangel entgegengesetzt ist das Doppelwerden derselben, wo die eine Zunge immer über der andern, mit ihr in einer größern oder geringern Strecke verbunden liegt.

Ansehnliche Größe der Zunge entsteht häufiger im Laufe des Lebens, besonders durch Uebertragung von Krankheiten, seltner als ursprünglicher Bildungsfehler.

Unter beiden Bedingungen kann sie ohne Schaden zum Theil erstirpt werden. Diese Abweichung scheint besonders dem weiblichen Geschlecht eigen.

Die Rückwärtsbeugung der Zunge, welche, sofern dadurch der Eingang in den Kehlkopf verschlossen wird, Erstickung hervorbringt, kann sowohl durch zu große Länge, als Durchschneidung des Zungenbändchens veranlaßt werden.

Leg-

1) Louis Mém. physiologique et pathologique sur la langue. Mém. de Chirurgie. T. V. p. 486 — 520.

Breidenstein de morbis linguae. Erlang. 1791.

2) Reich Beitr. zur path. Anat. S. 74.

Texturveränderungen der Zunge sind besonders **Schmerz** und **Krebs**.

## D. Munddrüsen.

### A. Regelmäßiger Zustand.

§. 2091.

Die Munddrüsen (*Glandulae orales*) zerfallen in die **Schleimdrüsen** und die **Speicheldrüsen**.

#### 1. Schleimdrüsen.

§. 2092.

Die Schleimdrüsen zerfallen in die **vorderen** und **hintern**. Die **vorderen** stehen mehr einzeln, sind kleiner, haben nur zwei Linien in ihrem längsten Durchmesser, liegen vorzüglich an den Lippen, in der Wangengegend, und den obern hintern Backzähnen gegenüber, zwischen der Mundhaut und den sie umgebenden Muskeln, und werden nach ihrer Lage in **Lippendrüsen**, **Wangendrüsen** und **Backzähendrüsen** (*Gl. labiales, buccales et molares*) eingetheilt. Die **hintern** sind nicht selten zu einer Masse zusammengedrängt, deren Ausführungsgänge sie zu einem verbinden.

Zu ihnen sind die **Gaumendrüsen** und die **Mandeln** (*Gl. palatinae et tonsillae linguales*). Die **Gaumendrüsen** bilden eine zusammenhängende Schicht, welche in der Dicke von 1 — 2 Linien den ganzen Gaumenharten und weichen Gaumen, dessen besonders an seiner hintern Fläche, befindet.

Die **Mandeln** sind **knäuelartige**, ungefähr 6 Linien hoch, und halb so breite und dicke Körper, welche in dem weichen



weichen Gaumen neben dem Zäpfen, zwischen dem vordern und hintern Vogen liegen, und sich mit mehreren weiten Oeffnungen an der vordern Fläche desselben in die Mundhöhle öffnen.

2. Mundspeicheldrüsen <sup>1)</sup>.

§. 2093.

Im Umfange der Mundhöhle und zunächst des Unterkiefers befinden sich die drei Mundspeicheldrüsen (*Glandulae salivales orales*), welche in die Klasse der zusammengehäuften Drüsen gehören, die Ohrspeicheldrüse (*Glandula parotis*), die Unterkieferdrüse (*Gl. submaxillaris*) und die Zungendrüse (*Gl. lingualis* s. *sublingualis*). Alle sondern eine eigenthümlich gemischte Feuchtigkeit, den Speichel (*Saliva*) ab, der eine der wässrigsten Flüssigkeiten ist, einen eignen, weder durch Kochen, noch Gerbestoff, noch übersaures essigsaures Blei gerinnbaren Speichelstoff, außerdem eine weiße schleimige Substanz und die gewöhnlichen Salze des Blutwassers enthält, und sich durch seine große Verwandtschaft zum Sauerstoff auszeichnet <sup>2)</sup>.

Diese

1) Nic. Stenonis de glandulis oris et nuper observatis inde prodeuntibus vasis. L. B. 1661. 4. rec. ibid. in Observat. Anatomic. etc. 1672. mit Ausnahme der Unterkieferdrüse, weil diese schon Wharton beschrieben hatte.

A. Nuok Sialographia ductuum aquosorum Anatome nova. L. B. 1690.

J. B. Siebold historia systematis salivales physiologie et pathologicae considerati. Jenae. 1797. 4.

2) Berzelius Uebers. der Fortschritte der thier. Chemie. Nürnberg. 1815. C. 47.

Diese Drüsen kommen mit einander, außer den allgemeinen Merkmalen der Ordnung, zu welchen sie gehören, vorzüglich durch folgende Merkmale überein. Sie haben

1) eine rundliche Gestalt;

2) eine röthliche Farbe;

3) sie besitzen, außer einem verdichteten Zellgewebe, keine eigne häutige Hülle, und sind locker an die benachbarten Theile geheftet;

4) sie liegen so, daß sie der mechanischen Einwirkung von Muskeln, zum Theil auch des durch diese bewegten Unterflusses, ausgesetzt sind.

5) Höchst wahrscheinlich bietet auch der von den verschiedenen Drüsen abgesonderte Speichel dieselben Eigenschaften dar.

Dieser allgemeinen Uebereinkunftspunkte ungeachtet, unterscheiden sich die Speicheldrüsen in Hinsicht auf äußere Form, Größe, inneres Gewebe, Lage, Farbe, so bedeutend, daß eine eigne Beschreibung derselben erforderlich ist.

#### a. Ohrspeicheldrüse.

##### §. 2094.

Die Ohrspeicheldrüse (Parotis) ist unter allen Mundspeicheldrüsen die bei weitem größte, und wiegt beim Erwachsenen gewöhnlich 4 bis 5 Drachmen.

Ihre Gestalt ist unregelmäßig viereckig. Sie ist gewöhnlich etwas mehr hoch als breit, von innen nach außen am niedrigsten, doch beträchtlich mehr hoch und breit als dick. In ihrer untern Hälfte ist sie beträchtlich dicker und breiter als in der obern.

Sie liegt, unmittelbar unter der Haut, vor der untern Hälfte des äußern Ohres, in der Lücke, welche sich zwischen dem

im Gehörgange, dem Zigenfortsatz des Schlafbeines nach unten, zwischen dem aufsteigenden Ast des Unterkiefers nach unten befindet.

Mit ihrem obern Ende, welches den kleinsten, obern Rand bildet, ragt sie bis zum hintern Ende des Jochbogens, und deckt den Kopf des aufsteigenden Astes des Unterkiefers. Ihre kleinere, vordere Hälfte liegt in ihrer ganzen Höhe auf dem vordern Theile des aufsteigenden Unterkiefers und des äußern Kiefermuskels, der hintere größere füllt die oben angegebene Lücke aus, und bedeckt den Gelenktheil und den Griffelfortsatz des Schlafbeines, die äußern Theile der beiden Flügelmuskeln, und den obern Theil der vom Griffelfortsatz absteigenden Muskeln. Hinten wird sie durch einen ziemlich geraden, etwas nach unten gewölbten Rand geendigt. Ihr unteres Ende reicht unter den Winkel des Unterkiefers herab, und berührt den hintern Theil der Unterkieferdrüse und die mittlere Sehne des zweibäuchigen Unterkiefermuskels.

Der untere, schief aufsteigende, gerade Rand bedeckt den vordern Bauch des zweibäuchigen Unterkiefermuskels, den hinten, zwischen ihm und dem hintern Rande liegenden Winkel, wöhnlich auch einen kleinen Theil des obern Endes des Kopfes.

Der hintere ausgehöhlte Rand legt sich um den untern Theil des Umfangs des knorpligen Gehörganges.

Sie besteht aus rundlichen, kleinen, sehr deutlich voneinander abgesonderten Körnchen.

Ungefähr am obern Ende des mittlern Dritttheils ihres vordern Randes, tritt der, verhältnismäßig zu seiner Weite häutige Ausführungsgang, der Stenonsche Gang, (Ductus

(Ductus Stenonianus) \*) aus ihr, und verläuft unmittelbar unter der Haut, gewöhnlich drei bis fünf Linien unter dem untern Rande des Jochbogens in Begleitung der queren Antlappulsader und einiger Aeste des Antlignerven, dicht auf dem äußern Kaumuskel von hinten und außen nach vorn und innen, schlägt sich über den vordern Rand des äußern Kaumuskels weg, tritt zwischen die Fasern des Trompetermuskels, und öffnet sich, dem ersten hintern Backzahne des Oberkiefers gegenüber, an der Seitenwand der Mundhöhle, also vor der Zahnreihe, durch eine bloße Mündung, ohne warzenartige Hervorragung, in die Mundhöhle.

Nicht selten findet sich eine Nebenhörspeicheldrüse (Glandula parotis accessoria), welche mehr oder weniger weit vor der normalen auf dem Jochbeine und dem Jochbogen liegt, nie mit der Hauptohrspeicheldrüse zusammenhängt, sondern selbst wieder in zwei Lappen zerfällt, und sich durch einen kleinen Gang in den Ausführungsgang derselben öffnet.

St

- \*) Ungeachtet der Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse allemal diesen Namen führt, ist es doch ungewiß, ob wirklich Stenson, und nicht Needham oder G. Blasius ihn entdeckt habe.

Nic. Stenonis disp. inaug. de glandulis oris et nuper observatis inde prodeuntibus valis. Leidae. 1561. 4.

Ejusdem observat. anatom. quibus varia oris, oculorum et narium vasa describuntur, novique salivae lacrumarumque et muci fontes deteguntur et novum Billii commentum rejiciunt. Ibid. 1662. 12. rec. in Mangeti Bibl. anat.

Needham de formato foetu. Lond. 1667. 8. prael.

G. Blasius Miscell. anat. hom. brutorumque fabricam diversam exhibentia Amstel. 1673. 8. auch bei Thomas Barthol. Hist. anat. Cent. III. 45.

Sie scheint mit der Augenhöhlendrüse mehrerer Säugthiere verglichen werden zu können.

b. Unterkieferdrüse 1).

§. 2095.

Die Unterkieferdrüse (*Glandula maxillaris* f. *submaxillaris*) ist bedeutend, wenigstens um die Hälfte, kleiner als Speicheldrüse, rundlich dreieckig, unten dicker als oben, und liegt in der Gegend des Unterkieferwinkels, zwischen seiner innern Fläche und dem Körper des Zungenbeines.

: Nach außen berührt sie den untern Theil der innern Fläche des innern Flügelmuskels, nach vorn schiebt sie einen kleinen Knopf über den hintern Rand und den hintern Theil der untern Fläche des queren Unterkiefermuskels, nach innen berührt sie das hintere Ende des vordern Bauches des zweibäuchigen Unterkiefermuskels, nach hinten den Griffelzungenmuskel.

: Ungeachtet diese Drüse bedeutend kleiner als die vorige, so besteht sie doch aus weit größern Lappen.

Aus ihrem vordern Ende entsteht der Ausführungsgang, oder der Whartonsche Gang, (*Ductus Whartonianus*), der im Verhältniß zu seinem Durchmesser sehr anhäutig, und im Verhältniß zur Drüse weiter als der Whartonsche ist. Er wendet sich schief von außen und unten nach innen und oben, verläuft über dem queren Unterkiefermuskel, unter und nach innen von der Unterkieferdrüse, nach

1) C. Wharton *Adenographia*. C. 21.

J. van Horne de ductibus salivalibus *disputationes* III. 1656.  
1658. Rec. in Halleri coll. *disputat.* T. II.

Meckel's Anat. 4. Th.

nach außen vom obern Rande des Zungenbein: Zungenmuskels, und endigt sich durch eine kleine vorspringende Warze neben der Wurzel des Zungenbändchens, also hinter der untern Zahnreihe.

Weiter nach innen setzt sich gewöhnlich die Substanz der Drüse als ein einige Linien dicker Streif ungefähr in derselben Richtung, allein weniger aufsteigend, fort, geht in den innern Theil des hintern Endes der Zungendrüse über, und öffnet sich bisweilen gemeinschaftlich mit einem, aus dieser tretenden Ausführungsgange, neben dem Whartonschen Gange. Dieser gemeinschaftliche Gang erhält den Namen des Bartholinischen (Ductus Bartholinianus) <sup>1)</sup>.

#### c. Die Zungendrüse <sup>2)</sup>.

§. 2096.

Die Zungendrüse, Unterzungendrüse (Glandula lingualis s. sublingualis) liegt dicht vor der vorigen, so daß ihr hinteres Ende das vordere derselben berührt, auf beiden Seiten in der ganzen Länge der Zunge, dicht unter der Mundhaut, so daß sie durch dieselbe sowohl gefühlt, als in einem ungleichen höckerigen Vorsprunge, welchen sie bilden, durch das Gesicht erkannt werden kann, zwischen dieser, dem queren Kiefermuskel, dem Kinnzungenmuskel, dem Kinnzungenbeinmuskel und dem Zungenbein: Zungenmuskel, hat eine sehr

1) Wurde von E. Bartholini bei einer Lebin entdeckt. E. C. Bartholini de ductu salivali hactenus non descripto observatio. L. B. 1684. 4.

2) A. F. Walther de lingua humana novis inventis octo sublingualibus salivae viis, nunc ex suis fontibus, glandulis sublingualibus educatis. Lipsiae. 1724. 4.

G. J. Trew de vasis linguae salivalibus atque sanguiferis opuscula. Norimbergae. 1754.

länglichbretteartige Gestalt und ungefähr dieselbe Größe als die Unterkieferdrüse.

Sie besteht aus kleineren Lappen als die vorigen, ist härter und weißer als sie, und öffnet sich nicht wie beide vorigen mit einer einfachen, sondern mit einer ansehnlichen Menge von, gewöhnlich sieben bis acht, Mündungen, ohne von ihrer Substanz verschiedne, freiliegende Ausführungsgänge zu beiden Seiten der Zunge in den Boden der Mundhöhle auf beiden Seiten unter und neben der Zunge. Außerdem verbinden sich entweder mehrere Ausführungsgänge des vordern Theiles der Zungendrüse (Ductus Riviniani) mit dem der Kieferdrüse, oder ein einziger vereinnigt sich mit einem, durch Zerfallen des letztern entstehenden, zur Bildung des größern, Bartholinischen Ganges. (S. S. 2095.)

§. 2097.

Andre Speicheldrüsen und Speichelgänge finden sich in der That nicht. Wenn sie gleich von mehreren Beobachtern angenommen wurden <sup>1)</sup>, so ist doch längst erwiesen, daß die

R 2

dafür

1) A. Vater. Novus ductus salivialis, qui in linguae superficie superiore circa ejus medium notabili orificio hiat. Vit. 1720. 4. Id. novus ductus salivialis isque praecipuus in lingua excretorius glandulae insignis ad latera linguae et sub eadem sitae, itemque super radicem linguae, epiglottidem, circa glottidem super arytaenoideas usque intra oesophagum expansae. Ib. 1721. 4. Id. de ductu salivali in lingua noviter antehac detecto, nunc dilucidato, confirmato, novisque experimentis adaucto, una ductus excretorius tonsillarum ac glandulae thyreoideae. Viteb. 1723. 4.

G. D. Coſch witz de ductu salivali novo. Halae. 1724. 4.

Ejusdem continuatio observationum de ductu salivali. Ib. 1729. 4.

dafür gehalten Theile entweder nur Schleimdrüsen an der Zungenwurzel und im Umfange des Kehlkopfes, oder selbst Blutadern auf dem Rücken der Zunge sind <sup>1)</sup>).

§. 2098.

Die Munddrüsen bieten keine periodischen Verschiedenheiten dar, die sie nicht mit den Drüsen überhaupt gemein hätten.

B. Regelwidriger Zustand der Munddrüsen.

§. 2099.

Die regelwidrigen Zustände der Munddrüsen bieten im Allgemeinen nicht viel Eigenthümliches dar. Ursprüngliche, überhaupt reine Formfehler sind selten.

Hierher gehören indessen ungewöhnliches Zusammenfließen der Ohr- und Kieferspeicheldrüse.

Verletzungen, besonders des Stenonschen Ganges, sind leicht, und geben zum Ausfluß des Speichels, der Speichelfistel, Veranlassung.

In der Verwachsung der Mündung des Ausführungsganges der Unterkieferdrüse ist wenigstens oft die Entstehung der Froschgeschwulst (Ranula) begründet, wenn sie gleich auch oft ein neugebildeter Balg ist. Keine Vergrößerungen kommen selten vor. Die Anschwellung der Speicheldrüsen bei der Entzündung findet im Zellgewebe zwischen den Lappen derselben Statt.

Eben so haben im Allgemeinen Texturveränderungen, Scirrhus, Blutschwamm, welche mit Vergrößerung

---

1) Trem a. a. D.



verbunden sind, gewöhnlich nicht in dem drüsigen Gewebe, sondern in Saugaderdrüsen ihren Sitz, welche sich in und unterhalb der Speicheldrüsen befinden, indem hierbei das Drüsengewebe selbst unverletzt zu seyn pflegt <sup>1)</sup>. Auch die unterhalb des Unterkiefers vorkommenden Geschwülste befinden sich in den Saugaderdrüsen des Halses. Bisweilen kommt hier, wie an andern Stellen, mit ganz regelwidrigen Bildungen, auch abnorme Knochenzerzeugung vor <sup>2)</sup>.

Steinige Concretionen kommen in den Mandeln und den Speicheldrüsen, namentlich den Ausführungsgängen der Unterkieferdrüse vor.

Diese bestehen nach Fourcroy <sup>3)</sup> aus thierischer Substanz und phosphorsaurem Kalk; indessen scheint sich, den physischen Merkmalen nach zu schließen, ein von mir beschriebener Speichelstein <sup>4)</sup> mehr den Cholesterinsteinen in der Gallenblase zu nähern.

Die in den Mandeln vorkommenden Steine sind schmutzig weiß. Der üble Geruch, welchen sie gewöhnlich haben <sup>5)</sup>, rührt wahrscheinlich wohl größtentheils von der Zersetzung der sie umgebenden und in ihre Zusammensetzung eingehenden thierischen Substanz her, da diese allein sehr häufig einen höchst äßlichen Geruch hat, der, wie die Bildung dieser Steine <sup>6)</sup>, von Verdauungsbeschwerden abhängt.

N 3

E. Zäh.

1) Burns Anatomy of the head and neck. p. 270 ff.

2) Burns in der Ohrspeicheldrüse mit Blutschwamm. N. a. D. S. 283.

3) Syst. des conn. chim. T. IX. p. 512.

4) Pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 2. S. 467.

5) Burns a. a. D. S. 265.

6) Burns ebendas. S. 265.

E. Z ä h n e <sup>1)</sup>.

§. 2100.

Die Zähne sind die härtesten Theile des Körpers, kommen durch ihre physischen und chemischen Eigenschaften mit den Knochen überein, unterscheiden sich aber durch die

1) Im Allgemeinen sind die Schriften über die Zähne zugleich anatomisch, physiologisch, pathologisch und therapeutisch, und unterscheiden sich von einander nur, sofern die eine oder die andre Richtung überwiegt, es ist daher desto zweckmäßiger, hier auch die welche vorzugsweise therapeutisch sind, anzuführen, da viele derselben interessante, allgemeine oder besondere anatomische, physiologische Bemerkungen über diesen Gegenstand enthalten.

B. Eustachii de dentibus libellus. Venet. 1565. 4. in Opusc. recuf.

B. Martin dissertation sur les dents. à Paris 1679.

A. C. G. Cumme dissertatio sistens dentium historiam. Helmst. 1716. 4.

P. Fauchard le chirurgien dentiste ou traité des dents. Vol. 1. 2. à Paris. 1728.

Lecluse nouveaux élémens d'odontologie. à Paris. 1754.

Bourdet recherches et observations sur toutes les parties de l'art du dentiste. à Paris. 1757. 8. Vol. 1. 2.

R. Curtis a treatise on the structure and formation of the teeth, etc. Oxford. 1769. 8.

F. X. de Wafferberg aphorismi anatomico-physiologici de dentibus. Vind. 1770. rec. in Opp. min. med. Fasc. I. 1775. p. 398 seqq.

J. Hunter natural history of the human teeth. London. 1771. 4. Zweite Ausgabe 1778. mit Kupf.

H. G. Courtois le dentiste observateur. à Paris. 1775. 8.

A. G. Berger Diss. de dentibus. Kiliae. 1788. 8.

S. H. Bring prael. Florman observationes in hodiernam de dentibus, praecipue hominum, doctrinam. Lundae. 1795. 4.

S. Hirsch praktische Bemerkungen über die Zähne. Jen. 1801. 8.

R. Blais

Mit ihres Zusammenhanges mit dem Körper, ihre Entwicklungsweise und ihre Lebenserscheinungen von ihnen, und nähern sich dagegen durch diese Bedingungen mehr den Oberhauttheilen, namentlich den Haaren und Nägeln.

## I. Regelmäßiger Zustand.

### 1. Vollkommener Zustand.

#### §. 2101.

a) Ortsverhältniß. Die Zähne befinden sich in dem ei weitem größten Theile ihrer Länge in den Zahnhöhlen (Alveoli) der Kiefer, eng von ihnen umgeben, und durch Einseilung mit ihnen verbunden. Ihr in den Zahnhöhlen enthaltener Theil ist die Zahnwurzel (Radix dentis). Nicht der ganze übrige Theil des Zahnes ist frei, sondern der mittlere, kleinste, der Hals (Collum l. cervix dentis) ist vom Zahnfleisch eng umgeben, der übrige, größere, die Krone der der Körper des Zahns (Corona l. corpus dentis) liegt frei in die Mundhöhle.

Die Wurzel und der Hals der Zähne sind zunächst von ner zarten Haut eng umfaßt, welche unten in das, die Höhle des Zahnes anfüllende gefäß- und nervenreiche Gewebe, oben

N 4

in

R. Blake de dentium formatione et structura in homine et in variis animalibus. Edinburgi 1798. Auszug in Keils Archiv. Bd. 4. S. 314 ff.

Neuaufgelegt und vermehrt als Essay on the structure and formation of the teeth in man and various animals. Dublin. 1801. Mit Kupf.

J. Fox the natural history and diseases of the human teeth in two parts. London. 1805. 2te Ausg. 1814. Mit Kupf.

A. Serres essai sur l'anatomie et la physiologie des dents, ou nouvelle théorie de la dentition. Paris 1817. Mit Kupf.

E. 3 d h n e <sup>1)</sup>).

§. 2100.

Die Zähne sind die härtesten Theile des Körpers, kommen durch ihre physischen und chemischen Eigenschaften mit den Knochen überein, unterscheiden sich aber durch die Art

- 1) Im Allgemeinen sind die Schriften über die Zähne zugleich anatomisch, physiologisch, pathologisch und therapeutisch, und unterscheiden sich von einander nur, sofern die eine oder die andre Richtung überwiegt, es ist daher desto zweckmäßiger, hier auch die welche vorzugsweise therapeutisch sind, anzuführen, da viele derselben interessante, allgemeine oder besondere anatomisch, physiologische Bemerkungen über diesen Gegenstand enthalten.

B. Eustachii de dentibus libellus. Venet. 1565. 4. in Opusc. recuf.

B. Martin dissertation sur les dents. à Paris 1679.

A. C. G. Cumme dissertatio sistens dentium historiam. Helmst. 1715. 4.

P. Fauchard le chirurgien dentiste ou traité des dents. Vol. 1. 2. à Paris. 1728.

Lecluse nouveaux élémens d'odontologie. à Paris. 1754.

Bourdet recherches et observations sur toutes les parties de l'art du dentiste. à Paris. 1757. 8. Vol. 1. 2.

R. Curtis a treatise on the structure and formation of the teeth. etc. Oxford. 1769. 8.

F. X. de Wasserberg aphorismi anatomico-physiologici de dentibus. Vind. 1770. rec. in Opp. min. med. Fasc. I. 1775. 4. p. 398 seqq.

J. Hunter natural history of the human teeth. London. 1771. 4. Dritte Ausgabe 1778. mit Kupf.

H. G. Courtois le dentiste observateur. à Paris. 1775. 8.

A. G. Berger Diss. de dentibus. Kiliae. 1788. 8.

S. H. Bring prael. Florman observationes in hodiernam de dentibus, praecipue hominum, doctrinam. Lundae. 1795. 4.

F. Hirsch praktische Bemerkungen über die Zähne. Jena. 1801. 8.

B. Blake

Art ihres Zusammenhanges mit dem Körper, ihre Entwicklungsweise und ihre Lebenserscheinungen von ihnen, und nähern sich dagegen durch diese Bedingungen mehr den Oberhauttheilen, namentlich den Haaren und Nägeln.

## I. Regelmäßiger Zustand.

### 1. Vollkommener Zustand.

#### §. 2101.

a) Ortverhältniß. Die Zähne befinden sich in dem bei weitem größten Theile ihrer Länge in den Zahnhöhlen (Alveoli) der Kiefer, eng von ihnen umgeben, und durch Einklemmung mit ihnen verbunden. Ihr in den Zahnhöhlen enthaltener Theil ist die Zahnwurzel (Radix dentis). Nicht der ganze übrige Theil des Zahnes ist frei, sondern der mittlere, kleinste, der Hals (Collum f. cervix dentis) ist vom Zahnfleisch eng umgeben, der übrige, größere, die Krone oder der Körper des Zahns (Corona f. corpus dentis) ragt frei in die Mundhöhle.

Die Wurzel und der Hals der Zähne sind zunächst von einer zarten Haut eng umfaßt, welche unten in das, die Höhle des Zahnes anfüllende gefäß- und nervenreiche Gewebe, oben

N 4 in

R. Blake de dentium formatione et structura in homine et in variis animalibus. Edinburgi 1798. Auszug in Reils Archiv. Bd. 4. S. 314 ff.

Neuaufgelegt und vermehrt als Essay on the structure and formation of the teeth in man and various animals. Dublin. 1801. Mit Kupf.

J. Fox the natural history and diseases of the human teeth in two parts. London. 1803. 2te Ausg. 1814. Mit Kupf.

A. Serres essai sur l'anatomie et la physiologie des dents, ou nouvelle théorie de la dentition. Paris 1817. Mit Kupf.

in das Zahnfleisch übergeht, und den Namen der *Weinhaut des Zahnes* führt, ungeachtet sich besonders aus der Bildungsgeschichte des Zahnes zu ergeben scheint, daß sie nicht mit ihm in derselben Beziehung als die Weinhaut mit dem Knochen steht.

Außerdem sind die Zahnhöhlen mit einer faserigen, dicken Haut bekleidet, welche mit dieser im normalen Zustande nicht zusammenhängt, aber gleichfalls oben in das Zahnfleisch übergeht, der Weinhaut der Zahnhöhlen.

Das Zahnfleisch (*Gingivae*) ist ein hartes, festes, mit der Mundhaut eng verbundenes, ungefähr eine halbe Linie dickes, nicht sehr gefäß- und nervenreiches Zellgewebe, welches nicht bloß den Hals der Zähne, sondern die beiden Flächen der Zahnhöhlenfortsätze der Kiefer eng bekleidet, und sich zwischen je zwei Zähne von der vordern zur hintern Fläche durch dünne Zwischenstreifen fortsetzt.

Alle Zähne eines jeden Kiefers zusammen, bilden einen Bogen, dessen Wölbung nach vorn, dessen Concavität nach hinten gewandt ist, stehen im Allgemeinen eng und gleich dicht neben einander, und die obern und untern sind mit den Kauflächen einander entgegen gewandt. Der Bogen, welchen die obern Zähne bilden, ist etwas größer, weil die obern Zähne im Allgemeinen die untern etwas an Größe übertreffen. Deshalb überragen die obern die untern etwas nach außen, die vordern dünnern bedecken sie sogar etwas. Zugleich sind die hintern untern mit den Kauflächen etwas nach innen, die obern mehr gerade nach unten gewandt.

b) *Äußere Form.* Alle Zähne haben eine mehr oder weniger längliche Gestalt, sind an ihrem untern Ende etwas zugespitzt, und hier mit einer kleinen Öffnung versehen. Diese führt

führt in einer Höhle, der Höhle des Zahnes (Cavum dentis), welche sich von der Spitze seiner Wurzel durch den größten Theil seiner Länge bis in die Krone erstreckt, verhältnißmäßig eng ist, die Form des Zahnes hat, und die durch Zellgewebe verbundenen Gefäße und Nerven desselben enthält.

c) Zahl. Die Zahl der Zähne ist in beiden Kiefern, beider Kieferhälften und in beiden Geschlechtern gleich, und beträgt im vollkommenen Zustande zwei und dreißig.

d) Gewebe. Das Gewebe der Zähne ist sehr hart und fest. Sie bestehen aus einer doppelten Substanz, der Knorpelsubstanz und dem Schmelz.

#### §. 2102.

Die Knorpelsubstanz bildet den bei weitem ansehnlichsten Theil des Zahnes, die Wurzel, den Hals und die Krone größtentheils, stellt daher die Gestalt des ganzen Zahnes dar. Ihre Härte, worin sie andre Knochen übertrifft, ist sowohl in ihrer mechanischen Anordnung als in ihrer Mischung begründet. Sie enthält nämlich keine Zellen, besteht nur sehr undeutlich aus longitudinalen, von außen nach innen übereinander liegenden Streifen, und in ihre Mischung gehen verhältnißmäßig mehr erdige Salze als in die andrer Knochen ein. In hundert Theilen finden sich nach

Berzelius <sup>1)</sup> 51,04 phosphorsaurer Kalk, 2,00 flusssäurer Kalk, 11,30 kohlensaurer Kalk, 1,16 phosphorsaurer Talk, 1,20 Natron mit einer unbestimmbar kleinen Menge salzsauren Natrons;

N 5

nach

1) Gehler's Journal für Chemie und Physik. Bd. 3. Hft. 1. S. 19.





Gourcroy und Bauquelin aus 72,90 phosphorsaurem Kalk und 27,10 Gallert und Wasser <sup>1)</sup>);

nach Pcpys 0,78 phosphorsaurem, 0,6 kohlensaurem Kalk und 0,16 Wasser <sup>2)</sup>);

nach Berzelius 85,3 phosphorsaurem Kalk, 3,3 kohlensaurem Kalk, 8,0 kohlensaurem Kalk, 1,5 phosphorsaurem Kalk, 2,0 thierischer Substanz und Wasser <sup>3)</sup>).

§. 2104.

Die verhältnismäßig ansehnlichen Gefäße und Nerven der Zähne gehen, die erstern von der innern Kieferpulsader, die letztern von dem zweiten und dritten Aste des dreigetheilten Nerven ab, dringen durch die an den Spitzen der Wurzel befindlichen Oeffnungen, und, der Zahl derselben genau entsprechend, in die Höhle, um, durch Zellgewebe zur Bildung eines kleinen, im Innern der Höhle enthaltenen Kernes oder Keimes (Palpus l. nucleus) zusammengehalten, an die Substanz des Zahnes zu treten. In der Gegend des Halses des Zahnes schwellen die Nerven an, werden weich und röthlich, und erscheinen von einem Gefäßnetz bedeckt <sup>4)</sup>.

§. 2105.

Diese Charaktere kommen allen Zähnen gemeinschaftlich zu; außerdem aber finden sich andre, wodurch sie sich von einander unterscheiden und demnach in verschiedene Ordnungen abgetheilt werden.

Sie

1) Horkels Archiv. Bd. 1. Hft. 2.

2) Aus For im deutschen Archiv. Bd. 3. S. 647.

3) Sehlen's Journal für die Physik und Chemie. Bd. 3. Hft. 1. S. 27.

4) Serres S. 52.

lichsten reicht doch der äußere Rand etwas weniger tief herab, und geht abgerundet in den untern über.

Die untern innern Schneidezähne haben diese Gestalt fast nie, die übrigen fast immer. Bei den äußern obern Schneidezähnen ist sogar der innere Rand etwas nach außen gewölbt, und geht allmählich, wenn gleich tiefer, in den untern über, so daß die Schneidefläche desselben schmaler als die größte Breite des Zahnes wird.

Merkwürdige Verschiedenheiten in der Form, weil sie einen allmählichen Uebergang von den innern untern Schneidezähnen durch die übrigen zu den folgenden Eckzähnen anweisen.

In Hinsicht auf Größe unterscheiden sich die Schneidezähne, sofern im Oberkiefer das innere Paar etwas, oft doppelt so groß als das äußere ist, während im untern alle dieselbe Größe haben, oder das äußere Paar das innere etwas übertrifft.

#### §. 2110.

Auf die Schneidezähne folgen die Eckzähne, Hundszähne, Spitzzähne (*Dentes canini, ferini, cuspidati*), einer auf jeder Seite, also vier im Ganzen. Ihre Krone ist von vorn nach hinten weit dicker als die der Schneidezähne, nimmt auch von oben nach unten nicht so schnell ab. Daher ist ihre Kaufläche weniger scharf. Zugleich ist diese spitz, indem die untere Fläche nicht gerade verläuft, sondern, da die beiden Seitenflächen früher aufhören als an den Schneidezähnen, und doch die Krone so hoch als an diesen ist, aus zwei Theilen zusammengesetzt, die in der Mitte zu einem Winkel zusammenlaufen. Die Krone hat daher eine mehr rundliche, zugespitzte Gestalt. Sie springt sowohl nach innen als nach außen über die der Schneidezähne etwas

in drei Zacken aus, eine mittlere und zwei seitliche. Diese verschwinden aber bald, und die Kaufläche bildet dann nur eine dünne, gerade Linie, welche die ganze Breite der Krone einnimmt.

Die Wurzel der Schneidezähne ist einfach, von der Krone an bis zu ihrem Ende zugespitzt. Doch ist es nicht ungewöhnlich, daß durch ihre ganze Länge auf beiden Seiten ein Eindruck verläuft, der eine Theilung in eine vordere und hintere Hälfte andeutet, und selbst die Spitze in zwei kleine Zacken, eine vordere und eine hintere, scheidet.

In Hinsicht auf die Richtung unterscheiden sich die Schneidezähne von den übrigen insofern, als sie in querrer Richtung so stehen, daß die eine ihrer freien Flächen nach vorn, die andre nach hinten gewandt ist, und ihre Schneidefläche von einer Seite zur andern verläuft.

#### §. 2109.

Die Schneidezähne unterscheiden sich aber unter einander gleichfalls bedeutend. Nirgends ist 1) der Unterschied zwischen den gleichnamigen Zähnen des Ober- und Unterkiefers so auffallend als bei ihnen, so daß auch da, wo sie einander an Größe am nächsten sind, dennoch die Schneidezähne des Oberkiefers um einen halben Zahn weiter nach außen reichen als die des Unterkiefers. Die obern sind wenigstens doppelt so groß als die untern.

Ferner unterscheiden sich die Schneidezähne desselben Kiefers unter einander sowohl durch Größe als Gestalt. Alle sind zwar meißelförmig, und ihr äußerer Rand ist ungefähr so hoch als der innere, bisweilen ist sogar an allen Zähnen hierin durchaus keine Verschiedenheit zu bemerken; allein am gewöhn-

lich-

Gene unterscheiden sich von diesen 1) durch Kleinheit. Sie sind kaum halb so groß als sie; 2) durch Compression von einer Seite zur andern; 3) durch geringere Ungleichheit ihrer Kauflächen; 4) durch die Gestalt ihrer Wurzeln. Diese sind höchstens zweizackig, und, auch wo dies der Fall ist, gewöhnlich nur in ihrer von der Krone am weitesten entfernten Hälfte, und nie so tief als die Wurzeln der hintern Backzähne gespalten. Am häufigsten sind sie nur von innen nach außen breiter als die der Schneide- und Eckzähne, nach unten weniger zugespitzt, und die beiden Seitenfurchen tiefer.

Die Kauflächen der kleinen Backzähne haben im Allgemeinen eine vordere äußere und eine hintere innere Spitze, daher der Name. Vorzüglich ist diese Bildung an den Backzähnen des Oberkiefers sehr deutlich, weil beide Spitzen hier durch eine tiefe Quersfurche von einander abgegränzt sind. An den untern sind sie dagegen durch einen von außen nach innen gehenden Rücken verbunden, eine merkwürdige Verschiedenheit, weil sich die Eckzähne (S. 2110.) beider Kiefer auf dieselbe Weise unterscheiden. Der äußere vordere Höcker ist immer höher als der innere, besonders an dem untern, vordersten Backzahne, wo der innere fast gar nicht entwickelt ist, und der durch beide Bedingungen sehr deutlich den Uebergang von den Eckzähnen zu den übrigen Backzähnen macht.

Am zweiten vordern Backzahne hat sich dagegen dem hintern Höcker nach hinten gewöhnlich noch ein kleiner, niedriger angebildet, oder bisweilen ist der hintere in zwei gleiche Hälften gespalten. Zugleich ist der äußere Höcker weniger hoch, seine Krone und Kaufläche sind am meisten rundlich viereckig, der Uebergang also durch ihn zu den hintern Backzähnen

zähnen am deutlichsten. Auch ist er immer etwas größer als der innere.

Die obern vordern Backzähne haben durch stärkere Entwicklung ihres hintern Höckers mehr Aehnlichkeit mit den hintern als die untern.

#### §. 2114.

Die drei hintern Backzähne haben am gewöhnlichsten vier stumpfe Höcker, zwei äußere und zwei innere, welche durch eine kreisförmige Vertiefung von einander abgesondert werden. Zwischen den beiden hintern aber befindet sich, im Rande der Kaufläche selbst, gewöhnlich noch ein kleinerer, fünfter. Diese Höcker selbst sind wieder durch mehrere Einschnitte ungleich. Sehr allgemein sind die äußern Zacken die größten und zahlreichsten, und nicht selten ist auch hier die innere einfach, vorzüglich an den beiden letzten Backzähnen. Der letzte große Backzahn ist gewöhnlich der kleinste, der erste dagegen der größte.

Am gewöhnlichsten haben die Wurzeln dieser Backzähne drei Zacken, in welche sie sich oft in geringer Entfernung von der Krone trennen. Der letzte hat zwar meistens nur eine einfache Wurzel, indessen ist diese nie so beträchtlich zugespitzt als bei den Schneide- und Eckzähnen, und immer wenigstens mit zwei sehr tiefen und breiten Furchen versehen, welche ein Streben zur Bildung jener Zacken andeuten. Auch die übrigen haben bisweilen nur zwei Zacken, wo aber dann die eine immer sehr viel breiter als die andre, und gleichfalls mit einer breiten und tiefen Furche versehen ist. Bisweilen spaltet sich diese Zacke nach unten in zwei kleine Spigen. Diese Zacken sind gewöhnlich weniger gerade als die einfachen Wurzeln der Schneide- und Eckzähne, divergiren anfangs von einander, krümmen sich aber gegen ihr Ende mehr oder weniger, oft sehr

Meckel's Anat. 4. Th. D ber

bedeutend, und selbst so entgegen, daß sie, nachdem sie anfangs getrennt gewesen waren, gegen ihre Spitze unter einander verwachsen, und dadurch ein Stück des Oberkiefers zwischen sich einschließen.

§. 2115.

Durch die angegebenen Bedingungen unterscheiden sich die Zähne, welche zusammen den größten Theil des Lebens hindurch bestehen. Von diesen verschieden sind andre, welche nur den weit kleinern, frühesten Lebensabschnitt hindurch bleiben, und deshalb den Namen der Milch-, Kinder- oder Wechselzähne (*Dentes decidui* *L. infantiles* *s. lactei*) führen, während jene bleibende Zähne (*Dentes permanentes*) heißen.

Die Zähne, welche zuerst hervorbrechen, bleiben nicht das ganze Leben hindurch, sondern mehrere derselben nur bis zum siebenten Jahre, und sind um das vierzehnte alle durch neuen, ihnen entsprechende, bleibende ersetzt.

§. 2116.

Diese beiden Classen von Zähnen unterscheiden sich von einander durch Zahl und Gestalt.

In ersterer Hinsicht, sofern sich in der Regel, weil in jeder Kieferhälfte nur zwei Backzähne vorhanden sind, nur zwanzig Wechselzähne finden, wogegen sich zwei und dreißig bleibende bilden.

In Hinsicht auf den zweiten Punkt giebt es zwar unter den Milchzähnen alle drei oben festgesetzte Classen; auch kommen die Schneide- und Eckzähne durch Gestalt, Zahl und Stellung mit den bleibenden, welche ihnen entsprechen, überein; allein alle Milchzähne, vorzüglich aber die Backzähne, unterscheiden sich von den entsprechenden bleibenden 1) durch verhältnißmäßig zur Wurzel weit beträchtlichere Größe der Krone,

so daß beide durch einen merklichen Absatz in einander übergehen; 2) durch geringere Höhe.

In Absicht auf Größe finden nicht für alle dieselben Bedingungen Statt. Die Milch-, Schneide- und Eckzähne sind absolut weit kleiner als die bleibenden, vorzüglich die unteren; allein für die Backzähne gilt das Gegentheil. Sie folgen unmittelbar auf die Eckzähne, an ihre Stelle treten die beiden vordern, und die hinter ihnen entstehenden drei Backzähne sind bleibende; offenbar also entsprechen ihnen unter den bleibenden der Lage nach die beiden vordern. Sie sind aber weit größer und haben eine ganz andre Gestalt als diese, indem sie nicht, wie jene, von vorn nach hinten platt gedrückt, sondern ansehnlich breit sind, eine viereckige, breite Krone, und eine durch mehrere, gewöhnlich fünf, Erhabenheiten, welche eine ansehnliche mittlere Vertiefung umgeben, ungleiche Kaufläche haben. Der vordere ist beinahe um die Hälfte kleiner als der hintere, dieser aber fast so groß als der größte bleibende Backzahn. Auch haben sie immer zwei, gewöhnlich drei Wurzeln.

Sie entsprechen daher nur durch Zahl und Stelle den vordern bleibenden, durch Größe und Form, also durch weit wesentlichere Bedingungen, den drei hintern Backzähnen.

## 2. Periodische Verschiedenheiten 1).

### a. Allgemeine Betrachtung.

§. 2117.

Die Zähne durchlaufen mehrere Perioden, in welchen sie sich selbst fast unähnlicher als irgend ein andrer Theil des Körpers sind.

Q 2

Die

- 1) Außer den oben in der Lehre von den Zähnen angeführten Schriften, welche auch diesen Gegenstand abhandeln, sind vorzüglich folgende zu bemerken.

J. J.

Die Entwicklungsgeschichte der Zähne bietet mehrere, höchst merkwürdige Bedingungen dar. Die vorzüglichsten Momente sind 1) die Art ihres Entstehens; 2) die Zeit ihres Hervorbrechens; 3) die Veränderungen, welche sie im Laufe des Lebens erleiden.

## 1) Die

J. J. Rau de ortu et regeneratione dentium. L. B. 1694. rec. in Halleri coll. diff. T. VI. p. 201.

J. A. Ungebauer de dentitione secunda. rec. in Halleri coll. diff. T. VII.

J. G. Jancke de ossibus mandibularum puerorum septennium. Lips. 1751.

B. S. Albinus de dentium ortu et incremento. Annot. acad. L. II. C. II. Quot dentes mutet puer et quos. Id. ib. C. III. De dentium mutatione. Id. ib. C. I.

Jourdain essai sur la formation des dents comparée avec celle des os suivie de plusieurs expériences sur les os et sur les parties qui entrent dans leur constitution. à Paris 1766.

A. A. Brunner de eruptione dentium lacteorum. In Wallenbergii Opp. min. Fasc. I. Vied. 1775.

M. Girardi de re anatomica oratio. Parmae. 1781. Tab. I. Andree de primæ puerorum dentitione. Lips. 1790. 4.

Léveillé Mém. sur les rapports qui existent entre les premières et les secondes dents et sur la disposition favorable de ces dernières au développement des deux mâchoires. In Mém. de la soc. médicale d'émulation. T. VII. à Paris. 1811.

Miel quelques idées sur le rapport des deux dentitions et sur l'accroissement de la mâchoire dans l'homme. Ebenas.

Duval Mém. sur la position relative de l'ouverture externe du canal maxillaire, pour servir à la démonstration de l'accroissement de la mâchoire inférieure. à Paris. 1812.

J. F. Meckel Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Zähne. In dessen Archiv für die Physiologie. Bd. 3. Hft. 4. 1817.

Miel note sur la manière dont les dents sortent des alvéoles et traversent les gencives. In Leroux's J. de méd. T. 59. p. 235 ff.



1) Die Zähne entstehen in rundlichen, überall geschlossenen Säckchen, welche mit dem Zahnfleisch auf das festeste zusammenhängen. Diese Säckchen bestehen aus einer doppelten Haut. Hunter<sup>1)</sup> hielt nur die innere, Blake<sup>2)</sup> nur die äußere für gefäßreich, allein in der That sind es, wie ich mich sowohl bei Menschen- als Thierembryonen überzeugt habe, und auch Foz<sup>3)</sup> richtig angiebt, beide, nur scheint das äußere weniger reich an Gefäßen zu seyn als das innere. Zwischen beiden Blättern befindet sich eine seröse Flüssigkeit, und sie sind desto weiter von einander entfernt, und desto leichter trennbar, je jünger der Fötus ist; wenn sie gleich, wegen Kleinheit der Theile in den frühern Perioden, beim ältern leichter darzustellen sind.

Das äußere Blatt ist schwammiger, lockerer, weicher, dicker als das innere, und sehr deutlich eine Fortsetzung des Zahnfleisches, weshalb man sehr leicht beim Fötus, vorzüglich in der frühen Periode desselben, den ganzen Zahnapparat in Verbindung mit dem Zahnfleische aus den Zahnhöhlen nehmen kann.

Das innere Blatt ist härter, aber dünner als das äußere.

Es kann von dem äußern und dem Zahnfleische als ein eigener Sack völlig getrennt dargestellt werden. Dieses Blatt steht mit dem Zahne in einer weit nähern Beziehung als das äußere. Es ist die eigentliche Bildungshaut desselben. Gefäße des Zahnes verbreiten sich sehr deutlich auch an ihm, und bei glücklichen Einspritzungen erscheint es vollkommen geröthet.

---

1) N. a. D. S. 37.

2) N. a. D. S. 4.

3) N. a. D. S. 20.

2) Die Säckchen erscheinen schon sehr früh. Um die zehnte Woche schon gehen in jeder Hälfte des Ober- und Unterkiefers deutlich vier, zwei vordere kleinere, zwei hintere größere, die je zwei dicht zusammen stehen, unter denen aber die vordern von den hintern durch eine ansehnliche Lücke getrennt sind, hervor. Nach Ablauf des dritten Monats findet man immer zwischen diesen beiden Paaren einen fünften Sack, im Ganzen also zwanzig. Schon am Ende des vierten hat sich gewöhnlich nach hinten überall ein sechster, für den vordersten bleibenden Backzahn gebildet.

3) Anfangs enthalten diese Säckchen bloß eine Flüssigkeit, die anfanglich röthlich, dann weißlichgelb wird. Bald aber, schon im vierten Monat, wächst von dem Boden des innern Blattes ein weicher, allmählich erhärtender, röthlicher Körper, der Zahnkeim (*Pulpus dentis*) empor. In diesem verbreiten sich vom Boden aus, in reichlicher Menge, Gefäße und Nerven, und er selbst scheint in seinem Umfange mit einer gefäßreichen Membran bekleidet, die sich aber nicht leicht von seiner Substanz trennen läßt. Er ist anfangs sehr niedrig und überall einfach, rundlich spitz, nimmt aber bald die Gestalt der verschiedenen Zähne an, stellt dieselbe ganz genau dar, und ist in der That die Form, der Kern, nach und um welchen sich der Zahn selbst bildet. Er entwickelt sich so, daß der freie Theil, welcher der Krone entspricht, sich zuerst bildet, diese allen ihren Erhabenheiten und Vertiefungen nach schon völlig ausgewirkt ist, während von dem übrigen Theile noch gar nichts vorhanden ist.

Um die Mitte der Schwangerschaft nimmt die Verknöcherung der Zähne ihren Anfang. Auf der freien Fläche des Kiefers erscheinen sehr zarte, dünne, feine, elastische Scherben, die

anfänglich sehr dick, feucht, und schwinden allmählich in demselben Verhältniß als sich die Schmelzbildung vollendet. Wirklich bilden sie einen Keim für diesen, wie vom Boden der Kapsel ein länger bestehender für den Knochentheil des Zahnes importwächst.

Die verschiedenen Arten der Zähne verknöchern in Hinsicht auf Zeit und äußere Form nicht genau nach demselben Typus. Zuerst erscheinen die innern Schneidezähne, zuletzt die hintern Backzähne. In Bezug auf die zwischen ihnen liegenden verhalten sich die Wechsellzähne etwas anders als die bleibenden. Die Schneidezähne und Eckzähne entstehen aus einem Scherbschen, die Backzähne aus mehreren, die kleinen aus zweien, die großen aus vier bis fünf. Immer bildet jedes Scherbschen bei seinem Entstehen ein niedriges Dreieck, hat also ungefähr die Form, welche der Krone des Eckzahnes beständig zukommt. Bei den Schneidez- und Backzähnen breiten sich diese Scherbschen aus, und bekommen bei den erstern zwei Nebenspitzen, die aber nicht als eigne Scherbschen entstehen. Unter den verschiedenen Scherbschen der Eckzähne entstehen die äußern peripherischen und vordern am frühesten, dann die innern, bei den großen hintern Backzähnen folgt auf das vordere äußere das vordere innere, dann in derselben Ordnung das zweite Paar. Nach demselben Gesetz geschieht auch die Vereinigung der verschiedenen Scherbschen, so daß auch durch seine Entwicklung der große Backzahn als eine Zusammensetzung aus zwei kleinen erscheint.

Die untern entstehen vor den obern und bilden sich früher als sie. Beim reifen Fötus sind die einzelnen Scherbsen des

1) Hérissant in *Mém. de Paris* 1754.

hintern, vordern, untern Wechselbackzahns gewöhnlich schon ganz vereint, die des obern noch nicht. In einem Falle, wo der erste bleibende untere, schon fünf Knochenscherben hatte, fand ich am obern nur drei.

#### §. 2118.

Wann ist die Bildung des Zahnes vollendet? Bestimmt noch nicht zur Zeit des Ausbruches, indem er vor der vollkommenen Ausbildung der Wurzel durch das Zahnfleisch dringt. Es fragt sich aber, ob er, nachdem die Wurzel vollendet ist, noch weitere innere Veränderungen erleidet?

Als Gründe für diese Ansicht giebt man an:

- 1) Die Veränderung des Zahnes durch den Genuß von Färbewürthen;
- 2) das Hervorragen eines Zahnes über die übrigen nach Wegnahme des ihm im entgegengesetzten Kiefer gegenüberstehenden;
- 3) die Heilung der Zahnbrüche;

Für die fortwährende Wiederverzeugung des Schmelzes führt man insbesondere an, daß:

- 4) krankhafte, in denselben eintretende Veränderungen, namentlich schwarze Flecke, welche weggenommen wurden, und nicht wieder erschienen, als eine ableitende Krankheit entstand <sup>1)</sup>).

- 5) Die Dauer des Schmelzes, welche sich bei der beständigen Reibung nur durch beständig Statt findende Wiederverzeugung erklären lasse <sup>2)</sup>).

Allein gegen diese Gründe läßt sich einwenden:

1) Daß

1) Hirsch'a. a. D. S. 17.

a) Ebenbaselbst.

1) Daß die Färbung der Knochen überhaupt durch Färbestoffe nichts für den beständig in ihnen vorgehenden Stoffwechsel beweist <sup>1)</sup>).

2) Daß unter den angeführten Umständen wahrscheinlich weniger richtig eine Vergrößerung, als ein Hervordringen des Zahnes aus der Zahnhöhle anzunehmen sey, überhaupt aber die Erscheinung beim Menschen und den meisten Säugthieren gar nicht Statt findet, wenn sie gleich bei denen, wo, wie z. B. bei den Nagethieren <sup>2)</sup>, sogar die abgeschnitten und ausgerissenen Zähne sich wiedererzeugen, eintritt.

3) Die Heilung der Zahnbrüche beweist nicht geradezu einen beständigen Stoffwechsel in der Zahnsubstanz, sondern nur, daß unter regelwidrigen Bedingungen der Zahnkeim, wie er früher die Knochensubstanz in seinem Umfange absonderte, auch einen erlittenen Verlust ersetzen kann.

4) In den angeführten Krankheitsfällen ist durchaus nicht bewiesen, daß sich der Schmelz wirklich wiedererzeugt hätte.

5) Die Dauer des Schmelzes rührt von seiner Festigkeit her.

Die Gründe für die beständige Bildung der Zähne überhaupt und des Schmelzes insbesondere sind mithin nicht beweisend.

Vielmehr beweist schon die bei 2) angeführte Thatsache Dagegen,

Eben

1) R. Gibson on the Effect of Madder Root on the Bones of Animals. In mem. of the literary society of Manchester. Second series. Vol. I. p. 146—164. Uebersetzt im deutschen Archiv Bd. 4. Hft. 4.

2) Lavagna off. sulla curia dei denti. Genova. 1812.

Eben so wird diese Ansicht unwahrscheinlich durch die Entstehungsweise des Schmelzes.

§. 2119.

Einen nicht unbeträchtlichen Theil des Lebens hindurch, außer der ganzen Fötusperiode, gewöhnlich wenigstens während der sechs ersten Monate nach der Geburt, sind die Zähne wenigstens nicht äußerlich sichtbar.

Ihre Stelle nimmt während dieser Periode eine sehr harte, wirklich knorpelige, zugespitzte, mehrfach eingeschnittene, einige Linien hohe, vom Zahnfleisch ganz verschiedene Erhabenheit ein, welche sich von den Zahnhöhlenrändern erhebt, die Function der Zähne, namentlich das Festhalten der Brustwarzen, in der ersten Lebenszeit übernimmt, und zweckmäßig den Namen des Zahnknorpels (*Cartilago dentalis*) erhalten kann. Sie ist sehr merkwürdig, indem sie dem Hornschnabel der Vögel und Reptilien analog ist. In dem Maas als die Zähne sich entwickeln und hervorbrechen, schwindet diese Substanz.

In ihr befinden sich, vorzüglich in der Gegend der Backenzähne, und nach innen, an seiner concaven Seite, mehrere, mit einer gelblichen, bröcklichen, ziemlich festen Substanz ausgefüllte Röhren von verschiedener Größe, höchstens dem Durchmesser einer halben Linie, welche sich mit keiner deutlichen Mündung nach außen öffnen, und zuerst von Cuvier angegeben worden sind <sup>1)</sup>. Sie erweichen nach ihm das Zahnfleisch des Kindes vor dem Ausbruche der Zähne, und sondern später den Weinstein ab. Indessen habe ich diese Röhren immer nur gegen die Zeit des Zahnausbruchs wahrgenommen, und halte  
sie

1) N. a. D. S. 28 — 33. Taf. 4. Fig. 6.

ie daher bis jetzt noch vielmehr für, durch den Reiz der hervordringenden Zähne entstehende, neue Bildungen, die wahrcheinlich nichts anders als Abscesse sind.

## §. 2120.

Die bleibenden, so wie die Wechselzähne erleiden im Laufe des Lebens an ihrer Kaufläche im Allgemeinen mehr oder weniger bedeutende Veränderungen. Der Schmelz wird allmählich mehr oder weniger abgetrieben, so daß die Knochensubstanz des Zahnes bloßgelegt, daher die Kaufläche, die anfangs ganz aus Schmelz bestand, jetzt aus diesem und Knochensubstanz gebildet wird, nachdem die anfangs scharfen Ränder und Spitzen stumpf geworden sind. Wenn die allmähliche Abreibung noch weiter geht, so daß die Knochensubstanz bis auf die Höhle des Zahnes zerstört, und diese daher geöffnet werden würde, erzeugt sich im Allgemeinen in demselben Verhältniß in dem obern Ende dieser Höhle eine bräunliche, der Knochensubstanz ähnliche, doch etwas weichere Substanz, welche die Höhle verschließt, und die in ihr enthaltenen Theile schützt <sup>1)</sup>. Auch diese Erscheinungen kann man als Gründe gegen die beständige Wiederverzeugung des Schmelzes anführen.

Allmählich vermindert sich indessen die Ernährung der Zähne, selbst ihre Ernährungslöcher verschließen sich. Ihre Verbindung mit den Zahnhöhlen wird aufgehoben, sie wackeln und fallen aus. Die Zahnhöhlen sinken zusammen, der ganze Zahnhöhlenrand schwindet, nachdem das Zahnfleisch die Öffnungen der Zahnhöhlen verschlossen hatte.

β. Ver-

---

1) Hunter a. a. O. S. 108 ff.

Prochaska Obl. de decremento dentium. In Annot. acad. Fase. I.

## §. Besondere Betrachtung.

## §. 2121.

Die verschiedenen Zähne durchlaufen die verschiedenen Perioden, welche oben im Allgemeinen beschrieben wurden, nicht zugleich, sondern auf eine sehr regelmäßige Weise, mehr oder weniger nach einander. Im Allgemeinen läßt sich festsetzen, daß 1) die verschiedenen Perioden nach demselben Gesetze verlaufen, so daß der Keim des Zahnes, dessen Säckchen zuerst erscheint, sich auch zuerst bildet, verknöchert und hervorbricht;

2) die gleichnamigen Zähne desselben Kiefers einander auch in dieser Hinsicht sehr genau entsprechen;

3) die untern Zähne sich vor den obern, die vordern vor den hintern ausbilden;

4) auf eine merkwürdige Weise die allmähliche Entwicklung der Zähne beim Menschen bleibenden Formen in der Reihe der Säugethiere entspricht.

## A. Wechselfähne.

## §. 2122.

Die Milchzähne entstehen, nach dem ersten Gesetze, noch früher als die bleibenden. Die Zeit, um welche sich ihre Säckchen bilden, so wie die Ordnung, in welcher diese erscheinen, ist schon oben (S. 214.) angegeben. Die beiden innern Säckchen sind die der Schneidezähne, die äußern die der Backzähne, der fünfte mittlere der des Eckzahnes.

Die Verknöcherung fängt zuerst im fünften Monate am innern Schneidezahne, am untern etwas früher als am obern, an, hierauf folgt der äußere Schneidezahn, darauf der vordere Backzahn. In diesen dreien findet man



in das Ende des fünften Monats zugleich Knochenabstanz, während von den beiden übrigen noch bloß der Keim vorhanden ist. Ob der Eckzahn oder der hintere Backzahn früher erkennbare, kann ich bis jetzt noch nicht mit völliger Gewißheit aussagen; da ich, einen einzigen Fall ausgenommen, immer entweder in beiden die Knochenkerne zugleich fehlend, oder vorhanden sahe; indessen verändere, wahrscheinlich der erstere, indem ich theils in einem Falle in ihm, nicht aber im hintern Backzahn einen Knochenkern fand, theils seinen Knochenkern immer größer als den des hintern Backzahns sahe, als er früher als dieser ausbricht. Doch erheben besonders beiden letzten Umstände meine Vermuthung keinesweges zu Gewißheit.

Schon im siebenten Monate des Fötuslebens entstehen alle Weisenzähne Knochenkerne <sup>1)</sup>).

Die Zahl und Anordnung der eignen Knochenstücke, aus welcher sie sich bilden, ist nicht immer ganz genau dieselbe.

Nach Hunter <sup>2)</sup> und Rudolphi <sup>3)</sup> entstehen die Schneidezähne aus drei Stücken, einem mittlern größern, zwei seitlichen kleinern; die Eckzähne nach Hunter aus einem Stück, nach Rudolphi aus zwei Seitenhälften; von den Backzähnen nach beiden der vordere aus einem vordern, und dem oder zwei hintern Stücken, der hintere aus einem vordern und mehreren hintern Stücken; indessen redet Hunter, wenn

1) Blake essay etc. p. 23. sagt nur, daß er bei einem achtmonatlichen Fötus in allen Zähnen Knochensubstanz gefunden habe.

2) N. a. D. S. 88.

3) Ueber die Zähne. In dessen anat. physiol. Untersuchungen. S. 126 ff.

wenn er gleich nach Beobachtungen zu sprechen scheint, nur kurz über diesen Gegenstand, und Rudolphi's Angaben sind nicht das Resultat von Untersuchungen über die Entwicklung der Fötuszähne, sondern bloß von Behandlung ausgebildeter Zähne mit Säuren, wobei sie in die angegebne Zahl von Stücken zerfielen. Ich habe bei vielfältigen Untersuchungen der erstern Art die Schneide- und Eckzähne sich immer nur aus einem Stück bilden gesehen, welches sich von der Mitte allmählich nach beiden Seiten ausbreitete, und muß daher sie jetzt jene, aus der Behandlung mit Säuren gezogenen Schlüsse um so mehr als nicht mit der Natur übereinstimmend erkennen, da auch andre, z. B. Albin<sup>1)</sup>, Blase<sup>2)</sup> ausdrücklich bemerkt, daß die Schneide- und Eckzähne sich nur aus einem Stücke bilden. Dagegen entstehen die Backzähne wirklich aus mehreren, denn jedes für sich auf eine merkwürdige Weise mit dem ersten Rudiment eines einfachen Schneide- oder Eckzahnes übereinkommt. Zuerst entsteht, auch mit diesen, und besonders den Schneidezähnen übereinkommend, das vordere größere Stück, welches anfangs verhältnismäßig zu seiner Höhe weit schmäler als späterhin ist, dann ihm gegenüber ein weit kleineres, welches sich allmählich ausbreitet, und entweder unmittelbar, oder auf der einen Seite durch ein drittes, noch später entstehendes mit dem ersten verbindet. Der zweite Backzahn entsteht regelmäßig wenigstens aus drei, meistens aus vier Stücken, einem vordern, zwei seitlichen, und einem hintern, von welchen das vordere immer das größere ist.

1) De dentium ortu et incremento. In Annot. zood. L. II. C. II. p. 16.

2) H. a. D. S. 6.

Alle einzelnen Stücke sind, mit Ausnahme eines kleinern  $\delta$  hintern Backzahns, bei der Geburt schon gewöhnlich zu dem Ganzen verbunden.

Um diese Zeit sind der erste und zweite Schneidezahn unfähig gleich weit, der ganzen Krone nach, entwickelt, ihnen nächst steht der Backzahn, dessen Krone indessen noch nicht die vollkommene Höhe hat; hierauf folgt der Eckzahn. Am vollkommensten ist der hintere Backzahn, der, auch abgesehen von der Trennung eines Theiles von der übrigen fehlenden Krone, an einer oder mehreren Stellen, in der mittlern Gegend derselben, ansehnliche Lücken hat. Die untern Backzähne bestehen indessen schon beim reifen Fötus aus selten aus einem Stück, und in beiden Kiefern verschwindet diese Trennung und die erwähnten Lücken schon in den ersten Monaten nach der Geburt.

Der Ausbruch der Wechselzähne fällt gewöhnlich in den Anfang des siebenten Lebensmonates. Gewöhnlich erscheinen die innern Schneidezähne zuerst, diesen folgen nach wenig Wochen die innern obern, einen bis zwei Monate nachher die obern untern und obern, nach Ablauf des ersten Jahres die obern untern Backzähne, bald darauf die vordern obern, am achtzehnten Monat die untern, bald nachher die obern Backzähne, um das Ende des zweiten Jahres die hintern Backzähne, so daß im dritten Jahre alle Wechselzähne ausgebrochen sind.

Den Wechselzähnen gehört eine eigne Pulsader an, welche als ein Ast der Zahnpulsader in einem eignen Kanale des Kiefers verläuft, in welchen sie durch eine abgesonderte Öffnung tritt <sup>1)</sup>.

1) Serres S. 16 ff.

Meckel's Anat. 4. Th.

## B. Bleibende Zähne.

§. 2123.

Die bleibenden Zähne entstehen und brechen ungefähr in derselben Ordnung hervor als die Wechselzähne, nur durchlaufen sie alle Perioden weit langsamer. Am frühesten, schon vor Ablauf der ersten Schwangerschaftshälfte, erscheint der Balg des vordern bleibenden Backzahns, erst im Anfange des achten Monates bilden sich die der Schneidezähne, dann der des Eckzahns, darauf der des mittlern großen Backzahns, erst einige Monate nach der Geburt, selten vor dem siebenten bis achten, der Balg des vordern kleinen Backzahns, darauf der des hintern kleinen Backzahns, im vierten Jahre gewöhnlich der Balg des dritten, hintersten großen Backzahnes. Die Keime entstehen fast zugleich mit den Bälgen.

Die Verknöcherung nimmt zuerst im vordersten großen Backzahn den Anfang. Gewöhnlich trägt im letzten Schwangerschaftsmonat und noch am Ende desselben seine vordere äußere Spitze ein Knochenscherbchen, welchem sich allmählich vier bis fünf andre, einzelne zugesellen, die nicht vor Ablauf des ersten Jahres zu einer Scherbe zusammengefloßen sind; doch habe ich einigemal bei sehr großen, reifen Fötus schon fünf Knochenscherbchen, immer indessen noch ganz von einander getrennt, und die hintern noch sehr klein, gefunden.

Die bleibenden Zähne stehen nicht alle in demselben Ortsverhältniß zu den Wechselzähnen. Die drei hintern Backzähne liegen mit ihnen in derselben Reihe, weiter nach außen, diejenigen dagegen, welche eigentlich die ausfallenden ersetzen, zwischen ihnen und der hintern Wand der Zahnhöhlen, die Schneidez-, Eck- und vordern Backzähne hinter ihnen. Anfangs sind die Säcke der bleibenden Zähne mit denen der alten in demselben

in Zahnhöhle enthalten. Ihre Entstehungsweise ist sehr würdig. Sie gehen von dem obern und hintern Theile schon vorhandenen Zahnsäcke ab, sprossen also gewissermaßen durch Zeugung von ihnen aus, und sitzen anfangs unmittelbar auf ihnen auf, hängen auch noch später, wenn sich Säcke der bleibenden Zähne verlängern, durch dünne, lange Änge mit ihnen zusammen. Indessen findet, nach meinen Untersuchungen, ein solcher Zusammenhang nur zwischen den äußern Blättern der Zahnsäcke Statt, die innern wesentlichen Theile sind völlig von einander getrennt, der neue innere Sack entwickelt sich daher an dem alten, zwischen ihm und äußern Blatte, ohne daß je ihre Höhlen zusammenhängen. Mindestens mußte ein solcher Zusammenhang in eine äußerst frühe Periode fallen, indem ich ihn bei mehrfacher genauer Untersuchung auch beim ersten Erscheinen der Säcke der bleibenden Zähne nie entdecken konnte. Die neuen Wälge werden nämlich von den alten durch Bildung neuer Zahnhöhlen abgesetzt. Diese erscheinen zuerst als schwache Vertiefungen in der innern Wand der alten Zahnhöhlen, welche, wie der Sack, kürzer sind, und sich viel weniger weit vom Zahnhöhlensande erstrecken, als die der früher vorhandenen. Allmählich steigt vom Boden aus gegen die Mündung der Zahnhöhle eine Leinwand, doch hängen beide Zahnhöhlen noch immer durch eine beträchtliche Oeffnung zusammen, durch welche der, beide verbindende Strang tritt. Die Verlängerung und das Fortwerden von diesem rührt von dem Wachsthum der Zähne in die Höhe her.

Die Oeffnungen zwischen den Schneide- und Eckzähnen an der hintern Fläche der Kiefern sichtbar. Die des innern Weichzahnnes entspricht der Höhle des innern Weichschneidezahnnes,

zahn, die des äußern liegt zwischen der Höhle des äußern Wechselschneidezahns und der des Wechseleckzahns, die des bleibenden Eckzahns hinter der Höhle des Wechseleckzahns. Die Verbindungsöffnungen der vordern Backzähne mit den Höhlen der Wechselbackzähne sind nach mehreren Anatomen<sup>1)</sup> nicht außen sichtbar, sondern befinden sich im Boden der letztern; allein in der That liegen sie, wie die erstern nach innen und hinten von der Zahnhöhlendöffnung des Wechselzahns, und sind nur enger als sie<sup>2)</sup>. Auf dieselbe Weise sprossen die Säcke des zweiten und dritten bleibenden Backzahns, jener von dem äußern Umfange des erstern, später der letztere von dem des zweiten, aus. Die Verbindungsöffnungen ihrer Höhlen befinden sich in dem obern Theile ihrer Scheidewände.

Indem allmählich der Kiefer und die Wechselzähne durch Bildung und Vollendung der Wurzeln an Höhe zunehmen, die bleibenden, sie ersetzenden Zähne nicht in demselben Verhältniß in dieser Richtung wachsen, aber bedeutend breiter als sie sind, kommen die letztern allmählich tiefer, und zum Theil weiter nach außen als die erstern zu liegen. Die innern bleibenden Schneidezähne liegen hinter den innern und einem Theil der äußern Wechselschneidezähne, die äußern bleibenden hinter den letztern und dem Wechseleckzahn, die vordern Backzähne hinter den Wechselbackzähnen, zwischen ihren Wurzeln. Sie berühren durch ihre Kronen fast die Wurzeln der äußern bleibenden Schneidezähne, und die Eckzähne liegen außer der Reihe, weiter vom Zahnhöhlenrande entfernt, und weiter nach vorn als die übrigen.

S. 2124

1) Albin a. a. D. S. 13 — 15. Blake S. 40. Serret S. 38.

2) Meckel a. a. D. S. 558.

## §. 2124.

Im sechsten oder siebenten Jahre nimmt der Zahnwechsel, das Ausfallen der Wechselzähne und der Ausbruch der bleibenden, seinen Anfang. Um diese Zeit verschwindet der Pulsader der Wechselzähne und ihr Kanal mehr oder weniger vollständig<sup>1)</sup>, und die Wechselzähne werden daher nicht mehr ernährt. Gewöhnlich, fast immer, brechen die vordern bleibenden Backzähne weit früher als der eigentliche Zahnwechsel anfängt, hervor, weshalb von Einigen irrig vier und manchmal Wechselzähne angenommen werden. Von den eigentlich ersetzenden Zähnen brechen gewöhnlich die innern tern Schneidezähne zuerst, hierauf die innern obern, dann die äußern, später, ungefähr im 13ten bis 14ten Jahre, meistens zugleich die Eckzähne und die mittlern bleibenden großen Backzähne, zuletzt, zu sehr unbestimmten Zeiten, vom 16ten bis 26sten Jahre, bisweilen weit später, bisweilen gar nicht, die hintersten Backzähne hervor. Ungeachtet also die bleibenden Eckzähne weit früher als die kleinen Backzähne entstehen, scheinen sie doch in der Regel weit später außerhalb der Kiefer, der Zeit nach zwischen ihnen und den hintern Backzähnen, gerade wie die Wechseleckzähne zwischen den beiden Wechselzähnen hervorbrechen.

Die Ordnung, in welcher die Zähne ausbrechen, ist also allgemein für die Wechsel- und bleibenden Zähne dieselbe.

Beide ahmen bleibende Thierbildungen nach.

Das Erscheinen der Schneidezähne vor allen übrigen ist insofern besonders merkwürdig, als es der bei den Fischen besonders, in der That aber bei allen Thieren mehr oder weniger vorherrschenden Entwicklung des Zwischen-

1) Serres S. 19.

Kieferbeines und des ihm entsprechenden mittlern Theiles des Unterkiefers entspricht. Die frühere Entwicklung der untern stellt auf eine merkwürdige Weise die Wiederkehrbildung, und die regelmäßige Anwesenheit der Schneidezähne und Backenzähne ohne Eckzähne die Kagerthierbildung dar.

Die Wechselzähne erleiden, ehe sie ausfallen, große Veränderungen. Ganz allgemein ist es, daß ihre Wurzeln schwinden, und sowohl kürzer als von vorn nach hinten dünner werden, so daß vorzüglich ihr innerer Theil verloren geht, und sie mehr oder weniger zugespitzt werden. Außerdem wird auch ihre Krone häufig durch Eiterung und Brand zerstört, ungeachtet sie, mit Ausnahme ihrer Wurzeln, im Allgemeinen nicht leiden.

Der mehr oder weniger enge Kanal, in welchen anfänglich die Höhle des bleibenden Zahnes ausläuft, so wie die Öffnung desselben erweitern sich allmählich in dem Maße, als sich der Zahn vergrößert, zuletzt wird auch die Scheidewand, welche die Höhle des bleibenden und des Wechselzahnes trennt, zerstört, und beide befinden sich nun wieder auf ähnliche Weise als im Anfange in derselben Höhle, doch mit dem Unterschied, daß der bleibende Zahn wegen ansehnlicherer Größe zugleich zum Theil in die Höhle des benachbarten Wechselzahnes tritt.

Unstreitig hängt von der mechanischen Einwirkung des bleibenden Zahnes auf den Wechselzahn die Zerstörung der Wurzel des letztern nach dem Gesetze ab, daß lange fortgesetzter Druck theils als der Ernährung hindernd, theils den Zerstörungsproceß beschleunigend, das Schwinden von Theilen veranlaßt. Dies ergiebt sich auch theils aus der Stelle, an welcher die Wurzel des Wechselzahnes schwindet, theils aus der Erfahrung, daß Wechselzähne, an deren Stelle kein blei-



## §. 2124.

Im sechsten oder siebenten Jahre nimmt der Zahnwechsel, das Ausfallen der Wechselzähne und der Ausbruch der bleibenden, seinen Anfang. Um diese Zeit verschwindet die Pulsader der Wechselzähne und ihr Kanal mehr oder weniger vollständig<sup>1)</sup>, und die Wechselzähne werden daher nicht mehr ernährt. Gewöhnlich, fast immer, brechen die vordern bleibenden Backzähne weit früher als der eigentliche Zahnwechsel anfängt, hervor, weshalb von Einigen irrig vier und zwanzig Wechselzähne angenommen werden. Von den eigentlich erscheidenden Zähnen brechen gewöhnlich die innern untern Schneidezähne zuerst, hierauf die innern obern, dann die äußern, später, ungefähr im 13ten bis 14ten Jahre, meistens zugleich die Eckzähne und die mittlern bleibenden großen Backzähne, zuletzt, zu sehr unbestimmten Zeiten, vom 16ten bis 26ten Jahre, bisweilen weit später, bisweilen gar nicht, die hintersten Backzähne hervor. Ungeachtet also die bleibenden Eckzähne weit früher als die kleinen Backzähne entstehen, erscheinen sie doch in der Regel weit später außerhalb der Kiefer, der Zeit nach zwischen ihnen und den hintern Backzähnen, gerade wie die Wechselzähne zwischen den beiden Wechselbackzähnen hervorbrechen.

Die Ordnung, in welcher die Zähne ausbrechen, ist also im Allgemeinen für die Wechsel- und bleibenden Zähne dieselbe.

Beide ahmen bleibende Thierbildungen nach.

Das Erscheinen der Schneidezähne vor allen übrigen ist insofern besonders merkwürdig, als es bei den Fischen besonders, in der That aber bei allen Thieren mehr oder weniger vorherrschenden Entwicklung des Zwischen-

1) Serres S. 19.

## §. 2125.

Nach dem Vorigen kommen die Zähne zwar, wie oben bemerkt, durch ihre Mischung und Härte mit den Knochen im Allgemeinen überein; indessen unterscheiden sie sich von ihnen selbst in diesen Hinsichten:

- 1) durch einen weit bedeutendern Grad von Härte;
- 2) durch ein viel festeres Gewebe;
- 3) durch die Zusammensetzung aus einer doppelten Substanz;
- 4) durch einen viel größern Gehalt an erdigten Salzen.

Außerdem entfernen sie sich von ihnen sehr auffallend:

- 5) durch Freiliegen eines großen Theiles ihres Umfangs;
- 6) durch die Art ihrer Verbindung mit dem übrigen Körper, und ihr Verhältniß zum Zahnkerne;
- 7) durch die Art ihrer Entwicklung;
- 8) durch ihren Mangel an Theilnahme an Krankheits des Knochensystems;
- 9) durch Gefäßlosigkeit;
- 10) durch weit größern Widerstand, welchen sie sowohl der Einwirkung chemischer Schärfen, als der von selbst nach dem Tode erfolgenden Zersetzung darbieten.

Dagegen nähern sie alle diese Bedingungen auffallend den Oberhauttheilen, eine Gleichung, welche noch mehr durch die vergleichende Anatomie bestätigt wird.

## II. Regelwidriger Zustand.

## §. 2126.

Nicht selten entfernen sich die Zähne vom Normal. Am häufigsten weicht das Gewebe von der Regel ab. An die Abnormitäten desselben schließen sich, in Hinsicht auf Häufigkeit des Vorkommens, die, welche die Zeit und Folge in der Ent-

Entwicklung betreffen, diesen stehen die der Zahl zunächst. Hierauf folgen die Abweichungen der Stellung und Richtung, endlich die der äußern Gestalt, der Größe und des Zusammenhanges.

#### A. Abweichungen der Form.

##### §. 2127.

1. Abweichungen der Entwicklung. Diese sind unbedeutendsten. Nicht selten erscheinen alle oder einige Zähne ungewöhnlich spät, besonders die hintern Backenzähne, wo es merkwürdig ist, daß ungewöhnliche Verspätung ihres Ausbruches nur eine weitere Ausbildung des Zeitverhältnisses ihres Erscheinens zu dem der übrigen Zähne und dieser unter einander ist. Seltner brechen einige oder alle Zähne ungewöhnlich früh hervor; doch werden bisweilen Kinder selbst mit mehreren schon ausgebrochenen Zähnen geboren. Merkwürdig, doch mit den Gesetzen und übrigen Erscheinungen des Bildungslebens sehr wohl vereinbar, ist es, daß dieses Vorausgehen in der Entwicklung durch längeres Verweilen des Fötus in der Gebärmutter auffallend begünstigt zu werden scheint, indem in verhältnißmäßig vielen Fällen bei neugeborenen Kindern, die nur einige Wochen über den gewöhnlichen Termin verweilten, bei der Geburt einer oder mehrere Zähne ausgebrochen waren.

Ein Verstoß gegen die regelmäßige Entwicklung ist auch das Bleiben der Wechselzähne über die gewöhnliche Periode hinaus, wodurch, indem dadurch nicht der Ausbruch der bleibenden nothwendig gehindert wird, Unregelmäßigkeit in der Stellung der letztern, und der Anschein von regelwidrig vermehrter Zahl veranlaßt wird. Häufiger bleiben die Milch-

zähne, ohne daß bleibende erscheinen, deren Mangel eben der Grund des Beharrens der ersten ist.

Außer diesen quantitativen Entwicklungsverschiedenheiten giebt es auch qualitative, deren Wesen eine Umkehrung der gewöhnlichen Zeitfolge ist. So brechen bisweilen alle untern Schneidezähne hervor, ehe ein oberer erscheint, weit seltner die obern vor den untern, die äußern Schneidezähne vor den innern, die vordern Backzähne vor den äußern Schneidezähnen, die hintern vor den Eckzähnen aus <sup>1)</sup>). Am seltensten erscheinen die Eckzähne früher als die vordern Backzähne, wenn gleich mehrere Schriftsteller diese Ordnung als die Regel oder wenigstens für eben so häufig als die oben beschriebene angegeben haben <sup>2)</sup>).

2. Abweichungen der Zahl. Dieselben Zähne, deren Erscheinung sich am häufigsten regelwidrig verzögert, die hintern Backzähne, brechen auch am häufigsten nie hervor; doch giebt es beinahe keinen, der nicht bisweilen gefehlt hätte <sup>3)</sup>). In einem Falle erschienen in jedem Kiefer nur vier bleibende Zähne, in einem andern im Oberkiefer nur ein Schneidezahn. Selbst der gänzliche Mangel derselben wird bisweilen beobachtet <sup>4)</sup>).

Seltner als Mangel ist Mehrzahl der Zähne, welche, außer der scheinbaren, unter 1. erwähnten, hauptsächlich nach  
zwei

1) Blase S. 25. For S. 7. Serres S. 35.

2) C. Meckel im deutschen Archiv. Bd. 3. S. 573. Auch noch neuerlich Niel im Bulletin de la société médico. d'anat. 1817. p. 94.

3) Beispiele bei For S. 41.

4) For a. a. D.

zwei verschiedenen Typen erscheint. Entweder sind die überzähligen Zähne mit den übrigen zugleich vorhanden, oder sie erscheinen nach ihnen.

Unter ersterer Bedingung stehen sie mit den übrigen in derselben Reihe, oder außer derselben, wodurch dann, wenn sich mehrere finden, eine doppelte Reihe entsteht. Meistens liegen sie weiter nach hinten, also nach dem regelmäßigen Verhältniß der bleibenden zu den Wechselzähnen. Es kommen hier dieselben Verschiedenheiten als bei der regelwidrigen Stellung der Zähne überhaupt vor. Die erste Andeutung des Mehrfachwerdens der Zähne ist wohl das Aus sprossen eines oder mehrerer rundlicher Vorsprünge an der Seite der Krone, die keimtragenden Zähne (*Dentes proliferi*), welches den großen Backzähnen fast eigenthümlich scheint, und insofern als weitere Ausbildung ihres Charakters, der Vielzackigkeit der Krone, merkwürdig ist. Eine höhere Entwicklung hiepon ist die Anwesenheit eigner, von einander getrennter, kleiner, dem Anschein nach aus eignen Keimen entstandner Zähne an einem normalen, deren Zahl in dem einzigen, meines Wissens bekannten Falle, wo ein Eckzahn sich auf diese Weise vervielfacht hatte, sich auf drei belief, welche bedeutend kleiner als der normale, aber alle nach demselben Typus gebildet waren, und an der Grundfläche der Krone, mit ihr in derselben Richtung, aufsaßen <sup>1)</sup>.

Am häufigsten kommen überzählige Zähne im Oberkiefer und vorn, in der Nähe der Eck- und Schneidezähne, vor, eine sehr merkwürdige Bedingung, indem bei mehreren Thieren die

Zahl

<sup>1)</sup> Lemaire deux observations d'anatomie pathologique sur les dents. In Leroux's journal de médec. T. 56. p. 252. Abbild.

Zahl der obern vordern Zähne regelmäßig die der untern übersteigt. Gewöhnlich unterscheiden sie sich von allen normalen durch ihre Gestalt und Größe, indem sie kleiner und keilförmig, bisweilen zweizackig sind. Kommen sie im hintern Theile des Mundes vor, so haben sie mit kleinen Weisheitszähnen Aehnlichkeit. Ihre Zahl variiert. Gewöhnlich finden sich nur wenige, doch wurde bisweilen eine sehr bedeutende Anzahl, in einem Falle bis auf 72, in jedem Kiefer acht Schneidezähne, vier Eckzähne, vier und zwanzig Backzähne \*) beobachtet, was aber vielleicht nicht ganz richtig und als ein gleichzeitiges Beharren der Milch- und Wechselzähne anzusehen ist. Bisweilen scheint auch die Mehrzahl der Zähne in einem Zerfallen zu gründen zu seyn.

Die zweite Art des Mehrfachwerdens der Zähne erhält den Namen des dritten Zahnens, auf welches bisweilen, doch vielleicht auf eine nicht völlig beglaubigte Weise, selbst ein viertes folgt. Die vorzüglichsten Bedingungen dieser merkwürdigen Erscheinung sind folgende:

a) Die Erscheinung der dritten Zähne geschieht unter denselben Zufällen als die der ersten und zweiten.

Die neuen Zähne sind kleiner als die, welche sie ersetzen, und dauern kürzere Zeit, fallen gewöhnlich bald aus.

b) Die Periode ihrer Bildung ist nicht bestimmt; nach einigen Thatfachen aber scheinen sie weit früher zu entstehen als sie ausbrechen. Höchst wahrscheinlich giebt es indessen in dieser Hinsicht individuelle Verschiedenheiten.

c) Gewöhnlich tritt das dritte Zahnen in sehr späten Lebensperioden ein.

d) Das

---

\*) Arnold observ. physio. medio. p. 69.

d) Das Zeitverhältniß der dritten zu den zweiten Zähnen ist nicht immer genau dasselbe, doch erscheinen sie meistens bald nach dem Ausfallen derselben.

e) Es giebt quantitative und qualitative Verschiedenheiten. Gewöhnlicher werden nur einer oder einige, als alle Zähne auf diese Weise gewechselt. Die hintern Backzähne scheinen sich am häufigsten zu erneuern, und, wäre auch diese Annahme unrichtig, so würden sie doch da, wo sie auf diese Weise gewechselt werden, den gewöhnlichen Zahnwechsel nachahmen.

3. Abweichungen der Stellung und Richtung. Diese bieten bedeutende Verschiedenheiten dar.

a) Stellung. Die Zähne entfernen sich in dieser Hinsicht, wenn gleich selten, dadurch von der Regel, daß sie, ungeachtet sie nicht aus der Reihe treten, ihre Stellen vertauschen, was ein Beitrag zur seitlichen Inversion ist. So steht zuweilen der Eckzahn zwischen beiden Schneidezähnen, in andern Fällen der vorderste Backzahn an der Stelle des Eckzahns, und dieser zwischen ihm und dem zweiten <sup>1)</sup>. Bisweilen bilden sich die Zähne auch an ganz ungewöhnlichen Theilen der Kiefer, besonders häufig im Gaumenfortsatz des Oberkiefers, dicht hinter oder weit von den normalen, im Unterkiefer im Winkel. Häufiger springen sie, wegen Enge des Kiefers, vor den übrigen hervor, wo zugleich ihre Richtung weniger senkrecht ist.

b) Richtung. Nicht selten sind die Zähne, vorzüglich wegen Schmalheit des Kiefers, schief, oder mit der Fläche  
nach

---

1) Miel observation sur un cas très rare de transposition des dents. In Leroux's Journal de médec. Tom. 40. 1817. p. 88 ff. mit Abbild.

nach den Seiten, den Rändern nach vorn und hinten, sehr selten dagegen ganz verkehrt mit den Spitzen der Wurzeln gegen den Zahnhöhlenrand, mit den Kronen nach der entgegengesetzten Gegend des Kiefers gerichtet.

4. Abweichungen der Gestalt. Die Gestalt der Zähne weicht auf sehr vielfache Weise von der Regel ab.

a) Für den ganzen Zahn spricht sich diese regelwidrige Anordnung durch Verwachsung zweier benachbarter aus, welche sich entweder durch die ganze Länge desselben, oder nur auf einen Theil, am gewöhnlichsten die Wurzeln, erstreckt).

b) Krone. α. Die Kaufläche der Krone hat bisweilen eine ganz ungewöhnliche Gestalt. Namentlich scheint der erste große Backzahn eine besondere Neigung zur unvollkommenen Ausbildung derselben zu haben, indem ich ihn allein einmal in beiden Kiefern auf beiden Seiten nicht mit großen Backen versehen, sondern durch eine beträchtliche Menge kleiner, unbedeutender Erhabenheiten ungleich fand, eine Bildung, die vorzüglich wegen der Ähnlichkeit mit den Backzähnen des Schweines merkwürdig ist.

β. Uebrigter Umfang. Der übrige Umfang ist, wegen zu geringer Absonderung des Schmelzes, bisweilen nicht glatt, sondern durch rundliche, quere und Längenvertiefungen und Erhabenheiten ungleich<sup>2)</sup>.

Seltner ist die ganze Krone auf eine höchst unregelmäßige Weise so gebildet, als wäre sie von oben nach unten gedrückt und umgebogen<sup>3)</sup>.

c) Wurz.

1) S. mehrere Fälle abgebildet bei For Taf. 8. Fig. 8 — 11.

2) S. Abbild. bei For a. a. O. Taf. 8. Fig. 14.

3) S. Abbild. bei For Taf. 8. Fig. 11 — 12.



a) Wurzeln. Häufiger als die Krone entfernen sich die Wurzeln, vorzüglich durch Mehrfachwerden und nach regelwidrige Richtung, von der Regel.

So haben, doch sehr selten, die obern Backzähne fünf<sup>1)</sup>, die untern vier<sup>2)</sup>, häufiger diese drei, die Eckzähne, selten die Schneidezähne, zwei Wurzeln<sup>3)</sup>.

Die regelwidrige Richtung der Zahnwurzeln steht vorzüglich in zu starker, hakenförmiger Krümmung<sup>4)</sup>, oder in zu schiefer Richtung. Beide Bedingungen kommen vorzüglich an den großen Backzähnen vor, und veranlassen besondere Festigkeit derselben.

5. Abweichungen der Größe. Vorzüglich entfernen sich die obern innern Schneidezähne in Folge eines Bildungsfehlers durch ungewöhnliche Größe von der Regel. Außerdem weicht der Umfang und die Masse des Zahnes auch in Folge krankhafter Höher oder verminderter Energie des Bildungsgeschäftes ab.

Der regelwidrigen Vergrößerung, Hyperostose, sind vorzüglich die Wurzeln<sup>5)</sup> unterworfen; doch vergrößert sich auch bisweilen, wenn gleich seltener, die Krone, und sehr mächtig. Hieher gehört auch mehr oder weniger die Bildung von Knochensubstanz in der Höhle des Zahnes, die entweder mit den Wänden desselben zusammenhängt, oder sich oft in der weichen Substanz desselben findet<sup>6)</sup>.

Der

1) For a. a. D. Fig. 13.

2) Ebendas. Fig. 11.

3) Tesmer obl. osteol. T. 1. F. 1 — 4.

4) S. einen Fall abgebildet bei Lemaire a. a. D. S. 244.

5) Abbild. bei For. Th. 2. Taf. 1.

6) Duval Considérations médic. sur les dents. In Leroux's Journ. de médec. T. 36. Ballet. de la fac. de méd. p. 101.

Der regelwidrigen Vergrößerung steht das Schwinden entgegen. Dieses erstreckt sich, wenn es an der Krone vorkommt, bisweilen bloß auf den Schmelz, und fängt wenigstens hier an, wenn es gleich allmählich sich auch auf die Knochensubstanz erstreckt, ohne daß diese in ihrem Gewebe allseitig und die Höhle bloßgelegt wurde. Vorzugsweise sind die vordern Zähne, und nur an ihrer vordern Fläche, dieser Krankheit, die besonders bei Rachitischen vorkommt, unterworfen.

6. Abweichung des Zusammenhanges. Trennung des Zusammenhanges, Bruch, tritt selten ohne vorangegangene Texturveränderung des Zahnes, wodurch Mürbheit desselben entstanden ist, ein. Unter dieser Bedingung geht ein Stück des Zahnes verloren, und, auch wo dies nicht geschieht, heißt doch der Bruch nicht, wohl aber, wenn der Zahn vorher völlig gesund war. Dies gilt sowohl für Längen- als Querbrüche; indessen heißen nur die Brüche der Wurzel, nicht der Krone, unstreitig, weil die Heilung durch Ausschwizung von Knochensubstanz an der äußern Fläche des Zahnkeimes, nach demselben Gesetze als bei normaler Bildung des Zahnes geschieht. Die äußere, sogenannte Weinhaut des Zahnes scheint daher eben so wenig an der einen, als an der andern Theil zu haben <sup>2)</sup>).

#### B. Abweichungen des Gewebes.

##### §. 2128.

#### 7. Texturveränderungen der Zähne sind:

a) die häufigsten unter allen der Weinfraß, der gewöhnlich von außen nach innen, selten umgekehrt, dringt,

1) Fox a. a. O. On the removing of th Enamel by the denuding process. p. 54 – 57. Taf. 2.

2) Duval sur la consolidation des fractures des dents. In Boudillot journal de medec. T. XIII. p. 275 ff.

welcher mit Zerstörung des Zahnschmalzes anfängt, selten über die Krone des Zahnes hinausdringt, vorzüglich die Backzähne befällt, im höhern Alter selten oder nie vorkommt. Unabhängig von der festen Substanz des Zahnes entzündet, vereitert sich und stirbt der Keim bisweilen ab <sup>1)</sup>, oder seine Entzündung scheint dem Verfraße des Zahnes voranzugehen <sup>2)</sup>.

b) Erweichung der Zähne ist sehr selten ein Theil der allgemeinen Knochenerweichung.

c) Bildung von, mit einer serösen oder mehr dicken Flüssigkeit angefüllten Sälen in der Zahnhöhle, welche theilweise Zerstörung der Wurzel des Zahnes veranlassen.

Das Zahnfleisch ist nicht selten locker, leicht blutend.

Regelmäßige Vergrößerung und Auflockerung desselben ist die Epulis, ein Name, womit indessen sehr verschiedene Veränderungen des Gewebes belegt werden.

#### Zweite Unterabtheilung.

**Hals- und Brusttheil der Verdauungswerkzeuge <sup>3)</sup>.**

#### §. 2129.

Der Hals- und Brusttheil der Verdauungswerkzeuge sind weit einfacher als der Kopftheil, und werden bloß durch das einfache Rohr des Schlundkopfes und der Speiseröhre gebildet, von welchen der erstere am hintern Ende der Mund-

1) Duval Considér. médic. sur les dents. Journal de médec. T. 36. p. 99. 100.

2) Serres C. 51.

3) H. Fabricius ab Aquapendente de gula et ventriculo. Patav. 1618. 4.

J. Fantonus de gula et ventriculo. Taur. 1742.

Meckel's Anat. 4. Th.

Mund- und Nasenhöhle seinen Anfang nimmt, in die letztere ununterbrochen übergeht, diese sich eben so unmittelbar den Magen überbiegt.

# I. Regelmäßiger Zustand.

## A. Schlundkopf 1).

§. 2130.

Der Schlundkopf (Pharynx) steigt von der Grundfläche des Schädels und dem Rachen bis zum untern Ende des Kehlkopfes, oder dem fünften Halswirbel gerade herab, und ist im Durchschnitt vier Zoll Länge, in seinem obern, weichen Theile im Zustande mittlerer Ausdehnung einen Zoll im Durchmesser. Unterhalb dieser Stelle verengt er sich beträchtlich, wird darauf wieder weiter, verengt sich dann wieder einmal, auf's Neue verengt, in die Speiseröhre überzugehen.

Er liegt mit seiner hintern, geraden Fläche dicht vor den fünf obern Halswirbeln, auf den hier befindlichen weichen Halsmuskeln, hinter der Mundhöhle und dem Kehlkopf zwischen den großen Gefäß- und Nervenstämmen am Hals.

Sein oberer Theil oder sein Gewölbe (Fornix) ist durch Zellgewebe an die untere Fläche des Grundbeinkörpers und des Felsentheiles des Schlafbeins, unter welcher er liegt gebunden, der ganze Schlundkopf durch die nachher zu beschreibenden Muskeln an verschiedene Stellen des Kopfes geheftet. Oben und hinten öffnen sich die hintern Nasendächer, unten und vorn die Mundhöhle, hinten und zur Seite die Othrympete in seinen Anfang, der durch den weichen Gaumen gewissermaßen in zwei Gänge, einen hintern und einen vordern gespalten erscheint.

§. 2131.

1) Santorinus de pharynge. Obs. anat. Cap. VII.

## §. 2131.

Zu äußerst wird er durch eine dünne, zellige Schicht umgeben, wodurch er locker an die benachbarten Theile geheftet wird.

Hierauf folgt, von dieser leicht trennbar, eine Lage von sehr reichlich angefülltem Zellgewebe, worin sich die Nerven- und Gefäßstämme verbreiten, welche an seine eigenthümlichen Häute dringen, und die mit der darunter befindlichen Muskelhaut eng verbunden ist.

## §. 2132.

Die Muskelhaut des Schlundkopfes wird vorzüglich aus der Schlundkopfschnüre (Constrictores pharyngis)<sup>1)</sup> gebildet, die man in drei, den obern, mittleren und untern zerfallen kann. Gemeinsame Bedingungen derselben sind:

1) Sie umgeben den Schlundkopf nur von der Seite und hinten, und heften sich mit ihren seitlichen Enden an die benachbarten, vor dem Schlundkopfe liegenden harten Theile, namentlich mehrere Antlitz- und Schädelknochen, das Zungenbein und den Kehlkopf.

2) Sie bestehen aus Fasern, welche von unten und der Seite nach oben und innen verlaufen, und hier von beiden Seiten in der Mittellinie zusammenstrahlen.

3) Sie bedecken einander von unten nach oben zum Theil.

4) Sie sind der Willkühr unterworfen.

D 2

L. 118

1) Santorini septemdecim tabulae. Tab. VI.

2) Die Säckchen erscheinen schon sehr früh. Um die zehnte Woche schon gehen in jeder Hälfte des Ober- und Unterkiefers deutlich vier, zwei vordere kleinere, zwei hintere größere, die je zwei dicht zusammen stehen, unter denen aber die vordern von den hintern durch eine ansehnliche Lücke getrennt sind, hervor. Nach Ablauf des dritten Monats findet man immer zwischen diesen beiden Paaren einen fünften Sack, im Ganzen also zwanzig. Schon am Ende des vierten hat sich gewöhnlich nach hinten überall ein sechster, für den vordersten bleibenden Backzahn gebildet.

3) Anfangs enthalten diese Säckchen bloß eine Flüssigkeit, die anfänglich röthlich, dann weißlichgelb wird. Bald aber, schon im vierten Monat, wächst von dem Boden des innern Blattes ein weicher, allmählich erhärtender, röthlicher Körper, der Zahnkeim (*Pulpus dentis*) empor. In diesem verbreiten sich vom Boden aus, in reichlicher Menge, Gefäße und Nerven, und er selbst scheint in seinem Umfange mit einer gefäßreichen Membran bekleidet, die sich aber nicht leicht von seiner Substanz trennen läßt. Er ist anfangs sehr niedrig und überall einfach, rundlich spiz, nimmt aber bald die Gestalt der verschiedenen Zähne an, stellt dieselbe ganz genau dar, und ist in der That die Form, der Kern, nach und um welchen sich der Zahn selbst bildet. Er entwickelt sich so, daß der freie Theil, welcher der Krone entspricht, sich zuerst bildet, diese allen ihren Erhabenheiten und Vertiefungen nach schon völlig ausgewirkt ist, während von dem übrigen Theile noch gar nichts vorhanden ist.

Um die Mitte der Schwangerschaft nimmt die Verknöcherung der Zähne ihren Anfang. Auf der freien Fläche des Kiefers erscheinen sehr zarte, dünne, feine, elastische Scherben,  
die

die anfangs weicher sind, und allmählich fester und dicker werden. Sie sind hohl, sehr niedrig, und erscheinen an den höchsten Stellen des Zahnkeims zuerst, so daß sie die Spitzen der künftigen Zähne darstellen. Auf einer jeden Spitze entwickelt sich ein Scherbchen, die erst allmählich zusammenfließen. Vom Keim ist nur ein Theil der Krone gebildet, wenn sich schon diese Scherbchen zu entwickeln anfangen. Sie umschließen den Theil des Zahnkeimes, welchen sie umgeben, sehr genau, so daß man sie nur mit einiger Gewalt von demselben trennt; doch erscheint ihre innere und die äußere Fläche des Zahnkeimes ganz glatt, die Schwierigkeit der Trennung rührt nur von der genauen Umschließung des Zahnkeims durch das Scherbchen her, wie sich deutlich daraus ergibt, daß, wenn jener nur erst an einer Stelle herausgezogen ist, der ganze Keim sehr leicht heraustritt, und es ist daher höchst unwahrscheinlich, daß ein Zusammenhang durch Gefäße, Schleimgewebe oder überhaupt irgend eine Substanz zwischen dem Keim und dem Knochenheil des Zahnes Statt findet. Merkwürdig ist es dagegen, daß der Keim, so weit er mit Knochensubstanz bedeckt ist, bedeutend röthler als in seinem übrigen Theile ist, und daß sich die Ausbreitung dieser Röthe genau nach dem Umfange der Verknöcherung richtet.

Die Scherbchen werden bald an der zuerst gebildeten Stelle, an der Kaufläche, am dicksten. Nach hinten laufen sie sehr dünn zu, und sind zugleich weicher. Allmählich vergrößert sich die Krone und bildet sich vollkommen aus. Ihr zusammengezogenes unteres Ende wird zum Halse. Die Wurzeln bilden sich als Verlängerungen der Krone so, daß auch hier der Keim des Zahnes sich durchaus vorher auf dieselbe Weise gestaltet. Die Zahl der Wurzeln wird, auch wenn der Keim nur noch

die Zahnkrone darstellt, doch schon durch die Zahl der von den Zahngefäßen abgesonderten Zweige angedeutet.

Die Knochensubstanz bildet sich von außen nach innen, so daß die zuerst entstehenden Spizchen die sind, welche beständig frei liegen, und die Kaufläche, so wie der ganze vorhandne Theil des Zahnes schon seine vollkommne Größe hat, während er noch äußerst dünn und seine Höhle sehr groß ist. Diese Erscheinung beweist wohl mit Bestimmtheit, daß der Knochentheil des Zahnes nicht von der innern Fläche der Kapsel, sondern von der äußern des Keimes aus gebildet wird, indem sonst das Gegentheil Statt finden würde. Allmählich verdickt sich der Knochentheil und in demselben Maasse schwindet der Zahnkeim und die Höhle im Zahne, ohne daß man doch eine Verknöcherung des Zahnkeimes annehmen könnte.

Bald nach, oder zugleich mit der Entstehung der Knochenscherbchen nimmt die Absonderung des Schmelzes ihren Anfang. Er wird von der innern Fläche des innern Blattes abgesondert, welche sehr genau die Krone des Zahnes umgiebt, indem sie sich überall zwischen die Erhabenheiten und Vertiefungen derselben verlängert. Aus der Flüssigkeit, welche diese Membran absondert, schlägt sich der Schmelz auf dem Knochentheile des Zahnes nieder, und ist noch beim reifen Zustande so weich und locker auf denselben angelagert, daß er leicht weggenommen werden kann. Auch springt er unter gewissen Umständen, besonders durch Einwirkung von Hitze, daher auch im vollkommenen Zustande leicht vom Knochentheile ab. Ein eigener drüsiger Apparat zur Absonderung des Schmelzes findet sich nicht, doch trennen sich die Verlängerungen des innern Blattes leicht von demselben ab. Diese, welche von dem, an das Zahnfleisch gehefteten Theile der Kapsel entstehen, sind  
an



anfänglich sehr dick, feucht, und schwinden allmählich in demselben Verhältniß als sich die Schmelzbildung vollendet. Wirklich bilden sie einen Keim für diesen, wie vom Boden der Kapsel ein länger bestehender für den Knochentheil des Zahnes empornwächst.

Die verschiedenen Arten der Zähne verknochern in Hinsicht auf Zeit und äußere Form nicht genau nach demselben Typus. Zuerst erscheinen die innern Schneidezähne, zuletzt die hintern Backzähne. In Bezug auf die zwischen ihnen liegenden verhalten sich die Wechselzähne etwas anders als die bleibenden. Die Schneidezähne und Eckzähne entstehen aus einem Scherbschen, die Backzähne aus mehreren, die kleinen aus zweien, die großen aus vier bis fünf. Immer bildet jedes Scherbschen bei seinem Entstehen ein niedriges Dreieck, hat also ungefähr die Form, welche der Krone des Eckzahnes beständig zukommt. Bei den Schneidez- und Backzähnen breiten sich diese Scherbschen aus, und bekommen bei den erstern zwei Nebenspitzen, die aber nicht als eigne Scherbschen entstehen. Unter den verschiedenen Scherbschen der Eckzähne entstehen die äußern peripherischen und vordern am frühesten, dann die innern, bei den großen hintern Backzähnen folgt auf das vordere äußere das vordere innere, dann in derselben Ordnung das zweite Paar. Nach demselben Gesetz geschieht auch die Vereinigung der verschiedenen Scherbschen, so daß auch durch seine Entwicklung der große Backzahn als eine Zusammensetzung aus zwei kleinen erscheint.

Die untern entstehen vor den obern und bilden sich früher als sie. Beim reifen Fötus sind die einzelnen Scherben des

---

1) Hérisson in *Mém. de Paris* 1754.

hintern, vordern, untern Wechselbackzahns gewöhnlich schon ganz vereinigt, die des obern noch nicht. In einem Falle, wo der erste bleibende untere, schon fünf Knochenscherben hatte, fand ich am obern nur drei.

§. 2118.

Wann ist die Bildung des Zahnes vollendet? Bestimmt noch nicht zur Zeit des Ausbruches, indem er vor der vollkommenen Ausbildung der Wurzel durch das Zahnfleisch dringt. Es fragt sich aber, ob er, nachdem die Wurzel vollendet ist, noch weitere innere Veränderungen erleidet?

Als Gründe für diese Ansicht giebt man an:

1) Die Veränderung des Zahnes durch den Genuß von Färbendrüthen;

2) das Hervorragen eines Zahnes über die übrigen nach Wegnahme des ihm im entgegengesetzten Kiefer gegenüberstehenden;

3) die Heilung der Zahnbrüche;

Für die fortwährende Wiedererzeugung des Schmelzes führt man insbesondere an, daß:

4) krankhafte, in denselben eintretende Veränderungen, namentlich schwarze Flecke, welche weggenommen wurden, und nicht wieder erschienen, als eine ableitende Krankheit entstand <sup>1)</sup>.

5) Die Dauer des Schmelzes, welche sich bei der beständigen Reibung nur durch beständig Statt findende Wiedererzeugung erklären lasse <sup>2)</sup>.

Allein gegen diese Gründe läßt sich einwenden:

1) Daß

1) Hirsch'a. a. D. S. 17.

2) Ebenbaselbst.

1) Daß die Färbung der Knochen überhaupt durch Farbstoffe nichts für den beständig in ihnen vorgehenden Stoffwechsel beweist <sup>1)</sup>).

2) Daß unter den angeführten Umständen wahrscheinlicher richtig eine Vergrößerung, als ein Hervordringen des Zahnes aus der Zahnhöhle anzunehmen sey, überhaupt die Erscheinung beim Menschen und den meisten Säugethieren gar nicht Statt findet, wenn sie gleich bei den Nagethieren <sup>2)</sup>, sogar abgeschnittenen und ausgerissenen Zähne sich wiedererzeugen, tritt.

3) Die Heilung der Zahnbrüche beweist nicht geradezu einen beständigen Stoffwechsel in der Zahnsubstanz, sondern nur, daß unter regelwidrigen Bedingungen der Zahnkeim, wie früher die Knochensubstanz in seinem Umfange absonderte, auch einen erlittenen Verlust ersetzen kann.

4) In den angeführten Krankheitsfällen ist durchaus nicht bewiesen, daß sich der Schmelz wirklich wiedererzeugt.

5) Die Dauer des Schmelzes rührt von seiner Festigkeit her.

Die Gründe für die beständige Bildung der Zähne überhaupt und des Schmelzes insbesondere sind mithin nicht bewiesen.

Vielmehr beweist schon die bei 2) angeführte Thatsache gegen,

Eben

---

1) R. Gibson on the Effect of Madder Root on the Bones of Animals. In mem. of the literary Society of Manchester. Second Series. Vol. I. p. 146—164. Uebersetzt im deutschen Archiv Bd. 4. Hft. 4.

2) Lavagna off. sulla carie dei denti. Genova. 1812.

Eben so wird diese Ansicht unwahrscheinlich durch die Entstehungsweise des Schmelzes.

§. 2119.

Einen nicht unbeträchtlichen Theil des Lebens hindurch, außer der ganzen Fötusperiode, gewöhnlich wenigstens während der sechs ersten Monate nach der Geburt, sind die Zähne wenigstens nicht äußerlich sichtbar.

Ihre Stelle nimmt während dieser Periode eine sehr hart, wirklich knorplige, zugespitzte, mehrfach eingeschnittene, einige Linien hohe, vom Zahnfleisch ganz verschiedene Erhabenheit ein, welche sich von den Zahnhöhlenrändern erhebt, die Function der Zähne, namentlich das Festhalten der Brustwarzen, in der ersten Lebenszeit übernimmt, und zweckmäßig den Namen des Zahnknorpels (*Cartilago dentalis*) erhalten kam. Sie ist sehr merkwürdig, indem sie dem Hornschnabel der Vögel und Reptilien analog ist. In dem Maas als die Zähne sich entwickeln und hervorbrechen, schwindet diese Substanz.

In ihr befinden sich, vorzüglich in der Gegend der Backenzähne, und nach innen, an seiner concaven Seite, mehrere, mit einer gelblichen, bröcklichen, ziemlich festen Substanz ausgefüllte Wälge von verschiedener Größe, höchstens dem Durchmesser einer halben Linie, welche sich mit keiner deutlichen Mündung nach außen öffnen, und zuerst von Cuvier angegeben worden sind <sup>1)</sup>. Sie erweichen nach ihm das Zahnfleisch des Kindes vor dem Ausbruche der Zähne, und sondern später den Weinstein ab. Indessen habe ich diese Wälge immer nur gegen die Zeit des Zahnausbruchs wahrgenommen, und habe

fe

1) N. a. D. C. 28 — 33. Taf. 4. Fig. 6.

sie daher bis jetzt noch vielmehr für, durch den Reiz der hervordringenden Zähne entstehende, neue Bildungen, die wahrscheintlich nichts anders als Abscesse sind.

S. 2120.

Die bleibenden, so wie die Wechsellähne erleiden im Laufe des Lebens an ihrer Kaufläche im Allgemeinen mehr oder weniger bedeutende Veränderungen. Der Schmelz wird allmählich mehr oder weniger abgerieben, so daß die Knochensubstanz des Zahnes bloßgelegt, daher die Kaufläche, die anfänglich ganz aus Schmelz bestand, jetzt aus diesem und Knochensubstanz gebildet wird, nachdem die anfangs scharfen Ränder und Spitzen stumpf geworden sind. Wenn die allmähliche Abreibung noch weiter geht, so daß die Knochensubstanz bis auf die Höhle des Zahnes zerstört, und diese daher geöffnet werden würde, erzeugt sich im Allgemeinen in demselben Verhältniß in dem obern Ende dieser Höhle eine bräunliche, der Knochensubstanz ähnliche, doch etwas weichere Substanz, welche die Höhle verschließt, und die in ihr enthaltenen Theile schützt <sup>1)</sup>. Auch diese Erscheinungen kann man als Gründe gegen die beständige Wiedererzeugung des Schmelzes anführen.

Allmählich vermindert sich indessen die Ernährung der Zähne, selbst ihre Ernährungslöcher verschließen sich. Ihre Verbindung mit den Zahnhöhlen wird aufgehoben, sie wackeln und fallen aus. Die Zahnhöhlen sinken zusammen, der ganze Zahnhöhlenrand schwindet, nachdem das Zahnfleisch die Öffnungen der Zahnhöhlen verschlossen hatte.

β. Ver

1) Hunter a. a. O. S. 108 ff.

Prochaska Obl. de decremento dentium. In Annot. acad. Fasc. I.

## §. Besondere Betrachtung.

## §. 2121.

Die verschiedenen Zähne durchlaufen die verschiedenen Perioden, welche oben im Allgemeinen beschrieben wurden, nicht zugleich, sondern auf eine sehr regelmäßige Weise, mehr oder weniger nach einander. Im Allgemeinen läßt sich festsetzen, daß 1) die verschiedenen Perioden nach demselben Gesetze verlaufen, so daß der Keim des Zahnes, dessen Säckchen zuerst erscheint, sich auch zuerst bildet, verknöchert und hervorbricht;

2) die gleichnamigen Zähne desselben Kiefers einander auch in dieser Hinsicht sehr genau entsprechen;

3) die untern Zähne sich vor den obern, die vordern vor den hintern ausbilden;

4) auf eine merkwürdige Weise die allmähliche Entwicklung der Zähne beim Menschen bleibenden Formen in der Reihe der Säugethiere entspricht.

## A. Wechselzähne.

## §. 2122.

Die Milchzähne entstehen, nach dem ersten Gesetze, noch früher als die bleibenden. Die Zeit, um welche sich ihre Säckchen bilden, so wie die Ordnung, in welcher diese erscheinen, ist schon oben (§. 214.) angegeben. Die beiden innern Säckchen sind die der Schneidezähne, die äußern die der Backzähne, der fünfte mittlere der des Eckzahnes.

Die Verknöcherung fängt zuerst im fünften Monate am innern Schneidezahne, am untern etwas früher als am obern, an, hierauf folgt der äußere Schneidezahn, darauf der vordere Backzahn. In diesen dreien findet man

an das Ende des fünften Monats zugleich Knochensubstanz, während von den beiden übrigen noch bloß der Keim vorhanden ist. Ob der Eckzahn oder der hintere Backzahn früher ausbricht, kann ich bis jetzt noch nicht mit völliger Gewißheit aussagen, da ich, einen einzigen Fall ausgenommen, immer entweder in beiden die Knochenkerne zugleich fehlend, oder vorhanden sehe; indessen verändere ich wahrscheinlich der letzteren, indem ich theils in einem Falle in ihm, nicht aber im hintern Backzahn einen Knochenkern fand, theils seinen Knochenkern immer größer als den des hintern Backzahns sah, als er früher als dieser ausbricht. Doch erheben besonders die beiden letzten Umstände meine Vermuthung keinesweges in Gewißheit.

Schon im siebenten Monate des Fötuslebens entstehen alle Wechselsähne Knochenkerne <sup>1)</sup>).

Die Zahl und Anordnung der eignen Knochenstücke, aus welchen sie sich bilden, ist nicht immer ganz genau dieselbe.

Nach Hunter <sup>2)</sup> und Rudolphi <sup>3)</sup> entstehen die Schneidezähne aus drei Stücken, einem mittlern größern, und zwei seitlichen kleinern; die Eckzähne nach Hunter aus einem Stück, nach Rudolphi aus zwei Seitenhälften; von den Backzähnen nach beiden der vordere aus einem vordern, und einem oder zwei hintern Stücken, der hintere aus einem vordern und mehreren hintern Stücken; indessen redet Hunter, wenn

1) Blake essay etc. p. 23. sagt nur, daß er bei einem achtmonatlichen Fötus in allen Zähnen Knochensubstanz gefunden habe.

2) N. a. D. S. 88.

3) Ueber die Zähne. In dessen anat. physiol. Untersuchungen. S. 126 ff.

wenn er gleich nach Beobachtungen zu sprechen scheint, nur kurz über diesen Gegenstand, und Rudolphi's Angaben sind nicht das Resultat von Untersuchungen über die Entwicklung der Fötuszähne, sondern bloß von Behandlung ausgewählter Zähne mit Säuren, wobei sie in die angegebne Zahl von Stücken zerfielen. Ich habe bei vielfältigen Untersuchungen der erstern Art die Schneide- und Eckzähne sich immer nur aus einem Stück bilden gesehen, welches sich von der Wurzel allmählich nach beiden Seiten ausbreitete, und muß daher für jetzt jene, aus der Behandlung mit Säuren gezogenen Schlüsse um so mehr als nicht mit der Natur übereinstimmend erachten, da auch andre, z. B. Albin<sup>1)</sup>, Blake<sup>2)</sup> ausdrücklich bemerken, daß die Schneide- und Eckzähne sich nur aus einem Stücke bilden. Dagegen entstehen die Backzähne wirklich aus mehreren, denn jedes für sich auf eine merkwürdige Weise mit dem ersten Rudiment eines einfachen Schneide- oder Eckzahnes übereinkommt. Zuerst entsteht, auch mit diesen, und besonders bei Schneidezähnen übereinkommend, das vordere größere Stück, welches anfangs verhältnismäßig zu seiner Höhe weit schmaler als späterhin ist, dann ihm gegenüber ein weit kleineres, welches sich allmählich ausbreitet, und entweder unmittelbar, oder auf der einen Seite durch ein drittes, noch später entstehendes mit dem ersten verbindet. Der zweite Backzahn entsteht regelmäßig wenigstens aus drei, meistens aus vier Stücken, einem vordern, zwei seitlichen, und einem hintern, von welchen das vordere immer das größere ist.

---

1) De dentium ortu et incremento. In Annot. zood. L. II. C. II. p. 16.

2) H. a. D. S. 6.



Alle einzelnen Stücke sind, mit Ausnahme eines kleinern 8 hintern Backzahns, bei der Geburt schon gewöhnlich zu dem Ganzen verbunden.

Um diese Zeit sind der erste und zweite Schneidezahn unfähig gleich weit, der ganzen Krone nach, entwickelt, ihnen nächst steht der Backzahn, dessen Krone indessen noch nicht die vollkommne Höhe hat; hierauf folgt der Eckzahn. Am vollkommensten ist der hintere Backzahn, der, auch abgesehen von der Trennung eines Theiles von der übrigen sehr unregelmäßigen Krone, an einer oder mehreren Stellen, in der mittleren Gegend derselben, ansehnliche Lücken hat. Die unteren Backzähne bestehen indessen schon beim reifen Fötus aus selten aus einem Stück, und in beiden Kiefern verschwinden diese Trennung und die erwähnten Lücken schon in den ersten Monaten nach der Geburt.

Der Ausbruch der Wechselzähne fällt gewöhnlich in den Anfang des siebenten Lebensmonates. Gewöhnlich erscheinen zuerst die innern Schneidezähne, diesen folgen nach wenig Wochen die innern oberen, einen bis zwei Monate nachher die äußern untern und oberen, nach Ablauf des ersten Jahres die äußern untern Backzähne, bald darauf die vordern oberen, im achtzehnten Monat die untern, bald nachher die äußern Backzähne, um das Ende des zweiten Jahres die hintern Backzähne, so daß im dritten Jahre alle Wechselzähne ausgebrochen sind.

Den Wechselzähnen gehört eine eigne Pulsader an, welche als ein Ast der Zahnpulsader in einem eignen Kanale des Kiefers verläuft, in welchen sie durch eine abgesonderte Öffnung tritt \*).

\*) Serres C. 16 ff.  
Rafel's Anat. 4. Th.

## B. Bleibende Zähne.

## §. 2123.

Die bleibenden Zähne entstehen und brechen ungefähr in derselben Ordnung hervor als die Wechselzähne, nur durchlaufen sie alle Perioden weit langsamer. Am frühesten, schon vor Ablauf der ersten Schwangerschaftshälfte, erscheint der Balg des vordern bleibenden Backzahns, erst im Anfange des achten Monates bilden sich die der Schneidezähne, dann der des Eckzahns, darauf der des mittlern großen Backzahns, erst einige Monate nach der Geburt, selten vor dem siebenten bis achten, der Balg des vordern kleinen Backzahns, darauf der des hintern kleinen Backzahns, im vierten Jahre gewöhnlich der Balg des dritten, hintersten großen Backzahnes. Die Keime entstehen fast zugleich mit den Wälgen.

Die Verknöcherung nimmt zuerst im vordersten großen Backzahn den Anfang. Gewöhnlich trägt im letzten Schwangerschaftsmonat und noch am Ende desselben seine vordere äußere Spitze ein Knochenscherbchen, welchem sich allmählich vier bis fünf andre, einzelne zugesellen, die nicht vor Ablauf des ersten Jahres zu einer Scherbe zusammengefloßen sind; doch habe ich einigemal bei sehr großen, reifen Fötus schon fünf Knochenscherbchen, immer indessen noch ganz von einander getrennt, und die hintern noch sehr klein, gefunden.

Die bleibenden Zähne stehen nicht alle in demselben Ortsverhältniß zu den Wechselzähnen. Die drei hintern Backzähne liegen mit ihnen in derselben Reihe, weiter nach außen, diejenigen dagegen, welche eigentlich die ausfallenden ersetzen, zwischen ihnen und der hintern Wand der Zahnhöhlen, die Schneidez-, Eck- und vordern Backzähne hinter ihnen. Anfangs sind die Säcke der bleibenden Zähne mit denen der alten in der  
selben

den Zahnhöhle enthalten. Ihre Entstehungsweise ist sehr merkwürdig. Sie gehen von dem obern und hintern Theile : schon vorhandenen Zahnsäcke ab, sprossen also gewissermaßen durch Zeugung von ihnen aus, und sitzen anfangs unmittelbar auf ihnen auf, hängen auch noch später, wenn sich Säcke der bleibenden Zähne verlängern, durch dünne, lange Stränge mit ihnen zusammen. Indessen findet, nach meinen Untersuchungen, ein solcher Zusammenhang nur zwischen den äußern Blättern der Zahnsäcke Statt, die innern wesentlichen Ätzer sind völlig von einander getrennt, der neue innere Hofsack entwickelt sich daher an dem alten, zwischen ihm und dem äußern Blatte, ohne daß je ihre Höhlen zusammenhängen. Wenigstens mußte ein solcher Zusammenhang in eine äußerst frühe Periode fallen, indem ich ihn bei mehrfacher genauer Untersuchung auch beim ersten Erscheinen der Säcke der bleibenden Zähne nie entdecken konnte. Die neuen Wölge werden allmählich von den alten durch Bildung neuer Zahnhöhlen abgetrennt. Diese erscheinen zuerst als schwache Vertiefungen in der obern Wand der alten Zahnhöhlen, welche, wie der Sack, viel kürzer sind, und sich viel weniger weit vom Zahnhöhlensande erstrecken, als die der früher vorhandenen. Allmählich hebt sich vom Boden aus gegen die Mündung der Zahnhöhle eine Leinwand, doch hängen beide Zahnhöhlen noch immer durch eine ansehnliche Oeffnung zusammen, durch welche der, beide verbindende Strang tritt. Die Verlängerung und das Innerwerden von diesem rührt von dem Wachsthum der Kiefer in die Höhe her.

Die Oeffnungen zwischen den Schneide- und Eckzähnen sind an der hintern Fläche der Kiefer sichtbar. Die des innern Schneidezahnes entspricht der Höhle des innern Wechselschneidezahnes,

Durchmesser, und hat überall, höchstens die etwas enger Stelle, wo er durch das Zwerchfell tritt, ausgenommen, gleiche Weite.

Seine Muskelhaut ist beträchtlich, im Allgemeinen wenigstens eine Linie dick.

Sie besteht sehr deutlich aus einer äußern longitudinalen und einer innern queren Schicht, von welchen die erstere doppelt so dick als die letztere ist. Die Längenfaser nehmen ordentlich mit drei Köpfen oder Bündeln ihren Anfang, einem mittlern und zwei seitlichen. Der mittlere entspringt durch eine Sehne von der Mitte der hintern Fläche des Ringknorpels, dicht unter dem obern Rande desselben, und breitet sich absteigend aus. Die beiden seitlichen gehen fleischig von dem untern Rande des untern Schlundkopfschnürrs ab. Alle vereinigen sich erst einige Zolle unter dem obern Ende zur Bildung einer vollständigen Muskelhaut.

Die Kreisfasern sind eine Fortsetzung des hintern innern Theiles des untern Schlundkopfschnürrs, allein viel dünner als er.

Die obersten verlaufen quer, die darauf folgenden steigen schräg von oben und außen nach unten und innen herab, kreuzen sich mit denen der andern Seite, und bilden Spirallinien, die untern wieder mehr gerade Ringe. In der Höhe eines Zolles, vom obern Ende der Speiseröhre an, fehlen die Kreisfasern an der vordern Fläche ganz, und, da hier auch die Längsbündel noch nicht vereinigt sind, so ist die Speiseröhre hier an ihrer vordern Fläche weit weniger muskulös und ausdehnbarer als in ihrem übrigen Verlauf.

Auf die Muskelhaut folgt die Zell- oder Gefäßhaut, welche mit ihr nur sehr locker, dagegen mit der darauf folgenden

den Zottenhaut fest verbunden ist, und mit ihr ein inneres, ziemlich leicht von der Muskelhaut trennbares Rohr bildet. In ihr befinden sich eine ansehnliche Menge von dicht an einander liegenden, aus kleinern Körnchen zusammengesetzten Schleimdrüsen, deren Zahl und Größe nach unten zunimmt.

Die innere oder Zottenhaut der Speiseröhre ist weiß, ziemlich fest, an der innern Fläche mit einer Menge feiner Längenfurchen, welche durch Zwischenwände abgetheilt werden, versehen. Diese Haut muß keinesweges mit der vorigen als eine angesehen werden<sup>1)</sup>.

In ihrer innern Fläche befindet sich eine dünnere, zartere, feuchte Bedeckung, offenbar eine Oberhaut, welche unten an der Uebergangsstelle in den Magen plötzlich aufhört. Durch Kochen und Maceration läßt sie sich ziemlich leicht in einzelnen Stücken, schwerer als zusammenhängende Membran, darstellen, Krankheitszustände ausgenommen, wo sie eine größere Festigkeit und Dicke bekommt. Auch außerdem findet man sie gewöhnlich am untern Ende der Speiseröhre, bald nach dem Tode stellenweise von unten nach oben getrennt, unstreitig, weil die von den Drüsen der Speiseröhre und des linken Magenmundes abgesonderte Feuchtigkeit sie und das lockere Zellgewebe, wodurch sie mit der Zellschale verbunden ist, auflöst.

Q 5

§. 2140.

1) Sömmerring (Eingeweibl. S. 216.) beschreibt beide als eine unter dem Namen der innern Gefäß- oder Drüsenhaut, und sagt, daß die innere und die Gefäßhaut des Magens in sie übergehn (S. 233.); in der That geht von diesen die erstere in sie, die zweite dagegen in die Gefäßhaut der Speiseröhre über. Noch weniger richtig sehen andre die Zottenhaut des Magens und Darmkanals als eine Fortsetzung der Oberhaut der Speiseröhre an.

Durchmesser, und hat überall, höchstens die etwas engere Stelle, wo er durch das Zwerchfell tritt, ausgenommen, gleiche Weite.

Seine Muskelhaut ist beträchtlich, im Allgemeinen wenigstens eine Linie dick.

Sie besteht sehr deutlich aus einer äußern longitudinalen und einer innern queren Schicht, von welchen die erstere doppelt so dick als die letztere ist. Die Längenfaser nehmen obengewöhnlich mit drei Köpfen oder Bündeln ihren Anfang, einem mittlern und zwei seitlichen. Der mittlere entspringt durch eine Sehne von der Mitte der hintern Fläche des Ringknorpels, dicht unter dem obern Rande desselben, und breitet sich absteigend aus. Die beiden seitlichen gehen fleischig von dem untern Rande des untern Schlundkopfschnürrers ab. Alle vereinigen sich erst einige Zolle unter dem obern Ende zur Bildung einer vollständigen Muskelhaut.

Die Kreisfasern sind eine Fortsetzung des hintern innern Theiles des untern Schlundkopfschnürrers, allein viel dünner als er.

Die obersten verlaufen quer, die darauf folgenden steigen schräg von oben und außen nach unten und innen herab, kreuzen sich mit denen der andern Seite, und bilden Spirallinien, die untern wieder mehr gerade Ringe. In der Höhe eines Zolles, vom obern Ende der Speiseröhre an, fehlen die Kreisfasern an der vordern Fläche ganz, und, da hier auch die Längsbündel noch nicht vereinigt sind, so ist die Speiseröhre hier an ihrer vordern Fläche weit weniger muskulös und ausdehnbarer als in ihrem übrigen Verlauf.

Auf die Muskelhaut folgt die Zell- oder Gefäßhaut, welche mit ihr nur sehr locker, dagegen mit der darauf folgenden

n Zottenhaut fest verbunden ist, und mit ihr ein inneres, milch leicht von der Muskelhaut trennbares Rohr bildet. In ihr befinden sich eine ansehnliche Menge von dicht an einander liegenden, aus kleinern Körnchen zusammengesetzten Schleimdrüsen, deren Zahl und Größe nach unten zunimmt.

Die innere oder Zottenhaut der Speiseröhre ist eiförmig, ziemlich fest, an der innern Fläche mit einer Menge inner Längenfurchen, welche durch Zwischenwände abgetheilt werden, versehen. Diese Haut muß keinesweges mit der vorhin als eine angesehen werden<sup>1)</sup>.

An ihrer innern Fläche befindet sich eine dünnere, zartere, feuchte Bedeckung, offenbar eine Oberhaut, welche mitten an der Uebergangsstelle in den Magen plötzlich aufhört. Durch Kochen und Maceration läßt sie sich ziemlich leicht in einzelnen Stücken, schwerer als zusammenhängende Membran, darstellen, Krankheitszustände ausgenommen, wo sie eine größere Festigkeit und Dicke bekommt. Auch außerdem findet man sie gewöhnlich am untern Ende der Speiseröhre, bald nach dem Tode stellenweise von unten nach oben abtrennt, unstreitig, weil die von den Drüsen der Speiseröhre und des linken Magenmundes abgesonderte Feuchtigkeit sie und das lockere Zellgewebe, wodurch sie mit der Zellohaut verbunden ist, auflöst.

§ 5

§. 2140.

- 1) Schmörring (Eingeweidl. S. 216.) beschreibt beide als eine unter dem Namen der innern Gefäß- oder Drüsenhaut, und sagt, daß die innere und die Gefäßhaut des Magens in sie übergehn (S. 233.); in der That geht von diesen die erstere in sie, die zweite dagegen in die Gefäßhaut der Speiseröhre über. Noch weniger richtig sehen andre die Zottenhaut des Magens und Darmkanals als eine Fortsetzung der Oberhaut der Speiseröhre an.

Durchmesser, und hat überall, höchstens die etwas engeren Stelle, wo er durch das Zwerchfell tritt, ausgenommen, gleiche Weite.

Seine Muskelhaut ist beträchtlich, im Allgemeinen wenigstens eine Linie dick.

Sie besteht sehr deutlich aus einer äußern longitudinalen und einer innern queren Schicht, von welchen die erstere doppelt so dick als die letztere ist. Die Längensfasern nehmen oben gewöhnlich mit drei Köpfen oder Bündeln ihren Anfang, einem mittlern und zwei seitlichen. Der mittlere entspringt durch eine Sehne von der Mitte der hintern Fläche des Ringknorpels, dicht unter dem obern Rande desselben, und breitet sich absteigend aus. Die beiden seitlichen gehen fleischig von dem untern Rande des untern Schlundkopfschnürrs ab. Alle vereinigen sich erst einige Zolle unter dem obern Ende zur Bildung einer vollständigen Muskelhaut.

Die Kreisfasern sind eine Fortsetzung des hintern innern Theiles des untern Schlundkopfschnürrs, allein viel dünner als er.

Die obersten verlaufen quer, die darauf folgenden schräg von oben und außen nach unten und innen herab, kreuzen sich mit denen der andern Seite, und bilden Spirallinien, die untern wieder mehr gerade Ringe. In der Höhe eines Zolles, vom obern Ende der Speiseröhre an, fehlen die Kreisfasern an der vordern Fläche ganz, und, da hier auch die Längensbündel noch nicht vereinigt sind, so ist die Speiseröhre hier an ihrer vordern Fläche weit weniger muskulös und ausdehnbarer als in ihrem übrigen Verlauf.

Auf die Muskelhaut folgt die Zell- oder Gefäßhaut, welche mit ihr nur sehr locker, dagegen mit der darauf folgenden



n Zottenhaut fest verbunden ist, und mit ihr ein inneres, milch leicht von der Muskelhaut trennbares Rohr bildet. In ihr befinden sich eine ansehnliche Menge von dicht an einander liegenden, aus kleinern Körnchen zusammengesetzten Schleimdrüsen, deren Zahl und Größe nach unten zunimmt.

Die innere oder Zottenhaut der Speiseröhre ist eiförmig, ziemlich fest, an der innern Fläche mit einer Menge inner Längenfurchen, welche durch Zwischenwände abgetheilt werden, versehen. Diese Haut muß keinesweges mit der vorern als eine angesehen werden<sup>1)</sup>.

An ihrer innern Fläche befindet sich eine dünnere, zarte, feuchte Bedeckung, offenbar eine Oberhaut, welche mitten an der Uebergangsstelle in den Magen plötzlich aufhört. Durch Kochen und Maceration läßt sie sich ziemlich leicht in einzelnen Stücken, schwerer als zusammenhängende Membran, darstellen, Krankheitszustände ausgenommen, wo sie eine größere Festigkeit und Dicke bekommt. Auch außerdem findet man sie gewöhnlich am untern Ende der Speiseröhre, bald nach dem Tode stellenweise von unten nach oben abtrennt, unstreitig, weil die von den Drüsen der Speiseröhre und des linken Magenmundes abgesonderte Feuchtigkeit sie und das lockere Zellgewebe, wodurch sie mit der Zellenhaut verbunden ist, auflöst.

§ 5

§. 2140.

- 1) Sömmerring (Eingeweidl. S. 216.) beschreibt beide als eine unter dem Namen der innern Gefäß- oder Drüsenhaut, und sagt, daß die innere und die Gefäßhaut des Magens in sie übergehn (S. 233.); in der That geht von diesen die erstere in sie, die zweite dagegen in die Gefäßhaut der Speiseröhre über. Noch weniger richtig sehen andre die Zottenhaut des Magens und Darmkanals als eine Fortsetzung der Oberhaut der Speiseröhre an.

Durchmesser, und hat überall, höchstens die etwas engeren Stelle, wo er durch das Zwerchfell tritt, ausgenommen, gleiche Weite.

Seine Muskelhaut ist beträchtlich, im Allgemeinen wenigstens eine Linie dick.

Sie besteht sehr deutlich aus einer äußern longitudinalen und einer innern queren Schicht, von welchen die erstere doppelt so dick als die letztere ist. Die Längensfasern nehmen oben gewöhnlich mit drei Köpfen oder Bündeln ihren Anfang, einem mittlern und zwei seitlichen. Der mittlere entspringt durch eine Sehne von der Mitte der hintern Fläche des Ringmuskels, dicht unter dem obern Rande desselben, und breitet sich absteigend aus. Die beiden seitlichen gehen fleischig von dem untern Rande des untern Schlundkopfschnürrs ab. Alle vereinigen sich erst einige Zolle unter dem obern Ende zur Bildung einer vollständigen Muskelhaut.

Die Kreisfasern sind eine Fortsetzung des hintern innern Theiles des untern Schlundkopfschnürrs, allein viel dünner als er.

Die obersten verlaufen quer, die darauf folgenden steigen schräg von oben und außen nach unten und innen herab, kreuzen sich mit denen der andern Seite, und bilden Spirallinien, die untern wieder mehr gerade Ringe. In der Höhe eines Zolles, vom obern Ende der Speiseröhre an, fehlen die Kreisfasern an der vordern Fläche ganz, und, da hier auch die Längsbündel noch nicht vereinigt sind, so ist die Speiseröhre hier an ihrer vordern Fläche weit weniger muskulös und ausdehnbarer als in ihrem übrigen Verlauf.

Auf die Muskelhaut folgt die Zell- oder Gefäßhaut, welche mit ihr nur sehr locker, dagegen mit der darauf folgenden

den Zottenhaut fest verbunden ist, und mit ihr ein inneres, ziemlich leicht von der Muskelhaut trennbares Rohr bildet. In ihr befinden sich eine ansehnliche Menge von dicht an einander liegenden, aus kleinern Körnchen zusammengesetzten Schleimdrüsen, deren Zahl und Größe nach unten zunimmt.

Die innere oder Zottenhaut der Speiseröhre ist weiß, ziemlich fest, an der innern Fläche mit einer Menge feiner Längsfurchen, welche durch Zwischenwände abgetheilt werden, versehen. Diese Haut muß keinesweges mit der vorzigen als eine angesehen werden<sup>1)</sup>.

An ihrer innern Fläche befindet sich eine dünnere, zartere, feuchte Bedeckung, offenbar eine Oberhaut, welche unten an der Uebergangsstelle in den Magen plötzlich aufhört. Durch Kochen und Maceration läßt sie sich ziemlich leicht in einzelnen Stücken, schwerer als zusammenhängende Membran, darstellen, Krankheitszustände ausgenommen, wo sie eine größere Festigkeit und Dicke bekommt. Auch außerdem findet man sie gewöhnlich am untern Ende der Speiseröhre, bald nach dem Tode stellenweise von unten nach oben getrennt, unstreitig, weil die von den Drüsen der Speiseröhre und des linken Magenmundes abgesonderte Feuchtigkeit sie und das lockere Zellgewebe, wodurch sie mit der Zellenhaut verbunden ist, auflöst.

§ 5

§. 2140.

1) Schmerring (Eingeweidl. S. 216.) beschreibt beide als eine unter dem Namen der innern Gefäß- oder Drüsenhaut, und sagt, daß die innere und die Gefäßhaut des Magens in sie übergehn (S. 233.); in der That geht von diesen die erstere in sie, die zweite dagegen in die Gefäßhaut der Speiseröhre über. Noch weniger richtig sehen andre die Zottenhaut des Magens und Darmkanals als eine Fortsetzung der Oberhaut der Speiseröhre an.

Durchmesser, und hat überall, höchstens die etwas enger Stelle, wo er durch das Zwerchfell tritt, ausgenommen, gleiche Weite.

Seine Muskelhaut ist beträchtlich, im Allgemeinen wenigstens eine Linie dick.

Sie besteht sehr deutlich aus einer äußern longitudinalen und einer innern queren Schicht, von welchen die erstere doppelt so dick als die letztere ist. Die Längenfaser nehmen oben gewöhnlich mit drei Köpfen oder Bündeln ihren Anfang, einem mittlern und zwei seitlichen. Der mittlere entspringt durch eine Sehne von der Mitte der hintern Fläche des Ringknorpels, dicht unter dem obern Rande desselben, und breitet sich absteigend aus. Die beiden seitlichen gehen fleischig von dem untern Rande des untern Schlundkopfschnürrers ab. Alle vereinigen sich erst einige Zolle unter dem obern Ende zur Bildung einer vollständigen Muskelhaut.

Die Kreisfasern sind eine Fortsetzung des hintern innern Theiles des untern Schlundkopfschnürrers, allein viel dünner als er.

Die obersten verlaufen quer, die darauf folgenden steigen schräg von oben und außen nach unten und innen herab, kreuzen sich mit denen der andern Seite, und bilden Spirallinien, die untern wieder mehr gerade Ringe. In der Höhe eines Zolles, vom obern Ende der Speiseröhre an, fehlen die Kreisfasern an der vordern Fläche ganz, und, da hier auch die Längsbündel noch nicht vereinigt sind, so ist die Speiseröhre hier an ihrer vordern Fläche weit weniger muskulös und ausdehnbarer als in ihrem übrigen Verlauf.

Auf die Muskelhaut folgt die Zell- oder Gefäßhaut, welche mit ihr nur sehr locker, dagegen mit der darauf folgenden

den Zottenhaut fest verbunden ist, und mit ihr ein inneres, ziemlich leicht von der Muskelhaut trennbares Rohr bildet. In ihr befinden sich eine ansehnliche Menge von dicht an einander liegenden, aus kleinern Körnchen zusammengesetzten Schleimdrüsen, deren Zahl und Größe nach unten zunimmt.

Die innere oder Zottenhaut der Speiseröhre ist weiß, ziemlich fest, an der innern Fläche mit einer Menge feiner Längenfurchen, welche durch Zwischenwände abgetheilt werden, versehen. Diese Haut muß keinesweges mit der vorigen als eine angesehen werden<sup>1)</sup>.

In ihrer innern Fläche befindet sich eine dünnere, zartere, feuchte Bedeckung, offenbar eine Oberhaut, welche unten an der Uebergangsstelle in den Magen plötzlich aufhört. Durch Kochen und Maceration läßt sie sich ziemlich leicht in einzelnen Stücken, schwerer als zusammenhängende Membran, darstellen, Krankheitszustände ausgenommen, wo sie eine größere Festigkeit und Dicke bekommt. Auch außerdem findet man sie gewöhnlich am untern Ende der Speiseröhre, bald nach dem Tode stellenweise von unten nach oben getrennt, unstreitig, weil die von den Drüsen der Speiseröhre und des linken Magenmundes abgesonderte Feuchtigkeit sie und das lockere Zellgewebe, wodurch sie mit der Zellohaut verbunden ist, auflöst.

§ 5

§. 2140.

1) Sömmerring (Eingeweidl. S. 216.) beschreibt beide als eine unter dem Namen der innern Gefäß- oder Drüsenhaut, und sagt, daß die innere und die Gefäßhaut des Magens in sie übergehen (S. 233.); in der That geht von diesen die erstere in sie, die zweite dagegen in die Gefäßhaut der Speiseröhre über. Noch weniger richtig sehen andre die Zottenhaut des Magens und Darmkanals als eine Fortsetzung der Oberhaut der Speiseröhre an.

## §. 2140.

Nachdem die Speisen in der Mundhöhle durch die Zähne verkleinert, durch den Speichel befeuchtet, und in eine weiche Masse verwandelt worden sind, werden sie durch die Thätigkeit der Muskeln der Zunge, des Zungenbeins, des Schlundkopfes und der Muskelhaut der Speiseröhre aus der Mundhöhle in den Magen bewegt, verschluckt, oder verschlungen<sup>1)</sup>. Zu diesem Behuf werden sie zuerst in der Mundhöhle von vorn nach hinten bewegt, wozu Verschließung derselben durch Annäherung der Kiefern und der Lippen nothwendig ist. Zugleich wird die Zunge durch ihre Muskeln so gestellt, daß sie an den Seiten in die Höhe ragt, in der Mitte dagegen sich vertieft, wodurch eine Rinne, und zwischen ihr und dem Gaumen ein Kanäl entsteht, in welchem die Substanzen nach hinten gleiten, wo sie den geringsten Widerstand finden, was durch Aufrichtung und Vorwärtsziehen der Zunge, wenn sie diesen Weg eingeschlagen haben, vermittelt der Kinnzungen- und Kinnzungenbeinmuskeln noch begünstigt wird. Sie drängen theils den weichen Gaumen in die Höhe, theils wird dieser durch die Gaumenheber aufwärts gezogen. Sind die zu verschlingenden Substanzen an diese Stelle gelangt, so treten die Schlundkopfschnürer in Thätigkeit, und zugleich wirken die Herabzieher des weichen Gaumens und die Griffelzungenmuskel, indem sie die Zunge aufheben, auf Verkleinerung der Rachenenge. Durch die Thätigkeit der obern Schlundkopfschnürer wird der Anfang des

Schlund-

1) Schulze de deglutitionis mechanismo. Halae. 1739.

F. B. Albinus de deglutitione. L. B. 1740.

Wentz de deglutitionis mechanismo. Erlang. 1790.

P. J. Sandifort deglutitionis mechanismus, verticali sectionum narium, oris, faucium illustratus. L. B. 1805.

Schlundkopfes an den weichen Gaumen gedrückt, und auf diese Weise jetzt der Weg zur Nase verschlossen, wie es vorher durch Aufwärtsdrücken des weichen Gaumens bewirkt wurde. Die Griffelschlundkopfmuskeln, dann auch die Verengerer der Rachenenge heben den Schlundkopf in die Höhe und erweitern ihn, so daß die Substanzen leichter in ihn fallen. In dem die Kinnzungenbeinmuskeln, Kieferzungenbeinmuskeln, Schildzungenbeinmuskeln, Zungenbeinzungenmuskeln den Kehlkopf nach vorn und oben ziehen, wird das Verschließen der Stimmritze durch den Kehledeckel, der außerdem auch durch die herabgleitenden Substanzen niedergedrückt wird, begünstigt, und so der Eintritt dieser in die Luftwege verhindert.

Alle diese Theile treten, wegen äußerst hoher Erregbarkeit, äußerst schnell und leicht in Thätigkeit. Das im Anfange unwillkürliche Schlucken ist in der Speiseröhre durchaus unwillkürlich, ungeachtet sie ihre Nerven von dem pneumogastrischen Paare erhält.

## II. Regelwidriger Zustand.

### 1. Formfehler.

#### §. 2141.

a) Ursprüngliche. Der Schlundkopf ist bisweilen, aber selten nach oben, die Speiseröhre nach unten durch einen Bildungsfehler blind geendigt. Unter der erstern Bedingung ist meistens zugleich wenigstens die Mundhöhle unvollkommen ausgebildet, der Unterkiefer fehlt ganz oder größtentheils. Dasselbe gilt, wenn sich der Schlundkopf mit einer sehr engen Oeffnung am Halse öffnet.

Eine andre, noch seltner urprüngliche Bildungsabweichung ist die Spaltung eines Theiles der Speiseröhre in zwei neben einander verlaufende Kanäle <sup>1)</sup>).

Ob Verengerungen der Speiseröhre, welche durch regelwidrige Faltung der innern Haut ohne krankhafte Aenderung ihres Gewebes entstehen, Fehler der Urbildung sind, oder sich später durch bloße Massezunahme derselben bilden, ist nicht immer ausgemittelt, wenn gleich bisweilen <sup>2)</sup> unstreitig das letztere Statt findet, da erst eine Zeitlang vor dem Tode Krankheitszufälle eintreten.

b) Erworbne. Erweiterungen der Speiseröhre entstehen fast immer zufällig. Am gewöhnlichsten bilden sie sich in Folge von Verengerungen, welche sich unter ihnen befinden, und sind unter dieser Bedingung all gemein.

Seltner ist nur ein Theil ihres Umfangs in Gestalt eines blinden Beutels ausgedehnt <sup>3)</sup>. In einem Falle <sup>4)</sup> war dieser Beutel bestimmt ein Bruch der innern Häute durch die Muskelhaut, während er in einem andern <sup>5)</sup> auch durch die letztern gebildet wurde.

Beutel dieser Art kommen nur am untern Ende des Schlundkopfes oder dem Anfange der Speiseröhre vor, vermuth-

1) Blasius obl. medicae rariores. Tab. VI. Fig. 2.

2) Baillie und Schmerring in Baillie's Anat. des fr. Baues. S. 51.

3) S. Fälle in meiner path. Anat. Bd. 2. Außerdem einen genau bei Bell. Surgical observations Part. 1. London. 1817. p. 67. Tab. 2.

4) Bell a. a. O.

5) Ludlow Medic. obl. and inq. Vol. 5.



muthlich wegen der plötzlichen Verengerung des Kanals und der geringen Muskulosität der Speiseröhre an dieser Stelle.

Zerreißen der Speiseröhre, welche entweder in querer <sup>1)</sup> oder Längsrichtung <sup>2)</sup> verlaufen, sind in der That nur ein höherer Grad des Bruches der innern Haut. Regelmäßige Märbheit ist unstreitig, wenigstens bisweilen die Veranlassung dazu.

Verengerungen entstehen, wenn sie bleibend sind, oft immer in Folge von vorangegangnen Texturveränderungen, Verdickungen und Verhärtungen der Speiseröhrenhäute, und sind daher selten reine Formfehler. Doch sind sie bisweilen anfangs nur in einer regelwidrigen, selbst nach dem Tode fortdauernden Zusammenziehung der Muskelfasern begründet, und die dann vorhandne größere Härte an dieser Stelle ist nicht Folge veränderter Textur, sondern bloß der härtern Zusammenziehung der Muskelfasern, wenn gleich der Druck anhaltender Zusammenziehungen auf die innern Häute Texturveränderungen derselben, zunächst Entzündung, und, durch Auschwüzung und Verschwärung, bleibende Härte veranlassen kann <sup>3)</sup>.

## 2. Fehler des Gewebes.

§. 2142.

Die gewöhnlichsten Fehler des Gewebes der Speiseröhre sind regelwidrige Härte, welche meistens mit Verdickung und

1) Boerhaave Hist. morbi atrocis. L. B. 1724.

2) Monro morbid anat. p. 311.

3) Baillie a. a. O. S. 41. Sah ich gleichfalls einigemal, gleichfalls in weiblichen Leichen.

Mauchart de struma oesophagi ejusque coactis. Tübing. 1742.

die wichtigsten drüsigen Organe desselben, die Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse. Dieser Abschnitt ist nicht nur der größte, sondern auch der wichtigste, sofern hier die eigentliche Verdauung vorgeht, zu welcher im Anfangstheile bloß Vorbereitungen getroffen, und deren Ueberbleibsel durch den Endstiel vorzüglich nur ausgestoßen werden.

Der Magen, die Leber, die Milz und die Bauchspeicheldrüse, nebst dem Anfangstheile des dünnen Darmes, den Zwölffingerdarm, in welchen sich Magen, Leber und Bauchspeicheldrüse öffnen, nehmen den obern Theil der Unterleibshöhle ein, werden von dem übrigen größern, untern, durch eine ansehnliche quere Falte des Bauchfelles, das Omentum, grümmarmgekröse gewissermaßen abgesondert; indessen ist es nicht zweckmäßig, den übrigen Dünndarm später als die Anhänge zu betrachten, und den Dickdarm von dem dünnen Darm abzusondern, da sie in derselben Höhle liegen, wesentlich denselben Bau haben, und ununterbrochen in einander übergehen.

Gewöhnlich wird vor diesem Theile des Verdauungssystems die ihn umgebende Hülle, das Bauchfell, beschrieben; allein, da theils nicht er allein in diesem enthalten ist, theils die Fortsätze des Bauchfelles, welche sich von dem äußern Sacke desselben zu den, in ihm enthaltenen Organen begeben, unstreitig erst nach erlangter Kenntniß der Lage und Gestalt dieser Organe selbst am besten beschrieben werden, theils endlich wichtige Abweichungen des Bauchfelles von der Regel, namentlich die bei den Brüchen vorkommenden, mit mehreren andern in ihm enthaltenen und benachbarten Organen in Beziehung stehen, so ist es unstreitig am zweckmäßigsten, erst die verschiedenen Apparate, hierauf erst das Bauchfell zu betrachten.

In der That hat auch Roux schon diese Methode benutzt<sup>1)</sup>.

In derselben Stelle wird auch am zweckmäßigsten die auch hohle genauer beschrieben werden, deren allgemeinste Bedingungen schon oben<sup>2)</sup> angegeben worden sind.

### Erste Unterabtheilung.

### S p e i s e k a n a l.

#### I. Regelmäßige Beschaffenheit.

##### 1. Vollkommener Zustand.

##### §. 2144.

Die verschiedenen Gegenden der mittlern Abtheilung des Speisekanals (S. 152.) unterscheiden sich zwar von einander in Hinsicht auf ihren Durchmesser sehr bedeutend, kommen indessen in ihrer Gewebe sehr unter einander überein, weichen dagegen von den übrigen Abtheilungen in dieser Hinsicht ab. Die Längsfasern der Muskelhaut umgeben diesen Theil des Speisekanals in seinem ganzen Umfange, die Gefäße, welche zu ihm gehören, sind weit zahlreicher und durch eine größere Menge von Nerven verbunden, die Oberfläche der innern Haut ist mehr oder weniger durch Vorsprünge ungleich, welche dem übrigen Theile des Speisekanals fehlen.

#### A. Der

<sup>1)</sup> In Viehat's Anat. dölser. T. V. p. 305.

<sup>2)</sup> Bd. 2. S. 4 — 8.

A. Der Magen <sup>1)</sup>.

## §. 2145.

Der Magen (Ventriculus l. Stomachus) ist der 6<sup>ten</sup> weiteste, zwischen der Speiseröhre und dem Zwölfdarm liegende Theil des Speisefanals, mit welchem der Bauchhöhle enthaltene Theil desselben anfängt, in welche eingenommenen Nahrungsmittel unmittelbar aus der Höhle durch den Schlund gelangen, und wo sie zuerst eine Verflüssigung durch Umwandlung in eine eigenthümliche Flüssigkeit den Speisebrei (Chymus) erleiden.

## a. Lage.

## §. 2146.

Er liegt in der rechten Unterrippengegend und der Bauchgegend, reicht aber bisweilen auch, wenn er ansehnlich groß ist, bis in die Nabelgegend, und steigt schräg von oben und oben nach rechts und unten herab, berührt mit seinem obern Ende das Zwerchfell, und reicht mit seinem untern Ende an den vordern Rand des viereckigen Leberlappens.

## §. 2147.

Neben dem linken Ende des Magens liegt die Milz, unter seiner hintern Fläche die Bauchspeicheldrüse, hinter ihm der Quergrimmdarm, über ihm der linke viereckige und der Spigel'sche Leberlappen. Letztern umfaßt er mit seinem obern oder kleinen Bogen.

---

1) S. außer den oben (S. 153. und 242.) angeführten S. von Fabricius, Glisson und Fantoni, J. D. Ger. Ventriculus humanus anat. et physiol. cons. Regiom. 1788. 4.

## b. G e s t a l t.

§. 2148.

Der Magen hat eine länglichkegelförmige, bubelsackähnliche, etwas gebogene Gestalt, und ist an seinem rechten Ende in meisten zusammengezogen, nach dem linken Ende hin am weitesten.

Man unterscheidet an ihm zwei Mündungen, zwei Bögen, zwei Flächen, den Grund und die Pfortneröhle.

Die obere oder linke Magenmündung, Magenmund (*Ostium ventriculi sinistrum* f. *superius* f. *cardiacum*) liegt am obersten Theile des Magens, in geringer Entfernung von seinem linken, blinden Ende, und ist die Gränze zwischen Magen und Speiseröhre, welche indessen hier ohne Einsprung so in einander übergehen, daß sich das untere Ende der Speiseröhre allmählich erweitert.

Der untere oder rechte Magenmund, der Pfortner (') (*Ostium vent. dextrum* f. *inferius* f. *pylorus* f. *janitorius*) bildet die Stelle des Ueberganges zwischen dem Magen und dem Zwölffingerdarm, welcher nicht, wie auf der linken Seite, ganz allmählich geschieht, sondern durch einen spornartigen Vorsprung, die Pfortnerklappe (*Valvula pylori*) vermittelt wird.

Zwischen diesen beiden Mündungen verlaufen die Flächen und Bögen des Magens.

Die hintere und vordere Fläche sind, wenn der Magen mehr oder weniger angefüllt ist, gleichmäßig ge-

R 2

wölbt,

1) *Leveling pylorus anatomice atque physiologicae consideratus. Argent. rec. in Sandiforti coll. thes. diss. T. III.*

wölbt, im Zustande der höchsten Entleerung gerade, platt, und mit einander in Berührung.

Von den Bögen ist der obere, welcher zwischen dem rechten Theile des Umfangs des obern Magenmundes und dem linken des Pförtners liegt, *conca v*, und weit kleiner als die untere, welcher stark gewölbt ist.

Bei leerem Magen sind beide Bögen mehr oder wenig scharfe Ränder, wodurch die beiden Flächen scharf von einander abgegränzt werden, bei angefülltem sind sie sehr stumpf und gehen unmerklich in die beiden Flächen des Magens über.

Der Grund oder Blindsacl des Magens (*Fundus* s. *saccus coecus*) ist die stumpf geendigte, am meisten nach links liegende blinde Verlängerung, welche sich von dem linken Theile des obern Magenmundes nach links hin bogenförmig, und die Insertion der Speiseröhre ungefähr um drei Zoll überragt.

Dieser Theil des Magens ist nicht beträchtlich enger als der mittlere Theil desselben. Von ihm und dem linken Magenmunde an, wird der Magen bis etwas über die Mitte seiner Länge nach der rechten Seite hin etwas weiter, zieht sich aber allmählich gegen den Pförtner beträchtlich zusammen.

In der Entfernung von einem bis zwei Zollen vom Pförtner biegt sich der große Bogen plötzlich nach innen, so gleich aber wieder, doch nicht zu einer so beträchtlichen Wölbung als die, welche er in seinem übrigen Verlauf hatte, heraus. Dem hiedurch entstehenden Einschnitt gegenüber wölbt sich der am meisten nach rechts liegende Theil des kleinen Bogens, der sich dahin vom obern Magenmunde aus *conca v* war, nach außen, ohne daß deshalb gewöhnlich hier eine Einschnürung, und

seit derselben, zwischen dieser Stelle und dem Pfortner, eine  
Weiterung Statt fände.

Dieser am meisten nach rechts liegende Theil des Magens  
die Pfortnerhöhle (Antrum pylori).

e. Dimensionen.

§. 2149.

Die Größe des Magens ist, selbst in demselben Körper  
verschiednen Zeiten auch im gesunden Zustande, äußerst  
verschieden, indem er einer bedeutenden Ausdehnung im ange-  
füllten, einer sehr beträchtlichen Zusammenziehung im leeren  
Zustande fähig ist. Die letztere findet vorzüglich im queren  
Durchmesser des Magens Statt, und ist oft so stark, daß er  
geringer als der dicke Darm im gewöhnlichen, mittlern Zustande  
in Ausdehnung ist.

Im Allgemeinen ist der nicht übermäßig stark ausgedehn-  
te Magen vom Grunde bis zum Pfortner einen Fuß lang, von  
vorn nach unten, wo er am höchsten ist, drei bis vier Zoll hoch,  
von vorn nach hinten beträgt seine größte Dicke ungefähr eben  
viel. Sein Flächeninhalt beträgt ungefähr einen Quadratfuß.

d. Befestigung.

§. 2150.

Der Magen wird an seiner obern Mündung auf beiden  
Seiten durch eine kurze Falte, das Zwerchfell-Magen-  
band (Lig. phrenico-gastricum), welche sich auf seiner linken  
Seite bis an den Anfang des Grundes, nach rechts längs  
dem größten Theil des kleinen Bogens herab erstreckt, an  
das Bauchfell, vorn und oben an den obern Endtheil des  
Zwerchfelles, geheftet.

Mit dieser läuft eine andre, beträchtlich längere, welche sich vom Grunde in den Ausschnitt der Milz erstreckt, an derselben heftet, und unten in das große Netz übergeht, das Magen = Milzband (Lig. gastro-splenicum), zusammen.

Mit dem Quergründarm wird der Magen durch das große, mit der Leber durch das kleine Netz, innere Verbindungen des Bauchfelles, deren Beschreibung bei diesem Magen wird, verbunden.

#### a. H ä u t e d e s M a g e n s :

##### §. 2151.

Der Magen ist überall, nur mit Ausnahme eines kleinen Streifens an seinem großen und kleinen Bogen, wo die Schlingen verlaufen, von der Bauchfellhaut bekleidet.

Auf diese folgt, dicht an sie geheftet, die Muskelhaut. Diese ist beträchtlich stark, stärker als am dünnen und dicken Darm, allein schwächer als am Schlunde und dem Mastdarm, ungefähr eine halbe Linie dick, und etwas zusammengeknüpft als im übrigen Darmkanal, indem sie, wenigstens stellenweise, mehr oder weniger deutlich aus drei Schichten gebildet wird.

Die äußerste Schicht besteht aus Längenfaseru, welche größtentheils mit den Längenfaseru des Schlundes und des Zwölffingerdarms zusammenfließen, und eine ununterbrochne Fortsetzung derselben sind. Sie sind vorzüglich an

1) D. G. Garsani de carnea ventriculi et intestinalium tunica. Comm. Bon, 1746.

Bertin description des plans musculaux dont la tunique charnue de l'estomac humain est composée. T. II. p. 281 de Paris. 1701.



Der Theile des Magens um den kleinen Bogen stark ent-  
wickelt, bekleiden indessen den ganzen Umfang des Magens.

Die mittlere Schicht wird aus ringförmigen  
Fasern gebildet, welche Kreise bilden, durch deren Mittelpunkt  
die Längsaxe des Magens verläuft. Sie fangen am Grunde  
des Magens an, und verbreiten sich, vielfach unter einander  
verflochten, etwas schief, über den ganzen Magen bis zum  
Ösophagus, wo sie sich besonders verstärken.

Sie erhalten den Namen der queren oder schiefen  
Fasern, und bilden die stärkste Schicht.

Unter diesen befindet sich, vorzüglich an der linken Seite  
und am kleinen Bogen eine dritte Schicht<sup>1)</sup>, welche den  
Magen gleichfalls ringförmig, aber in einer der vorigen entge-  
engesetzten Richtung, also der Länge nach, umgiebt, Fort-  
setzung der Kreisfasern des Schlundes ist, und mit den schiefen  
Fasern vielfach zusammenfließt.

Die Gefäßhaut des Magens ist dicker, gefäßreicher,  
mehr von der innern Haut abgesondert als an der Speiser-  
öhre.

Sie geht in die Gefäßhaut, nicht aber in die innere  
der Zottenhaut der Speiseröhre ununterbrochen über.

Die Zottenhaut des Magens ist dünn, weich, locker,  
schwammähnlich, weicher und lockerer als dieselbe Haut der  
Speiseröhre, dagegen etwas dicker als diese, meistens bald  
nach dem Tode von gelber, bräunlicher, röthlicher Farbe.  
Nicht selten ist, vorzüglich bald nach dem Tode, die innere  
Haut des Magens in größern oder kleinern Strecken, vorzüg-

R 4 lich

1) Schon von Galeati (a. a. O. S. 240.) lange vor Berti  
beschrieben.

lich im Grunde und am kleinen Bogen, durch ein Netz von kleinen, fast immer bloß venösen Gefäßen sehr stark geröthet. Man ist gewöhnlich geneigt, diesen Zustand als Folge einer im Leben Statt gefundenen Entzündung anzusehen, und von dieser auf Vergiftung zu schließen; allein genaue Untersuchungen beweisen, daß er, ohne Verdacht einer solchen Ursache, erst in und nach dem Tode eintritt, und namentlich durch plötzlich gehemmten Blutlauf durch die Lungen veranlaßt wird <sup>1)</sup>. In nicht ausgedehnten Zustände ist sie, und dadurch die innere Fläche des Magens durch eine Menge größerer und kleiner, sehr unregelmäßig gestellter Runzeln, ungleich. Diese verschwinden aber auch bei mäßiger Ausdehnung des Magens völlig, und die innere Fläche desselben erscheint dann dem bloßen Auge durchaus glatt, unter dem Mikroskop dagegen deutlich aus durch eine Menge kleiner Zwischenwände, welche sich gegen den Pförtner hin vergrößern, und dadurch den Darmzotten ähnlicher werden, in dichtstehende, den Honigzellen ähnliche Vertiefungen abgetheilt <sup>2)</sup>. In der linken Magenhälfte sind die Zellen zugleich größer, weniger zahlreich, die Zwischenwände einfach, in der Pförtnergegend die letztern vielfach eingeschnitten, mithin auch aus diesem Grunde den Darmzotten ähnlicher, wenn gleich diese Zotten weit kleiner als die Darmzotten sind <sup>3)</sup>.

Kupfer

- 1) J. Yelloly on the vascular appearance of the human Stomach, which is frequently mistaken for Inflammation of that Organ. Med. chir. transact. Vol. IV. 1815. p. 571 — 424.
- 2) Hewson experim. Inquiries. Vol. 2. p. 175.
- 3) Abgebildet von E. Home. Observations on the gastric glands of the human stomach and the contraction which takes place in that viscus. Philosoph. Transact. 1817. Part. 1. p. 547 ff. P. 1. 18. 19. Uebersetzt in Med. d. b. Archip. Bd. 4.

Außer einer großen Menge sehr feiner Vertiefungen, welche die Mündungen kleiner, einfacher Drüsen sind, enthält die innere Haut, vorzüglich in der Gegend der beiden Oeffnungen des Magens größere, welche zu mehr oder weniger deutlichen, schalenförmigen Drüsen führen. Diese bilden an der Uebermündungsstelle der Speiseröhre in den Magen einen 3 — 4 Linien breiten, sehr deutlichen Vorsprung, wodurch beide Höhlen von einander etwas abgegränzt werden.

Die Zottenhaut des Magens geht in die Zottenhaut der Speiseröhre und des Darmkanals ununterbrochen über. Mit der Oberhaut derselben scheint sie mir dagegen keinen Zusammenhang zu haben, indem man diese an dem linken Magenmunde ohne die geringste Gewalt von ihr und der Zottenhaut der Speiseröhre trennen kann, während diese sehr deutlich in die Zottenhaut des Magens übergeht.

Die Häute des Magens sind weder in allen Körpern, noch in demselben Körper zu verschiedenen Zeiten und an allen Stellen gleich dick <sup>1)</sup>.

Im Allgemeinen sind sie in ersterer Beziehung in gesunden männlichen Körpern am dicksten, in der zweiten natürlich desto dünner, je weniger der Magen ausgedehnt ist.

In der dritten Hinsicht läßt sich für die Bauchfellhaut annehmen, daß sie überall gleich dick ist, dagegen sind die übrigen Häute im Grunde des Magens bei weitem am dünnsten, gegen den Pförtner am dicksten, hier nicht selten sechs- oder siebenmal dicker als dort.

1) Pelloly a. a. O. S. 400—409.

## f. Pfortnerklappe.

§. 2152.

Die Pfortnerklappe (Valvula pylori) (§. 2148.) wird durch die Kreisfasern der Muskelhaut, der Gefäßhaut und die Schleimhaut des Magens und des Zwölffingerdarmes, von welchen die erstern an dieser Stelle beträchtlich verdickt, alle nach innen umgeschlagen sind, gebildet.

Die Längensfasern, so wie die Bauchfellhaut, streichen nur über diese Stelle äußerlich weg.

Vermittelt Durchschneidung oder Wegnahme der Kreisfasern, kann man sehr leicht die Klappe völlig vernichten, was gleich immer an diesen Stellen zwischen dem Zwölffingerdarm und Magen eine verengte Stelle übrig bleibt.

Von einer eignen drüsenähnlichen Substanz zwischen der Muskel- und Bauchfellhaut, welche den Pfortnerring bildet und seine Gestalt bestimmte <sup>1)</sup>, habe ich bei der sorgfältigsten Untersuchung nie die geringste Spur gefunden, wenn gleich vor derselben sich unter der Muskelhaut des Zwölffingerdarms eine sehr starke Drüschicht befindet.

Die Klappe selbst hat nicht überall dieselbe Gestalt.

Meistentheils umgibt sie den ganzen Umfang der Mündung, und ist entweder kreisförmig oder mehr oder weniger oval, so daß dann der Längendurchmesser gewöhnlich von oben nach unten verläuft.

Seltner ist sie halbmondförmig, so daß sie nur einen Theil der Oeffnung umgibt. Den Uebergang von dieser zu der vorhergen

1) Commerring's Eingeweidelehre. S. 236.

A. Portal Anat. méd. T. V. p. 161.

gen Bildung macht beträchtliche Verschiedenheit der Breite der Klappe an verschiedenen Stellen.

Unter allen diesen Bedingungen ist sie bald größer, bald kleiner.

Ungewiß ist es wohl, ob man immer mit Recht annehmen kann, daß die im Tode gefundenen Formen im Leben Statt fanden.

Auch läßt sich der Einfluß einer bestimmten Form, selbst angenommen, daß sie schon im Leben und bleibend vorhanden war, auf die Thätigkeit der Klappe und den höhern oder geringern Grad von Vollkommenheit der Verschließung des Pfortners durch dieselbe, nicht mit Gewißheit bestimmen, da es einleuchtet, daß der Grad des Zusammenziehungsvermögens der sie vorzüglich bildenden Kreisfasern von einem noch größern Einflusse ist.

g. Vorübergehende Veränderungen der Gestalt und Lage des Magens.

#### §. 2153.

Der Magen verändert regelmäßig seine Gestalt und Lage vorübergehend, je nachdem er Nahrungsmittel enthält oder nicht, also auf eine, den verschiedenen Zuständen der Verdauung entsprechende Weise.

Der leere Magen ist nicht nur nach allen Richtungen fleischer als der angefüllte, sondern hat auch keine cylindrische Gestalt. Seine vordere und hintere Fläche berühren einander, und der obere und untere Rand gränzen sie scharf von einander ab, während die Flächen und Ränder bei angefülltem Magen allmählich in einander übergehen.

Noch merkwürdiger ist eine, während der Verdauung eintretende, vorübergehende Scheidung des Magens in eine rechte

rechte und linke Hälfte, welche sich ungefähr in der Mitte seiner Länge findet, und mehr oder weniger beträchtlich ist. Die linke Hälfte enthält die flüssigen, die rechte die festen Substanzen, und die erstern treten aus dieser, ohne nothwendig oder wenigstens ganz durch die rechte und den Pförtner in den Dünndarm zu gelangen <sup>1)</sup>. Die Mündungen des Magens verschließen sich während der Verdauung mehr oder weniger fest, doch öffnet sich, wenn sie eine Zeitlang gedauert hat, der Pförtner, und die in ihm enthaltne Masse tritt in demselben Verhältniß als ihre Umwandlung vorgeschritten ist, durch ihn in den Zwölffingerdarm.

Zugleich ändert sich während der Verdauung die Lage des Magens ab, indem er sich so um seine Ase dreht, daß die vordere Fläche mehr nach oben, die hintere nach unten gewandt ist, wenn gleich diese anscheinende Veränderung der Stellung größtentheils in der vorher angegebenen Gestaltsveränderung begründet ist.

#### h. Verrichtung des Magens.

##### §. 2154.

Die innere Haut des Magens sondert den Magensaft (Succus gastricus), eine Flüssigkeit ab, deren wesentliche Beschaffenheit wegen ihrer immer mehr oder weniger Statt findenden Vermischung mit eingenommenen Substanzen sehr schwer genau zu bestimmen ist. Im Allgemeinen enthält er freie Säure, doch erscheint der Magensaft derselben Person bald sauer, bald neutral. Die Grundlage scheint eine der im Speichel vorkommenden sehr ähnliche, eiweißartige Substanz <sup>2)</sup>.

Viele

1) E. Home Lect. on comparative anatomy. I. p. 158 ff.

2) Boström in med. chir. Transact. Vol. IV. p. 77.

Vielleicht ist die Mischung nicht immer dieselbe, sondern wird durch die Beschaffenheit der auf die innere Magenhaut einwirkenden Substanzen abgeändert. Durch die Einwirkung des Magensaftes, vielleicht auch der Galle werden die eingenommenen Substanzen in den schleimigen, grauen, dicklichen, ekelhaft riechenden und schmeckenden Speisenbrei (Chymus) umgewandelt, der nach der Beschaffenheit der Nahrungsmittel verschieden ist, mehr feste Substanz, weniger Salz als irgend eine andre thierische Flüssigkeit, und viel Kohlenstoff, Eiweiß, aber, nach einigen Versuchen wenigstens, keine Gallert enthält, und sich nach und nach vorzüglich im Pfortnertheil bildet <sup>1)</sup>.

Die Bildung des Speisenbreies oder die Magenverdauung wird durch die Verschließung der beiden Mündungen desselben sehr begünstigt. Auch tragen dazu Bewegungen bei, welche anfangs unbestimmt sind, und allmählich, gegen das Ende der Magenverdauung, in der Richtung von der linken zur rechten Magenmündung Statt finden.

## i. Geschlechtsverschiedenheiten.

### §. 2155.

Am Speisefanal bietet vorzüglich nur der Magen eine Geschlechtsverschiedenheit dar, indem er beim Manne größer, weiter und kürzer, beim Weibe kleiner, enger und länglicher ist. Seine und des ganzen Speisefanals Muskelhaut ist zugleich im Allgemeinen beim Weibe dünner.

B. Dün-

---

1) Marcet in med. chir. transact. Vol. 6. p. 627. Deutsches Archiv Bd. 2. S. 274.

B. Dünner Darm <sup>1)</sup>.

§. 2156.

Der enge oder dünne Darm (*Intestinum tenue*) ist der längste und engste Theil des Darmkanals, welcher zwischen dem Magen und dem dicken Darm liegt, und in beide zwar ununterbrochen übergeht, indessen doch durch klappenartige Vorsprünge, den Pförtner und die Grimmdarmklappe, so von ihnen abgesondert wird, daß durch Verschließung derselben seine Höhle von der übrigen vollkommen getrennt werden kann, und unter gewissen Bedingungen wirklich getrennt wird.

Sein äußerer Umfang ist gleichförmig. Auch ist sein Durchmesser in dem bei weitem größten Theile seiner Länge gleich, seine Gestalt daher cylindrisch.

Die Länge des ganzen dünnen Darmes vom Pförtner bis zum Anfange des Grimmdarms variiert bedeutend, indem ich sie zwischen 13 und 27 Fuß schwankend fand, ohne daß die Länge des Körpers in demselben Verhältniß verschieden gewesen wäre <sup>2)</sup>.

Sein Durchmesser beträgt bei einer mäßigen Ausdehnung ungefähr einen Zoll.

Von den übrigen Dünndarm getrennt, kann man den Zwölffingerdarm betrachten, weil er sich mehrfach von demselben unterscheidet.

1. Zwölff.

1) L. Helvetius observations sur la membrane interne des Intestins grêles, appelée membrane veloutée, sur leur membrane nerveuse, sur leur membrane musculieuse ou charnue. In Mém de Paris 1721. p. 392—403. mit Abbild.

C. B. Albini descriptio intestinorum tenuium hominis. L. B. 1722. 1724.

2) E. Meckel über die Bildung des Darmkanals. Deutschs Archiv Bd. 3. Tabelle.



1. Zwölffingerdarm 1).

§. 2157.

Der Anfangstheil des dünnen Darms, welcher unmittelbar auf den Magen folgt, ist der Zwölffingerdarm (Duodenum), der seinen Namen von seiner Länge erhält.

Er liegt in der rechten Hälfte des Unterleibes, und bildet einen, mit der Wölbung nach rechts, der Aushöhlung nach links gewendeten ansehnlichen Bogen, an dem man drei Theile, einen obern, schief von links nach rechts und etwas nach hinten aufsteigenden, einen mittlern, schief von der rechten zur linken Seite aufsteigenden, endlich einen dritten, von rechts nach links aufsteigenden Theil unterscheiden kann.

Er ist genau an die Gallenblase und den Anfang des queren Grimmdarms geheftet. Sein oberer, kleinerer Theil liegt aber, der untere größere, unter dem Quergrimmdarm. Er wird in dem größten vordern Theile seines Umfangs von der hintern Wand des Bauchfelles, welche sich hier zur Bildung des Quergrimmdarmgefäßes nach vorn fortsetzt, und ihn locker umgiebt, bekleidet, und dadurch genauer an die hintere Wand der Unterleibshöhle geheftet.

Der mittlere Theil tritt unter dem Quergrimmdarmgefäße nach unten, und ist hier, wenn dieses in die Höhe geschlagen wird, rechterseits von dem Dünndarmgefäße sichtbar. Der aufsteigende dritte Theil, liegt dagegen auf der linken Seite des Dünndarmgefäßes, welches in seinem obern, größern Theile zunächst von ihm entspringt. Hier verläuft er bis zum zweiten Lendenwirbel, tritt an der Stelle, wo das obere  
Ende

1) L. Claußenda intestini duodeni figura et natu. Lips. 1757. 4.  
Rec. in Sandiforti thes. diss. T. III.

E. Sandifort tabulae intestini duodeni. L. B. 1780. 4.

Ende des Dünndarmgefäßes und des Quergrimmdarmgefäßes zusammenfließen, hervor, und geht in den Leerdarm über.

Mit Ausnahme seines Anfangstheiles, der überall vom Bauchfell bekleidet ist, wird er nur an dem vordern Theil seines Umfangs von demselben umgeben, in dem hintern Theil durch lockeres Zellgewebe an die hintere Wand der Unterleibshöhle, und zunächst an die hinter ihm liegenden Organe geheftet, der mittlere Theil steigt längs dem hohlen Rande der rechten Niere und der rechten Seite der Wirbelsäule bis zum vierten Lendenwirbel herab.

Der untere aufsteigende Theil liegt rechterseits von der unteren Hohlvene und den Gefäßen der rechten Niere, linkerseits von der Aorte, hinter dem obern Theile der Wurzel des Gefäßes, der obern Gefäßpulsader und der großen Gefäßblutader.

Der ausgehöhlte linke Theil seines Umfangs umgibt den rechten Theil der Bauchspeicheldrüse genau.

#### §. 2158.

Er ist anfangs gewöhnlich weniger eng als in dem größten übrigen Theile seines Verlaufes, an seiner ausgehöhlten Fläche eingeschnürt, gerunzelt, in der gewölbten glatt ausgespannt. Von dem übrigen Dünndarm unterscheidet er sich außer der Lage und Befestigung durch ansehnlichere Weite und weniger regelmäßige Anordnung der Falten.

### 2. Uebriger Theil des dünnen Darms.

#### a. Hülle des dünnen Darms.

#### §. 2159.

Der dünne Darm wird in seiner ganzen Länge zudufert überall vom Bauchfelle bekleidet, und mit Ausnahme des

Wölffingerdarmes durch eine lange Falte desselben, das Mesenterium (Mesenterium) an den Lendentheil der Wirbelsäule befestigt.

Die auf diese Fülle folgende Muskelhaut<sup>2)</sup> ist dünn, ungefähr eine Drittheitslinie dick.

Die äußere oder Längenschicht, welche beträchtlich dünner als die innere, und sehr eng mit ihr verbunden ist, allein nie ganz fehlt, umgiebt ihn größtentheils in einem ringförmigen Umfange, die innere quere, oder vielmehr schräge, durchsetzt.

Die Gefäßhaut<sup>3)</sup> bietet keine besonders merkwürdigen Bedingungen dar.

Durch die Anordnung der innern oder Schleimhaut<sup>4)</sup> unterscheidet sich der dünne Darm am auffallendsten von den übrigen Theilen des Darmkanals. Das Hauptmerkmal derselben ist bedeutende Vermehrung ihrer Oberfläche, und weit beträchtlicher Flächeninhalt als der äußern Häute, vorzüglich der Muskel- und Bauchfellhaut.

Dies wird durch Faltung derselben nach Innen bewirkt, welche auf doppelte Art, durch die Bildung größerer und kleinerer Falten Statt findet.

Die

2) V. Malacarne sulla struttura anatomica delle intestine etc. in Mem. della soc. Italiana. T. X. p. 27—62.

3) B. S. Albini dissertatio de arteriis et venis intestinorum hominis. Adjecta icon coloribus distincta. L. B. 1756. 4.

J. Bleuland vasculorum in intestinorum tenuium tunicis, subtilioris anatomies opera detegendorum, descriptio. Ic. ad naturae fidem pictis illustrata. Ultraj. 1797. 4.

4) Helvetius a. a. D.

D. G. Galeati de cribriformi intestinorum tunica. In Comm. Bonon. Vol. I. 1751. p. 359—370. mit Abbild.

Wiedel's Anat. 4. Th.

Die größern Falten führen den Namen der Klappen (Valvulae), die kleinern sind die Zotten oder Flocken (Villi).

Beide sind vorzüglich im obern Theile des Dünndarms stark entwickelt, und nehmen vom Anfange bis zum Ende desselben in Hinsicht auf Zahl und Größe bedeutend ab.

#### a. K l a p p e n.

§. 2160.

Die Klappen haben im obern Theile des dünnen Darms vollkommen die Höhe von drei Linien.

Sie verlaufen in querrer Richtung größtentheils um den ganzen Umfang des Darmkanals, den sie daher kreisförmig umgeben, spalten sich aber in ihrem Verlauf ein- oder mehrfach, und fließen außerdem durch schiefe oder senkrechte, meistens niedrigere, immer weit kürzere Erhabenheiten, den sich immer drei bis vier zwischen je zwei Klappen befinden, unter einander zusammen.

Ihre Anzahl ist sehr beträchtlich, indem sie nur wenig Linien weit von einander abstehen.

Im untern Theile des dünnen Darms fehlen sie ganz, nachdem sich sowohl ihre Zahl, als Höhe und Breite allmählich bedeutend vermindert hat.

Sie werden nur durch die innere und Gefäßhaut des Darms gebildet, sind daher keiner eignen Bewegung fähig, sondern werden durch die, mittelst der Muskelhaut fortgetriebenen Flüssigkeiten, welche im Darmkanal enthalten sind, hin und her geschoben, und sind im leeren Darmkanal gegen einander gerichtet, so daß sie, wenn er aufgeschnitten in eine Flüssigkeit schwimmt, dachziegelförmig auf einander liegen.

Daher

Daher erhalten sie auch den Namen der zusammen-  
 gereinigten Klappen (*Valvulae conniventes*), nach Kerck-  
 ring, der sich indessen unrichtig die Ehre ihrer Entdeckung  
 anmaßte, den Namen der Kerckringschen Klappen (*Val-  
 vulae Kerckringii*).

In der Grundfläche einer jeden Klappe verläuft gewöhn-  
 lich ein Puls- und ein Blutaderzweig.

Diese Klappen verlangsamen den Gang der im Darmkanal  
 enthaltenen Substanzen bedeutend, und ihre vorzugsweise Ent-  
 richtung in dem obern Theile desselben, wo die in ihm befind-  
 liche Flüssigkeit die meisten nährenden Bestandtheile enthält,  
 ist daher sehr merkwürdig.

Außerdem sind sie auch als eigenthümliches Merk-  
 mal der menschlichen Bildung sehr merkwürdig.  
 Schon Morgagni erwähnt ihres Mangels bei einigen Vie-  
 re (erklären<sup>1)</sup>); ich habe sie eben so vergeblich bei einer nicht  
 bedeutenden Menge von Säugthieren fast aller Ordnungen,  
 selbst den Affen, gesucht. Zwar haben auch mehrere Fische eine oft  
 sehr bedeutende Menge querer, diesen sehr ähnlicher Klappen;  
 allein theils nehmen sie hier den Endtheil des Darms ein,  
 theils sind sie hier nicht mit Zotten besetzt. Das letztere gilt  
 auch für die Amphibien, bei welchen ich sie fand<sup>2)</sup>. Genauer

daher für jetzt der obige Satz so zu stellen, daß nur der  
 Mensch im Dünndarm quere Falten und Zotten  
 zugleich hat, in ihm also diese Bildungen,  
 welche bei den übrigen Thieren getrennt vor-  
 kommen, vereinigt sind. In der That haben die

S 2

Säug-

1) Ep. an. XIV. 20.

2) Ueber den Darmkanal der Reptilien. Archiv für die Physiol.  
 Bd. 3. H. 2.

Säugthiere und Vögel sehr allgemein, außerdem auch einige Amphibien und Fische, bloß Zotten, nur einige Gattungen aus den beiden letztern Klassen bloß quere Falten.

β. Z o t t e n <sup>1)</sup>.

§. 2161.

Die Zotten, Flocken sind kleine, dünne, längliche, meistens rundliche, bald cylindrische, bald fegelförmige, abmählich zugespitzte, bald an ihrem freien Ende knopfförmig angeschwollene Verlängerungen der Schleimhaut, von welchen diese auch den Namen Zottenhaut oder Sammelhaut (*Tunica villosa*) erhält.

Sie bekleiden die ganze innere Fläche derselben, und sitzen überall, besonders aber im obern Theile des dünnen Darms, äußerst dicht neben einander, im untern sind sie dagegen weiter von einander entfernt. In Hinsicht auf ihre Gestalt nimmt man den von einigen, z. B. Galeati<sup>2)</sup> angegebenen Unterschied, daß sie im obern Theile cylindrisch oder zugespitzt, im untern feulfförmig seyen, keinesweges allgemein wahr, dagegen habe ich sehr beständig, mit Hewson's Angabe übereinstimmend,

1) Außer den schon angeführten Schriften von Helvetius, Galeati, s. über die Zotten insbesondere:

J. N. Lieberkühn de fabrica et actione villorum intestinalium tenuium hominis. Ic. aeri incisilis illustr. L. B. 1745. 4.

Hewson in dessen exper. inquir. T. 2. Cap. 12.

R. A. Hedwig disquisition ampullularum Lieberkühnii physico-microscopica. Lips. 1797.

M. Rudolphi über die Darmzotten in dessen Abhandl. S. 39f.

2) M. a. D. S. 173.

end, die Zotten des obern Theiles verhältnißmäßig zu ihrer Länge breiter, und die queren Klappen durch ihre Gestalt wiederholend, im untern dünner, länglicher, ja bisweilen selbst nger gefunden. Ihre Länge beträgt ungefähr eine Viertellinie, die Zahl kann man wegen ihrer äußerst dichten Stellung, indem sich auf einem Quadrat Zoll ungefähr 4000 finden, nach einer mäßigen Berechnung wenigstens auf eine Million setzen.

Sie erscheinen unterm Mikroskop aus einer körnigen Substanz gebildet, und an ihrer Oberfläche nicht völlig glatt, doch ohne zackige Erhabenheiten. Sind indessen die Blutgefäße des Darmkanals angefüllt, so werden nicht nur die Zotten weiter entwickelt und strogend, sondern auch ihre Oberfläche ungleicher, indem sich dadurch ein Netz von Gefäßen auf ihrer Oberfläche entwickelt.

Auch durch Anfüllung der Lymphgefäße erscheint an ihrer Oberfläche ein aus Gefäßen dieses Systems gebildetes Netz.

Sie sind daher aus Zellgewebe, und in demselben verlaufenden höchst feinen Blut- und Lymphgefäßzweigen, deren Hülle indessen nicht deutlich von jenem geschieden sind, gebildet.

Schon längst wird die Frage verhandelt, ob die Zotten ihrer Oberfläche mit Oeffnungen versehen sind oder nicht?

Zum Theil vortreffliche Beobachter, Lieberkühn, unter, Cruikshank, Hewson, Hedwig, Bleuland nehmen nach eignen Untersuchungen diese Oeffnungen an. Nach Lieberkühn und Bleuland findet sich gewöhnlich nur an der Spitze der Zotte eine, selten mehrere, die übrigen geben mehrere an, setzen sie aber an dieselbe Stelle. Die durch feine Einspritzungen aufgerichteten, angeschwollenen und rundlich cylindrisch gewordenen Zotten,

lich im Grunde und am kleinen Pogen, durch ein Netz von kleinen, fast immer bloß venösen Gefäßen sehr stark geröthet. Man ist gewöhnlich geneigt, diesen Zustand als Folge einer im Leben Statt gefundenen Entzündung anzusehn, und von dieser auf Vergiftung zu schließen; allein genaue Untersuchungen beweisen, daß er, ohne Verdacht einer solchen Ursache, erst in und nach dem Tode eintritt, und namentlich durch plötzlich gehemmten Blutlauf durch die Lungen veranlaßt wird <sup>1)</sup>. Im nicht ausgedehnten Zustande ist sie, und dadurch die innere Fläche des Magens durch eine Menge größerer und kleinerer, sehr unregelmäßig gestellter Runzeln, ungleich. Diese verschwinden aber auch bei mäßiger Ausdehnung des Magens völlig, und die innere Fläche desselben erscheint dann dem bloßen Auge durchaus glatt, unter dem Mikroskop dagegen durch aus durch eine Menge kleiner Zwischenwände, welche sich gegen den Pförtner hin vergrößern, und dadurch den Darmzotten ähnlicher werden, in dichtstehende, den Honiggellen ähnliche Vertiefungen abgetheilt <sup>2)</sup>. In der linken Magenhälfte sind die Zellen zugleich größer, weniger zahlreich, die Zwischenwände einfach, in der Pförtnergegend die letztern vielfach eingeschnitten, mithin auch aus diesem Grunde den Darmzotten ähnlicher, wern gleich diese Zotten weit kleiner als die Darmzotten sind <sup>3)</sup>.

Außer

- 1) J. Yelloly on the vascular appearance of the human Stomach, which is frequently mistaken for Inflammation of that Organ. Med. chir. transact. Vol. IV. 1815. p. 371 — 424.
- 2) Hewson experim. Inquiries. Vol. 2. p. 175.
- 3) Abgebildet von E. Home. Observations on the gastric glands of the human stomach and the contraction which takes place in that viscus. Philosoph. Transact. 1817. Part. 1. p. 547 ff. P. 1. 18. 19. Uebersetzt in Medels d. Archiv. Bd. 4.



Außer einer großen Menge sehr feiner Vertiefungen, welche die Mündungen kleiner, einfacher Drüsen sind, enthält die innere Haut, vorzüglich in der Gegend der beiden Oeffnungen des Magens größere, welche zu mehr oder weniger deutlichen, ansehnlichen Drüsen führen. Diese bilden an der Uebergangsstelle der Speiseröhre in den Magen einen 3 — 4 Linien breiten, sehr deutlichen Vorsprung, wodurch beide Höhlen von einander etwas abgegränzt werden.

Die Zottenhaut des Magens geht in die Zottenhaut der Speiseröhre und des Darmkanals ununterbrochen über. Mit der Oberhaut derselben scheint sie mir dagegen keinen Zusammenhang zu haben, indem man diese an dem linken Magenrande ohne die geringste Gewalt von ihr und der Zottenhaut der Speiseröhre trennen kann, während diese sehr deutlich in die Zottenhaut des Magens übergeht.

Die Häute des Magens sind weder in allen Körpern, noch in demselben Körper zu verschiednen Zeiten und an allen Stellen gleich dick <sup>1)</sup>.

Im Allgemeinen sind sie in ersterer Beziehung in gesunden männlichen Körpern am dicksten, in der zweiten natürlich desto dicker, je weniger der Magen ausgedehnt ist.

In der dritten Hinsicht läßt sich für die Bauchfellhaut annehmen, daß sie überall gleich dick ist, dagegen sind die übrigen Häute im Grunde des Magens bei weitem am dünnsten, gegen den Pförtner am dicksten, hier nicht selten sechsmal dicker als dort.

1) Velloty a. a. O. S. 400 — 406.

wenigstens nur selten mehr breit als lang sind, und sich nie an dem Theile des Krummdarms, welcher dem Gekröse entspricht, sondern an den Seitentheilen, vorzüglich aber an dem vordern Theile befinden.

Sie ragen nicht, oder doch immer äußerst wenig, über die Oberfläche des Darms hervor, und man erkennt sie nur an der hier geringern Durchsichtigkeit desselben. Sie bilden eine aus hellen, durchsichtigen, sehr wenig vertieften, runden Stellen und dazwischen befindlichen dunklern Rändern zusammen gesetzte Lage von sehr geringer Dicke an der hintern Fläche der Schleimhaut.

Ihre Größe variirt von dem Durchmesser einiger Linien bis zur Länge von drei bis vier Zoll:n, und der Breite von ungefähr neun Linien.

Im obern Theile des Krummdarms stehen sie fünf bis sechs Zoll weit aus einander, im untern gehen sie, vorzüglich kurz vor dem Ende desselben, fast in einander über, und bilden bisweilen an dem freien Theile des Umfangs des dünnen Darms eine bis acht Zoll lange, beinahe ununterbrochne Schicht.

#### b. Verrichtungen des dünnen Darms.

§. 2163.

Die innere Haut des dünnen Darmes sondert den Darmschleim (*Mucus intestinalis*) und den Darmsaft (*Liquor entericus*) ab, die aber wahrscheinlich nur eine Flüssigkeit bilden, welche theils verähnlichend auf die eingenommenen Substanzen wirkt, theils durch Schlüpfrigmachen der innern Darmfläche das Fortschaffen derselben erleichtert. Dies wird durch die Muskelhaut des Darmkanals bewirkt, welche sich allmählich und abwechselnd von dem Anfange des Darmes gegen

gegen das Ende so zusammenzieht und erweitert, daß dadurch die Substanzen in dieser Richtung fortbewegt werden. Im ganzen dünnen Darm, vorzüglich aber im Zwölffingerdarm, wird, vorzüglich durch Einwirkung der Galle, welche durch den Bauchspeichel unterstützt wird, der Speisenbrei in den Milchsafft (Chylus), eine weißliche, dem Blute in ihrer Mischung sehr ähnliche Flüssigkeit, und den Koth (Faeces) geschieden, von welchen jene durch die Zotten der innern Darmhaut aufgenommen wird, und in die Sanguadern, höchst wahrscheinlich auch in die Darmblutadern gelangt, diese dem dicken Darm übergeben wird.

### C. Dicker Darm.

§. 2164.

Der dicke oder weite Darm (Int. crassum s. colon) unterscheidet sich von dem dünnen Darm 1) durch Lage und Befestigung; 2) äußere Gestalt; 3) Länge; 4) Weite; 5) Anordnung seiner Häute.

#### 1. Lage und Befestigung.

§. 2165.

Der dicke Darm bildet einen Bogen, der anfangs von rechts und unten nach oben, hierauf in querrer Richtung nach links, Dann nach unten absteigt, mit der Uebergangsstelle des dünnen Darms in ihn anfängt, und sich mit dem After endigt. Er nimmt seinen Anfang in der rechten Hüftgegend. Die Stelle ist nicht immer genau dieselbe. Meistentheils befindet sie sich an dem obern Ende der vordern Fläche des rechten Darmbeinmuskels, zwischen ihm und dem runden Lendenmuskel, bisweilen beträchtlich tiefer, bisweilen auch ansehnlich höher, vor dem rechten runden Len-

rechte und linke Hälfte, welche sich ungefähr in der Mitte seiner Länge findet, und mehr oder weniger beträchtlich ist. Die linke Hälfte enthält die flüssigen, die rechte die festen Substanzen, und die erstern treten aus dieser, ohne nothwendig oder wenigstens ganz durch die rechte und den Pförtner in den Dünndarm zu gelangen <sup>1)</sup>. Die Mündungen des Magens verschließen sich während der Verdauung mehr oder weniger fest, doch öffnet sich, wenn sie eine Zeitlang gebauert hat, der Pförtner, und die in ihm enthaltne Masse tritt in demselben Verhältniß als ihre Umwandlung vorgeschritten ist, durch ihn in den Zwölffingerdarm.

Zugleich ändert sich während der Verdauung die Lage des Magens ab, indem er sich so um seine Ase dreht, daß die vordere Fläche mehr nach oben, die hintere nach unten gewandt ist, wenn gleich diese anscheinende Veränderung der Stellung größtentheils in der vorher angegebenen Gestaltsveränderung begründet ist.

#### h. Verrichtung des Magens.

§. 2154.

Die innere Haut des Magens sondert den Magensaft (Succus gastricus), eine Flüssigkeit ab, deren wesentliche Beschaffenheit wegen ihrer immer mehr oder weniger Statt findenden Vermischung mit eingenommenen Substanzen sehr schwer genau zu bestimmen ist. Im Allgemeinen enthält er freie Säure, doch erscheint der Magensaft derselben Person bald sauer, bald neutral. Die Grundlage scheint eine der im Speichel vorkommenden sehr ähnliche, eiweißartige Substanz <sup>2)</sup>.

Viel:

<sup>1)</sup> E. Home Lect. on comparative anatomy. I. p. 158 ff.

<sup>2)</sup> Boström in med. chir. Transact. Vol. IV. p. 77.

stern, welches mit demselben Stücke einen mehr spitzen Winkel bildet.

Zwischen beiden befindet sich eine quere, länglichrundliche Faltung, die etwas zusammengezogene Mündung des dünnen Endes.

Jedes dieser Blätter wird durch die innere Haut der Gehäut und die Kreisfasern der Muskelhaut des Dünndarms und Grimmdarms gebildet, welche hier gegen einander umgehen sind, während die Längensfasern und die Bauchfellhaut nicht umbiegen, sondern brückenartig von dem freien Theile des dünnen Darmes zum dicken übergehen. Die Muskelhäute der Darmstücke werden an ihrer äußern Fläche durch Schleimgewebe an einander gehalten, und liegen, in Beziehung zur Klappe, am meisten noch innen. Wird dieses Schleimgewebe zwischen den Muskelhäuten vorsichtig gelöst, so wird die Klappe völlig zerstört, der dünne Darm öffnet sich durch eine Mündung, die etwas weiter als sein übriger Kaliber ist, trompetenförmig und ganz ohne Unterbrechung in den dicken, und die Verbindung beider hat dann eine desto größere Ähnlichkeit mit dem Uebergange der Speiseröhre in den Magen; da er wie dort die Scheidung dennoch durch auffallende, stark eichnete Verschiedenheit des Gewebes der innern Haut, größere Weite des untern aufnehmenden Theiles, und Uebertreten des letztern über den erstern in Gestalt eines blinden Endes genau angedeutet ist.

#### §. 2167.

Die Dickdarmklappe scheidet im normalen Zustande den dünnen und dicken Darm so von einander ab, daß zwar die abfließenden aus dem erstern ungehindert in den letztern übergehen, aber den in dem Dickdarm enthaltenen der Rücktritt vollständig

B. Dünner Darm<sup>1)</sup>

## §. 2156.

Der enge oder dünne Darm (*Intestinum tenue*) ist der längste und engste Theil des Darmkanals, welcher zwischen dem Magen und dem dicken Darm liegt, und in beide zwar ununterbrochen übergeht, indessen doch durch klappenartige Vorsprünge, den Pfortner und die Grimmdarmklappe, so von ihnen abgesondert wird, daß durch Verschließung derselben seine Höhle von der übrigen vollkommen getrennt werden kann, und unter gewissen Bedingungen wirklich getrennt wird.

Sein äußerer Umfang ist gleichförmig. Auch ist sein Durchmesser in dem bei weitem größten Theile seiner Länge gleich, seine Gestalt daher cylindrisch.

Die Länge des ganzen dünnen Darmes vom Pfortner bis zum Anfange des Grimmdarms variirt bedeutend, indem ich sie zwischen 13 und 27 Fuß schwankend fand, ohne daß die Länge des Körpers in demselben Verhältniß verschieden gewesen wäre<sup>2)</sup>.

Sein Durchmesser beträgt bei einer mäßigen Ausdehnung ungefähr einen Zoll.

Von den übrigen Dünndarm getrennt, kann man den Zwölffingerdarm betrachten, weil er sich mehrfach von demselben unterscheidet.

## 1. Zwölff-

1) L. Helvetius observations sur la membrane interne des Intestins grêles, appelée membrane veloutée, sur leur membrane nerveuse, sur leur membrane musculieuse ou charnue. In Mém de Paris 1721. p. 392 — 403. mit Abbild.

C. B. Albini descriptio intestinorum tenuium hominis. L. B. 1722. 1724.

2) C. Meckel über die Bildung des Darmkanals. Deutsches Archiv Bd. 3. Tabelle.

1. Zwölffingerdarm 1).

§. 2157.

Der Anfangstheil des dünnen Darms, welcher unmittelbar auf den Magen folgt, ist der Zwölffingerdarm (Duodenum), der seinen Namen von seiner Länge erhält.

Er liegt in der rechten Hälfte des Unterleibes, und bildet einen, mit der Wölbung nach rechts, der Ausbuchtung nach links gewendeten ansehnlichen Bogen, an dem man drei Theile, einen obern, schief von links nach rechts und etwas nach hinten aufsteigenden, einen mittlern, schief von der rechten zur linken Seite absteigenden, endlich einen dritten, von rechts nach links aufsteigenden Theil unterscheiden kann.

Er ist genau an die Gallenblase und den Anfang des queren Grimmdarms geheftet. Sein oberer, kleinerer Theil liegt über, der untere größere, unter dem Quergrimmdarm. Er wird in dem größten vordern Theile seines Umfangs von der hintern Wand des Bauchfelles, welche sich hier zur Bildung des Quergrimmdarmgekröses nach vorn fortsetzt, und ihn locker umgiebt, bekleidet, und dadurch genauer an die hintere Wand der Unterleibshöhle geheftet.

Der mittlere Theil tritt unter dem Quergrimmdarmgekröse nach unten, und ist hier, wenn dieses in die Höhe geschlagen wird, rechterseits von dem Dünndarmgekröse sichtbar. Der aufsteigende dritte Theil, liegt dagegen auf der linken Seite des Dünndarmgekröses, welches in seinem obern, größern Theile zunächst von ihm entspringt. Hier verläuft er bis zum zweiten Lendenwirbel, tritt an der Stelle, wo das obere

Ende

1) L. Claußen de intestini duodeni situ et nexu. Lips. 1757. 4.  
Rec. in Sandiforti thes. diss. T. III.

E. Sandifort tabulae intestini duodeni. L. B. 1780. 4.

Unter dieser Bedingung hat er entweder in seiner ganzen Länge diese aufsteigende Richtung, oder sein oberes Ende biegt sich wieder in einer längern oder kürzern Strecke nach unten um.

#### c. Aufsteigender dicker Darm.

##### §. 2171.

Der dicke Darm steigt von seinem Anfange aus als rechter oder aufsteigender dicker Darm (*Colon descendens*), das kürzeste Stück des dicken Darms, vor der rechten Niere, durch das kurze aufsteigende Quergrimmdarmgekröse eng an sie geheftet, nach oben bis an den vordern Theil der untern Fläche des rechten Leberlappens, schlägt sich hierauf unter einem rechten oder spitzen Winkel unter dem Grunde der Gallenblase, ohne im normalen Zustande mit ihr verbunden zu seyn, nach rechts, und wird zum Quergrimmdarm (*Colon transversum*).

#### d. Querer Grimmdarm.

##### §. 2172.

Dieser verläuft von hier aus, durch das viel breitere Quergrimmdarmgekröse an die hintere Wand des Unterleibes geheftet, unter dem Magen liegend, durch das große Netz mehr oder weniger eng mit ihm verbunden, immer mehr oder weniger tief vor den dünnen Därmen, gewöhnlich bis unter die Nabelgegend, oft bis in das kleine Becken herabreichend, immer beträchtlich, oft sehr ansehnlich länger als der aufsteigende Theil, und dann mehrere Windungen bildend, von der rechten zur linken Seite, ist an beiden Enden durch das hier kürzere Gekröse eng an den Zwölffingerdarm geheftet.



d. geht auf der Mitte der vordern Fläche der linken Niere, diam untern Ende der Milz unter einem Bogen, oder einem mehr oder weniger spitzigen, bisweilen doppelten Winkel in den absteigenden Grimmdarm (Colon descendens) über.

e. Absteigender Grimmdarm.

§. 2173.

Der absteigende Grimmdarm erstreckt sich von dem untern Ende der Milz längs der untern Hälfte der vordern Fläche der linken Niere, dann des breiten viereckigen Lendensteins, endlich dem obern und innern Theile des linken Lebermuskels zum Becken herab, und geht vor der linken Kreuz- und Heiligbeinverbindung in den Mastdarm über.

In seinem obern Theile ist er durch ein kurzes, in seinem untern durch ein ansehnliches Gefäß an die hintere Leberwand geheftet.

Dieser untere, mehr oder weniger weit nach vorn und oben ragende, bisweilen selbst mit dem Blinddarm verwachsene, nach rechts und vorn gewölbte Theil erhält den Namen: Krümmung des absteigenden Grimmdarmes (Curva sigmoidea s. iliaca s. S. romanum).

f. Mastdarm.

§. 2174.

Der Mastdarm (I. rectum) ist der letzte Theil des Darmkanals, der sich mit dem After nach außen öffnet. Er beginnt am untern Ende des Grimmdarms seinen Anfang, ist oben in einer kurzen Strecke durch eine kurze Falte, das Mastdarmgefäß (Mesorectum), im größten Theile seines Verlaufs nur durch lockeres Zellgewebe an die linke Hälfte der vordern

vordern Fläche des Heiligbeins geheftet, verläuft in dem größten Theile seiner Länge, so weit er im Bauchfelle enthalten ist, von links und oben nach rechts und unten, und nimmt erst nachdem er aus dem Bauchfelle getreten ist, zur untern Hälfte seiner Länge eine gerade Richtung an.

Während der Mastdarm nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite im Becken herab. In einem Exemplar dieser Art, den ich sah, schlug sich die linke untere große Biegung des absteigenden Grimmdarms beträchtlich weit nach der rechten Seite, verband sich in ihrem mittlern Theile sehr eng mit dem Anfange des aufsteigenden Grimmdarms, und wurde dadurch auf der rechten Seite befestigt. Ihr aufsteigender und ihr absteigender Theil hingen gleichfalls genau mit einander zusammen, entfernten sich aber nach unten wieder etwas voneinander. Unterhalb dieser Stelle aber wurden der Anfang der Krümmung und des Mastdarms wieder durch eine Verdopplung des Bauchfells mit einander verbunden, so daß hier eine beträchtliche Vertiefung entstand, welche leicht einen Theil des dünnen Darms von der Länge einiger Follen aufnehmen, und dadurch zur Bildung eines innern Bruchs Veranlassung geben konnte.

Man kann zwar mit Recht den Mastdarm als den untern Theil des dicken Darms ansehen, indessen unterscheidet er sich von diesem durch mehrere Bedingungen.

Er ist 1) meistens mehr oder weniger beträchtlich weiter;

2) die Bauchfellhaut bekleidet ihn nur in seiner obersten Hälfte, und auch hier nur in seiner größten Länge in dem hintern vordern Theile seines Umfangs, und bildet keine nebst ihm hängenden Anhänge;

3) ist

3) sind seine Muskelfasern bei weitem stärker, und die Längenschicht umgibt ihn in seinem ganzen Umfange.

Die innere Haut ist gleichfalls glatt und voll einfacher Schleimdrüsen, die aber hier kleiner und feltner sind.

### 3. Äußere Gestalt.

#### §. 2175.

Die äußere Gestalt des dicken Darmes ist nicht, wie die übrigen Abschnitte des Darmkanals, gleichförmig, cylindrisch, sondern er wird durch eine Menge von Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich. Die Längensmuskelfasern sind wirklich in drei Streifen zusammengedrängt, welche durch Zwischenräume von einander getrennt sind, und die ganze Muskelhaut ist kürzer als die inneren Häute. Dadurch entsteht, von der Zeit an, wo die Höhle des dicken Darmes mit den Leugnissen der Verdauung angefüllt wird, zwischen je zwei Wülsten eine Reihe von größern und kleinern bogenförmigen, wulstigen Hervorragungen, Zellen (*Cellulae*, s. *haustra*), welche einander ähnlich, aber nicht gleich und durchaus nicht symmetrisch angeordnet sind. Daß die Entstehungsweise dieser Unebenheiten die angegebne ist, ergibt sich aus der Bemerkung, daß, wenn die Längestreifen durchschnitten werden, an den Stellen des Darmkanals die Ungleichheiten verschwinden, und er eine gleichmäßige cylindrische Gestalt annimmt.

### 4. Länge und Weite.

#### §. 2176.

Die Länge des dicken Darms beträgt im Durchschnitt ungefähr fünf Fuß, sein Durchmesser bei einer mittlern Ausdehnung zwischen anderthalb und zwei Zollen.

Säugthiere und Vögel sehr allgemein, außerdem auch einige Amphibien und Fische, bloß Zotten, nur einige Gattungen aus den beiden letztern Klassen bloß quere Falten.

β. Z o t t e n <sup>1)</sup>.

§. 2161.

Die Zotten, Flocken sind kleine, dünne, längliche, meistens rundliche, bald cylindrische, bald fegelförmige, allmählich zugespitzte, bald an ihrem freien Ende knopfförmig angeschwollene Verlängerungen der Schleimhaut, von welchen diese auch den Namen Zottenhaut oder Sammethaut (*Tunica villosa*) erhält.

Sie bekleiden die ganze innere Fläche derselben, und stehen überall, besonders aber im obern Theile des dünnen Darmes, äußerst dicht neben einander, im untern sind sie dagegen weiter von einander entfernt. In Hinsicht auf ihre Gestalt nimmt man den von einigen, z. B. Galeati<sup>2)</sup> angegebenen Unterschied, daß sie im obern Theile cylindrisch oder zugespitzt, im untern keulförmig seyen, keinesweges allgemein wahr, dagegen habe ich sehr beständig, mit Hewson's Angabe übereinstimmend,

1) Außer den schon angeführten Schriften von Helvetius, Galeati, s. über die Zotten insbesondere:

J. N. Lieberkühn de fabrica et actione villorum intestinalium tenuum hominis. Ic. aeri incis. illustr. L. B. 1745. 4.

Hewson in dessen exper. inquir. T. 2. Cap. 12.

R. A. Hedwig disquisitio ampullularum Lieberkühni physico-microscopica. Lips. 1757.

A. Rudolphi über die Darmzotten in dessen Abhandl. S. 39 ff.

2) A. a. D. S. 173.

ser Isolation der Längensfasern des dicken Darmes rührt die ringere Dicke seiner Muskelhaut her. Die Streifen selbst sind in dem Verhältniß dicker, als sie sich von dem ganzen Anfänge des dicken Darmes zurückgezogen haben, über eine gleiche Linie dick, so daß die Muskelhaut da, wo sie sich findet, eine ansehnliche Dicke hat.

Zwischen diesen drei Streifen aber verlaufen hie und da mehrere einzelne Bündel von Längensfasern, und bei stark entwickelter Muskulosität ist der ganze Dickdarm von einer Längensfaserhülle umgeben, doch immer so umgeben, daß die Zwischenräume weit schwächer als die drei Streifen sind.

Die Kreisfasern umgeben immer den ganzen Umfang des Darmes, sind aber bedeutend schwächer als die Längensstreifen.

#### a. S c h l e i m h a u t.

##### §. 2179.

Die Schleimhaut ist, oberflächlich angesehen, völlig glatt, bei mehrerer Betrachtung aber durch eine reichliche Menge dicht an einander stehender, länglich-rundlicher, kleiner, mit Nabelspitzen gestochener Vertiefungen ungleich, wie gerinnt, und erhält dadurch, wie die innere Fläche der Schleimhaut des Magens, das Ansehen von Honigzellen<sup>1)</sup>. Die Erhabenheiten zwischen den Vertiefungen nehmen einen freien Raum als diese ein, und können als den Zotten des dünnen Darmes entsprechend angesehen werden. In Bezug auf die Anordnung der innern Haut beider Abtheilungen des Darmkanals, selbst an ihrer Uebergangsstelle, außersichtlich verschieden, und beide sind plötzlich von einander

2

abges

1) Gleichfalls schon von Heron richtig bemerkt. Exper. inquir. P. II, p. 174.

abgesetzt, wenn sie gleich im ununterbrochenen Zusammenhang stehen.

Ob diese Vertiefungen vorzugsweise absondern, und <sup>so</sup> her als kleine Schleimdrüschchen anzusehen sind, läßt sich nicht ausmitteln. Gewiß aber ist, daß sie von keiner, der übrigen Substanz der Schleimhaut verschiedenen Substanz umgeben sind, sondern diese hier dünner, durchsichtiger als in den Zwischenstellen erscheint.

Außer ihnen aber ist die innere Haut des Darmes außerordentlich reich an größern Schleimdrüsen, welche einzeln, oder zu zweien bis dreien vereinigt (*Gl. solitariae*), in gewissen Entfernungen von einander stehen, und als kleine, mit einem mehr oder weniger erhabnen Rande versehene Vertiefungen erscheinen, die man besonders an in Weingeist gehärteten Därmen wahrnimmt, wo sie durch die Zusammenziehung der innern Haut, und durch eine bräunliche Farbe, welche sie annehmen, deutlicher werden. Sie werden zum Theil durch die Vereinigung mehrerer der kleinsten Drüschchen gebildet <sup>1)</sup>.

#### 6. Muskeln des Afters.

§. 2180.

Das antere Ende des Mastdarms ist der Willkühr unterworfen, und wird durch mehrere Muskeln bewegt. Diese sind die Schließer, der Heber des Afters und die queren Mittelfleischmuskeln, von welchen ich aber hier nur die Schließer, die übrigen bei den Zeugungstheilen betrachte, indem sie mit diesen in gleich naher Beziehung stehen.

Schließ

1) Galeati a. a. D. Fig. 3.

## Schließer des After.

§. 2181.

Der After hat zwei Schließer, einen innern und einen äußern, welche beide wesentlich nur eine stärkere Entwicklung von Kreisfasern des Mastdarms sind.

## a. Innerer Schließer.

§. 2182.

Der innere Schließer (Sphincter ani internus) steht vorzüglich auf die angegebne Weise, indem die Längensfasern des Mastdarms drei bis vier Linien weit fehlen, die Kreisfasern röther und dicker, und zu einem, die Längensfasern überragenden platten Ringe werden, welcher die angegebne Höhe, ungefähr zwei Linien Dicke hat, und unmittelbar unter der äußern Haut liegt, wo sie sich nach innen schließt.

## b. Äußerer Schließer.

§. 2183.

Der äußere Schließer (Sphincter ani externus) ansehnlicher, stärker, deutlich von dem vorigen abgesondert, liegt ihn aber genau. Er liegt unter der Haut, mit welcher er sehr genau zusammenhängt, ist platt und dünn, die inneren Fasern sind gerader, die äußern mehr gewölbt, die vordern und hintern treten unter spitzen Winkeln zusammen. Sowohl an seinem vordern als an seinem hintern Ende läuft er eine Spitze aus.

Die hintere heftet sich unmittelbar oder durch verdichtetes Gewebe an die hintere Fläche der letzten Streißbeine.

Die vordere verwebt sich mit den queren Mittelfleischmuskeln, fließt außerdem gewöhnlich beim Manne mit dem hintern

Ende des Harnschnellers, beim Weibe mit dem des Scheidenschnellers zusammen, endigt sich aber auch oft, ohne einen von beiden Muskeln zu erreichen, fleischig oder sehnig im Rintfleisch.

Beim Manne ist er mehr länglichrund, so daß der größte Durchmesser von vorn nach hinten verläuft, beim Weibe mehr kreisförmig, überhaupt, vorzüglich aber in seinem vorderen Theile, breiter und stärker, Geschlechtsverschiedenheiten, welche unstreitig mit der Verschiedenheit der Form des Beckens und der äußern Geschlechtstheile zusammenhängen.

#### 7. Einrichtungen des dicken Darmes.

§. 2184.

Im dicken Darm werden aus den, in ihn gelangten Nahrungsmitteln die geringe Menge von, zur Ernährung tauglichen Bestandtheilen aufgenommen, die unbrauchbaren gegen das Afters getrieben. Auf diesem Wege wird der Koth immer dichter und fester, und periodisch durch die Thätigkeit der Mastdarmmuskulatur desselben, wenn die der Afterschließer durch sie überwunden oder willkürlich aufgehoben ist, ausgeleert.

#### 2. Periodische Verschiedenheiten<sup>1)</sup>.

§. 2185.

Unter den in der Unterleibshöhle enthaltenen Theilen der Verdauungswerkzeuge entsteht der Darmkanal zuerst. Die Art seiner ersten Entstehung, die Veränderungen, welche er in Hinsicht auf Lage, Gestalt und Größe entwickelt, bieten gleich merkwürdige Bedingungen dar.

a. Ent-

1) C. F. Wolff de formatione intestinorum N. C. Petrop. T. XII. 1768. Uebersetzt und mit einer einleitenden Vorrede versehen von J. F. Meckel. Halle. 1814.

Dien's



## a. Entstehungsweise.

§. 2186.

In der ersten Beziehung muß zuvörderst ein, mit der Bildung des ganzen Embryo, zunächst aber des Darmkanals in der engsten Verbindung stehender Theil, die Darmblase oder Nabelblase (*Vesicula intestinalis* s. *umbilicalis*) betrachtet werden. Dies ist ein mehr oder weniger rundliches Bläschen, das zwischen der Gefäßhaut und der Schafhaut liegt, und verhältnißmäßig zum Embryo desto größer ist, je näher es sich seinem Ursprunge befindet. In den frühesten Perioden ist es sogar größer als er selbst, wahrscheinlich immer früher als er vorhanden. Anfänglich reicht es bis dicht an

24

die

Oken's anatomisch, physiologische Untersuchungen, angestellt an Schweinsfötus, Schweinsembryonen und Hundeembryonen zur Lösung des Problems über das Nabelbläschen. Dessen Anatomie von drei Hundsembryonen u. s. w. Dessen Beweis, daß alle Säugthiere die Darmblase besitzen, und die Därme aus ihr ihren Ursprung nehmen. In Oken's und Kieser's Beiträgen. Hamburg. 1806. 1807.

J. F. Meckel in dessen Abhandl. aus der menschl. und vergl. Anatomie. Halle. 1806.

In dessen Beiträgen zur vergl. Anatomie. Halle. 1808. Bd. 1. Hft. 1. No. V. Beiträge zur Geschichte des menschl. Fötus.

Derselbe über die Divertikel in Keil's Archiv. S. die Physiologie Bd. 9.

D. Kieser der Ursprung des Darmkanals aus dem Nabelbläschen. Göttingen. 1810.

Höchstetter und Emmert über das Nabelbläschen. In Keil's Archiv. Bd. 10.

Fleischmann's Leichenöffnungen. Erlangen. 1815. I. Abnormitäten des Darmkanals. S. 1 — 75.

J. F. Meckel's Bildungsgeichte des Darmkanals der Säugthiere und namentlich des Menschen. Im deutschen Archiv für die Physiol. Bd. 3. Hft. 1.

die vordere Fläche seines Körpers, so daß dieser auf ihm unmittelbar aufliegt, allmählich und zwar schon ziemlich früh schon im ersten Monate, verkleinert es sich bedeutend, und entfernt sich vom Embryo, so daß es im zweiten schon immer außerhalb der Nabelscheide liegt.

Ob die Nabelblase und der Darmkanal anfänglich durch ihre Wände zusammenhängen, ist nach mehreren, sehr verdorbenen Anatomen <sup>1)</sup> weder beim Säugthierembryo überhaupt, noch beim menschlichen insbesondere erwiesen. Indessen wird dieser Zusammenhang durch folgende Bedingungen höchst wahrscheinlich:

1) die Analogie mit den Vögeln, Reptilien und Knorpelfischen, deren Dotterhaut der Nabelblase völlig entspricht<sup>2)</sup>, und bei denen ein solcher Zusammenhang in allen Perioden des Fötuslebens, besonders aber den frühesten, völlig erwiesen ist;

2) sieht man bei zarten Embryonen bisweilen einen, von dem Nabelbläschen durch die Nabelscheide gegen den Unterleib verlaufenden Gang, in und aus welchem man die in dem ersten enthaltne Flüssigkeit hin- und her schieben kann <sup>3)</sup>;

3) finden sich beständig beim Embryo bis zum Anfang des vierten Monats Blutgefäße, welche vom Gefröße aus gegen das Nabelbläschen hinlaufen, sich anfänglich auf demselben verzweigen, allmählich aber nur bis zur vordern Wand des

1) Emmert. Höchstetter. Cuvier. Mém. du muséum. T. III.

2) Needham de form. foetu. Lond. 1667. p. 79.

Blumenbach. Spec. phys. comp. inter anim. oal. lang. or. et viv. Gott. 1789. p. II.

3) Emmerring. (Hallers Grundr. Bd. 2. S. 799. 800.

3) Hunter. Anat. Besch. des schw. Uterus. S. 68.

Unterleibes reifen, dann absterben, so daß sie endlich zer-  
reißen und ganz verschwinden, die Nabelgefäßgefäße  
(Vasa omphalo-mesaraica) eine Arterie und eine Vene,  
welche aus den Gefäßgefäßen entspringen<sup>1)</sup>.

Diese finden sich auch bei den Vögeln und begeben sich  
bei diesen längs dem Dottergange von und zu dem Dotter;

4) liegen die Därme anfänglich der Nabelblase sehr nahe,  
außerhalb der eigentlichen Unterleibshöhle, in der Nabelscheide,  
die jetzt wirklich ein Theil der Unterleibshöhle ist<sup>2)</sup>;

5) findet sich verhältnißmäßig nicht selten beim reifen  
Fötus ein offener Gang, welcher vom Darm zum Nabel geht,  
sich hier öffnet, und immer von den Nabelgefäßgefäßen be-  
gleitet ist<sup>3)</sup>.

Hieraus ist es also sehr wahrscheinlich, wenn gleich  
keinesweges gewiß, daß anfänglich ein Zusammenhang  
zwischen dem Dotter und dem Darmkanal Statt findet. In-  
dessen finden sich Thatsachen, welche die Anwesenheit dieses  
Zusammenhanges zur Gewißheit zu erheben scheinen.

So habe ich schon früher eine von mir gemachte Beobach-  
tung angeführt, wo bei einem fünf Linien langen menschlichen  
Embryo ein deutlicher, mit der Nabelblase zusammenhängen-  
der Faden zum Darm verlief<sup>4)</sup>, und bei Embryonen von

L 5

Schas

1) Meckel path. Anat. S. 563. Eine Bemerkung, die ich stets  
dem wenigstens an 10 Embryonen aus dieser Periode bestätigt  
gefunden habe.

2) Meckel Abhandl. 1806. S. 301.

Oken. Beitr. 1806. Hft. I. X.

3) Beispiele von dieser Mißbildung, die ich selbst einmal gesehen  
und beschrieben, (Meils Archiv Bd. IX.) habe ich im ersten  
Bande meiner path. Anat. zusammengestellt.

4) A. (Nr. 3.) u. D. Archiv Bd. 3. 1817. S. 20.

Schafen und Kühen diesen Zusammenhang abgebildet <sup>1)</sup>. In sen stellen auch mehrere, zu dem, die erste Beobachtung haltenden Aufsätze gehörige Abbildungen, deren Originale noch in meiner Sammlung befinden, dar. <sup>2)</sup>, und später durch Beschreibung und Abbildung von *Wojanus* am Sch. embryo bestätigt worden <sup>3)</sup>.

Doch wird die Richtigkeit dieser Ansicht von trefflichen Männern bestritten. Namentlich behaupten *Emmert*, *Hofketter* und *Euvier* <sup>4)</sup>, daß keinesweges ein wirklicher Substanzzusammenhang zwischen beiden Theilen Statt hat und der einzig vorhandne nur zwischen dem Gefäßsystem des Embryo und der Nabelblase vermittelt der Nabelgefäßgefäße bestehe. Zwar erkennen sie außer den Nabelgefäßgefäßen einen dritten Faden zwischen Darmkanal und Nabelblase an, halten diesen aber nicht für einen Verbindungskanal, sondern für einen bloßen Fortsatz des Bauchfelles, und führen die Gründe für ihre Ansicht an:

1) Die Unmöglichkeit, Luft oder den flüssigen Inhalt der Darmblase aus dieser in den Darmkanal zu treiben <sup>5)</sup>.

2) Die bedeutende Verschiedenheit zwischen der weissen, dicken Substanz des Darmkanals von der dünnen, röthlichen Haut der Darmblase sowohl, als dem garten durchscheinenden

1) Müller de genitalium evolutione. Halae. 1815. Fig. 1. 2. 2<sup>a</sup>. n. p. 11.

2) Deutsches Archiv 1817. Bd. 3. Taf. 1. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 1. Taf. 2. Fig. 1.

3) Ueber die Darmblase des Schafsfötus, zum Beweise, daß die Vesicula umbilicalis schon längst mit dem Darm unmittelbar zusammenhängt. Deutsches Archiv. 1818. Bd. 4. S. 34 ff.

4) A. a. D.

5) Emmert in Reils Archiv Bd. 10. S. 52.

hutzen, welches diese beiden Organe verbindet und die Magenkrösgefäße begleitet \*).

Allein gegen die Beweiskraft des ersten Grundes läßt sich leicht Recht einwenden, daß diese Erscheinung sowohl in der Mündung des Ganges als in der Dünne der Nabelblase begründet seyn kann, und daß sie höchstens den Mangel eines hohlen Verbindungsganges beweisen würde, dessen Annahme durchsich nicht nothwendig ist, da der Darmkanal mehrerer Thiere in regelmäßigem Zustande stellenweise solide ist.

Der zweite Grund verliert gleichfalls alles Gewicht, wenn man erwägt, daß die Harnhaut und der Harnstrang wenigstens eben so verschieden von der Harnblase sind, und daß in verschiedenen Abschnitten desselben Systems beständig dieselben und noch größere Verschiedenheiten im Baue Statt finden. Je desto gegründerere Bemerkung, da ich bei den Haifischfötus die Verbindungsöffnung bei den größten Verschiedenheiten zwischen Dotterhaut und Darmkanal weiter als irgendwo fand.

Ueberdies sind diese in der That in den zuletzt erwähnten Fällen nichts weniger als bedeutend.

Ich glaube daher für jetzt noch einen Substanzzusammenhang zwischen der Darmblase und dem Darmkanal annehmen dürfen, ohne bestimmen zu wollen, ob die Höhlen beider Organe sich in einander öffnen.

Der Analogie mit der Entwicklung des Darms im Vogelei-Eryo nach entsteht dieser so, daß die Dotterhaut, welche sich fangs von der Wirbelsäule unmittelbar umbiegt, allmählich auf beiden Seiten einen kleinen Vorsprung bildet, so daß so der Darm zuerst die Gestalt einer, vorn offenen, hohlen Kanne hat. Allmählich verschließt sich diese, indem ihre Wände

von

1) Emmert ebendas. S. 75.

von hinten nach vorn, von oben nach unten, und von unten nach oben wachsen, bis auf die Stelle, an welcher die Höhle des nun gebildeten Darms mit dem Dotterfact durch den sich allmählich immer mehr verengenden Dottergang zusammenhängt<sup>1)</sup>. Weit weniger wahrscheinlich ist es dagegen, wie Oken glaubt, der Darmkanal von der Nabelblase aus schon als hohler Kanal nach oben und nach unten in den Unterleib hineinzuwachsen, indem für diese Meinung durchaus keine Thatsache spricht.

§. 2187.

Zunächst fragt es sich, ob der Darmkanal immer an einer bestimmten Stelle mit dem Dotter in Verbindung steht, und an welcher? Anfänglich geht der Darmkanal in seinem ganzen vordern Rande in den Dotter über; indessen ist es schon an und für sich, der überall Statt findenden Beständigkeit der Bildungsgeschichte wegen, wahrscheinlich, daß die Stelle, auf welche zuletzt dieser Zusammenhang beschränkt wird, wenn gleich in einer gewissen Breite, doch immer eine bestimmte seyn werde.

Solcher Stellen sind zwei angegeben worden. Nach Oken ist es die Uebergangsstelle des dünnen Darms in den

1) Diese Darstellung der Entwicklung des Darmkanals aus der Dotterhaut hat Wolff beim Vogel schon längst durch äußerst genaue und sorgfältige, zur rechten Zeit, d. h. in sehr frühen Entwicklungsperioden angestellte Versuche, nachgewiesen. (De formatione intestinorum in nov. comment. Petropol. T. XII. 1768.) Da schon Needham, Blumenbach und Sommering die Identität des Dotters mit der Nabelblase ausgesprochen haben, so ergibt es sich, mit welchem Recht Oken sich (Beitr. zur vergleichenden Anatomie 1806. und auch neuerlich im Lehrbuch der Naturgesch. 1815., wo er S. 2. sagt: diese Entstehung der Därme aus den Nabelbläschen hat sich in Schweinspüllen entdeckt) zueignen könne.

den dicken, und der Wurmfortsatz und Blinddarm sind die Restate und Ueberbleibsel dieser Verbindung <sup>1)</sup>. Einer Meinung nach wird, indem das Nabelbläschen zusammenfällt und die Därme zurückstreben, eine enge Stelle, ein Hals, gebildet, deren Wände sich allmählich berühren und verschließen, wodurch der Darm von dem Nabelbläschen abgeschnürt wird. Nun tritt der Darm in die Bauchhöhle zurück, wo sich jetzt die vorher parallele Lage der Därme ändern muß, so daß sich nothwendig der vordere Darm unter einem Winkel in den Hals senkt; der, weil er mit dem hintern Darm in derselben Richtung bleibt, eine Verlängerung von ihm wird. Deshalb scheint sich der obere Darm in den untern einzusenken, und der Winkel des Zusammenflusses wird Dickdarmklappe, der Hals Blinddarm und Wurmfortsatz.

Allein man sieht 1) durchaus nicht ein, warum nothwendig die Folge dieses Abschnürens und Zurücktretens der Därme in der Unterleib Einsenkung des obern Darmtheils, in den untern unter einem Winkel, und Bildung eines Wurmfortsatzes die Folge haben soll: dies um so weniger, da in der That nicht beim Menschen der Mangel eines Blinddarms und der Dickdarmklappe bisweilen als abweichende, sondern bei vielen mit einer Nabelblase versehenen Säugthieren als beständige Bildung vorkommt, während andre, die einen ungeheuren Blinddarm haben, keine besitzen. Ueberhaupt wird schon durch die große Verschiedenheit des Blinddarms in Hinsicht auf Länge und Bau diese Meinung höchst unwahrscheinlich. Es ist im Gegentheil viel wahrscheinlicher, daß die Folge davon die Bildung eines einfachen, ununterbrochnen Kanals seyn werde.

2) Fins

1) H. a. D. Hft. II. S. 25.

2) Findet die Veranlassung, welche Oken angiebt, nicht Statt, denn der Blinddarm findet sich längst, ehe die Därme in die Bauchhöhle getreten sind, ja er liegt selbst in der Nabelscheide.

3) Würde unfreilich, wenn der Blinddarm die Stelle wäre, an welcher sich der Darm von der Nabelblase trennte, dieser am weitesten nach vorn, der Nabelblase am nächsten liegen. Dies aber ist nie der Fall, sondern immer liegt ein Bündel des dünnen Darmes vor dem Wurmfortsatz. Oken hat zwar, „nach seiner Idee, nach welcher sich die Därme im Menschen vom Nabelbläschen ablösen müssen“, das Gegentheil abgebildet<sup>1)</sup>, allein unglücklicherweise ohne die Natur zu befragen.

4. 2188.

Diese Meinung hat desto mehr gegen sich, da eine Menge von Gründen es höchst wahrscheinlich machen, daß sich der Zusammenhang zwischen dem Darm und der Nabelblase zuletzt zwar immer auf eine bestimmte aber ganz andere Stelle beschränkt. Diese Stelle befindet sich am dünnen Darm, seinem untern Ende weit näher als dem obern.

Gründe für diese Ansicht, welche eben so viele Widerlegungsgründe der von Oken aufgestellten abgeben, sind:

1) Von dieser Stelle aus verlaufen je desmal die, im Vorigen (S. 297.) angeführten offenen Gänge zur vordern Unterleibsfläche.

2) In einem seltenen Falle sah sogar bei einem reifen, durch mehrere Hemmungsbildungen entstellten menschlichen Fötus, auf einem solchen offenen Gange eine wahre, regelwidrig fortgewachsene Nabelblase auf<sup>2)</sup>.

3) In

1) A. a. D. S. 84. Taf. IV. Fig. 4.

2) Liedemann kopflose Mißgeburten. Landsh. 1813. Taf. 4.



3) In diesen Theil des Darmkanals senkt sich bei den Vögeln und Reptilien der Dottergang.

4) Bei den meisten Vögeln, vielleicht einigen Säugethieren, findet sich als normale, beim Menschen und andern Säugethieren nicht selten als abweichende Bildung das ganze Leben hindurch an eben dieser Stelle, und nur an dieser, eine Spur jenes Ganges als ein, immer einfacher, mehr oder weniger langer und weiter, aus denselben Häuten mit dem übrigen Darm gebildeter, rundlicher Fortsatz oder Anhang, das Divertikel, welches häufig sowohl beim Fetus als beim Erwachsenen von Spuren der Nabelgefäßgefäße begleitet wird.

Höchst wahrscheinlich giebt es eine Periode im Leben des menschlichen Embryo, wo, nachdem sich die Nabelblase vom Darmkanal getrennt hat, ein solcher kleiner Höcker regelmäßig vorhanden ist. Ich habe, weil ich bei vier menschlichen Embryonen aus dem Ende des dritten Monates, die ich fast zugleich untersuchte, immer ein sehr ansehnliches, von den Nabelgefäßgefäßen begleitetes Divertikel fand, sogar vermuthet, daß sich dieses regelmäßige Divertikel, noch nachdem die Därme in den Unterleib getreten sind, bis in diese Periode erhalten möge<sup>1)</sup>. Diese Vermuthung nehme ich, ungeachtet sie von niemand berichtet worden ist, zurück. Findet sich wirklich ein Divertikel eine Zeit lang als normale Bildung, so verschwindet es weit früher als in der angegebenen Periode, denn schon in der siebenten Woche habe ich einen deutlichen Blinddarm, aber kein Divertikel gefunden, so daß also die Nabelgefäßgefäße weit länger als das Divertikel bestehen. Dies aber beweist natürlich eben so wenig, daß sich nie ein Divertikel als normale

1) Path. Anat. Bd. 1. S. 565.

male Bildung finde, als daß der Blinddarm die von Oken angegebne Bedeutung habe.

5) Laufen die Nabelgefäßgefäße sowohl nachdem die Därme in den Unterleib zurückgetreten sind, als vorher, gerade über eben diese Stelle weg in die Nabelscheide.

6) Unter allen diesen Bedingungen sind immer an der gewöhnlichen Stelle des Ueberganges des dünnen in den dicken Darm, ein oder zwei normale Blinddärme vorhanden.

Diese Gründe scheinen mir die Ansicht, daß die Nabelblase am Krummdarm aufsitzte, viel wahrscheinlicher, als die erstere zu machen. Das bisweilen vorkommende Divertikel entsteht entweder in Folge einer regelwidrigen Trägheit des Bildungsprocesses, oder, weil der Hals der Nabelblase, der sonst vielleicht bis zum Darmkanal hin abstirbt, hier nur in einer kürzern Strecke verschwand.

Oken hat zwar, ungeachtet diese Gründe gegen seine Ansicht und für die letztere schon längst angeführt worden sind, kürzlich nicht nur abermals erklärt, daß das von der Nabelblase abgelöste Ende des Darmkanals *Blinddarm* heiße <sup>1)</sup>, sondern, wie es scheint, als Widerlegung jener Gründe, und um seine Ansicht zu retten, die Gesetze gegeben: „daß es 1) nie „mehr als einen Blinddarm gebe; 2) die Blinddärme der „Vögel diesen Namen nicht verdienen, sondern Harnblasens „zipfel seyen <sup>2)</sup>; 3) daß der Blinddarm bei allen Säugethieren, „Vögeln und den Fischen, welche große Eier legen, vorhanden, nur bei manchen, vorzüglich solchen Thieren, deren Eier „klein sind, sehr klein, so klein sey, daß er nicht erkannt werden könne <sup>3)</sup>; 4) daß er der ehemalige Dotterkanal sey.“

Da

1) Zoologie. 1815. Bd. I. S. 2.

2) N. a. D. S. 10.

3) Ebendas.

Da diese Behauptungen in einem Elementarwerke vorkommen, das für den allergrößten Wirkungskreis wenigstens stimmt, so verdienen sie einige Beleuchtung; ungeachtet ihre Richtigkeit dem Kenner augenblicklich einleuchtet.

Bei Aufstellung dieser Gründe dachte Oken schwers: 1) an die mit zwei Blinddärmen versehenen Säugthiere, namentlich die Dama, den Phaslosom; 2) an die Gleichzeitigkeit der Anwesenheit des Nabelblasenganges und Divertikels mit dem Blinddarm bei Säugthieren und Vögeln; 3) an die völlige Gleichheit der Verhältnisse, welche bei Vögeln und Säugthieren zwischen Blinddärmen, Dottergang, Divertikel und dem übrigen Darmkanal Statt finden, sofern jener sich überall an der Gränze zwischen dünnem und dickem Darm befindet, dieses nicht; 4) an den gänzlichen Mangel irgend einer, die nur einigermaßen die Probe haltenden Thatsache, welche die Verbindung zwischen dem Darm und der Nabelblase nach dem Blinddarm erweise, während diese Verbindung mit dem untern Theile des dünnen Darms in vielen Fällen Statt findet; 5) daß die Größe oder Kleinheit hier gar keinen Einfluß auf Mangel, Größe und andre Bedingungen des Blinddarms haben, da er bei vielen Säugthieren sehr groß ist, bei vielen Vögeln fehlt. Selbst wenn man Oken zugeben wollte, daß der Divertikel der Vögel Blinddarm sey, (was doch ganz möglich ist) so wäre gerade sein drittes Gesetz dadurch am besten widerlegt. Was es übrigens heiße, daß alle Säugthiere u. s. w. einen Blinddarm haben, dieser aber bei mehreren so klein sey, daß er nicht erkannt werden könne, ist allerdings etwas schwer verständlich.

Später hat derselbe Schriftsteller als fernere Gründe für seine Ansicht aufgestellt:

1) Die Anordnung der Blinddärme der Fische, bei welchen der Dotter höherer Thiere in mehrere blinde Säcke zerfallen sey;

2) die Bildung der Chondropterygier, wo die Entstehung des Blinddarms aus dem Dotter sehr deutlich sey <sup>1)</sup>.

Diese könnte man füglich auf sich beruhen lassen; da der Sachkundige, wenn er auf Oken nicht den gewiß ungegründeten Verdacht werfen will, daß er an sie geglaubt habe, auf den ersten Blick sieht, für welche Leser sie bestimmt sind; indessen, um jedem, dadurch bei Unkundigen bezweckten Irrthum vorzubeugen, ist zu bemerken, daß

1) die vergleichende Anatomie auf das kündigste darthut, daß die Blinddärme der Fische Bauchspeicheldrüsen sind, welche bis jetzt niemand mit dem, zugleich bei demselben Thiere vorkommenden Dotter verglichen hat;

2) der Blinddarm der Chondropterygier in das Ende des dicken, der Dottergang in das Ende des dünnen Darmes tritt.

3) Der letztere mit dem Dotter weit offen beim Embryo, gleichzeitig mit dem erstern und von ihm durchaus getrennt, vorhanden ist, und dieser das ganze Leben hindurch besteht, während der erstere spurlos verschwindet.

Nach dem Gesagten glaube ich also der von mir vorgetragenen Meinung, daß der Blinddarm nicht das Ueberbleibsel einer ehemaligen Verbindung zwischen der Dotterblase und dem Darmkanal sey, und daß diese, gleichviel auf welche Weise, an einer andern, namentlich der von mir angegebenen Stelle,

Statt

---

1) Isis 1818. S. 30.

Statt finde, getreu bleiben zu können, und fühle mich um so mehr in derselben befestigt, da treffliche Autoritäten, namentlich von Riedemann<sup>1)</sup>, Cuvier<sup>2)</sup>, Dutrochet<sup>3)</sup>, Jäger<sup>4)</sup> für dieselbe sprechen.

## b. L a g e.

## §. 2189.

Die Lage des Darmkanals ist, schon nach dem vorigen, nicht in allen Perioden dieselbe. Ungeachtet er sich an der vordern Fläche der Wirbelsäule bildet, so liegt er doch in frühen Perioden seinem größten Theile nach weiter von derselben entfernt als späterhin. Nur sein kürzester, oberer und unterer Theil befinden sich in der eigentlichen Bauchhöhle, der bei weitem größere in der Nabelscheide, die zum Theil, aber nicht bloß aus diesem Grunde, anfänglich außerordentlich dick, und eine Fortsetzung der Bauchhöhle ist. Anfangs liegt das obere und untere Ende des Darmkanals hier gerade neben einander, und beide biegen sich unter einem Winkel in einander über. Allmählich aber, schon um die siebente Woche des Embryolebens, ziehen sie sich zurück, fangen an sich zu winden, und legen sich in einen Knäuel vor der Nabelöffnung zusammen. Nur der dünne Darm bildet diese Windungen, der dicke liegt ganz gerade, mit seinem stumpfen Ende, dem Blinddarm, nach vorn gerichtet, immer aber weit hinter dem vordern Ende des dünnen Darms.

Um die Mitte des dritten Monates tritt der ganze Darmkanal bei regelmäßiger Entwicklung jedesmal völlig in die Un-

1) Anat. der kopflosen Mißgeburten. S. 66.

2) Oken's Jss. 1818. S. 138.

3) Deutsches Archiv f. die Physiol. Bd. 4. S. 295.

4) Deutsches Archiv f. die Physiol. Bd. 3. S. 543.

terleibshöhle zurück, so daß der untere Theil des dünnen Darms zuletzt einschlüpft. Sowohl jetzt, als noch eine Zeitlang nachher, eben so sehr als in frühern Perioden, weicht vorzüglich der dicke Darm von der später normalen Lage ab. Er besteht nämlich nicht aus einem rechten und linken senkrechten, und einem mittlern queren Theile, deren erstere durch kurze Falten dicht auf die dahinter liegenden Theile geheftet wären, sondern anfangs bloß aus einem senkrechten, durch ein langes Gefäß auf die Mitte der hintern Unterleibswand gehefteten Theile, der allmählich sich erst oben von der linken zur rechten Seite umbiegt, darauf rechterseits von oben nach unten herabsteigt, so daß erst am Ende des vierten Monates die Stelle des Ueberganges des dünnen in den dicken Darm sich an der rechten Hüftgegend befindet. Sehr lange, und selbst noch beim reifen Fötus bildet der absteigende Theil des dicken Darms in der linken Hüftgegend einen weit größern Bogen als im vollkommenen Zustande, unstreitig wegen Enge des Beckens.

Der Magen weicht insofern in frühen Perioden von seiner normalen Lage ab, als er anfänglich beinahe ganz senkrecht steht. Von ihm geht der Zwölffingerdarm, ohne Windungen zu bilden, gerade nach unten und vorn herab. Erst mit der Verkleinerung der Leber und dem Eintritt der Därme in die Unterleibshöhle verändert sich die Lage beider allmählich.

c. G r ö ß e.

§. 2190.

Der Darmkanal ist überhaupt desto kürzer und enger, in je frühern Perioden er untersucht wird. Anfangs hat er nur die Länge der Wirbelsäule, indem er aus der vordern Fläche derselben hervorstößt. Darauf streckt er sich und reicht,  
aber

aber immer gerade, in die Nabelscheide. Bei zunehmender Größe windet er sich, indem er auf einen engen Raum beschränkt ist.

Der dünne Darm ist verhältnismäßig zum dicken desto weiter, je jünger der Embryo ist. In dieser Hinsicht findet ein dem spätern ganz entgegengesetztes Verhältniß Statt, indem lange der dünne Darm viel weiter als der dicke ist. Selbst noch beim reifen Fötus ist der dicke oft gar nicht, oder nur sehr unbedeutend weiter als der dünne.

Dagegen ist der dicke Darm verhältnismäßig zum dünnen desto länger, je jünger der Embryo ist, unstreitig, weil anfangs der dünne verhältnismäßig zum Körper weit kleiner als in spätern Perioden ist.

Der Blinddarm und Wurmfortsatz sind anfänglich klein, entwickeln sich aber bald bedeutend, so daß sie lange, in Hinsicht auf Weite und Länge, verhältnismäßig weit ansehnlicher sind als in spätern Perioden. Beide Theile sind anfangs gar nicht auf dieselbe Art als späterhin von einander verschieden, indem sich der Blinddarm nicht, ehe er in den Wurmfortsatz übergeht, über denselben hinausbiegt, dieser auch nicht als ein so enger Anhang, sondern als das wenig zusammengezogene, über den Krummdarm hinausreichende blinde Ende des dicken Darmes erscheint.

Da der Blinddarm anfänglich beim Menschen und den Säugethieren überhaupt, sowohl als beim Vogel, anfangs als ein kleiner Höcker erscheint, der sich erst allmählich vergrößert, anfangs gar nicht sichtbar ist, so ist seine Entstehung schon aus diesem Grunde nicht auf die von Oken angenommene Art, sondern aus einem Heraufwachsen aus dem dicken Darm

zu erklären. Vorher findet sich keine Spur eines Unterschiedes zwischen dickem und dünnem Darm. Auch die Grimmdarmklappe ist anfangs unvollkommen, klein, doch ist sie schon im dritten Monate deutlich, und beim reifen Fötus vollkommen ausgebildet.

d. G e s t a l t.

§. 2191.

Sowohl die Gestalt des Darmkanals im Ganzen als die Beschaffenheit seiner Häute im Einzelnen bietet bedeutende Entwicklungsverschiedenheiten dar.

Manche der erstern, welche den Blinddarm betreffen, sind schon bei Betrachtung der Größerverschiedenheiten angegeben. Außerdem ist zu bemerken, daß 1) der Magen in den frühesten Perioden länglicher, dann rundlicher als bei vollkommener Ausbildung ist; der blinde Sack anfangs ganz fehlt, dann stärker als späterhin ist.

2) Die äußere Fläche des Dickdarms ist bis um das Ende des fünften Monats völlig gleich. Die, seine größere Weite begründenden Zellen entstehen zuerst in seinem Querstücke.

Von den Häuten des Darmkanals zeigt vorzüglich die innere folgende Entwicklungsverschiedenheiten.

Sie ist:

1) sich selbst in den verschiednen Gegenden des Darmkanals in den frühern Lebensperioden ähnlicher als in spätern. Dies ergiebt sich sowohl aus der Betrachtung der Zotten als der Falten.

a) Zotten. Vor dem dritten Embryomonat nimmt man keine Zotten wahr. Jetzt erscheinen sie zuerst im ganzen Darmkanal als Längenfalten, welche an ihrer Oberfläche eingekerbt sind,



sind, und deren Zahl, so wie die der Einschnitte, sich allmählich vermehrt. Hiedurch entstehen die Zotten. Haben sie sich auf diese Weise gebildet, so sind sie bis in den siebenten Fötusmonat auch im dicken Darm vorhanden, wenn gleich ihre Länge schon im dritten hier bedeutend geringer als im dünnen ist, und mit jedem Monate sowohl diese als ihre Zahl abnimmt, wodurch anfangs der dünne und dicke Darm überein kamen.

b) Falten. Die Falten des Leerdarms fehlen bis in den siebenten Monat, und sind noch beim reifen Fötus sehr niedrig und leicht durch Zerrung zu zerstreuen.

Beide Bedingungen sind als Thierähnlichkeiten merkwürdig.

2) Die innere Haut des Magens ist in den frühern Embryoperioden dicker und weit leichter von der darauf folgenden trennbar als später, so daß man sie leicht als einen vollständigen Sack herausnehmen kann.

## II. Regelwidriger Zustand <sup>1)</sup>.

### §. 2192.

Der Unterleibstheil des Speisefanals bietet sowohl in Rücksicht auf äußere als innere Form sehr bedeutende Abweichungen dar, und wird in dieser Hinsicht am besten im Zusammenhang betrachtet.

#### II 4

#### I. Form.

---

1) A. Monro the morbid anatomy of the human gullet, stomach and intestines. Edinburgh. 1811.

## I. Formabweichungen.

## A. Ursprüngliche Bildungsfehler.

§. 2193.

Die ursprünglichen Bildungsfehler gehören vorzüglich in die Klasse der quantitativen.

Unter diesen sind in die erste Klasse, deren Wesen ein unvollkommenes, oder nach dem Embryotypus Statt findendes Wirken der bildenden Thätigkeit ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder entschiedner Gewißheit folgende zu setzen.

## 1. Allgemeine.

a) Mangel. Dieser trifft vorzüglich

α) den Magen, namentlich bei wahrer Kopfflosigkeit, wo sich der fast immer oben blind geendigte Darmkanal nur höchst selten erweitert. Bisweilen fehlen auch einzelne Theile des Magens, namentlich die Pfortnerklappe, entweder ganz oder in einem Theile ihres Umfangs<sup>1)</sup>;

β) den dünnen Darm, unter derselben Bedingung ganz oder zum Theil, indem hier oft nur der dicke, oder nur der untere Theil des dünnen vorhanden ist;

γ) den Wurmfortsatz, der, indessen nur selten, auch bei übrigen regelmäßiger Bildung fehlt;

δ) die Dickdarmklappe, welche dann bloß durch verstärkte Muskelfasern ersetzt wird;

ε) den Dickdarm. Hier giebt es verschiedene Grade, die, weil meistens zugleich der After verschlossen ist, gewöhnlich in die Rubrik der Afterschließung (Atresia ani) gesetzt werden.

Am

---

<sup>1)</sup> Fleischmann's Leichendöffnungen. S. 100 — 102.

Am seltensten fehlt der ganze Dickdarm, so daß er nur als ein kleiner blinder Anhang am dünnen erscheint. Hierauf folgt in Hinsicht auf Häufigkeit die Bildung, wo ein kleines Stück des Anfangs fehlt, und die Verbindung zwischen Dünn- und Dickdarm unterbrochen ist; dann die, wo der Dickdarm bis zum Eingange des Beckens gebildet ist, und der Mastdarm fehlt. Bisweilen ist ein Theil des Mastdarms gebildet, er endigt sich aber blind, und zwischen ihm und dem blinden Ende des Dickdarms befindet sich eine Lücke.

Unter diesen Bedingungen öffnet sich bisweilen der Mastdarm in die Scheide (*Atresia vaginalis*), oder in die Harnblase oder Harnröhre (*A. vesicalis et urethralis*), und es ist daher zugleich Klokabildung vorhanden.

b) Verminderung des Durchmessers.

Diese hat verschiedne Grade. Der höchste ist Verschießung und Unterbrechung der Höhle des Kanals (*Atresia vera*). Mit Mangel eines Theiles ist sie immer zugleich vorhanden, indem der vorhandne Theil hier immer blind geendigt ist.

Sie kommt vorzüglich am After vor und hat sehr verschiedne Grade, indem bald die Höhle des Mastdarms nur durch die dünne Haut verschlossen ist, bald sich an der Stelle des ganzen Mastdarms Zellgewebe oder ein fester Strang befindet. Hiernächst am häufigsten ist der dicke Darm höher oder tiefer gegen den After hin verschlossen. Seltner sind Krummdarm und Dickdarm gegen einander blind geendigt.

Noch seltner ist der dünne Darm in seinem Verlauf, oder an seinem obern Ende gegen den Magen, von diesem gegen ihn hin, oder die Continuität des Darmkanals an mehrern Stellen auf diese Weise unterbrochen.

Auch die bloße Enge (*Atresia spuria*) ist am Mastdarm und After am häufigsten. Indessen erscheint sie auch am Magen nicht selten, und bietet hier merkwürdige Bedingungen dar. Am gewöhnlichsten ist der Magen dann durch eine, ungefähr in der Mitte seiner Länge befindliche Einschnürung in einen linken, weitem, mehr rundlichen, und einen rechten, engeren, länglichen Sack abgetheilt. Der oberer Umfang des linken ist gewöhnlich nicht ausgehöhlt, sondern stark gewölbt, beide Bögen, vorzüglich aber der untere, sind in ihrer Gestalt besonders abgeändert, indem der letztere tief eingeschnitten ist. Die Speiseröhre senkt sich immer an ihrer gewöhnlichen Stelle ein, und nie ist der Blindsack ungewöhnlich vergrößert. Der Grad der Einschnürung variiert bedeutend, nach fünf Fällen, die ich vor mir habe, von einem halben bis zwei Zoll. Gewöhnlich ist aber die Richtung der rechten Hälfte regelmäßig, doch wendet sich diese in einem Falle, den ich vor mir habe, so um ihre Ase, daß die Wölbung nach oben und vorn, die Ausbuchtung nach unten und hinten gerichtet ist, und hier vor dem rechten Ende der Kardiahälfte herabsteigt.

Seltner ist der Magen durch eine zweite Einschnürung in drei Säcke abgetheilt, deren dritter dann unstreitig durch stärkere Absonderung der Pfortnerhöhle von der übrigen Höhle entsteht.

Alles merkwürdige Thierähnlichkeiten, welche vorzüglich beim weiblichen Geschlechte vorkommen.

Dabei ist an der Einschnürungsstelle das Gewebe des Magens durchaus nicht verändert. Indessen reicht dieser Umstand freilich nicht hin, um die vorgetragene Ansicht, daß dieser Zustand ursprüngliche Abweichung sey, ganz festzustellen, vorzüglich da, wie oben bemerkt, auch der einfache Magen wäh-  
rend

rend der Verdauung sich gerade an dieser Stelle vorübergehend einschnürt, mithin diese regelmäßig vorübergehende Verengerung aus mehr als einem Grunde sich krankhaft in eine beständige umwandeln könnte. Das vorzugsweise Vorkommen dieser Anordnung beim weiblichen Geschlechte ist beiden Ansichten gleich günstig, und unstreitig ist die Vermuthung gegründet, daß sie nicht immer auf dieselbe Weise entsteht, vorzüglich, da sie bisweilen, und in Gesellschaft mit offensibaren Hemmungsbildungen angehoren ist \*).

Seltner ist der Magen durch Fehler der Urbildung darmartig eng, dann keiner Ausdehnung fähig.

Hierher gehört wahrscheinlich auch eine klappenartige Einschnürung des linken Magenmundes, die, sehr merkwürdig, mit Mangel der Pfortnerklappe verbunden war <sup>2)</sup>, wenn gleich, im Fall hier nicht bloße Verengerung Statt fand, diese Bildung vielmehr in einem Uebermaße der bildenden Thätigkeit begründet seyn würde.

c) Kürze, die bisweilen den ganzen Darmkanal, häufiger nur den Wurmfortsatz betrifft.

## 2. Besondere.

### §. 2194.

Diese sind:

a) Am Magen:

α) Mangel des Grundes, welchen ich bei einem zweimonatlichen Kinde fand, wo die Pfortnerhöhle weit größer als der kaum merkliche blinde Sack ist;

β) senk-

1) Sandifort obs. an. pathol. L. III. p. 11.

2) Fleischmann S. 100.

β) senkrechte Stellung, welche durchaus nicht immer in einer regelwidrigen Vergrößerung der Leber, oder überhaupt in einer mechanischen Veranlassung begründet ist.

b) Am Darm:

a) Vorliegen in der Nabelscheide beim angeborenen Nabelbruche. Vorzüglich weicht hiedurch der dünne Darm von der Regel ab, weil er auch bei regelmäßiger Entwicklung am spätesten zurücktritt.

β) Mehr oder weniger vollkommenes Verharren desselben auf seiner frühern Verbindung mit der Nabelblase<sup>1)</sup>.

Dieses hat verschiedene Grade.

Entweder 1) die Nabelblase erhält sich noch über die gewöhnliche Periode hinaus, und hängt mit dem Krummdarm durch einen offenen Gang zusammen, welchen die Nabelgefäßgefäße begleiten<sup>2)</sup>; oder

2) es findet sich bloß ein offener, längerer oder kürzerer von derselben Stelle, und gleichfalls in Begleitung der Nabelgefäßgefäße vom Krummdarm zum Nabel, wo er sich geöffnet endigt, verlaufender Gang<sup>3)</sup>; oder endlich

3) an

1) S. hierüber Meckel Beiträge zur vergleichenden Anat. Bd. 1. Hft. 1. 1808.

Derselbe über die Divertikel in Keil's Archiv f. d. Physiologie. Bd. 9. Hft. 3. Pathol. Anat. Bd. 1. S. 553—597.

2) S. einen höchst merkwürdigen Fall hievon aus einem fast reifen menschlichen Fötus, beschrieben und abgebildet von Lieder mann. Anatomie der kopflosen Mißgeburten. S. 66. T. 4.

3) S. mehrere Fälle hievon von mir zusammengestellt, und einen neuen beschrieben in Keil's Archiv Bd. 9.

3) an eben dieser Stelle befindet sich nur ein längerer oder kürzerer Vorsprung, ein blinder Anhang, Fortsatz, das Krummdarmdivertikel, welches sehr häufig die Nabelgefäßgefäße begleitet, so, daß sie entweder von seiner Spitze frei herabhängen, oder sich an den Nabel oder an einen andern Theil des Darmkanals heften, und dadurch eine Schlinge bilden.

Daß diese drei regelwidrigen Erscheinungen nur verschiedene Stufen derselben Bildungsabweichung sind, ergibt sich aus der Gleichheit der Stelle, an welcher sie vorkommen, ihr Verhältniß zu den Nabelgefäßgefäßen und den gradweisen Verschiedenheiten, welche abermals eine jede dieser Stufen in Hinsicht auf Länge und Weite darbietet.

Daß sie die angegebne Bedeutung haben, folgt 1) aus der oben angegebenen Darstellung der Entwicklungs Geschichte des Darmkanals, 2) aus der beständig gleichzeitigen Anwesenheit des Blinddarms und Wurmfortsatzes mit ihnen und 3) aus der Ursprünglichkeit dieser Bildungsabweichungen.

Die Ursprünglichkeit derselben ergiebt sich:

1) aus der beständig beobachteten Gleichförmigkeit der Stelle, an welcher sie vorkommen;

2) der Bildung derselben aus allen Häuten des Darmkanals;

3) dem gleichzeitigen Vorkommen derselben mit andern ursprünglichen Bildungsabweichungen, welche entweder Hemmungsbildungen sind, oder doch ihr Entstehen begünstigen.

Aus diesem Grunde können diese regelwidrigen Bildungen durchaus nicht für zufällig<sup>1)</sup>, weder für Auswüchse des Krumm-

---

1) Ofen in der Jenaer Literaturzeitung. 1815. Nr. 25.

Krummdarms <sup>1)</sup>, noch für hervorgezerrte <sup>2)</sup>, oder zufällig hervorgebrängte <sup>3)</sup> Theile desselben angesehen werden.

Zwar hat man als Gründe gegen die angegebne Bedeutung dieser Anhänge angeführt:

1) das nicht beständige Vorkommen <sup>4)</sup>, die Seltenheit <sup>5)</sup> derselben, da doch nicht alle vorübergehende Bildungen bei gehöriger Entwicklung spurlos verschwinden, und überdies der Dottergang der Vögel beständig beharrt;

2) das Vorkommen mehrerer wahrer Anhänge an demselben Darmkanale, oder wenigstens wahrer Anhänge an andern Stellen als am Krummdarm <sup>6)</sup>;

3) das häufige Zusammentreffen derselben mit regelwidriger Verdopplung, und mit regelwidrig gehemmter Ausbildung <sup>7)</sup>;

4) die beträchtliche Weite derselben und die Dicke ihrer Wände, die, selbst wenn in frühern Lebensperioden ein Nabelblasengang vorhanden gewesen sey, von einer erhöhten Wirksamkeit der bildenden Kraft zeugen sollen <sup>8)</sup>.

Allein alle diese Gründe habe ich zum Theil schon, ehe die meisten derselben kürzlich von Neuem vorgetragen wurden, widerlegt, zum Theil sind sie zu beseitigen.

1) Der

1) Fleischmann. S. Leichenöffnungen. Erlangen 1815.

2) Littre, Mery, (Mém. de Paris. 1700. 1701.)

3) Fabricius und Morgagni (Morg. Ep. an. med. 54. a. 17.)

4) Ofen in der Jenaer Literaturzeit. 1815. No. 26.

5) Emmert im deutschen Archiv. Bd. 4. S. 24.

6) Emmert a. a. D.

7) Ebendasselbst.

8) Ebendasselbst.



1) Der erste beweist nichts, indem mehrere andre unlängbare Hemmungsbildungen noch weit seltner sind, und bei regelmäßiger Entwicklung völlig spurlos verschwinden. Hierher gehören z. B. das Beharren der Pupillarmembran, der Mangel der Gliedmaßen, das Offenbleiben des Pulsaberganges, des offenen Harnstranges, die Spaltung der Gebärmutter, der Nabelgefäßgefäße selbst. Die Analogie mit den Vögeln beweist nichts, da selbst bei mehreren Vögeln, z. B. den Raubvögeln, der Dottergang immer ganz zu verschwinden scheint, und bei einem Thiere, namentlich einem niedrigeren, sich Spuren früherer Zustände länger zu erhalten pflegen als bei einem andern, namentlich höhern.

2) Gegen den zweiten Grund läßt sich gerade die außerordentliche Seltenheit der angeführten Erscheinung anführen. Ueberdies fragt es sich, ob nicht unter diesen äußerst seltenen Fällen einige falsche Anhänge vorkommen, ob nicht in andern auch ein wahrer durch Ausdehnung entstand, ob nicht andre in einer regelwidrigen Verbindungsstelle des Darmkanals mit der Nabelblase begründet waren, zu geschweigen, daß in andern die Bildungsabweichung auf andre als die gewöhnliche Weise ursprünglich entstehen konnte, ohne daß daraus etwas gegen diese gefolgert werden könnte.

3) Der dritte Grund beweist gerade für meine Ansicht, und gegen die, für welche er angeführt wird, denn sehr selten zeigen bei Verdopplung des ganzen Körpers einzelne Organe, unabhängig davon, ein gleiches Streben, so daß sich unter dieser Bedingung z. B. ein überschüssiger Finger, ein überzähliges Auge, anbildete; dagegen sind hier unvollkommene Bildungen überhaupt, besonders aber Hemmungsbildungen, z. B. Wirbel-, Schädel-, Gaumen- und Bauchspalte, Hemmungen  
des

des Herzens, des Darmkanals, sehr gewöhnliche Erscheinungen, während verschiedene Organe sehr häufig zugleich in einem Körper in der Entwicklung gehemmt erscheinen.

4) Eben so wenig Beweiskraft hat der letzte Grund, da die Verschiedenheit der Dicke und Weite sich einerseits auf die Periode, in welche die Hemmung fällt, beziehen, andrerseits von später eintretenden zufälligen Bedingungen abhängen kann. Offenbar ist das offene eirunde Loch nicht weniger ein Stehenbleiben auf einer frühern Bildungsstufe, wenn es eine Linie, oder wenn es einen Zoll im Durchmesser hat, und wenn es während des Lebens zufällig durch mechanische Veranlassung von dem ersten Umfange in den letzten umgewandelt wurde.

7) Ansehnliche Größe des Wurmfortsatzes als Fortwachsen desselben nach dem Fötustypus, die indessen auch später entstehen kann.

#### §. 2195.

Weit seltner sind Formabweichungen, deren Wesen ein zu energisches Bilden ist.

Wahrscheinlich kann man als solche die Spaltung des Zwölffingerdarms in zwei Kanäle, die Anwesenheit zweier Wurmfortsätze ansehen. Auch gehört wohl hieher die ungewöhnliche Länge des Darmkanals, welche besonders am dicken Darm vorkommt, und vielfache Windungen, besonders Abwärtssteigen seines Querstückes zur Folge hat. Eben so kann man die an ungewöhnlichen Stellen, namentlich am Dickdarm vorkommenden wahren Anhänge vielleicht hieher rechnen, wenn sie gleich vermuthlich eben so wohl als qualitative Formfehler angesehen werden können.

#### §. 2196.

§. 2196.

Qualitative Abweichungen beziehen sich entweder auf Gestalt oder auf Lage, oder auf beide zugleich.

Zu der letztern gehört die seitliche Umkehrung der Lage des Magens und Darmkanals, indem hier die Theile nicht bloß auf der entgegengesetzten Seite liegen; sondern auch verkehrt gebildet sind.

Die qualitativ regelwidrige Gestalt des Magens oder Darmkanals ist eine seltne Erscheinung, und die vorhandenen Beispiele lassen sich fast immer auf Abweichungen des Durchmessers zurückführen.

Qualitativ regelwidrige Lage bietet der Magen bisweilen durch Drehung nach oben dar, so daß der gewölbte Stand nach oben, der ausgehöhlte nach unten liegt<sup>1)</sup>.

B. Erworbne Formabweichungen.

§. 2197.

Die erworbnen Formabweichungen beziehen sich a) auf den Umfang; b) die Masse; c) die Lage; d) die Gestalt.

a) Umfang. 1) Regelwidrige Ausdehnung erstreckt sich selten über den ganzen Unterleibstheil des Speisekanals, kommt aber in allen Theilen vor, und wird durch sehr verschiedene Veranlassungen, vorzüglich durch Verschließung, Verengerung, Erschlaffung, zuletzt immer durch Anhäufung von Substanzen hervorgebracht.

Die

1) Fleischmann C. 98.

Die nicht seltne, regelwidrige Ausdehnung der Gefäße des Darmkanals verdient hier gleichfalls betrachtet zu werden.

Am häufigsten kommt sie am Mastdarm in Gestalt von rundlichen, in die Höhle des Darmes ragenden Geschwülsten, als Hämorrhoiden, vor. Nach der gewöhnlichen Annahme sind die Mastdarmblutadern der Sitz derselben, indessen haben unstreitig auch die Pulsadern Antheil daran, ohne daß man sie doch mit Erubeil hier<sup>1)</sup> als neue, cavernöse Bildungen ansehen könnte. Wahrscheinlicher sind bisweilen die kleineren, bisweilen größere Gefäße ausgedehnt, und diese, unter der letztern Bedingung, wo sie als Wälge erscheinen, von dem übrigen Theile des Gefäßes getrennt.

Ausdehnungen der Gefäße des Magens kommen gewöhnlich in der schwarzen Krankheit (Melaena) vor, und die ausgebrochne, und im Magen gefundene schwarze Substanz ist mehr oder weniger alienirtes Blut, welches durch ihre Enden ausschwißt.

2) Regelwidrige Verengung ist selten, wenn sie nicht ursprünglich ist, reiner Formfehler, sondern entsteht in Folge vorangegangner Texturveränderung, Entzündung und Ausschwizung, Cicatrix u. Die erstere Bedingung tritt am gewöhnlichsten ein, wenn die gewöhnlichen Veranlassungen zur Ausdehnung nicht Statt finden, also bei langem Fasten, im ganzen Darmkanal, bei regelwidriger Unterbrechung des Zusammenhanges des Darmes in dem unterhalb der Unterbrechungsstelle befindlichen Theile desselben, also bei Entstehung eines künstlichen Afteres nach Wunden, brandigen Brüchen.

b) Selt-

---

1) Anat. pathol. T. II. p. 145 ff.

b) Seltner findet Zunahme oder Verminderung der Masse, ohne Texturveränderung, Statt. Die erstere erstreckt sich dann vorzüglich auf die Muskelhaut, und tritt in Folge ungewöhnlich verstärkter Bewegungsthätigkeit ein. So erweitert sich der Magen gefräßiger Menschen weniger als sich seine Muskelhaut verdickt, eben so verändert sich diese in dem, einen Bruch bildenden Darmstücke.

Bei allgemeiner Abmagerung schwindet auch die Muskelhaut bedeutend.

c) Lage. Die Abweichungen der Lage werden am besten in der Lehre von den Brüchen betrachtet, indem sie meistens bei diesen vorkommen. Vorzüglich verändert der dünne Darm, wegen größter Beweglichkeit und geringster Weite, seine Lage, ihm zunächst steht der Magen, der am gewöhnlichsten durch die weiße Linie oder den obern Theil der Bauchmuskeln, bisweilen aber selbst durch den Bauchring, hervortritt. Regelmäßige Oeffnungen im Zwerchfell haben besonders die abweichende Lage des Magens in der Brusthöhle zur Folge.

d) Die Gestaltsveränderung besteht vorzüglich a) in Umbiegung (Inversio). Ein Theil des Darms wendet sich so, daß seine innere Fläche zur äußern, die äußere zur innern wird. Trifft diese Veränderung den untern Theil des Mastdarms, so erhält sie den Namen des Aftervorfalls (Prolapsus ani), in dem übrigen Theile dagegen wird sie als Einschiebung (Intususceptio s. invaginatio) bezeichnet, weil sich der umgekehrte Theil in den darunter liegenden drängt. Der erste Zustand ist einfacher, indem der vorgefallne Theil nur aus zwei über einander liegenden, dem äußern umgekehrten, und dem innern normalen besteht, zu welchen bei dem

zweiten ein dritter kommt, in welchen sich der umgekehrte schiebt. Bisweilen finden sich selbst noch mehr Lagen übereinander, indem sich zwei Einschiebungen in einander begeben.

Oft kommen mehrere Einschiebungen vor.

Am häufigsten sind sie im Dünndarm, unstreitig wegen der beweglicheren Anheftung desselben.

Selbst hoch oben anfangende Einschiebungen können übrigens durch den Mastdarm aus dem After hervortreten.

Die gewöhnlichste Veranlassung dazu giebt unregelmäßige Thätigkeit der Muskelhaut; doch entstehen sie bisweilen auch mechanisch durch Geschwülste, wodurch ein Theil des Darmkanals umgekehrt und herabgezogen wird.

Unbedeutende, kleine Einschiebungen sind unstreitig oft vorübergehend und verschwinden von selbst; größere dagegen veranlassen Entzündung und Brand des eingeschobnen Stückes, die gewöhnlich, aber nicht immer tödtlich sind, sondern auf Kosten des abgestorbnen und sich trennenden Stückes, während sich zugleich die Lücke durch adhäsive Entzündung verschließt, geheilt werden.

β) Trennungen des Zusammenhanges, welche entweder bloß mechanisch, durch Zerschneidung, Zerreißung, oder in Folge vorangegangner Texturveränderungen, durch Erylceration entstehen. Sie sind entweder vollständig, und erstrecken sich durch alle Häute, oder nur durch die Muskel- und Bauchfellhaut, wovon dann die Folge ein Bruch der innern Haut durch die äußere, und Bildung einer rundlichen Geschwulst, des falschen Darmhanges (Diverticulum spurium) ist, welche sich durch Rundlichkeit, Mangel mehrerer Häute, und durch den Umstand, daß sie überall, selbst am Magen,

des

besonders aber am Zwölffingerdarm, und gewöhnlich in mehrfacher Zahl vorkommt, von dem wahren unterscheidet.

## II. Texturabweichungen.

### §. 2198.

Eine nicht selten vorkommende Texturveränderung des Darmkanals, besonders aber des Magens, ist die regelmäßige Erweichung und Verdünnung desselben, welche, wenn sie ihren höchsten Grad erreicht, selbst in Zerstörung und Durchlöcherung übergeht. Sie kommt vorzüglich im Grunde und an der hintern Wand des Magens vor, nimmt in der innern Haut ihren Anfang, und der Magen erscheint daher hier unter dieser Bedingung stärker geröthet. Die Ränder des Einrisses sind sehr ungleich, unterscheiden sich aber von den Rändern eines zerrissenen Geschwüres durch gänzlichen Mangel an Verdickung und Härte, vielmehr durch beträchtliche Verdünnung und Erweichung im Umfange. Bisweilen entsteht bestimmt diese Veränderung erst nach dem Tode, in andern Fällen dagegen findet sie deutlich schon während des Lebens Statt. Unter beiden Bedingungen ist sie in der Einwirkung des Magensaftes auf den Magen begründet, und kann als eine Verdauung des letztern durch den erstern angesehen werden, welche unter der letztern Bedingung durch eine vorangegangene Veränderung in der Mischung des Magensaftes veranlaßt wird. Ist der Magen an einer Stelle zerstört, so setzt sich durch die Einwirkung der ergossenen Flüssigkeit die Erweichung auch auf die benachbarten Theile fort <sup>1)</sup>.

### § 3

### §. 2199.

1) S. hierüber umständlicher meine pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 2.

Kanals in den andern, oder, wenn die Wand der Bauchhöhle der mit dem kranken Organe verwachsene Theil ist, unmittelbar nach außen gelangen.

Eine sehr gewöhnliche Folge der Entzündung der Bauchfellhaut des Speisefkanals ist mehr oder weniger enge oder allgemeine Verwachsung der verschiednen Theile desselben, so daß bisweilen seine Wände nicht von der verbindenden Substanz getrennt werden können, und nur als Wege in derselben erscheinen.

Eine der häufigsten Texturveränderungen des Darmkanals ist die scirröse, die sich von der Aderhaut und den Schleimdrüsen aus, wo sie ursprünglich ihren Sitz hat, in die innere und Muskelhaut fortsetzt, wodurch Verschmelzung, beträchtliche Verdickung und Verhärtung aller Häute entsteht, die zuletzt in carcinomatöse Verschwärung übergeht. Die Folge jener Veränderungen ist eine, oft äußerst beträchtliche Verengung des Kanals. Vorzüglich kommt sie am Pfortner, am Ende des absteigenden Dickdarms und des Mastdarms vor, vielleicht nur, weil die hier wegen des Baues der Theile länger aufgehaltenen Substanzen häufigere Reizung veranlassen, verbreitet sich aber mehr oder weniger weit, so daß bisweilen der ganze Magen und beträchtlichere Strecken des Darms umgewandelt sind.

Höchst wahrscheinlich gehört hieher die von Monro beschriebne Absezung von eiweißartiger Substanz in die Gefäßhaut, indem alle wesentlichen Merkmale dieselben sind, und sie sich nur durch die äußere Form unterscheidet, sofern sie in Gestalt von rundlichen Körperchen erscheint \*).

Weit

\* 1) Morbid anat p. 217.



1) Weil seltner sind: schwammige Auswüchse der Schleimhaut; doch kommen sie an allen Stellen vor. So finden sich einige Fälle von sehr beträchtlichen Polypen im Magen, deren einer von dem linken Magenmunde bis in den Zwölffingerdarm reichte 1). Ich selbst fand kürzlich in der Leiche eines jungen Menschen, der häufig Unterleibsbeschwerden ausgelegt gewesen war und an einer heftigen Darmentzündung starb, zwei Auswüchse in der Schleimhaut des dünnen Darmes, wovon der eine, von ungefähr vier Linien im Durchmesser, mit der Schleimhaut von allen Seiten bedeckt war, der andre, einen Zoll im Durchmesser haltende, dieselbe zerstört hatte und frei lag. Häufiger als an den übrigen Stellen kommen sie im Mastdarm vor, wovon ich anderswo mehrere Fälle zusammengestellt habe 2). Sie kommen nur durch äußere Gestalt unter einander überein, unterscheiden sich aber durch ihr Gewebe bedeutend, indem sie bald sehr hart und fest, bald schwammig und locker sind. Die erstern gehören wahrscheinlich zur Klasse der Faserknorpel, die letztern zum Blutschwamme. Unstreitig ist eine, von Monro unter dem Namen der *Fischhoden ähnliche* (Milt-like) beschriebne Geschwulst der innern Haut, vorzüglich des Magens, Blutschwamm 3).

Bei mehrmaliger Untersuchung der Eingeweide von Menschen, die an heftigen Blattern gestorben waren, fand ich

§ 5

war

1) Breschet tumeur polypeuse développée dans l'estomac. *Bullet. de la fac. de méd. T. V. 1817. p. 576 ff.* Andre Fälle s. bei Monro *morbid anat. Tab. VI. Fabre gazette de médecine de Paris. Juin. 1845.*

2) *Pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 2. S. 311.*

3) *Morbid anat. p. 160 ff.*

## §. 2199.

Sehr häufig entzündet sich der Darmkanal, namentlich die Schleimhaut desselben.

Bei Ausmittlung der Entzündung des Magens nach dem Tode ist zu bemerken, daß die innere, der Entzündung wegen ihres Gefäßreichthums, ihrer Bildungsthätigkeit, ihres Zusammenhanges mit der Haut und der unmittelbaren Einwirkung der äußern Schädlichkeiten auf sie am meisten unterworfenste Haut häufig auch ohne Anwesenheit von Entzündung wegen Anhäufung von Blut in den kleinern Venenzweigen, besonders nach Todesarten, welche das Verweilen des Blutes in denselben begünstigen, indem sie den Rückfluß desselben hindern, äußerst stark geröthet ist <sup>1)</sup>).

Bei der Entzündung der Schleimhaut wird der Schleim dicker, fester, zugleich wird häufig sowohl an der innern Fläche als in der Substanz derselben Faserstoff ausgeschwigt. Die Folge des erstern Processus ist die Bildung von dickern oder dünnern, hohlen oder soliden Cylindern, welche ausgestoßen, und mit Unrecht für getrennte Häute des Darmes gehalten werden, die des letztern Verdickung der Wände, und dadurch Verengerung der Höhle des Darmes. Es entstehen unter dieser Bedingung, doch selten, und wahrscheinlich nur, wenn Verschwärung eingetreten ist, selbst Verwachsungen zwischen verschiedenen Punkten seines Umfangs <sup>2)</sup>).

Ge-

---

1) Yelloly observations on the vascular Appearance in the human Stomach, which is frequently mistaken for inflammation of that organ. In med. chir. transact. of London. Vol. 4. p. 571 — 425.

2) Monro morbid anat. Tab. VII.

Geschwüre der Schleimhaut haben gewöhnlich etwas aufgeworfene, ungleiche, harte Ränder, bisweilen aber sind diese glatt, scharf, wie ausgeschnitten.

Eine nicht ungewöhnliche Folge von Entzündung und Vereiterung ist die Mastdarmpistel (Fistula ani), ein Gang, der sich neben dem Mastdarm erstreckt, gewöhnlich an seiner inneren Fläche anfängt, sich neben dem After nach außen öffnet, wie alle Fisteln eine schleimhautähnliche innere Oberfläche hat, und von verdichtetem Zellgewebe umgeben ist.

In der Ruhr, einer Entzündung, welche vorzüglich in der Schleimhaut des Dickdarms, besonders des Mastdarms, ihren Sitz hat, sterben oft einzelne Stellen der Schleimhaut ab, und erscheinen als schwarze, trockene, von der übrigen Ausbreitung derselben getrennte Schorfe.

Alle diese Erscheinungen sind gewöhnlich bloß auf die Schleimhaut beschränkt; doch dringt die tuberkulöse Entartung in Gestalt weißlicher, harter, rundlicher Massen von ihr aus bis zur äußeren Oberfläche, und bildet hier mehr oder weniger starke Hervorragungen. Diese erscheint gewöhnlich im letzten Abschnitt der tuberkulösen Lungenschwindsucht und namentlich hauptsächlich im dünnen Darm. Ueberhaupt setzt sich auch die Verschwärung bisweilen durch alle Häute des Magens von innen nach außen fort. Nicht nothwendig, ja in der That verhältnißmäßig selten, ist hiervon die Folge Ergießung der in der Höhle enthaltenen Substanzen in die Bauchhöhle, indem diese durch zugleich entstandne Verwachsung mit benachbarten Theilen verhütet wird. Entweder wird dann durch diese der zerstörte Theil ersetzt, oder, wenn auch sie zerstört werden, doch die Oeffnung des Darmes oder des Magens unschädlich, indem die Substanzen entweder aus einem Theile des Darms

Kanals in den andern, oder, wenn die Wand der Bauchhöhle der mit dem kranken Organe verwachsene Theil ist, unmittelbar nach außen gelangen.

Eine sehr gewöhnliche Folge der Entzündung der Bauchfellhaut des Speisefkanals ist mehr oder weniger enge oder allgemeine Verwachsung der verschiednen Theile desselben, so daß bisweilen seine Wände nicht von der verbindenden Substanz getrennt werden können, und nur als Wege in derselben erscheinen.

Eine der häufigsten Texturveränderungen des Darmkanals ist die scirröse, die sich von der Aderhaut und den Schleimdrüsen aus, wo sie ursprünglich ihren Sitz hat, in die innere und Muskelhaut fortsetzt, wodurch Verschmelzung, beträchtliche Verdickung und Verhärtung aller Häute entsteht, die zuletzt in carcinomatöse Verschwärung übergeht. Die Folge jener Veränderungen ist eine, oft äußerst beträchtliche Verengung des Kanals. Vorzüglich kommt sie am Pfortner, am Ende des absteigenden Dickdarms und des Mastdarms vor, vielleicht nur, weil die hier wegen des Baues der Theile länger aufgehaltenen Substanzen häufigere Reizung veranlassen, verbreitet sich aber mehr oder weniger weit, so daß bisweilen der ganze Magen und beträchtlichere Strecken des Darms umgewandelt sind.

Höchst wahrscheinlich gehört hieher die von Monro beschriebne Absetzung von eiweißartiger Substanz in die Gefäßhaut, indem alle wesentlichen Merkmale dieselben sind, und sie sich nur durch die äußere Form unterscheidet, sofern sie in Gestalt von rundlichen Körperchen erscheint \*).

Weit

\* 1) Morbid anat p. 217.

1) Weist seltner sind schwammige Auswüchse der Schleimhaut; doch kommen sie an allen Stellen vor. So finden sich einige Fälle von sehr beträchtlichen Polypen im Magen, deren einer von dem linken Magenmunde bis in den Zwölffingerdarm reichte 2). Ich selbst fand kürzlich in der Leiche eines jungen Menschen, der häufig Unterleibsbeschwerden ausgelegt gewesen war und an einer heftigen Darmentzündung starb, zwei Auswüchse in der Schleimhaut des dünnen Darmes, wovon der eine, von ungefähr vier Linien im Durchmesser, mit der Schleimhaut von allen Seiten bedeckt war, der andre, einen Zoll im Durchmesser haltende, dieselbe zerstört hatte und frei lag. Häufiger als an den übrigen Stellen kommen sie im Mastdarm vor, wovon ich anderswo mehrere Fälle zusammengestellt habe 3). Sie kommen nur durch äußere Gestalt unter einander überein, unterscheiden sich aber durch ihr Gewebe bedeutend, indem sie bald sehr hart und fest, bald schwammig und locker sind. Die erstern gehören wahrscheinlich zur Klasse der Faserknorpel, die letztern zum Blutschwamme. Unstreitig ist eine, von Monro unter dem Namen der Fishyoden ähnliche (Milt-like) beschriebne Geschwulst der innern Haut, vorzüglich des Magens, Blutschwamm 3).

Bei mehrmaliger Untersuchung der Eingeweide von Menschen, die an heftigen Blattern gestorben waren, fand ich

§ 5

war

1) Breschet tumeur polypeuse développée dans l'estomac. Bullet. de la fac. de méd. T. V. 1817. p. 576 ff. Andre Fälle s. bei Monro morbid anat. Tab. VI. Fabre gazette de société de Paris. Juin. 1815.

2) Pathol. Anat. Ed. 2. Abth. 2. S. 311.

3) Morbid anat. p. 160 ff.

zwar die innere Haut des Darmkanals sehr stark geröthet, aber nie Spuren von Blüthen.

Nur sehr selten wiederholen sich normale Gewebe regelwidrig im Darmkanal. Doch gehören hieher Fettgeschwülste, welche sich an der innern Fläche der Schleimhaut erzeugen<sup>1)</sup>, Haare, welche entweder allein an der innern Fläche des Darms wachsen<sup>2)</sup>, oder sich mit Zähnen im Magen entwickelten<sup>3)</sup>, ferner

Verknöcherungen an der innern Fläche des Darms<sup>4)</sup>, und, wenigstens in manchen Fällen, Hämorrhoiden, wenn sie cavernöse Bildungen sind.

#### §. 2200.

Fremde Körper sehr verschiedner Art sind eine zum Theil häufige Erscheinung im Unterleibstheile des Speisefkanals, namentlich dem Darne.

Die gewöhnlichsten sind Entozoen, welche in der That unter allen Theilen des Körpers hier am häufigsten vorkommen. Von diesen leben der Spulwurm (*Ascaris lumbricoides*), der breite und der langgliedrige Bandwurm (*Taenia lata* f. *Bothryocephalus latus* und *Taenia solium*) im Dünndarm, der Peitschenwurm (*Trichocephalus dispar*) im dicken Darm, besonders im Blinddarm, der Pfriemenschwanz (*Ascaris vermicularis*, *Oxyuris vermicularis* Bremsler) im dicken Darm, besonders im Mastdarm.

Daf

1) E. Fälle in meiner path. Anat. Bd. 2. Abth. 2. S. 124.

2) E. Fälle zusammengestellt in meinem Archiv Bd. 1. S. 523, 524.

3) Ruysch advers. anat. Dec. III.

4) E. Fälle in meiner pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 2. S. 227.

Daß eine solche Art, (*Dyacanthos polycephalus*)<sup>1)</sup>, wirklich ein Eingeweidewurm sey, wird durch Rudolph's<sup>2)</sup> Behauptung, daß er ein Pflanzenstengel sey, wenigstens sehr ungewiß.

In den Magen, so wie in die Gallenwege, gelangen sie nur zufällig und meistens erst nach dem Tode. Die Öffnungen, durch welche sie bisweilen in die Bauchhöhle gelangen, werden nicht durch sie gebildet.

Weit seltner sind zufällig in den Speisefanal gelangte Concretionen, welche entweder, und dies gewöhnlicher, Gallensteine, die aus der Gallenblase in den Darmkanal traten, oder ganz oder zum Theil in ihm entstandne Darmsteine<sup>3)</sup> sind,

#### Zweite Unterabtheilung.

#### Drüsig-Organ des Unterleibstheiles des Verdauungssystems<sup>4)</sup>.

§. 2201.

Die drüsigen Organe des Unterleibstheiles des Verdauungssystems, die man auch, in Verbindung mit dem Magen, die Milchsaftbereitenden (*Viscera chylopoetica*) nennt, Leber, Bauchspeicheldrüse und Milz, liegen in der obern Hälfte des Unterleibes, und stehen unter einander und mit dem Magen und Zwölffingerdarm in der nächsten Beziehung, nicht bloß in Hinsicht auf Lage, sondern auch auf

Ge:

1) Stiebel in Meckel's deutschem Archiv Bd. 3. Hft. 2.

2) Bei Bremser über lebende Würmer in lebenden Menschen. Wien. 1819. S. 267. 268.

3) S. Meckel im deutschen Archiv f. die Physiol. Bd. 1.

4) J. Fantoni de Jacore, Liene et Pancreate. In Diss. renov. Taurini. 1745. D. VI.

β) senkrechte Stellung, welche durchaus nicht immer in einer regelwidrigen Vergrößerung der Leber, oder überhaupt in einer mechanischen Veranlassung begründet ist;

b) Am Darm:

a) Vorliegen in der Nabelscheide beim angebornen Nabelbruche. Vorzüglich weicht hiedurch der Darm von der Regel ab, weil er auch bei regelmäßiger Entwicklung am spätesten zurücktritt.

β) Mehr oder weniger vollkommenes Verharren desselben auf seiner frühern Verbindung mit der Nabelblase <sup>1)</sup>).

Dieses hat verschiedne Grade.

Entweder 1) die Nabelblase erhält sich noch über die gewöhnliche Periode hinaus, und hängt mit dem Krummdarm durch einen offenen Gang zusammen, welchen die Nabelgefäße begleiten <sup>2)</sup>; oder

2) es findet sich bloß ein offner, längerer oder kürzerer von derselben Stelle, und gleichfalls in Begleitung der Nabelgefäße vom Krummdarm zum Nabel, wo er sich gedffnet endigt, verlaufender Gang <sup>3)</sup>; oder endlich

3) an

1) S. hierüber Keil's Beiträge zur vergleichenden Anat. Bd. 1. Hft. 1. 1808.

Der selbe über die Divertikel in Keil's Archiv f. d. Physiologie. Bd. 9. Hft. 3. Pathol. Anat. Bd. 1. S. 553—597.

a) S. einen höchst merkwürdigen Fall hievon aus einem fast reifen menschlichen Fötus, beschrieben und abgebildet von Lieder mann. Anatomie der kopflosen Mißgeburten. S. 66. T. 4.

β) S. mehrere Fälle hievon von mir zusammengestellt, und einen neuen beschrieben in Keil's Archiv Bd. 9.



Thail der linken Unterrippengegend ein, steigt auf der rechten Seite beträchtlich tiefer als auf der linken herab, und liegt daher schief von rechts und unten nach links und oben. Linksseits endigt sie sich in geringer Entfernung von dem obern Ende der Milz, bedeckt durch ihren linken Theil den Magen, durch den rechten hinten die rechte Niere gewöhnlich ganz, bisweilen, wenn diese tiefer als gewöhnlich liegt, nur in ihrer größern obern Hälfte.

b. Größe und Gewicht.

§. 2203.

Sie ist in querrer Richtung am längsten, beim Erwachsenen ungefähr 10 — 12 Zoll breit, von vorn nach hinten 6 — 7 Zoll dick, von oben nach unten auf der rechten Seite, wo sie am dicksten ist, 2 Zoll hoch.

Das Gewicht der Leber beträgt im Durchschnitt beim Erwachsenen vier Pfund, und sie verhält sich daher zum ganzen Körper ungefähr wie 1:36.

c. Gestalt.

§. 2204.

Sie hat eine unregelmäßige, länglichviereckige Gestalt, und ist von einer Seite zur andern beträchtlich breiter, als von vorn nach hinten, von oben nach unten am dünnsten.

§. 2205.

Die Leber wird zunächst in zwei Hälften oder Lappen (Lobi) abgetheilt, den rechten und den linken, welche an der obern Fläche das Aufhängeband der Leber, am vordern Rande ein starker Einschnitt, an der untern Fläche die, die ganze

ganze Breite der Leber durchlaufende linke Längenfurche von einander abgegränzt.

§. 2206.

Der rechte, große Leberlappen (*L. hepatis dexter* s. *major*) ist ungefähr viermal größer als der linke (*L. h. sinister* s. *minor*), und übertrifft ihn in allen Dimensionen, besonders aber der Dicke, beträchtlich.

Die obere Fläche ist gleichförmig gewölbt, die untere der Theil der Leber, welcher durch Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich ist.

Diese stehen mit den ein- und austretenden Blut-, Lymph- und Gallengefäßen in Beziehung, und entsprechen dem Ausschnitte (*Hilus*) der übrigen drüsigen Organe.

Die obere Fläche der Leber ist bei weitem einfacher als die untere, und ziemlich gleichmäßig gewölbt, die untere, im Allgemeinen ausgehöhlt, durch mehrere Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich.

Ihre beiden Ränder, der vordere untere, und der hintere obere sind im Allgemeinen gewölbt, der erstere stärker als der letztere, jener sehr scharf und dünn, dieser breit und stumpf, so daß hier die obere und untere Fläche allmählich in einander übergehen, dort scharf von einander abgegränzt sind.

Der kleinere, linke Theil der untern Fläche des rechten Leberlappens, der mittlere der ganzen Leber, hat die Gestalt eines von vorn nach hinten liegenden H, dessen mittlere, quere, so wie die seitlichen Längenslinien durch die nach hinten convergirenden Furchen (*Sulci* s. *foveae*) der untern Leberfläche, gebildet werden, und zwischen welchen sich Erhabenheiten (*Lobuli*) befinden.

§. 2207.

1) Der erste beweist nichts, indem mehrere andre unläugbare Hemmungsbildungen noch weit seltner sind, und bei regelmäßiger Entwicklung völlig spurlos verschwinden. Dieser gehören z. B. das Beharren der Pupillarmembran, der Mangel der Gliedmaßen, das Offenbleiben des Pulsaderganges, des offenen Harnstranges, die Spaltung der Gebärmutter, der Nabelgefäßgefäße selbst. Die Analogie mit den Vögeln beweist nichts, da selbst bei mehreren Vögeln, z. B. den Raubvögeln, der Dottergang immer ganz zu verschwinden scheint, und bei einem Thiere, namentlich einem niedrigeren, sich Spuren früherer Zustände länger zu erhalten pflegen als bei einem andern, namentlich höhern.

2) Gegen den zweiten Grund läßt sich gerade die außerordentliche Seltenheit der angeführten Erscheinung anführen. Ueberdies fragt es sich, ob nicht unter diesen äußerst seltenen Fällen einige falsche Anhänge vorkommen, ob nicht in andern auch ein wahrer durch Ausdehnung entstand, ob nicht andre in einer regelwidrigen Verbindungsstelle des Darmkanals mit der Nabelblase begründet waren, zu geschweigen, daß in andern die Bildungsabweichung auf andre als die gewöhnliche Weise ursprünglich entstehen konnte, ohne daß daraus etwas gegen diese gefolgert werden könnte.

3) Der dritte Grund beweist gerade für meine Ansicht, und gegen die, für welche er angeführt wird, denn sehr selten zeigen bei Verdopplung des ganzen Körpers einzelne Organe, unabhängig davon, ein gleiches Streben, so daß sich unter dieser Bedingung z. B. ein überschüssiger Finger, ein überzähliges Auge, anbildete; dagegen sind hier unvollkommene Bildungen überhaupt, besonders aber Hemmungsbildungen, z. B. Wirbel-, Schädel-, Gaumen- und Bauchspalte, Hemmungen  
des

Leber ist, in einen wahren Kanal, wie bei den meisten Thieren, verwandelt.

Die hintere, besonders gegen den linken Lappen flachere Hälfte der linken Längsfurche, ist die Grube des Blutaderganges (Fossa pro ductu venoso), der in ihr von vorn und unten nach hinten, oben und zuletzt etwas rechts verläuft.

Hinten geht diese Grube in die Grube für die untere Hohlvene über.

Selten ist sie, und dann auch nur mit einer dünnen, eng mit dem venösen Gange verbundenen Schicht von Lebersubstanz bedeckt.

§. 2209.

Die rechte Längsfurche (Fossa longitudinalis dextra) ist beträchtlich flacher, und ihr vorderer von dem hinteren Theile durch die Pforte, sowohl der Form als der Bedeutung nach, deutlicher geschieden.

Der vordere, flachere, nicht mit der Bauchfellhaut bekleidete Theil ist die Grube für die Gallenblase (Fossa pro vesicula fellea), die vorn gewöhnlich durch einen flachern oder tiefern Einschnitt angedeutet ist, und bisweilen gegen ihr vorderes Ende durch eine wirkliche Oeffnung mit der obern Leberfläche zusammenfließt.

Der hintere, aufwärts steigende, und in den hinteren Rand übergehende Theil, die Hohlvenengrube (Fossa venae cavae) nimmt den obern Theil der untern Hohlvene auf, fließt hinten im stumpfen Leberrende mit der Furche des Blutaderganges zusammen, und wird selten ganz oder zum Theil durch eine Brücke von Lebersubstanz in einen Kanal verwandelt.

Aus dieser Grube treten von unten nach oben mehrere, ungefähr zwanzig, paarweise neben einander stehende, kleinere Lebervenen, an ihrem obern Ende aber zwei große Stämme derselben, ein rechter und ein linker, in die untere Hohlvene.

Diese befolgt also durch die Anordnung ihrer Gefäße dasselbe Gesetz als die übrigen Gefäße der Leber und, ungeachtet die Leber ein einfaches Organ ist, so erscheint sie doch auch hiedurch aus einer rechten und einer linken Hälfte zusammenge setzt.

Die Gefäß Einschnitte derselben sind zwar durch den hintern Mittellappen an der untern Fläche von einander abgegränzt, fließen aber doch in der That hinten zu einem zusammen.

#### §. 2210.

Der, zwischen den beiden Längenfurchen liegende Theil der untern Fläche der Leber wird durch die Pforte in eine vordere und eine hintere Hälfte getheilt.

Der vordere, niedrigere, zwischen der Gallenblase und Nabelblutaderfurcher, der Pforte und dem vordern Rande liegende ist der, von seiner Gestalt so genannte viereckige Leberlappen (Lobus quadratus).

Der hintere, kleinere, mehr längliche, schmalere, aber, weil er auf einer schmalern Grundfläche aufsitzt, stärker vorspringende, zwischen der Pforte, der untern Hohlvenengrube, der Grube des Blutaderganges und dem hintern Rande liegende, stärker vorspringende ist der geschwänzte oder Spiegel'sche Lappen (Lobulus Spiegelii s. caudatus).

## §. 2211.

Der rechte, bei weitem größere und dickere Theil der untern Fläche des großen Lappens ist gleichmäßig ausgehöhlt oder gewölbt.

## §. 2212.

Der linke, beträchtlich kleinere und dünnere Lappen endigt sich allmählich stumpf zugespitzt, und ist an der obern und untern Fläche eben.

Außer den beschriebnen Einschnitten finden sich nicht selten, vorzüglich am rechten Lappen, größere und kleinere, unbeständige, welche an die bei den Säugthieren gewöhnliche Spaltung der Leber in mehrere Lappen erinnern.

## d. Befestigung.

## §. 2213.

Die Leber ist überall, mit Ausnahme des rechten Theiles ihres hintern Randes, und des durch die Gallenblase bedeckten Theiles ihrer untern Fläche, vom Bauchfell, welches sich hinten von dem stumpfen Rande, vorn von der Pforte, oben vom Aufhängebande aus über sie wirft, dicht bekleidet. In ihrem größten Theile kann man zwischen ihr und dieser Haut keine weiteren Hüllen nachweisen, doch findet sich gegen den Rand im hintern Theile ihrer obern Fläche eine dichte Lage von Schleimgewebe zwischen beiden.

## §. 2214.

Sie wird durch mehrere Verdopplungen des Bauchfelles, namentlich 1) das Kranzband an ihrem hintern Rande, 2) durch das rechte und 3) das linke dreieckige Band an ihrem rechten und linken Ende mit der untern Fläche des Zwerch-

Zwerchfelles, durch das Aufhängeband mit der untern Fläche des Zwerchfelles und der weißen Linie verbunden.

Das kleine Netz verbindet sie mit dem kleinen Bogen des Magens. Mit der rechten Niere, welche sie in eine Vertiefung der untern Fläche ihres rechten Lappens aufnimmt, wird sie durch kurzes Zellgewebe locker zusammen geheftet.

a. Farbe, specifisches Gewicht und Festigkeit.

§. 2215.

Die Farbe der Leber ist in der Jugend und in der Blüthe des Lebens braunroth. Im Alter wird sie dunkler, schwärzlicher. Ihr specifisches Gewicht ist ungefähr wie 15 : 10. Ihre Substanz ist hartlich, aber brüchig, und die Leber gehört daher unter die Organe, welche, in Folge mechanischer, auf die Unterleibswände einwirkender Schädlichkeiten, am häufigsten, auch ohne Verletzung äußerer Theile, zerreißen.

L. G e w e b e.

§. 2216.

Das Parenchyma der Leber ist nicht durchaus homogen. Zwar findet man nicht, wie bei andern Drüsen und dem Gehirn, die beiden Substanzen, woraus sie besteht, so angelagert, daß die eine den äußern Theil, die andre den innern des Organs einnähme; allein dagegen ist dieß in seiner ganzen Ausbreitung sehr genau in zwei, überall mit einander abwechselnde Substanzen geschieden. Von diesen ist die eine rothbraun, die andre gelblich. Sie scheinen auf den ersten Anblick geschlängelte, ungefähr eine halbe Linie dicke Streifen zu bilden; bei näherer Betrachtung aber erscheint die gelbe durch die ganze Leber zusammenhängend und eine Menge von Erhabenheiten und Vertiefungen bildend, wenn gleich vielfach durchbrochen,

zweiten ein dritter kommt, in welchen sich der umgekehrte schiebt. Bisweilen finden sich selbst noch mehr Lagen übereinander, indem sich zwei Einschiebungen in einander begeben.

Oft kommen mehrere Einschiebungen vor.

Am häufigsten sind sie im Dünndarm, unstreitig wegen der beweglicheren Anheftung desselben.

Selbst hoch oben anfangende Einschiebungen können übrigens durch den Mastdarm aus dem After hervortreten.

Die gewöhnlichste Veranlassung dazu giebt unregelmäßige Thätigkeit der Muskelhaut; doch entstehen sie bisweilen auch mechanisch durch Geschwülste, wodurch ein Theil des Darmkanals umgekehrt und herabgezogen wird.

Unbedeutende, kleine Einschiebungen sind unstreitig oft vorübergehend und verschwinden von selbst; größere dagegen veranlassen Entzündung und Brand des eingeschobnen Stückes, die gewöhnlich, aber nicht immer tödtlich sind, sondern auf Kosten des abgestorbenen und sich trennenden Stückes, während sich zugleich die Lücke durch adhäsive Entzündung verschließt, geheilt werden.

β) Trennungen des Zusammenhanges, welche entweder bloß mechanisch, durch Zerschneidung, Zerreißen, oder in Folge vorangegangner Texturveränderungen, durch Exulceration entstehen. Sie sind entweder vollständig, und erstrecken sich durch alle Häute, oder nur durch die Muskel- und Bauchfellhaut, wovon dann die Folge ein Bruch der inneren Haut durch die äußere, und Bildung einer rundlichen Geschwulst, des falschen Darmanges (Diverticulum spurium) ist, welche sich durch Rundlichkeit, Mangel mehrerer Häute, und durch den Umstand, daß sie überall, selbst am Magen,



Bei näherer Untersuchung erscheint die gelbe Marksubstanz aus kleinern, punktförmlichen Körnern gebildet.

Kleinere Anhäufungen von Mark und Rinde vereinigt, kann man Läppchen (Acini) der Leber nennen, wenn gleich alle weit mehr als in andern Drüsen verschmelzen, nicht durch Zwischenräume, die bloß Zellgewebe anfüllt, von einander getrennt sind, und daher die Leber einen weit weniger gelassenen Bau als z. B. die Speicheldrüsen hat.

Wegen der Festigkeit und Härte der Lebersubstanz bleiben die Wandungen ihrer, mit ihr eng verbundenen Gefäße, wenn sie durchschnitten sind, geöffnet. Die Wandungen der feineren Zweige derselben geben besonders der bräunlichen, vorzüglich aus Gefäßen gebildeten Substanz ein siebförmiges, löcheriges Ansehen.

#### §. 2217.

Die Leber ist aus den Verzweigungen der Gallen-gefäße, der Pfortader, der Leberpulsader, der Leberblutadern, den Saugadern und den Nerven gebildet, welche durch Schleimgewebe zusammengehalten werden. Ihren wesentlichsten Theil bilden die Gallen-gefäße und das sie zunächst umgebende Schleimgewebe.

#### §. 2218.

Die Gefäße der Leber verbreiten sich weder genau auf dieselbe Art, noch stehen sie in demselben Zusammenhange unter einander und in demselben Verhältniß zur Lebersubstanz.

Die Leberpulsader, die Pfortader und die Gallen-gefäße sind in ihrer Verbreitung durch die Leber überall von einer gemeinschaftlichen, zelligen Hülle, einer Fortsetzung der Glisson'schen Kapsel, umgeben, und dadurch mit der

S. 2199.

Siehe hierzu auch den sich der Darmkanal, namentlich  
S. 2199. 2200. 2201. 2202.

Die Entzündung der Entzündung des Magens nach  
der Seite der Entzündung. Daß die innere, der Entzündung  
nach der Seite der Entzündung. ihrer Bildungsthätigkeit, ihres  
Zusammenhangs mit der Haut und der unmittelbaren Einwirkung  
der äußeren Einwirkungen auf sie am meisten unterworfen  
ist, ist eine Folge aus ihrer Anwesenheit von Entzündung  
nach der Seite der Entzündung. von Seite zu den kleinern Aestigen,  
während sie sich ausbreitet, welche das Verweilen des Blutes  
in denselben bewirken, indem sie den Rückfluß desselben hindern  
und zugleich auch bewirken ist.

Bei der Entzündung der Schleimhaut wird der Schleim  
dick und zäh, und wird häufig sowohl an der innern Fläche  
als an der äußern, der Entzündung ausgetrieben. Die  
Entzündung der Schleimhaut ist die Bildung von dickern oder  
dünnern, oder auch von beiden, welche ausgetrieben,  
oder auch in der Schleimhaut selbst gehalten  
werden. Die Entzündung der Schleimhaut der Wände, und dadurch  
die Entzündung der Schleimhaut des Darmes. Es entstehen unter  
dieser Entzündung die Entzündung und Wahrscheinlich nur, wenn  
die Entzündung der Schleimhaut ist. Selbst Verwachsungen zwischen  
verschiedenen Punkten eines Darms.

C.

... on the vascular Appearance in the  
... which is frequently mistaken for inflam-  
... In med. chir. transactions of London.  
Vol. 4. p. 301 - 325.

Monatly medical and anat. Tab. VII.

Hiermit übereinstimmend, werden von der Pfortader aus vorzugsweise leicht die Leberblutadern und jene von diesen aus angefüllt <sup>1)</sup>. Andre Zweige, die meistens feiner sind, stehen in einem nähern Zusammenhange mit den Anfängen des Leberganges, indessen ist dieser weit weniger unmittelbar als der vorige, da von der Pfortader aus nie die Gallengefäße allein, sondern immer nur in Verbindung mit andern, namentlich den Leberblutadern, angefüllt werden <sup>2)</sup>. Ihre feinem Zweige dringen nicht in die Marksubstanz der Leber, sondern verbreiten sich in der Rindensubstanz, hängen auch selbst nicht nahe mit der erstern zusammen <sup>3)</sup>.

## §. 2220.

Die Gallengefäße unterscheiden sich von den übrigen Gefäßen der Leber durch weniger feine Verzweigung. Nur die größern Nester verzweigen sich dichotomisch, die feinem weniger regelmäßig, so, daß von demselben Punkte mehrere abgehen. Ihre Wände sind durchaus fester als die der Venen. Die schleimabsondernden Vertiefungen, welche ihre innere Fläche außerhalb der Leber enthält, finden sich nur in den größern Nesten, verschwinden dagegen in den feinem, die völlig glatt sind. Eingespritzte Substanzen dringen aus ihnen am gewöhnlichsten in kein andres Lebergefäß, am häufigsten und vollkommensten aber in die Saugadern <sup>4)</sup>, diesen zunächst in die Pfortader.

P 4

Die

1) Walter. S. 63 ff.

Mappes S. 23.

2) Walter. S. 64. 65.

Mappes. S. 22.

3) Derselbe S. 11 — 13.

4) Walter. S. 70 ff.

Mappes. S. 24.

Die feinsten Zweige dieser Gefäße scheinen auf der Gränze zwischen der Mark- und Rindensubstanz zu entstehen, wenn man sie gleich nicht deutlich durch die erstere treten sieht<sup>1)</sup>; nie endigen sich diese Gefäße an der Oberfläche der Leber, sondern senken sich, auch wenn sie oberflächlich verliefen, in das Innere derselben.

§. 2221.

Die Leberblutadern verzweigen sich gleichfalls weniger zahlreich und fein als die Pfortader und selbst die Leberpulsader, nicht dichotomisch, und bilden einen kleinern Theil der Leber als die erstere<sup>2)</sup>, wenn gleich allerdings ihre geringere Entwicklung zum Theil nur scheinbar und darin begründet ist, daß wegen ihrer Zartheit ihre feinem Zweige leichter als die der übrigen Gefäße der Leber zerstört werden. Einspritzungen dringen aus ihnen vorzüglich nur in die Pfortader<sup>3)</sup>. Sie verbreiten sich mehr in querer, die übrigen Lebergefäße dagegen in schräg aufsteigender, fast senkrechter Richtung, und kreuzen sich daher mit ihnen. Die letzten Zweige der Leberblutadern stehen in einer engern Verbindung mit der Marksubstanz als die der übrigen Lebergefäße, und lassen sich bis zu ihr mehr oder weniger deutlich verfolgen, was zum Theil von dem Mangel der zelligen Hülle abhängt, die jene umgiebt.

§. 2222.

Die Lymphgefäße der Leber stehen in einer besonders engen Verbindung mit dem Lebergange, und es findet daher zwischen ihrer Höhle entweder ein ununterbrochener Zusammenhang Statt, oder die zwischen ihnen befindliche Substanz ist äußerst dünn, weich und leicht zerstörbar.

Die

1) Mappes, C. I.

2) Walter a. a. D.

3) Glisson p. 285.

Die Gefäße der verschiednen Gegenden der Leber stehen durch keine Anastomosen unter einander in Verbindung, indem durch Einspritzung eines Astes nur der Theil der Leber, zu welchem er sich begiebt, angefüllt wird.

2. Ausführender Theil des Gallenapparates.

§. 2223.

Der ausführende Theil des Gallenapparates wird durch einen Gang, den eigentlichen Ausführungsgang (Ductus excretorius), und eine blinde Anschwellung desselben, die Gallenblase (Cystis l. vesicula fellea) gebildet.

a. Ausführungsgang.

§. 2224.

Der Ausführungsgang, dessen innerhalb der Leber befindlicher Theil schon oben beschrieben wurde, besteht aus einer äußern, dickern, festen, zelligen, einer innern, dickern, glatten, durch eine Menge dichtstehender Vertiefungen ungleichen Schleimhaut. Er zerfällt in drei Abschnitte, den Lebergang (Ductus hepaticus), den Gallenblasengang (Ductus cysticus) und den Gallengang (Ductus cholangus).

Der Lebergang ist der erste Theil desselben, der in der Pforte gewöhnlich aus zwei Ästen, einem rechten Kleinern, aus dem vordern Theile des großen Leberlappens, und einem linken, weit größern, aus dem hintern Theile desselben und dem linken Leberlappen tretenden, die noch in der Pforte unter einem spitzen Winkel zusammenfließen, gebildet wird.

Er wendet sich, anderthalb bis zwei Zoll lang, im normalen Zustande ungefähr zwei Linien weit von oben und rechts

nach unten und links, und spaltet sich in die zwei übrigen, ununterbrochen mit ihm zusammenhängenden Theile.

Der Gallenblasengang geht unter einem spitzen Winkel nach vorn, unten und rechts, ist enger, aber gewöhnlich etwas länger als er, und schwillt zur Gallenblase an.

#### b. Gallenblase.

§. 2225.

Die Gallenblase, welche in einer eignen Vertiefung der untern Leberfläche liegt, hat gewöhnlich eine birnförmige Gestalt, und ist an ihrem offenen Ende, dem Halse (Cervix), am engsten, in der Mitte am weitesten. Mit ihrem blinden vordern Ende, oder dem Grunde (Fundus) überragt sie gemeinlich den vordern Rand der Leber etwas. Gewöhnlich ist sie mit dem obern Theile ihres Umfangs dicht an die untere Fläche der Leber geheftet, bisweilen aber auch bloß durch eine Verdopplung des Bauchfelles locker mit ihr verbunden, und in dem Maße weniger oder mehr vollständig von der Bauchfellhaut bekleidet.

Auf diese folgt ein verdicktes, die größern Gefäßstämme enthaltendes Schleimgewebe, die Gefäß- oder Zellhaut (T. *nervea* s. *vasculosa*), an dessen äußerer Fläche verschiedentlich gerichtete, bisweilen der Muskelhaut des Darmkanals sehr ähnliche, meistens weißliche Fasern verlaufen, die man nicht deutlich als eine eigne Schicht darstellen kann.

Diese bekleidet die innerste oder Schleimhaut (T. *intima* s. *mucosa*), deren innere Fläche durch Falten, welche ein aus unregelmäßigen Fünfecken gebildetes, auch bei der stärksten Ausdehnung nicht verschwindendes, sächeriges, netzförmiges

formiges Gewebe darstellen, ungleich gemacht wird. Sehr kleine Oeffnungen an ihrer innern Fläche führen zu meistens theils undeutlichen, einfachen Drüsen. Auf den Falten verbreiten sich vorzüglich nur Blutaderzweige.

Der Gallenblasengang und der Gallenblasenhals werden durch ungefähr zwölf quere Falten, Klappen, welche durch die Zell- und innere Haut gebildet werden, mit dem freien Rande meistens so gegen die Höhle der Gallenblase gerichtet sind, daß durch sie und die Wand des Ganges eine nach derselben Gegend gewandte Vertiefung entsteht, ungleich gemacht und verengt.

Diese Falten vergrößern sich von dem Lebergange aus gegen die Gallenblase allmählich, und hängen, vorzüglich die größten, durch longitudinale und schräge, niedrigere Zwischenerhabenheiten zusammen.

§. 2226.

Der Gallengang, das untere Stück des Ausführungsganges der Leber, ist die gemeinschaftliche Fortsetzung des Leberganges und des Gallenblasenganges und etwas weiter als beide, durch Structure und Durchmesser aber dem Lebergange ähnlicher, auch eine ununterbrochene Fortsetzung von diesem, indem wenigstens sehr häufig längs der Einmündungsstelle des Gallenblasenganges eine kleine Erhabenheit zwischen ihm und diesen beiden Gängen in der Richtung derselben verläuft.

Dieser Gang, der gewöhnlich ungefähr vier Zoll lang ist, tritt mit seinem untern Theile an die hintere Wand des Zwölffingerdarms, in dessen mittleres Stück er sich öffnet. Bis zu der Stelle, wo er mit demselben in Berührung kommt, behält er ungefähr denselben Durchmesser, auf seinem Wege zwischen  
der

der Muskel- und Zellhaut desselben aber verengt er sich beträchtlich; und endigt sich endlich mit einer engeren Mündung.

§. 2227.

Die Einmündungsstelle des Gallenganges ist schon beim Aufschneiden des Zwölffingerdarms an der hintern Wand desselben durch eine längliche, ungefähr vier Linien lange, mit einer schiefen, von oben nach unten abgeschnittenen Mündung an ihrem untern Ende versehenen Warze kenntlich, die sich gewöhnlich ungefähr drei Zoll weit vom Anfange des Zwölffingerdarms befindet, und durch die hier über einander liegende Schleim- und Zellhaut des Darmes und des Gallenganges, welche ununterbrochen in einander übergehen, gebildet wird.

Der untere Theil derselben gehört nicht bloß dem Gallengange, sondern ist auch dem Bauchspeicheldrüsendange gemeinschaftlich.

§. 2228.

Die deutlichste, sehr wichtige Function der Leber ist die Absonderung der Galle, einer zur Verdauung durchaus erforderlichen, grünen, sehr bitteren, alkalischen Flüssigkeit, deren sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften in mehr als einer Hinsicht sehr bedeutende Verschiedenheiten darbieten. Vorzüglich unterscheidet man im Allgemeinen Blasens- und Lebergalle, deren erstere dicker, dunkler, bitterer, also concentrirter als die letztere ist, Verschiedenheiten, welche von dem Verweilen derselben in der Gallenblase, nicht von dem verschiednen Ursprunge beider Gallenarten abhängen, ungeachtet selbst *Malpighi*<sup>1)</sup> und *Galeati*<sup>2)</sup> zum Theil das letztere annehmen.

Die

1) De liene C. 6.

2) Comm. Bonon. T. I. ib. T. II. p. 1.



Die Mischung der Galle ist, auch von dieser graduellen Verschiedenheit abgesehen, höchst wahrscheinlich nicht immer dieselbe.

Immer aber enthält sie eine sehr beträchtliche Menge Wasser, im Allgemeinen  $\frac{1}{12}$ . Der feste Rückstand besteht nach Thénard vorzüglich aus Eiweiß, Harz, die ihn ungefähr zu gleichen Theilen beinahe ganz bilden, einer geringen Menge gelber, unauflöslicher, und einer noch unbedeutendern aufgelösten Substanz, außerdem aus schwachen Spuren von Natron, phosphorsaurem, schwefelsaurem und salzsaurem Natron, phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd, die alle, mit Ausnahme der gelben unauflöslichen Substanz, in Wasser aufgelöst sind <sup>1)</sup>. Das, von Thénard und seinen Vorgängern angenommene Gallenharz entsteht dagegen nach Berzelius <sup>2)</sup> in der That erst durch die Einwirkung von Säuren auf die eigenthümliche, eiweißartige Gallensubstanz, und ist der, durch beide gebildete Niederschlag. Nach ihm besteht die Galle aus Wasser 907,4.

Gallensubstanz . . . . .	80,0.
Schleim . . . . .	3,0.
Gewöhnliche Alkalien und Salze . . . . .	9,6.

100,0.

Keiner ihrer Bestandtheile enthält Stickstoff, was wegen der häufigen Umwandlung der Fette und der Ähnlichkeit des Rindspeches mit Pflanzensubstanzen merkwürdig ist.

Eine, bei den meisten Vierfüßern vorkommende, eigne, bitterlich-süße Substanz, das Pikromel, wurde von Thénard  
der

1) Thénard über die Mischung der Galle. Mém. de la Soc. d'Armeil T. 1. Gehlen's Journ. f. Chemie. Bd. 4.

2) Med. chir. Transact. Vol. III.

der menschlichen Galle abgesprochen, allein von Chevalier<sup>1)</sup> theilich in derselben nachgewiesen.

Höchst wahrscheinlich wird die Galle ganz oder wenigstens bei weitem größtentheils aus dem venösen Blute der Pfortader gebildet, dagegen ist die Leberpulsader bloß ernährendes Gefäß.

Gründe hiefür sind: vorzüglich

- 1) die oben (§. 2218.) beschriebene Verbreitung der Leberpulsader in den Gefäßhäuten;
- 2) schon die Anwesenheit des Pfortadersystems;
- 3) die nähere Uebereinkunft der Mischung des venösen als des arteriösen Blutes mit der Galle;
- 4) die der Größe der Leber, nicht aber der Gallenabsonderung parallelaufende Größe der Leberpulsader, und die dem Grade der Gallenabsonderung entsprechende Entwicklung der Pfortader.

Die Gegengründe, welche

- 1) von dem Mangel des Pfortadersystems bei den wirbellosen Thieren;
- 2) dem Stattfinden der Gallenabsonderung bei in die Hohlader geöffneten Pfortader mit vergrößerter Leberpulsader<sup>2)</sup>;
- 3) der Correspondenz zwischen der Größe des Ausführungsganges der Leber und der Leberpulsader, dagegen der

---

1) Ueber die menschliche Galle und das darin enthaltne Pikromel. Ann. de Chimie et de Physique. T. 9. Daraus in Meckel's deutschem Archiv. Bd. 5. Hft. 1.

2) S. die Fälle hiervon Bd. 3. S. 363.

bedeutenden Differenz zwischen jenem und der Pfortader entslehnt werden, widerlegen jenen Satz nicht. Aus mehreren Gründen kann auch das arterielle Blut in den wirbellosen Thieren zur Absonderung der Galle tauglicher seyn als das arterielle in den höhern; das arterielle dürfte auch bei diesen im zweiten Falle dazu geeigneter seyn als gewöhnlich, gerade weil das Pfortaderblut nicht durch Gallenabsonderung dem arteriellen ähnlich geworden war. Ueberdies kamen alle bekannte Fälle in Kindern vor, die Galle war weniger bitter und in geringerer Menge vorhanden als gewöhnlich. Wider den dritten Grund läßt sich bemerken, daß die Leberpulsader, im Vergleich mit den Pulsadern andrer Absonderungsorgane, zur gleichzeitigen Ernährung und Absonderung zu klein scheint.

Eine von der Gallenabsonderung verschiedne Function der Leber, welche mehrere ihrer Größe, Beständigkeit und häufigen Krankheiten wegen anzunehmen geneigt sind, ist wenigstens nicht mit Bestimmtheit erwiesen. Unstreitig nützt die Galle dem Organismus nicht bloß in Beziehung auf die Verdauung, sondern auch auf den ganzen Lebensproceß, sofern sie durch die Gallenabsonderung das Ueberhandnehmen des Kohlen- und Wasserstoffes hindert, wie ihre Vergrößerung mit Abnahme des Athmungsprocesses in der Thierreihe, beim Embryo und in Krankheiten andeutet <sup>1)</sup>.

Außerdem kann der Pfortaderblutlauf jedoch den Zweck haben, die fremden aus dem Darmkanal durch den venösen Theil desselben Gefäßes aufgenommenen Substanzen zu vertheilen, zu verähnlichen, und dadurch unschädlicher zu machen.

B. Perio.

---

1) Meckel's Abhandlungen 1806. Cuvier's Vorl. über vergl. Anat. Bd. 4. S. 723.

B. Periodische Entwicklungsverschiedenheiten <sup>1)</sup>).

§. 2229.

Die Entwicklungsverschiedenheiten der Leber beziehen sich auf Größe, davon abhängende Lage, Gestalt und Gewebe.

a) Die Leber ist schon in der ersten Woche des Embryonallebens als ein sehr ansehnliches Organ vorhanden, und fast von dem Augenblick ihrer Entstehung an verhältnißmäßig desto größer, je jünger der Embryo ist. So ist sie beim dreiwöchentlichen Embryo halb so schwer als der ganze übrige Körper <sup>2)</sup>, und noch beim reifen Fötus wie 1:18 — 1:20 da sie beim Erwachsenen wie 1:35 — 36 ist. Die bedeutende verhältnißmäßige Größe der Leber mindert sich aber schon vor Ablauf der ersten Hälfte des Embryonallebens, indem sie von nun an langsamer wächst. Doch vergrößert sie sich bis zur Geburt. Nach der Geburt aber vermindert sich sogar eine Zeitlang die absolute Größe und Schwere derselben bis um das Ende des ersten Jahres, indem bei fünf neugeborenen Kindern die Lebern um ein Viertel mehr wogen, als bei eben so vielen, die acht bis zehn Monate gelebt hatten.

b) Sie nimmt daher einen desto größern Raum ein, je jünger der Fötus ist, füllt anfangs, noch im dritten, selbst vierten

---

1) Walter L. c. Sect. I.

A. Portal obs. sur la situation des viscères du bas-ventre chez les enfans, et sur le déplacement qu'ils éprouvent dans un âge plus avancé. Aus den Mém. de Paris 1771 in dessen Mém. sur pl. malad. I. p. 110. Ebenfalls. Obs. sur la situation du foie dans l'état naturel, avec des remarques sur la manière de connoître, par le tact, plusieurs de ses maladies. M. den M. de Paris 1773. M. a. D. C. 173.

2) Walter a. a. D. C. 45.

vierten Monate, fast die ganze Unterleibshöhle, reicht bis zum Hüftbeinkamme herab, und verdeckt die übrigen Eingeweide von vorn. Zum Theil rührt indessen diese Verschiedenheit davon her, daß sie anfangs mehr senkrecht steht, so daß ihre später obere Fläche nach vorn, die untere nach hinten gewandt ist.

c) Anfangs ist sie in demselben Verhältniß symmetrischer gebildet als sie symmetrischer liegt, indem der linke Lappen dem rechten an Größe weit ähnlicher ist, und die Gränze von beiden mehr in die Mittellinie fällt. Die eben erwähnte absolute Abnahme der Leber geschieht fast ganz auf Kosten des linken Lappens, indem während dieser ganzen Zeit der rechte dieselbe Größe als bei der Geburt behält, selbst oft etwas zunimmt, nur der linke dagegen sich nach allen Richtungen so verkleinert, daß er beim einjährigen Kinde kaum halb so groß als beim neugeborenen ist. Dagegen vergrößert sich der Spigelische Lappen etwas.

Die Gestalt der Leber ist anfangs rundlicher, ihre untere Fläche stärker gewölbt als späterhin.

d) Ihr Gewebe ist in den frühern Lebensperioden, besonders in den ersten Embryomonaten, weicher, homogener, brüchiger, weit blutreicher als späterhin, wo sich ihre Gefäße verengen und viele verschwinden. Schon beim reifen Fötus unterscheidet man indessen deutlich die doppelte Substanz der Leber.

e) Ihre Farbe ist anfangs hellgraubraun, erst nach Ablauf der ersten Schwangerschaftshälfte wird sie dunkelroth. Diese dunkle Farbe wird bald nach der Geburt, aus dem so eben angeführten Grunde, heller.

## §. 2211.

Der rechte, bei weitem größere und dickere Theil der untern Fläche des großen Lappens ist gleichmäßig ausgefüllt oder gewölbt.

## §. 2212.

Der linke, beträchtlich kleinere und dünnere Lappen endigt sich allmählich stumpf zugespitzt, und ist an der obern und untern Fläche eben.

Außer den beschriebnen Einschnitten finden sich nicht selten, vorzüglich am rechten Lappen, größere und kleinere, unbeständige, welche an die bei den Säugthieren gewöhnliche Spaltung der Leber in mehrere Lappen erinnern.

## d. B e f e s t i g u n g.

## §. 2213.

Die Leber ist überall, mit Ausnahme des rechten Theils ihres hintern Randes, und des durch die Gallenblase bedeckten Theiles ihrer untern Fläche, vom Bauchfell, welches sich hinten von dem stumpfen Rande, vorn von der Hohl-, oben vom Aufhängebande aus über sie wirft, dicht bekleidet. In ihrem größten Theile kann man zwischen ihr und dieser Haut keine weiteren Hüllen nachweisen, doch findet sich gegen den Rand im hintern Theile ihrer obern Fläche eine dicke Lage von Schleimgewebe zwischen beiden.

## §. 2214.

Sie wird durch mehrere Verdopplungen des Bauchfells, namentlich 1) das Kranzband an ihrem hintern Rande, 2) durch das rechte und 3) das linke dreieckige Band an ihrem rechten und linken Ende mit der untern Fläche des  
Zwerch

ies unfreilich wegen ihres sehr zusammengesetzten Baues, an der Regel abweichen.

Man kann am besten die Leber an sich, die Gallenwege, und die Galle in pathologischer Hinsicht abgesondert trachten.

### 1. Leber an sich.

#### §. 2232.

Unter den Abweichungen der äußern Form ist ihr Mangel eine bis jetzt nur bei mehreren kopflosen Mißgeburten beobachtete Erscheinung. Hier ist er Regel, die nur seltne Abnahmen hat, und auch dann ist die Leber nur klein.

Ihre Lage bleibt wegen unvollkommner Entwicklung der vordern Fläche des Unterleibes nicht ganz selten hypochondrich, sofern sie unter dieser Bedingung allein oder mit den übrigen Eingeweiden mehr oder weniger frei herabliegend, und mit einem Theil ihrer Masse nach einem Nabelbruch abfällt. Seltner ragt sie, wegen unvollkommner Ausbildung des Zwerchfelles, in die Brusthöhle. Unter diesen Veränderungen, vorzüglich der ersten, wird dann bisweilen der vordere Theil in einen Fortsatz ausgezogen, der mit der übrigen Leber nur durch einen dünnen Stiel zusammenhängt, wodurch die irrige Annahme einer doppelten Leber veranlaßt werden kann. Auf ähnliche Weise erscheint auch bisweilen die Leber regelwidrig, ohne eine solche mechanische Veranlassung, in eine größere oder geringere Anzahl durch flachere oder tiefere Einschnitte von einander getrennter Lappen getheilt.

Diesem Zustande äußerlich ähnlich, doch durch die Form sowohl als die Entstehung deutlich von ihm unterschieden, sind Zerreißungen der Leber, die, auch ohne Verletzung der mehr äußern Theile, wegen Brüchigkeit derselben leicht durch äußere mechanische Einwirkungen nicht bloß auf die Stelle des Körpers, an welcher sie liegt, sondern auch auf entfernte, eintreten.

Selten erreicht die Leber durch Fehler der Urbildung nicht das gewöhnliche Maaß, verkleinert sich dagegen später, vorzüglich im Alter, sehr oft, und wird zugleich regelwidrig dicht und fest, ein Zustand, der, aber nicht ganz richtig, mit dem Namen *Scirrhus* belegt wird.

Die Vergrößerung der Leber ist eine der gewöhnlichsten Affectionen derselben, welche in jeder Periode des Lebens, vorzüglich aber im spätern Alter eintritt. Am gewöhnlichsten ist sie mit mehr oder weniger beträchtlicher Texturveränderung, vorzüglich Verhärtung, auch da verbunden, wo sie nicht bloß in Entstehung neuer Bildungen in ihrem Innern begründet ist. Doch ist, gegen die gewöhnliche Meinung, Verhärtung keine nothwendige Begleiterinn ihrer Vergrößerung, in dem diese bisweilen selbst mit Auflöserung ihrer Substanz verbunden ist. Die Vergrößerung der Leber ist vorzüglich mit chronischen allgemeinen Krankheiten, namentlich Rachitis, Scropheln, Wassersucht, verknüpft. Unter dieser Bedingung ist sie gewöhnlich zugleich verhärtet, beim Scorbut dagegen, wo sie sich gleichfalls wenigstens häufig vergrößert, mehr aufgelockert. Die bei Lungenleiden gewöhnlich Statt findende Vergrößerung der Leber ist unstreitig wenigstens oft ein Mittel der Heilkraft der Natur.

Ver:



Verhärtung der Leber ist die gewöhnlichste Texturveränderung derselben, die vorzüglich häufig mit und ohne Veränderung ihres Volums entsteht. Weit seltener ist Auflockerung, welche bisweilen mit, bisweilen ohne Verkleinerung eintritt <sup>1)</sup>.

Die neuen Bildungen in der Leber wiederholen nur selten Theile, welche zur normalen Zusammensetzung des Körpers gehören. Am häufigsten ist die Umwandlung der Leber in Fett, welche verschiedene Grade hat, meistens die ganze Masse derselben einnimmt, und vorzüglich die Begleiterinnträger Ruhe ist.

Die regelwidrige Knochenzeugung erscheint am gewöhnlichsten an dem Umfange der Leber, unter der Bauchfellhaut, und ist am wahrscheinlichsten nur Metamorphose eines andern Aftergebildes, eines serösen, oder faserigserösen Balges, der sich nicht ganz selten als die Bildungsstätte von Hydatiden in der Leber entwickelt.

Nicht selten ist die Leber der Sitz völlig regelwidriger neuer Bildungen, welche im Allgemeinen mit dem Namen von Knoten (Tubera) belegt werden, selten eingebalgt sind, eine rundliche Gestalt, gewöhnlich eine weißliche, selten eine braune oder rothe Farbe haben, vom Durchmesser einiger Linien bis zu dem von drei bis vier Zollen variiren, und sich oft in außerordentlicher Menge in der übrigens gesunden Lebersubstanz entwickeln. Wie die meisten neuen Bildungen sind sie meistens eiweißartig <sup>2)</sup>, doch haben die bräunlichen nach einigen

3 3

Ver:

1) Portal S. 117.

2) Portal a. a. O. Des obstructions albumineuses du foie. p. 95 ff.

Versuchen mehr Aehnlichkeit mit der Gallert <sup>1)</sup>. Die Krankheiten, welche sie darstellen, sind vorzüglich entweder Scropheln oder Blutschwamm.

Alle angeführten Umwandlungen der Masse, des Volums, der Cohäsion, die Entwicklung der meisten neuen Bildungen entstehen vorzüglich in Folge des übermäßigen Genusses geistiger Getränke. Häufig verursachen sie, indem die Leber dadurch zur Gallenabsonderung unfähig oder der abgesonderten Galle der Austritt versperrt wird, Gelbsucht, indem die Galle in einer größern oder geringern Menge von Organen und Flüssigkeiten, und namentlich der Haut, abgesetzt wird. Doch können auch benachbarte Organe diese Krankheit veranlassen, und bisweilen findet gar keine Alienation Statt. Wegen der Wichtigkeit ihrer Function und des genauen Zusammenhanges ihres Zustandes mit dem des Gemüthes, weicht die Leber in allen allgemeinen chronischen Krankheiten sowohl als in Gemüthskrankheiten gewöhnlich mehr oder weniger vom Normal ab.

Seltner entwickeln sich Entozoen in der Leber. Namentlich sind dies Hydatiden, welche vorzugsweise vor allen Organen der Leber zukommen, und sich, oft in außerordentlicher Größe und Zahl, und mit bewundernswürdiger Schnelligkeit gewöhnlich an einer, selten an mehreren Stellen, vorzüglich im rechten Lappen entwickeln, von der übrigens gesunden Lebersubstanz durch, meistens aus mehreren Schichten zusammengesetzte Wälle abgesondert sind, nicht selten fast die ganze Leber zerstören, und von ihrer ursprünglichen Bildungsstelle, am gewöhnlichsten in den Darmkanal, seltner in die Brusthöhle und die Lungen, oder durch die allgemeinen Bedeckungen unmittelbar nach außen gelangen.

Weit

1) Ebenas. Des obstructions gélatineuses. p. 98 ff.

1) Weit seltner kommen in der Leber aus der Galle gebildete Concretionen vor, die wahrscheinlich immer ursprünglich in den Gallengefäßen entstehen, und erst aus ihnen in die Substanz derselben gelangen.

## 2. Gallenwege.

S. 2233.

Hiaweilen, doch selten, fehlt ein Theil der Gallenwege, namentlich die Gallenblase, durch einen Fehler der Urbildung, ohne nothwendig nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit, was um so weniger befremdend ist, da die Exstirpation der letztern nach Berlin's Versuchen von Ragen ohne Nachtheil vertragen wurde, und ihr Mangel bei vielen Thieren Regel ist. Häufiger Mangel der Gallenwege<sup>1)</sup> dagegen, hat die schädlichsten Folgen.

Selten sind auch qualitative Bildungsabweichungen der Gallenwege, die Anwesenheit von Leberblasengängen (Ductus hepatico-cystici), welche unmittelbar aus der untern Leberfläche in die Gallenblase treten, die späte Vereinigung der beiden Wurzeln des Leberganges, der Eintritt einer oder mehrerer Aeste desselben in den Blasengang, oder selbst in die Blase, die Einsenkung des Gallenganges an einer ungewöhnlichen Stelle des Darmkanals, selbst des Magens. Häufiger weicht die Gallenblase auf diese Weise vorzüglich so ab, daß sie durch eine Einschnürung in zwei, der Länge nach auf einander folgende, seltner durch eine Längenscheidewand in zwei seitlich neben einander liegende Hälften getheilt wird. Vergrößerung und Verkleinerung der Gallenwege rühren meistens

3. 4

theils

1) Home. Medel's Archiv Bd. 2. S. 249.

theils von mechanischen Ursachen her. Namentlich sind dies am häufigsten in ihrer Höhle befindliche Gallensteine, seltener angeschwollene Saugaderdrüsen, welche sie an einer Stelle von außen zusammendrücken. Die Gallenblase kann durch ihr enthaltne Steine sowohl verengt als erweitert werden. Die Verengung und gänzliche Obliteration ihrer Höhle findet Statt, wenn Steine von geringer Größe und Zahl durch ihre Lage den Eintritt der Galle völlig verhindern. Dagegen wird die Blase durch viele oder beträchtliche Steine allein, oder zugleich durch die Galle, oft sehr bedeutend erweitert, wenn die Lage von diesen den Ein- und Austritt der Galle nicht ganz verhindert, oder wenn sie sich im gemeinschaftlichen Gallengange befinden. Auch bloß übermäßige Erzeugung der Galle bewirkt indessen, ohne mechanisches Hinderniß, bisweilen ungeheure Ausdehnung derselben. Hierbei sind ihre Häute gewöhnlich verdünnt, im entgegengesetzten Zustande beträchtlich verdickt, die verschiedenen Steine zuweilen durch, selbst vollständige Scheidewände, von einander abgesondert.

Stets ist die Gallenblase der Sitz neuer Bildungen. Hierher gehören indessen Knoschensichten, welche sich zuweilen an der äußern Fläche ihrer Schleimhaut erzeugen, und Haare, welche von der innern hervortachsen.

### 3. G a l l e.

#### §. 2234.

Die Galle entfernt sich durch ihre chemischen und physischen Eigenschaften sehr häufig vom Normal, ohne daß man immer einen bestimmten Zusammenhang zwischen der Beschaffenheit des Gewebes der Leber und diesen Abnormitäten wahrnimmt. Doch erscheint sie bei der Fettumwandlung der Leber im Allgemeinen viel weniger bitter als gewöhnlich.

Die

Die auffallendste Abweichung bieten die Gallensteine dar.

Diese sind, besonders im Alter und bei sitzender Lebensart, sehr gewöhnliche krankhafte Bildungen, welche sich durch die Stelle, die sie einnehmen, durch Mischung, Farbe, Zahl, Größe, Gefüge, äußere Gestalt und Consistenz bedeutend von einander unterscheiden.

1) Stelle. Bei weitem am häufigsten kommen sie in der Höhle der Gallenblase vor, und scheinen sich daher in den meisten Fällen hier zu bilden. Doch finden sie sich auch, wenn gleich verhältnißmäßig sehr selten, in den Gallenwegen innerhalb der Leber. Außerdem ist ihr Sitz bisweilen der Leber- oder Blasen- oder Gallengang, wohin sie aber gewöhnlich aus der Gallenblase gelangen. Aus dem Gallengange treten sie nicht selten in den Darmkanal.

Am seltensten liegen sie außerhalb der Höhle der Gallenwege in der Lebersubstanz oder den Häuten der Gallenblase. Die erstern können hier sehr wohl gebildet seyn, die letztern aber sind unstreitig erst aus der Höhle der Gallenblase zwischen die Häute der Gallenblase gelangt, und durch Verwachsung der anfänglichen Oeffnung von ihr getrennt, wenn man gleich angenommen hat, daß sie sich ursprünglich an dieser Stelle bilden, und diese Thatsache sogar als ein Beweis für die, zum Theil durch die Drüsen der Gallenblase bewirkte Ab-

1) Vicq d'Azyr Mém. de la Soc. de médéc. 1779.

Fourcroy sur les calculs des animaux. Ann. du Muséum. T. I. Th. Sümmering de concretis biliariis. Francof. 1795. Thénard in dessen Abhandl. über die Galle in Gehler's J. f. die Chemie und Physik. Bd. 4.

Moskovius Diss. de calculorum animalium etc. origine et natura. Berol. 1812.

sonderung der Galle angesehen worden ist. In der That findet man bisweilen als Uebergang von der gewöhnlichen freien Lage der Gallensteine in der Gallenblase zu der Lage außerhalb ihrer Höhle die Steine in Vertiefungen der Wände derselben.

2) *Mischung.* Die Mischung der Gallensteine bestimmt im Allgemeinen alle folgenden Merkmale derselben. Vorzüglich gehen zwei Substanzen, eine, mehr oder weniger dunkel gefärbte, bräunliche, und eine farblose, weiße, in ihrer Zusammensetzung ein; von denen die letztere (Cholesterina)-Wallrathähnlich, und im Normalzustande nicht in der Galle enthalten, die erstere die gelbe, färbende Substanz derselben ist.

Die erstere entsteht vermuthlich durch eine Umwandlung des eigenthümlichen Gallenstoffes. Außerdem enthalten die Gallensteine fast immer etwas, durch Wasser trennbare Galle.

Selten findet sich an der Oberfläche kohlensaurer Kalk<sup>2)</sup>.

3) *Farbe.* Gewöhnlich sind die Gallensteine mehr oder weniger gefärbt, vom hellsten gelb bis zum dunkelsten schwarzbraun, indem fast immer beide erwähnte Substanzen zugleich vorkommen; nur die seltneren, ganz aus Wallrath gebildeten sind ganz weiß. Uebrigens ist die Farbe nicht durch den ganzen Gallenstein dieselbe.

4) *Zahl.* Die Zahl variirt von einem bis auf mehrere Hundert. Die reinen Wallrathsteine sind gewöhnlich einzeln, oder wenigstens nur in geringerer Zahl vorhanden.

#### 5) *Größe.*

1) D. G. Galeati de calculis in cysti fellea, et intra ejus tunicas repertis. Comm. Bonon. I. p. 554.

Idem de cystis felleae ductibus. Comm. Bonon. T. II, part. 2. p. 351 seqq.

2) London med. repository. T. 4. p. 469.

5) Größe. Auch die Größe variiert bedeutend. Gewöhnlich steht sie mit der Zahl im Gegensatz. Die reinen Wallrathsteine sind meistens größer als die zusammengesetzten. Doch nimmt ein einzelner Stein der letztern Art bisweilen die ganze, überdies ausgedehnte Gallenblase ein.

6) Äußere Gestalt. Im Allgemeinen sind sie mehr oder weniger rundlich, die Wallrathsteine länglicher als die übrigen. Die Gestalt derselben wird auch durch die Zahl abgeändert, sofern durch das Aneinanderreiben mehrere glatte Flächen entstehen. Diese fehlen gewöhnlich bei den einzeln vorkommenden Wallrathsteinen, welche daher eine rauhere Oberfläche als die zusammengesetzten haben. Selten aber haben sie scharfe Spizen.

7) Das Gefüge ist sehr verschieden. a) Am gewöhnlichsten sind die Gallensteine solide, doch bewahre ich einen durchsichtigen hohlen auf;

b) bestehen sie aus mehreren, über einander liegenden, verschiedenlich gefärbten Schichten.

c) Diese Schichten sind bisweilen, aber selten, bloß aus einer der beiden vorher beschriebnen Substanzen allein gebildet, daher meistens alle gefärbt, und nur durch den Grad der Färbung verschieden. Nicht selten liegt eine weiße Schicht am meisten nach außen.

d) Die helleren Schichten haben fast immer einen mehr oder weniger deutlich strahligen, faserigen Bau, und erscheinen oft deutlich aus lose neben einander liegenden, mit den Spizen in der Mitte zusammentreffenden, sehr länglichen Pyramiden zusammengesetzt. Diese Bildung scheint von dem Wallrath herzurühren, da sie in den reinen Wallrathsteinen

am

seinem Wege unter rechtem Winkel, von oben und unten eine ansehnliche Menge, leicht bis zu den kleinsten Läppchen zu verfolgender Zweige einsenken, wodurch er allmählich beträchtlich, oft bis zum Durchmesser von anderthalb Linien, anschwillt.

Kurz vor seinem Austritte aus der Drüse nimmt er noch einen oder einige sehr beträchtliche Aeste, welche aus dem Kopfe treten, und sich nicht ganz selten allein in den Zwölffingerdarm öffnen, auf.

Er wird nirgends außerhalb der Substanz der Drüsen sichtbar, und erscheint erst nach Durchschneidung derselben.

Seine Einsenkung in den Zwölffingerdarm findet gewöhnlich drei bis vier, bisweilen aber selbst zehn Zoll weit vom Pfortner Statt.

An der Stelle, wo er den Zwölffingerdarm erreicht, ist er äußerlich mit dem Gallengange verbunden, doch bleiben auch zwischen den Wänden des Darmes, wenn sie gleich dicht neben einander liegen, beide Gänge völlig von einander getrennt, und sie öffnen sich dicht neben einander, der Bauchspeicheldrüsendrang weiter nach der linken Seite, in den Boden einer kleinen, ungefähr zwei Linien langen Vertiefung, deren Bekleidung völlig die Merkmale der innern Haut des Zwölffingerdarms hat, so daß man also beiden Gängen eigentlich keine gemeinschaftliche Öffnung zuschreiben kann.

Der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse erweitert sich gegen seine Mündung mehr oder weniger beträchtlich, verengt sich dagegen an seiner Einmündungsstelle selbst unmerklich, hat aber weder hier, noch in seinem ganzen Verlauf etwas Klappenartiges.



Der Anschein einer Klappe an seiner Mündung entsteht bloß durch die Scheidewand zwischen seiner und der Mündung des Gallenganges.

## §. 2238.

Die Bauchspeicheldrüse ist, wie alle Speicheldrüsen und die meisten drüsigen Organe, in den frühern Lebensperioden stärker als in den spätern entwickelt.

Außerdem bietet nach meinen Untersuchungen, auf eine sehr beständige Weise, ihr Ausführungsgang insofern eine merkwürdige Entwicklungsverschiedenheit dar, als er anfänglich doppelt ist, indem sich, außer dem bleibenden, ein zweiter in den Zwölffingerdarm öffnet <sup>1)</sup>.

## §. 2239.

Angeborne Abweichungen dieser Drüse erstrecken sich vorzüglich auf die Anordnung ihres Ausführungsganges, der bisweilen, und im Allgemeinen durch Beharren, auf der eben erwähnten Fötusbildung, doppelt erscheint <sup>2)</sup>.

Später entstehende sind vorzüglich Verhärtung, Vergrößerung. Seltener kommen in ihrem Ausführungsgange Steine vor <sup>3)</sup>, welche aus einer thierischen Substanz und phosphorsaurem Kalk bestehen.

## III. Mitz.

1) Meckel's Abhandlungen S. 331. 353. 366. 380.

Deutsches Archiv f. die Physiol. Bd. 3. S. 70. 71.

2) Riedemann über die Verschiedenheiten des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse bei dem Menschen und den Säugthieren. Deutsches Archiv f. die Physiol. Bd. 4. S. 403.

3) Ein merkwürdiger Fall abgebildet von Baillie. Engravings. Fasc. V. Tab. 7.

Lebersubstanz in einer weniger engen Berührung als die Leberblutadern, welchen diese Hülle fehlt, deshalb zugleich weicher und fester als diese.

Die Leberpulsader erscheint vorzüglich als ernährendes Gefäß, indem sie sich, wie schon Clisson<sup>1)</sup> richtig bemerkte, und nachher Bianchi<sup>2)</sup>, Walter<sup>3)</sup> und Mappes<sup>4)</sup> bestätigten, auf den übrigen Gefäßen, ein sehr zusammengesetztes Netz bildend, verbreitet. Doch öffnen sich auch ihre feinsten Zweige in die Hölle der Pfortader<sup>5)</sup>. Ihre Aeste sind weniger zahlreich, und verlaufen in geraderer Richtung als die der Legetern<sup>6)</sup>. Wird sie eingespritzt, so fällt sie sich gewöhnlich allein, außerdem vorzugsweise nur die Pfortader an<sup>7)</sup>.

#### §. 2219.

Die Pfortader bildet den bei weitem größten Theil der Gefäßsubstanz der Leber. Sie verzweigt sich sehr vielfach und deutlich dichotomisch, wenn gleich der eine Ast größer als der andere ist<sup>8)</sup>. Sie endigt sich auf doppelte Weise. Mehrere, zum Theil beträchtliche, bis auf eine Linie weite Aestmündungen mit entsprechenden der Leberblutadern ein<sup>9)</sup>, und

1) L. I. Cap. 29. de Arterias hepatis distributione.

2) A. a. D. Pars I. Cap. VIII. §. 5.

3) A. a. D. S. 96.

4) A. a. D. S. 13.

5) Walter. S. 96. 99.

6) Walter. S. 95. 96.

7) Derselbe. S. 68.

8) Mappes. S. 13.

9) Bortin in Mém. de Paris. 1765.

Walter. S. 94. 95.

auchsfelles mit dem Zwerchfell, dem Magen und dem absteigenden Grimmdarm verbunden.

Ihre Größe ist nicht nur in verschiedenen Körpern, sondern selbst in demselben zu verschiedenen Zeiten und abwechselnd, sehr verschieden. Im Allgemeinen kann man festsetzen, daß beim Erwachsenen ungefähr vier Zoll lang, drei breit, nicht allg einen Zoll dick ist.

Ihr Gewicht ist auf dieselbe Weise vielen Abänderungen unterworfen. Im Durchschnitt beträgt es ungefähr acht Unzen, das Verhältniß zum Körper ist also beim Erwachsenen ungefähr wie 1:210. Keinesweges stehen aber Größe und Gewicht der Milz nothwendig im umgekehrten Verhältniß mit der Ausdehnung des Magens \*).

Ihr specifisches Gewicht zum destillirten Wasser ist wie 200:1000.

Ihre Farbe ist mehr oder weniger dunkelroth.

Die Consistenz der Milz ist gering, zugleich ist sie sehr weich.

§. 2241.

Dieses Organ besteht aus den ersten Anblick ganz aus Blutgefäßen, von welchen die Pulsader aus dem Stamme der Eingeweidepulsader (Vd. 2. S. 207.) entspringt, die Blutader, welche dicht an sie geheftet, und verhältnißmäßig zu ihr weicher als irgend eine im Körper ist, in die Pfortader tritt (Vd. 2. S. 364.) und ergossenem dunkelrothen Blute.

Die Substanz desselben wird von einer festen, serbafaserigen Haut umgeben.

Das seröse Blatt ist das äußere, und stammt von dem Zwerchfelle, mit welchem es durch die erwähnten Verlängerungen zusammenhängt.

Das

\*) Bissolant a. a. O. S. 129 — 133.

Meckel's Anat. 4. Th.

Das faserige ist der Milz eigenthümlich, aber von dem selbst nur im Gefäßauschnitt und in geringer Entfernung längs demselben deutlich zu trennen.

Von der faserigen Haut der Milz erstrecken sich eine beträchtliche Menge vielfach mit einander verschlungener, sehr feiner, solider Blätter und Fasern durch den ganzen, von ihr umgebenen Raum, und bilden unregelmäßige Räümchen, in welchen sich die Gefäße der Milz verbreiten, und die überhaupt die Grundlage des Gewebes der Milz bilden.

Außer diesen Fäden gehen von der innern Haut der Milz an dem Einschnitt derselben andre hohle Kanäle ab, welche die Gefäße derselben eng umgeben, und sich mit ihnen verzweigen. Die erstern Fäden heften sich auf dieselbe Weise an die äußere Fläche dieser Kanäle als an die innere der Faserhaut.

Von den Gefäßen der Milz geben die Pulsaderäste in ihrem Verlauf eine beträchtliche Menge Zweige ab, welche sich pinselförmig äußerst fein vertheilen, aber nicht unter einander anastomosiren. Dagegen anastomosiren die Venenzweige, welche diese Pulsaderpinsel umstricken, vielfach unter einander und mit den benachbarten. Indessen hängen weder die Pulsadern, noch die Blutadern der verschiednen Gegenden der Milz durch große Anastomosen zusammen. Dagegen ist die Verbindung der Puls- und Blutadern der Milz weit, wie theils das Mikroskop, theils der leichte Uebergang eingespritzter Substanzen aus den Pulsadern in die Blutadern erweist.

Außer den Blutgefäßen enthält die Milz eine ansehnliche Menge von Saugadern.

Ihre Nerven, welche von dem Milzgeflecht (Vd. 3. S. 762.) stammen, sehr klein sind, und kaum  $\frac{1}{2}$  der Größe der

der Pulsadern haben, welche sie umflechten, lassen sich nicht weit in das Innere des Organs verfolgen.

Außer diesen Bestandtheilen, welche nach mehreren Anatomen die einzigen sind, enthält die Milz nach den richtigern Angaben anderer, namentlich Malpighi, Hewson, Dupuytren, Home, Heusinger, mit welchen auch meine Untersuchungen übereinkommen, in sehr großer Menge noch andere, rundliche, weißliche, höchst wahrscheinlich hohle, oder wenigstens sehr weiche Körperchen von sehr verschiedner Größe und gegenseitigem Ortsverhältniß, indem die erstere von  $\frac{1}{2}$  Linie bis zu einer Linie variirt, und sie in Bezug auf das letztere bald sehr nahe an einander, bald ziemlich weit von einander entfernt stehen. Sie hängen sehr genau mit dem übrigen Gewebe der Milz zusammen, und sind sehr gefäßreich. Nach Home's, von Heusinger und mir bestätigten Beobachtungen an Thieren schwellen sie besonders nach eingenommenem Getränk beträchtlich an.

Diese Körperchen hielt Malpighi für Drüsen, Kuyfch und mehrere Anatomen läugneten ihre Anwesenheit, und erklärten sie, indessen ohne Grund, für bloße Gefäßbüschel.

Ungeachtet weder diese einzelnen Körperchen, noch die ganze Milz, Ausführungsgänge haben, so ist es doch im hohen Grade wahrscheinlich, daß sie einen bedeutenden Antheil an der Umwandlung des Blutes in der Milz, und damit sowohl an der Bildung des Magensaftes, als vorzüglich unmittelbar der Galle haben.

Die braunrothe Substanz, welche sich durch Auswaschen und Ausdrücken sehr leicht völlig ausscheiden läßt, ist wahrscheinlich nicht als ein Bestandtheil der Milz, sondern als das so umgewandelte Blut zu betrachten.

nach unten und links, und spaltet sich in die zwei übrigen, ununterbrochen mit ihm zusammenhängenden Theile.

Der Gallenablasengang geht unter einem spitzen Winkel nach vorn, unten und rechts, ist enger, aber gewöhnlich etwas länger als er, und schwillt zur Gallenblase an.

#### a. Gallenblase.

§. 2225.

Die Gallenblase, welche in einer eignen Vertiefung der untern Leberklappe liegt, hat gewöhnlich eine birnenförmige Gestalt, und ist an ihrem obern Ende, dem Halse (Cervix), am engsten, in der Mitte am weitesten. Mit ihrem blinden vordern Ende, oder dem Grunde (Fundus) überragt sie gemeinlich den vordern Rand der Leber etwas. Gewöhnlich ist sie mit dem obern Theile ihres Umfangs dicht an die untere Fläche der Leber geheftet, bisweilen aber auch bloß durch eine Verdickung des Zwerchfelles locker mit ihr verbunden, und in dem Maße weniger oder mehr vollständig von der Bauchfellhaut bekleidet.

Auf diese folgt ein verdicktes, die größten Gefäßstämme enthaltendes Schleimgewebe, die Gefäß- oder Zellhaut (T. nervosa l. vasculosa), an dessen äußerer Fläche verschiedentlich gerichtete, bisweilen der Muskelfhaut des Darmkanals sehr ähnliche, meistens weißliche Faseru verlaufen, die man nicht deutlich als eine eigne Schicht darstellen kann.

Diese bekleidet die innerste oder Schleimhaut (T. intima l. mucosa), deren innere Fläche durch Falten, welche ein aus unregelmäßigen Fünfecken gebildetes, auch bei der stärksten Ausdehnung nicht verschwindendes, fächeriges, netz-  
für

in ihr ruht, sondern unstreitig umgewandelt wurde; so ist diese Beziehung zugleich eine chemische. Im Anfange der Magenverdauung erhält die Milz weniger Blut, weil der angefüllte Magen den freien Eintritt desselben hindert; allein in dem Maaß als er sich entleert, strömt das Blut wieder freier zur Milz, und ihre Function in Bezug auf die Leber wird daher erhöht. Außerdem unterstützt die Milz höchst wahrscheinlich die zuletzt (S. 352.) erwähnte Function der Leber, und wirkt veräähnlichend und neutralisirend auf die fremden, eingenommenen Substanzen. Hiernach würde sie, und in letzterer Beziehung auch die Leber, als ein Organ anzusehen seyn, welches im Blutgefäßsystem den zusammengeballten Drüsen im Saugadernsystem entspräche. Die Milz hat größere Aehnlichkeit mit diesen als die Leber, sofern sie keinen Ausführungsgang hat; die Leber erscheint dagegen als eine Zusammensetzung aus einer conglomerirten und zusammengeballten Drüse im Gefäßsystem.

Mit der Thätigkeit des Magens kann die der Milz auf mehrfache Weise in Beziehung stehen; 1) in dynamischer, sofern beide Organe im Gegensatz zu stehen scheinen, indem die Milz weich, schwärzlich, in Hinsicht auf ihre Substanz und die Veränderung des zu ihr tretenden Blutes auf Wasserstoffentwicklung, der Magen dagegen, der Natur des von ihm abgesonderten Saftes auf Sauerstoffentwicklung thätig angesehen werden kann; und 2) in mechanischer, sofern sie außer der Zeit der Magenverdauung das Blut von demselben ableitet, dagegen bei gefülltem Magen in geringerer Menge aufnimmt, so daß dieses jetzt, also zu der Zeit, wo es zur Absonderung des Magensaftes am meisten nothwendig ist, am reichlichsten zum Magen strömt.

Außerdem scheint die Milz auch die Function zu haben, wenigstens einen Theil der in den Magen gelangten Flüssigkeiten schnell aufzunehmen (S. 371.), ungeachtet ihr diese allerdings nicht allein zukommt, da die Flüssigkeiten auch nach Wegnahme der Milz gleich schnell aus dem Magen verschwanden und die in ihnen enthaltenen Substanzen in gewissen Flüssigkeiten gefunden wurden.

## 2. Periodische Verschiedenheiten.

### §. 2243.

Die Milz fehlt anfänglich und erscheint erst im zweiten Embryomomate deutlich.

Sie ist anfänglich im Verhältniß zum Körper, noch mehr zur Leber, außerordentlich viel kleiner als in spätern Lebensperioden, wenn sie gleich im höhern Alter wieder einschrumpft.

In den spätern Fötusperioden und der Kindheit sind die weißen Körperchen verhältnißmäßig größer und deutlicher als späterhin.

Alle diese Bedingungen sind als Beiträge zu dem achten Bildungsgezet (Bd. I. S. 51.) sehr wichtig, indem den Molken die Milz bei anwesender Leber fehlt, sie von den Säugthieren abwärts durch die ganze Thierreihe verhältnißmäßig kleiner wird, und bei den meisten Säugthieren, wie bei mehreren andern Thieren, jene Körperchen regelmäßig verhältnißmäßig größer als beim Menschen sind.

## B. Regelwidrige Beschaffenheit.

### §. 2244.

Unter den regelwidrigen Zuständen der Milz sind besonders einige Formabweichungen derselben merkwürdig.

Sie



Sie fehlt höchst selten durch ursprüngliche Bildungsabweichung in übrigens regelmäßig gebildeten Körpern, dagegen ist ihr Mangel bei wahrer Kopfslosigkeit eine fast allgemeine Bedingung.

Eine diesem Organ fast eigenthümliche, wenigstens ihm vorzugsweise zukommende, qualitative Bildungsabweichung ist das Zerfallen desselben in mehrere, wodurch die sogenannten Nebenmilzen (*Lienculi* L. *lienes accessorii*) entstehen. Diese liegen immer an der innern Fläche, meistens gegen das untere Ende der Milz, haben meistens, doch nicht immer, eine runde Gestalt und variiren in ihrer Zahl von 1 — 23. Doch wurde der letztere Fall nur einmal gefunden, und sehr selten kommen sogar mehr als eine vor. Bedeutende Mehrzahl der Nebenmilzen setzt sich fast immer mit andern Bildungsabweichungen zusammen. So verhielt es sich in dem Falle, wo drei und zwanzig <sup>1)</sup> gefunden wurden. In einem andern von sieben <sup>2)</sup> war namentlich zugleich Inversion aller vegetativen Organe, in einem von vier <sup>3)</sup> sehr weit offnes eirundes Loch des Herzens vorhanden.

Die Größe dieser Nebenmilzen variirt außerordentlich.

Auf eine merkwürdige Weise macht eine größere oder geringere Zahl oft sehr tiefer Einschnitte am vordern Rande, hauptsächlich gegen sein unteres Ende, oder eine mehr oder weniger beträchtliche, quere, über die ganze äußere Fläche verlaufende Furche den Uebergang von ihnen zu der normalen Bildung.

Na 4

Ein

1) Otto Handb. der pathol. Anat. S. 302.

2) Baillie phil. Tr. V. 78. p. 350.

3) Heusinger a. a. D. S. 62.

Ein sehr gewöhnlicher, erworbener Formfehler der Milz ist bedeutende, meistens mit Härte verbundene Größe derselben, die meistens durch Uebertragung einer allgemeinen Krankheit entsteht.

Auch außerdem erscheint die Milz nicht selten ungewöhnlich hart, auf entgegengesetzte Weise sehr weich, letzteres vorzüglich bei Krankheiten von großer Schwäche.

Neue Bildungen entwickeln sich selten in ihr. Tuberkeln, welche sie bisweilen enthält, sind wahrscheinlich die vergrößerten weißen Körperchen. Vielleicht eigenthümlich ist eine gelbweiße, feste, ungleiche Masse, die sich öfter in ihr bildet, doch aber dem Blutschwamm (*Fungus haematodes*) sehr nahe verwandt scheint.

Ihre Hülle verknöchert nicht selten sehr bedeutend, besonders im Alter, so daß, wenn die Knochensubstanz eine beträchtliche Dicke erreicht, und in demselben Verhältniß die der Milz verschwindet, diese selbst in Knochen umgewandelt zu seyn scheint.

#### Gefäße und Nerven des Unterleibstheiles der Verdauungswerkzeuge.

##### §. 2245.

Die Gefäße des wichtigsten und größten Theiles der Verdauungswerkzeuge entspringen größtentheils aus den drei, unmittelbar aus der Unterleibsarterie entstehenden großen Stämmen, der Eingeweidearterie, der obern und untern Gefäßarterie und anastomosiren auf das vielfachste mit einander. Das untere Ende des Mastdarms wird aus der Beckenarterie versehen.

Die

Die Blutadern bilden, mit Ausnahme derer, welche vom untern Theile des Mastdarms aus sich in die Beckenblutadern senken, die Pfortader, so daß also alles, von diesen Organen zurückgehende Blut, ehe es zu dem Herzen und von da aus in die Lunge gelangt, durch die Leber tritt.

Die Nerven entspringen größtentheils vom großen sympathischen oder Gangliennerv. Indessen wird der Magen vorzüglich vom pneumogastischen, der Mastdarm von den Heiligbeinnerven versehen.

## Zweiter Abschnitt.

### Von den Stimm- und Athmungswerkzeugen.

§. 2246.

Nachdem im vorigen Abschnitte die Verdauungswerkzeuge, als die Organe des bildenden Lebens zuerst abgehandelt worden sind, welche in der Thierreihe sowohl als beim Embryo des höhern Thieres zuerst entstehen, anfangs zugleich die Function aller übrigen vollziehen, den Typus abgeben, nach welchem sich dieselben, nur weit unvollkommner und weniger zusammenge setzt als sie, bilden, ist es am zweckmäßigsten die Athmungs-  
werkzeuge zu betrachten, in welchen die, in jenen gebildete allgemeine Nahrungsflüssigkeit vollendet wird, und deren Thätigkeit, in Hinsicht auf Vollendung derselben, zunächst auf die ihrige folgt.

Mit den Athmungs-  
werkzeugen sind die Stimm-  
werkzeuge so verbunden, daß sie sich an dem obern Ende des, sie mit der Nasen- und Mundhöhle, und dadurch mit

Ein sehr gewöhnlicher, erworbnener Formfehler der Milz ist bedeutende, meistens mit Härte verbundene Größe derselben, die meistens durch Uebertragung einer allgemeinen Krankheit entsteht.

Auch außerdem erscheint die Milz nicht selten ungewöhnlich hart, auf entgegengesetzte Weise sehr weich, letzteres vorzüglich bei Krankheiten von großer Schwäche.

Neue Bildungen entwickeln sich selten in ihr. Tuberkeln, welche sie bisweilen enthält, sind wahrscheinlich die vergrößerten weißen Körperchen. Vielleicht eigenthümlich ist eine gelbweiße, feste, ungleiche Masse, die sich öfter in ihr bildet, doch aber dem Blutschwamm (*Fungus haematodes*) sehr nahe verwandt scheint.

Ihre Hülle verknöchert nicht selten sehr bedeutend, besonders im Alter, so daß, wenn die Knochensubstanz eine beträchtliche Dicke erreicht, und in demselben Verhältniß die der Milz verschwindet, diese selbst in Knochen umgewandelt zu seyn scheint.

#### Gefäße und Nerven des Unterleibstheiles der Verdauungswerkzeuge.

§. 2245.

Die Gefäße des wichtigsten und größten Theiles der Verdauungswerkzeuge entspringen größtentheils aus den drei, unmittelbar aus der Unterleibsarterie entstehenden großen Stämmen, der Eingeweidepulsader, der obern und untern Gefäßpulsader und anastomosiren auf das vielfachste mit einander. Das untere Ende des Mastdarms wird aus der Beckenpulsader versehen.

Die

Die Blutadern bilden, mit Ausnahme derer, welche vom untern Theile des Mastdarms aus sich in die Beckenblutadern senken, die Pfortader, so daß also alles, von diesen Organen zurückgehende Blut, ehe es zu dem Herzen und von da aus in die Lunge gelangt, durch die Leber tritt.

Die Nerven entspringen größtentheils vom großen sympathischen oder Gangliennerv. Indessen wird der Magen vorzüglich vom pneumogastischen, der Mastdarm von den Heiligbeinnerven versehen.

### Zweiter Abschnitt.

#### Von den Stimm- und Athmungswerkzeugen.

§. 2246.

Nachdem im vorigen Abschnitte die Verdauungswerkzeuge, als die Organe des bildenden Lebens zuerst abgehandelt worden sind, welche in der Thierreihe sowohl als beim Embryo des höhern Thieres zuerst entstehen, anfangs zugleich die Function aller übrigen vollziehen, den Typus abgeben, nach welchem sich dieselben, nur weit unvollkommener und weniger zusammenge setzt als sie, bilden, ist es am zweckmäßigsten die Athmungs- werkzeuge zu betrachten, in welchen die, in jenen gebildete allgemeine Nahrungsflüssigkeit vollendet wird, und deren Thätigkeit, in Hinsicht auf Vollendung derselben, zunächst auf die ihrige folgt.

Mit den Athmungs- werkzeugen sind die Stimm- werkzeuge so verbunden, daß sie sich an dem obern Ende des, sie mit der Nasen- und Mundhöhle, und dadurch mit

Ein sehr gewöhnlicher, erworbnener Formfehler der Milz ist bedeutende, meistens mit Härte verbundene Größe derselben, die meistens durch Uebertragung einer allgemeinen Krankheit entsteht.

Auch außerdem erscheint die Milz nicht selten ungewöhnlich hart, auf entgegengesetzte Weise sehr weich, letzteres vorzüglich bei Krankheiten von großer Schwäche.

Neue Bildungen entwickeln sich selten in ihr. Tuberkeln, welche sie bisweilen enthält, sind wahrscheinlich die vergrößerten weißen Körperchen. Vielleicht eigenthümlich ist eine gelbweiße, feste, ungleiche Masse, die sich öfter in ihr bildet, doch aber dem Blutschwamm (*Fungus haematodes*) sehr nahe verwandt scheint.

Ihre Hülle verknöchert nicht selten sehr bedeutend, besonders im Alter, so daß, wenn die Knochensubstanz eine beträchtliche Dicke erreicht, und in demselben Verhältniß die der Milz verschwindet, diese selbst in Knochen umgewandelt zu seyn scheint.

#### Gefäße und Nerven des Unterleibstheiles der Verdauungswerkzeuge.

##### §. 2245.

Die Gefäße des wichtigsten und größten Theiles der Verdauungswerkzeuge entspringen größtentheils aus den drei, unmittelbar aus der Unterleibsarterie entstehenden großen Stämmen, der Eingeweidepulsader, der obern und untern Gefäßpulsader und anastomosiren auf das vielfachste mit einander. Das untere Ende des Mastdarms wird aus der Beckenpulsader versehen.

Die

Die Blutadern bilden, mit Ausnahme derer, welche vom untern Theile des Mastdarms aus sich in die Beckenblutadern senken, die Pfortader, so daß also alles, von diesen Organen zurückgehende Blut, ehe es zu dem Herzen und von da aus in die Lunge gelangt, durch die Leber tritt.

Die Nerven entspringen größtentheils vom großen sympathischen oder Gangliennerven. Indessen wird der Magen vorzüglich vom pneumogastischen, der Mastdarm von den Heiligbeinnerven versehen.

## Zweiter Abschnitt.

### Von den Stimm- und Athmungswerkzeugen.

§. 2246.

Nachdem im vorigen Abschnitte die Verdauungswerkzeuge, als die Organe des bildenden Lebens zuerst abgehandelt worden sind, welche in der Thierreihe sowohl als beim Embryo des höhern Thieres zuerst entstehen, anfangs zugleich die Function aller übrigen vollziehen, den Typus abgeben, nach welchem sich dieselben, nur weit unvollkommner und weniger zusammenge setzt als sie, bilden, ist es am zweckmäßigsten die Athmungs- werkzeuge zu betrachten, in welchen die, in jenen gebildete allgemeine Nahrungsflüssigkeit vollendet wird, und deren Thätigkeit, in Hinsicht auf Vollendung derselben, zunächst auf die ihrige folgt.

Mit den Athmungs- werkzeugen sind die Stimm- werkzeuge so verbunden, daß sie sich an dem obern Ende des, sie mit der Nasen- und Mundhöhle, und dadurch mit

Ein sehr gewöhnlicher, erworbner Formfehler der Milz ist bedeutende, meistens mit Härte verbundene Größe derselben, die meistens durch Uebertragung einer allgemeinen Krankheit entsteht.

Auch außerdem erscheint die Milz nicht selten ungewöhnlich hart, auf entgegengesetzte Weise sehr weich, letzteres vorzüglich bei Krankheiten von großer Schwäche.

Neue Bildungen entwickeln sich selten in ihr. Tuberkeln, welche sie bisweilen enthält, sind wahrscheinlich die vergrößerten weißen Körperchen. Vielleicht eigenthümlich ist eine gelbweiße, feste, ungleiche Masse, die sich öfter in ihr bildet, doch aber dem Blutschwamm (*Fungus haematodes*) sehr nahe verwandt scheint.

Ihre Hülle verknöchert nicht selten sehr bedeutend, besonders im Alter, so daß, wenn die Knochensubstanz eine beträchtliche Dicke erreicht, und in demselben Verhältniß die der Milz verschwindet, diese selbst in Knochen umgewandelt zu seyn scheint.

#### Gefäße und Nerven des Unterleibschelles der Verdauungswerkzeuge.

##### §. 2245.

Die Gefäße des wichtigsten und größten Theiles der Verdauungswerkzeuge entspringen größtentheils aus den drei, unmittelbar aus der Unterleibsarterie entstehenden großen Stämmen, der Eingeweidepulsader, der obern und untern Gefäßpulsader und anastomosiren auf das vielfache mit einander. Das untere Ende des Mastdarms wird aus der Beckenpulsader versehen.

Die



Die Blutadern bilden, mit Ausnahme derer, welche vom untern Theile des Mastdarms aus sich in die Beckenblutadern senken, die Pfortader, so daß also alles, von diesen Organen zurückgehende Blut, ehe es zu dem Herzen und von da aus in die Lunge gelangt, durch die Leber tritt.

Die Nerven entspringen größtentheils vom großen sympathischen oder Gangliennerven. Indessen wird der Magen vorzüglich vom pneumogastischen, der Mastdarm von den Heiligbeinnerven versehen.

## Zweiter Abschnitt.

### Von den Stimm- und Athmungswerkzeugen.

§. 2246.

Nachdem im vorigen Abschnitte die Verdauungswerkzeuge, als die Organe des bildenden Lebens zuerst abgehandelt worden sind, welche in der Thierreihe sowohl als beim Embryo des höhern Thieres zuerst entstehen, anfangs zugleich die Function aller übrigen vollziehen, den Typus abgeben, nach welchem sich dieselben, nur weit unvollkommner und weniger zusammenge setzt als sie, bilden, ist es am zweckmäßigsten die Athmungs- wer k ze u ge zu betrachten, in welchen die, in jenen gebildete allgemeine Nahrungsflüssigkeit vollendet wird, und deren Thätigkeit, in Hinsicht auf Vollendung derselben, zunächst auf die ihrige folgt.

Mit den Athmungs- wer k ze u gen sind die Stimm- wer k ze u ge so verbunden, daß sie sich an dem obern Ende des, sie mit der Nasen- und Mundhöhle, und dadurch mit

der Luft verbindenden Ganges, der Luftröhre, befinden, von der sie in der That nur eine weitere Entwicklung, das wahre obere Ende sind. Daher werden diese am zweckmäßigsten hier zuerst beschrieben.

### Erste Abtheilung.

#### Von den Stimmwerkzeugen<sup>1)</sup>.

§. 2247.

Die Stimmwerkzeuge bestehen vorzüglich aus dem Kehlkopf, wo die Stimme in der That wesentlich gebildet wird, wenn sie gleich durch die, vor demselben liegende Mund- und Nasenhöhle mehrere Abänderungen verschiedner Art erleidet.

### Erste Unterabtheilung.

#### Regelmäßige Beschaffenheit.

#### I. Vollkommener Zustand im Allgemeinen.

§. 2248.

Der Kehlkopf (Larynx) ist eine, aus mehreren Knorpeln, sie vereinigenden Bändern, bewegenden Muskeln zusammengefezte, mit einer Schleimhaut, welche nach oben und vorn in die Mundhaut, nach unten in die der

Luft

1) C. Galeni vocalium instrumentorum dissectio. Seors. et in Opp. omn.

H. Fabricius ab Aquapendente de visione, voce et auditu. Id. de larynge vocis instrumento. Seors. et in Opp. omn.

J. Cafferius de vocis auditusque organis. Ferrariae. 1600.

D. Santorinus de larynge. In obs. anat. C. VI.

A. E. Walther de larynge et voce. Lips. 1740. 4.

Luftröhre übergeht, bekleidete, länglichviereckige Höhle, die sich von oben nach unten allmählich verengt, und oben und vorn am Halse, hinter und unter dem Unterkiefer, zwischen der Mundhöhle, der Nasenhöhle und der Luftröhre so befindet, daß sie eine unmittelbare Fortsetzung von ihnen bildet.

### I. Knorpel des Kehlkopfes.

§. 2249.

Die Zahl der Knorpel, welche die Grundlage des Kehlkopfes bilden, beläuft sich auf neun, wovon drei unpaare und sechs paare sind. Von diesen liegen die paaren auf beiden Seiten, die unpaaren werden durch die Mittellinie des Körpers in zwei gleiche Hälften, eine rechte und eine linke zerfällt.

Die unpaaren, die ansehnlichsten, die Gestalt des ganzen Kehlkopfes hauptsächlich bestimmenden, sind der Schildknorpel, der Ringknorpel und der Kehlschiel, die paaren, die Gießbeckenknorpel, die runden und die keilförmigen Knorpel.

#### 1. Der Schildknorpel.

§. 2250.

Der Schildknorpel (*Cartilago thyreoidea*), der bei weitem größte unter den Knorpeln des Kehlkopfes, der unter dem Namen des Adamsapfels am obern Theile des Halses hervortragt, und den obern und vordern Theil des Kehlkopfes bildet,

---

R. A. Vogel de larynge humano et vocis formatione. Erf. 1747. 4. Opp. Gott. 1768. 4.

J. G. Runge de voce ejusque organis. L. B. 1753. 4.

J. M. Busch de mechanismo organi vocis hujusque functione. Groning. 1770. 4.

pitatum Santorinianum<sup>1)</sup>, der mit der gewölbten Fläche nach vorn, der innern nach hinten gewandt ist, dessen ausgehöhlte untere Fläche auf der gewölbten Spitze des vorigen ruht, und mit ihm durch ein lockeres, durch Bandfasern befestigtes Kapselband vereinigt wird.

#### 5. Keilförmige Knorpel.

##### §. 2254.

Der etwas gebogene keilförmige Knorpel (*Cartilago cuneiformis*), liegt, mit der Grundfläche nach oben, der Spitze nach unten gewandt, mitten in der häutigen Ausbreitung zwischen dem Stießbeckenknorpel und dem Kehlschilde.

#### 6. Kehlschilde.

##### §. 2255.

Der Kehlschilde (*Epiglottis* s. *ligula*) ein sehr weicher, ungefähr rautenförmiger, unten stärker zugespitzter, oben flach ausgeschnittener Knorpel, liegt dicht über dem Ausschnitte im obern Rande des Schildknorpels. Er ist von oben nach unten beträchtlich mehr hoch als breit, von vorn nach hinten am dünnsten. Seinen mittlern Theil ausgenommen, ist er durch eine ansehnliche Menge ründlicher Oeffnungen durchsichert, durch welche Schleimdrüsen, die an der hintern und vordern Fläche liegen, dringen, und sich an beiden öffnen. Vermöge seiner Schnellkraft und der nachher anzugebenden Bänder steht er gewöhnlich senkrecht, und ragt in die Rachenenge empor, wird aber sowohl durch die Schwere der über ihn weggleitenden Substanzen, als durch eigne Muskeln so nach unten gezogen, daß er den Eingang des Kehlkopfes bedeckt.

Er

1) H. a. D. S. 97.

Er verhütet daher das Einfallen fremder Körper aus der Mund- und Nasenhöhle, besonders aber das Eindringen von Speise und Getränk aus der erstern in den Kehlkopf. Wenn gleich pathologische Beobachtungen von Wangel des Kehlsdeckels<sup>1)</sup> und Versuche, wo einerseits nach Wegnahme des Kehlsdeckels bei unverletzten Nerven und Muskeln der Stimmröhre das Schlingen nicht gestört wurde, andererseits nach Zerstörung dieser Nerven nur sehr unvollkommen war, ungeachtet der Kehlsdeckel unversehrt blieb<sup>2)</sup>, beweisen, daß dieses Einfallen auch durch die Verengerung der Stimmröhre verhindert wird, so folgt doch hieraus nicht, daß der Kehlsdeckel nicht die angegebne Function habe. Die, schon seit Aristoteles bei allen Physiologen bestehende Ueberzeugung von der Richtigkeit jener Annahme, welche Casseri zu einer sehr energischen aber richtigen Erklärung veranlaßte<sup>3)</sup>, hat kürzlich auch Mayer gegen die Magendie'sche Behauptung durch sorgfältige, an sich selbst angestellte Beobachtungen bestätigt<sup>4)</sup>.

## II. Verbindungen des Kehlkopfes.

§. 2256.

Die Knorpel des Kehlkopfes werden unter einander und mit dem Zungenbeine und der Luftröhre durch Kap-

1) Targioni Tozzetti prima racc. di Osserv. Firenze, 1752.

Magendie précis de physiologie. T. II. p. 65.

2) Magendie mémoire sur l'Épiglotte. Paris. 1815.

3) H. a. D. De Epiglottide C. XVII. Talis structura, talis officium, ut Cupidus ille, veorsus dici mereatur, quem non eorum consideratio, attonitum quasi, in admirationem Dei rapiat.

4) Ueber die Function des Kehlsdeckels. Salzburger Zeitung. 1814. Bd. 3. S. 156 ff.

selbänder, Faserbänder und verdichtetes Zellgewebe verbunden.

### Eigene Bänder des Kehlkopfes.

#### L. Bänder zwischen dem Schild- und Ringknorpel.

##### §. 2257.

Der Schild- und Ringknorpel werden durch drei Bänder, das mittlere oder kegelförmige und die seitlichen vereinigt.

#### a. Kegelförmiges Band.

##### §. 2258.

Das kegelförmige oder mittlere Schild- und Ringband (Lig. conoideum s. thyreo-cricoidum medium) ist störs, kurz, stark, dreieckig, mit der Grundfläche nach unten, der stumpfen Spitze nach oben gerichtet, und füllt den Raum zwischen der Mitte des untern Randes des Schildknorpels und des obern des Ringknorpels aus.

Es beschränkt die Entfernung des Schild- und Ringknorpels nach oben und unten von einander.

#### b. Seitliches Schild- und Ringband.

##### §. 2259.

Das seitliche Schild- und Ringband (L. thyreo-cricoidum laterale) ein lockeres, oben und unten mit sehr absteigenden Fasern bekleidetes Band zwischen dem untern Horne des Schildknorpels und der untern Gelenkfläche des Ringknorpels.

Wirkt dem. vorlgen. ähnlich, beschränkt indessen zugleich auch etwas die Bewegung beider Knorpel nach vorn und hinten.

2. Bänder zwischen dem Schildknorpel und Zungenbein.

a. Mittleres Schild- und Zungenbeinband.

§. 2260.

Das mittlere Schild- und Zungenbeinband (*L. thyreo-hyoideum medium*) ist eine breite Schicht verdichteten Schleimgewebes, welches vom hintern Rande des Zungenbeinkörpers zum mittlern Ausschnitte des obern Randes des Schildknorpels herabsteigt.

b. Seitliches Schild- und Zungenbeinband.

§. 2261.

Das seitliche Schild- und Zungenbeinband (*L. thyreo-hyoideum laterale*) ist ein aus Längenfaseru gebildetes, länglichrundes Band, welches sich von der Spitze des obern Hornes des Schildknorpels zum Ende des großen Zungenbeinhornes erstreckt, und ungefähr in seiner Mitte, gewöhnlich weiter nach oben, einen länglichrunden Knorpel, oder Knochen, den Wai zenknorpel (*C. triticea*) einen wirklichen Sehnenknorpel, eingewebt enthält.

3. Bänder zwischen dem Ring- und Stießeckenknorpel.

§. 2262.

Jeder Stießeckenknorpel wird an seiner untern Fläche durch eine lockere, mit schwachen Fasern stellenweise verstärkte

**Synovialkapsel mit der obern Gelenkfläche des Ringknorpels verbunden.**

4. Band zwischen dem Gießbeckenknorpel und dem rundlichen Knorpel.

§. 2263.

Diese beiden Knorpel werden durch eine lockere, oft sehr undeutliche Synovialhaut und über dieselbe verlaufende Fasern vereinigt.

5. Bänder des Kehldeckels.

- a. Kehldeckel-Zungenbeinband.

§. 2264.

Der Kehldeckel wird durch verdichtetes Schleimgewebe mit dem obern Rande des mittlern Zungenbeines verknüpft, welches den Namen des Kehldeckel-Zungenbeinbands (L. Epiglotti-hyoideum) führt.

- b. Schild- und Kehldeckelband.

§. 2265.

Das Schild- und Kehldeckelband (Lig. thyreo-epiglottideum), ein sehr starkes, faseriges Band, erstreckt sich von der untern Spitze des Kehldeckels zum Ausschnitte des obern Schildknorpelrandes.

6. Bänder zwischen den Gießbeckenknorpeln und dem Schildknorpel.

§. 2266.

Zwischen den Gießbeckenknorpeln und dem Schildknorpel befinden sich über einander, auf jeder Seite zwei,  
von



von Hälften, oben und außen nach vorn, unten und innen laufende Bänder, die um einige Linien von einander abstehen, die Schild- und Gießknorpelbänder (Lig. thyreo-arytaenoidea).

a. Stimmbänder.

§. 2267.

Das untere (Lig. thyreo-arytaenoideum inferius), bei weitem stärkere, aus deutlichen Fasern gebildete, erstreckt sich von dem untern vorspringenden Ende des vordern Randes der innern Fläche des Gießbeckknorpels zum untern Theile der hintern Fläche des Schildknorpels, und heftet sich hier, dicht neben dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite, oberhalb des Einschnittes des untern Randes an.

Diese Bänder, welche im männlichen Geschlecht meistens theils stärker entwickelt sind als im weiblichen, erhalten auch den Namen der Stimmbänder, Stimmmembranen (Ligamenta vocalia s. glottidis), weil der Raum oder die Spalte, welche sich zwischen ihnen befindet, die Stimmrinne (Glottis s. rima glottidis) heißt.

b. Taschenbänder.

§. 2268.

Die obern Schild- und Gießknorpelbänder, oder Taschenbänder (Lig. thyreo-arytaenoidea superiora s. ventricularum laryngis) liegen weiter nach außen und oben, zwischen der Mitte der vordern Fläche des Gießbeckknorpels und dem Winkel des Schildknorpels. Sie liegen viel weiter von einander entfernt, sind schlaffer, weit weniger deut-

seiner vordern Fläche. Bisweilen liegt über dem gewöhnlichen ein zweiter \*).

Er zieht mittelst des Schildknorpels den Kehlkopf, und, wegen seiner Verbindung mit dem folgenden Muskel, auch das Zungenbein herab.

#### a. Schild: Zungenbeinmuskel.

§. 2274.

Der Schild: Zungenbeinmuskel (*M. Hyo-thyreoideus*), ein sehr länglichviereckiger, von unten nach oben allmählich schmaler, zugleich aber dicker werdender Muskel, entsteht von der schiefen Linie des Schildknorpels, dicht über dem obern Rande des vorigen Muskels, und steigt längs dem äußern Theile der Seitenfläche des Schildknorpels zum großen Horne des Zungenbeines empor, wo er sich an den vordern Theil der untern Fläche desselben heftet.

Er zieht durch den Schildknorpel den Kehlkopf bei befestigtem Zungenbein herauf, im entgegengesetzten Falle dieses herab, wirkt unter ersterer Bedingung zur Erzeugung hoher Töne, unterer letzterer beim Schlingen.

#### B. Besondere Muskeln des Kehlkopfes.

§. 2275.

Die besondern Muskeln des Kehlkopfes sind 1) Erweiterer, 2) Verengerer der Stimmrinne.

1. Er:

---

1) G ü n z observat. anat. In mém. prés. à l'ac. des sc. I. p. 286.

## 1. Erweiterer der Stimmröhre.

## a. Ring- und Schildknorpelmuskel.

§. 2276.

Der Ring- und Schildknorpelmuskel, vorderer Erweiterer der Stimmröhre (*M. Crico-thyreoideus* f. *Dilatator glottidis anterior*), ein kleiner, ungefähr rautenförmiger, doch etwas ungleichseitigviereckiger Muskel, liegt, vom Brustbein: Schildmuskel bedeckt, zwischen den Seitenflächen des Schildknorpels und dem untern Rande des Ringknorpels, entspringt vom untern Rande und der Seitenfläche des letztern, steigt, mit schrägen, nach hinten und oben gerichteten Fasern, welche nicht selten in zwei völlig getrennte Bündel, ein vorderes und ein hinteres, zerfallen, empor, und heftet sich durch eine kurze Sehne an den untern Rand und das untere Horn des Schildknorpels.

Er zieht die Seitenhälften des Schildknorpels nach unten und außen, und erweitert dadurch die Stimmröhre.

## b. Hinterer Ring- und Gießbeckenmuskel.

§. 2277.

Hinterer Ring- und Gießbeckenmuskel, hinterer Erweiterer der Stimmröhre (*M. Crico-arytaenoideus* f. *dilatator glottidis posticus*), ein rautenförmiger Muskel, welcher den größten Theil der hintern Fläche des Ringknorpels anfüllt, von der ganzen Ausbreitung desselben entsprungen, schräg von unten und innen nach oben und außen emporsteigt, und sich mit einer kurzen Sehne unten an den äußern Rand des Gießbeckenkorpels heftet.

pressor epiglottidis), entsteht vom mittlern Theile der innern Fläche des Schildknorpels, und setzt sich an den Seitenrand und untern Theil des Kehldeckels.

Bisweilen findet sich ein kleinerer, weiter nach innen und oben entspringender.

Beide ziehen den Kehldeckel herab.

#### V. Nerven des Kehlkopfes.

§. 2282.

Die, von dem Lungenmagennerven stammenden Nerven des Kehlkopfes sind der obere und der untere oder zurücklaufende Kehlkopfsnerv. Beide verbreiten sich in der Schleimhaut, und in den Muskeln des Kehlkopfes, der erstere ganz oder wenigstens fast ganz nur in dem Ring- und Schildknorpelmuskel und dem Gießbeckenmuskel; dieser dagegen in den hintern und seitlichen Ring- und Gießbeckenmuskeln und dem Schild- und Gießbeckenmuskel, so daß also sowohl die verschiednen Verengerer als Erweiterer der Stimmröhre von einem dieser beiden Nerven versehen werden.

Durchschneidung oder vollständige Unterbindung eines von beiden schwächt daher die Stimme, die ganz verloren geht, wenn alle auf beiden Seiten zerstört werden.

#### VI. Lebenserscheinungen des Kehlkopfes.

§. 2283.

Die Schleimhaut des Kehlkopfes ist, wegen ihres ansehnlichen Nervenreichthums, vorzüglich in der Gegend der Stimmröhre

se im hohen Grade empfindlich. Hierdurch wird das Einfallen fremder Körper in die Luftröhre verhindert, und dadurch der sehr leicht eintretenden Erstickung vorgebeugt. Sehr merkwürdig ist es, daß nur diese Stelle, nicht auch die Schleimhaut der Luftröhre, diese bedeutende Empfindlichkeit besitzt.

Das Leben des Kehlkopfes äußert sich vorzüglich durch Bewegung, welche in mehrfacher Beziehung doppelter Art ist, sofern sie sich 1) theils auf den ganzen Kehlkopf, theils auf die einzelnen in seine Zusammensetzung eingehenden Theile erstreckt; 2) unter mehreren Bedingungen Statt findet, mit mehreren Functionen in Beziehung steht.

Durch die erste, allgemeine Bewegung des Kehlkopfes verändert der Kehlkopf sein Ortsverhältniß zu den benachbarten Theilen, indem er ab- und aufwärts, vor- und rückwärts gezogen wird; durch die letztere verändern die verschiedenen, ihn zusammensetzenden Theile ihre Lage gegen einander, und bewirkt besonders Verschiedenheiten in der Gestalt und dem Umfang der Stimmröhre.

Allgemeine Bewegungen kommen sowohl beim Schlingen als bei der Bildung der Stimme vor.

Beim Schlingen wird der Kehlkopf auf die oben (S. 251.) angegebene Weise so nach vorn und oben gezogen, daß dadurch das Einfallen von Speisen verhütet wird.

In Bezug auf die Bildung der Stimme wird der Kehlkopf bei hohen Tönen in die Höhe gezogen, sowohl um den Schildknorpel vom Ringknorpel zu entfernen, und dadurch die Stimmröhre zu verengen, ihre Wände zugleich zu spannen, als um zugleich die Luftröhre zu verlängern und zu verengern.

Bei

Bei tiefern dagegen wird er, um die entgegengesetzten Veränderungen hervorzubringen, herabgezogen.

Die besondern Bewegungen stehen mit dem Schlingen, dem Athmen und der Stimm-*ritze* in Beziehung.

In der That verengt sich beim Schlingen durch die erhöhte Thätigkeit ihrer Zusammenschürer die Stimm-*ritze* so, daß auch ohne Anwesenheit des Kehlkopfs Substanzen nicht nothwendig und beständig aus dem Schlunde in sie dringen.

Die mit dem Athmen zusammenfallenden Bewegungen der Stimm-*ritze* sind eine, das Einathmen begleitende Erweiterung, und eine, beim Ausathmen Statt findende Verengerung, welche beständig, selbst dann eintritt, wenn auch dadurch, wegen einer in der Luftröhre angebrachten Oeffnung kein Laut gebildet wird<sup>1)</sup>, Erscheinungen die nicht auffallend sind, da sie mit gleichzeitigen identischen Veränderungen in der Luftröhre zusammentreffen, und der Kehlkopf allen seinen Theilen nach nur eine weitere Entwicklung der Luftröhre ist.

Nach Legallois's Untersuchungen ist die Verschließung der Stimm-*ritze* die Ursache des schnellen Erstickungstodes, der nach

---

1) Bichat anat. descr. 1802. T. II. p. 405.

Legallois Expériences sur le principe de la vie. à Paris. 1812. p. 198.

L. Mende über die Bewegung der Stimm-*ritze* beim Athemholen, eine neue Entdeckung; mit beigelegten Bemerkungen über den Nutzen und die Verrichtung des Kehlkopfs. Greifswalde. 1816.

nach Durchschneidung des pneumogastrischen oder des zurücklaufenden Kehlkopfsnerven unter gewissen Bedingungen, namentlich in der Jugend, erfolgt, indem er immer in diesem Falle die Stimmrize sehr verengt fand <sup>1)</sup>.

Diese Thatsache ist richtig; allein die gegebne Erklärung derselben durch eine Lähmung der Sießbeckenknorpelmuskeln ist es nur zum Theil. Die Verengerung, selbst Verschließung der Stimmrize in Folge einer Lähmung der, durch den zurücklaufenden Kehlkopfsnerven versehenen Muskeln scheint vielmehr durch das Uebergewicht, welches dadurch die Sießbeckenknorpelmuskeln, deren Nerven nicht verletzt waren, über den unter ihnen befindlichen, kraftvollen Erweiterer, den hintern Ring- und Sießbeckenknorpelmuskel, erhielten, also nur mittelbar durch Lähmung bewirkt zu werden, sofern der Ring- und Schildknorpelmuskel weniger bedeutend auf Erweiterung der Stimmrize wirkt.

In der That wird daher auch bei ältern Thieren, wo diese Operation wegen Weite der Stimmrize weniger gefährlich ist, die Stimmrize auch nach Durchschneidung beider zurücklaufenden Nerven fast vollkommen verschlossen, sehr unvollkommen dagegen, wenn die obern Kehlkopfsnerven durchschnitten sind, und die Möglichkeit, sie zu verschließen, hört nach Durchschneidung aller Kehlkopfsnerven ganz auf <sup>2)</sup>.

Vorzüglich sind die besondern Bewegungen des Kehlkopfes bei Hervorbringung der Stimme merkwürdig.

Bei

<sup>1)</sup> Expériences sur le principe de la vie. Paris. 1812. p. 197.

<sup>2)</sup> Magendie sur l'épiglotte. à Paris. 1815. p. 4 ff.

Bei jedem Laute wird die Stimmröhre, und in dem Maße stärker als der Laut stärker ist, verengt<sup>1)</sup>. Vorzüglich findet diese Verengung von einer Seite zur andern, doch bisweilen auch von vorn nach hinten, oft in allen Richtungen zugleich, Statt.

#### §. 2284.

Der Kehlkopf ist Stimmorgan.

Dies wird

1) durch den, ohne Störung des Athmens Statt findenden Verlust der Stimme in Folge einer Oeffnung in der Luftröhre, durch welche die Luft beim Athmen ein- und austritt;

2) durch die Minderung oder gänzlichen Verlust der Stimme in Folge von Zerstörung auch nur einzelner Theile des Kehlkopfes, der Stimmbänder, Durchschneidung der Gießbeckenknorpel, des Schildknorpels, der Kehlkopfsnerven;

3) in Verbindung mit diesen Thatsachen durch die, mit Verschiedenheiten in der Anordnung des Kehlkopfes Statt findende Verschiedenheit der Stimme bewiesen.

Die Stelle, an welcher die Stimme gebildet wird, ist die Stimmröhre, indem die Stimme verloren geht, wenn die Bänder zwischen dem Schild- und Ringknorpel durchschnitten werden, und die Wegnahme der obern Hälfte der Gießbeckenknorpel, die Längenspaltung des Schildknorpels denselben Erfolg haben, an dieser Stelle immer bei Hervorbringung von Lauten die Verengerung wahrgenommen wird, Wegnahme der obern Bänder keinen Einfluß auf die Stimme hat, und diese auch

---

1) Schon Ferrein Mém. de Paris 1741. p. 559. gegen die frühere Meinung, daß das Gegentheil Statt fände. Nachher Bichat Anat. descr. T. II. p. 408.



auch im Leben immer so weit von einander stehen, daß keine hinlängliche Verengerung der Stimmröhre möglich ist.

§. 2285.

Es fragt sich aber ferner, auf welche Weise die Stimme an der angegebenen Stelle gebildet werde? Man nimmt, diese Frage zu beantworten, entweder an, daß sie durch Schwingungen der Luft, wie in einem Blasinstrument <sup>1)</sup>, oder der Stimmbänder, wie in einem Saiteninstrument, entsteh: <sup>2)</sup>, oder verbindet beide Meinungen <sup>3)</sup>.

Für die erste Ansicht wird angeführt:

1) die Analogie mit den Blasinstrumenten, wo nur die Veränderung des Durchmessers der Oeffnung die Bildung der verschiedenen Laute bestimmt;

2) die Vergleichung mit den Lippen, wo dieselben Bedingungen eintreten.

3) Ver-

---

1) Fabricius ab Aquapendente de larynge etc. Pars II. Cap. IV. Vocis opifex, causa seu organum inquiritur.

R. F. S. Liszkovius Theorie der Stimme. Leipzig. 1814. S. 28 — 37.

2) A. Ferrein de la formation de la voix dans l'homme. Mém. de Paris. 1741. p. 545.

3) Galenus de usu part. VII. 10.

Casserijs de larynge Lib. I. Cap. XIV. de Glottide.

Dodart Mém. sur les causes de la voix de l'homme et de ses différens tons. Mém. de Paris. 1700. p. 308.

Derselbe Supplémens aux Mém. sur la voix et sur les Tons.

Ebdas. 1706. S. 169. und 500. 1707. S. 23 ff. Doch legt Dodart bei weitem den größten Werth auf die Schwingungen der Luft, und es ist daher schwer zu erklären, wie man neuerlich, auch wenn Fabricius übersehen worden wäre, bloß die Ferreinsche Ansicht als bestehend ansehen und die entgegengesetzte als neu vortragen konnte, zumal da Ferrein selbst Dodart's Meinung ausdrücklich bekämpft.

3) Versuche, wo namentlich a) Anspannung und Erschlaffung der Stimmbänder auf Höhe und Tiefe des Tones nur in sofern Einfluß hatte, als die Stimmreihe dadurch erweitert oder verengt wurde; b) Nichtentstehen zweier verschiedener Töne bei Anspannung des einen, Erschlaffung des andern Stimmbandes, sondern eines einzigen Tones, dessen Höhe mit der Weite der Stimmreihenöffnung im Verhältniß stand; c) Nichtveränderung des Tones bei Berührung der Stimmbänder; d) Steigen des Tones durch bloße Verengerung, Sinken durch bloße Erweiterung der Stimmreihe ohne veränderte Spannung und unabhängig von der Gestalt derselben; e) Unabhängigkeit des Tones von der Stärke des Aufsteinsblasens; f) Nichtentstehen von Tönen, wenn, bei stark erweiterter Stimmreihe, die Stimmbänder bedeutend gespannt waren, und Luft stark eingeblasen wurde <sup>1)</sup>).

Die zweite Meinung sieht man als erwiesen an:

- 1) durch die Ähnlichkeit der Stimmbänder mit Saiten <sup>2)</sup>;
- 2) durch Versuche, wobei der Grad der Oeffnung des Kehlkopfes durchaus ohne Einfluß auf die Höhe oder Tiefe des Tones war <sup>3)</sup>, diese dagegen in demselben Verhältniß stieg, als die Stimmbänder durch die austretende Luft nach außen gedrängt und gespannt wurden, verstummte, wenn die Bänder gedrückt wurden, sich auf dieselbe Weise als der Ton der Saiten abänderte, wenn die Stimmbänder an verschiedenen Stellen fixirt wurden, verschiedene Töne entstanden, wenn die Bänder verschieden gespannt wurden; endlich ganz dieselben

Er

1) Lisfrons a. a. D. S. 29 — 34.

2) Ferrein S. 556. 560.

3) Ebenbas. S. 559.

Erscheinungen eintreten, auch wenn man die Bänder, mit Ausnahme ihrer beiden Enden, völlig vom Kehlkopfe trennte ).

Nicht die Verschiedenheit der Töne, wohl aber die Stärke des Lautes würde daher hienach von dem Grade der Oeffnung der Stimmrize abhängen <sup>2)</sup>).

Höchst wahrscheinlich ist die dritte Meinung die richtigere, wenn es sich gleich aus den zuerst angeführten Versuchen ergibt, daß die Erzitterungen der Bänder einen weit geringern Antheil als die Schwingungen der durch die Stimmrize tretenden Luft haben und jene nur gleichzeitig entstehen, ohne mit der Stimmbildung in einer ursächlichen Beziehung zu stehen, vorzüglich, da auch der Kehlkopf und die Luftröhre bei starkem Lufteinblasen beträchtlich zittern, ohne daß ein Laut entstünde <sup>3)</sup>. Hierzu kommt noch, daß die Höhe der weiblichen Stimme zwar sehr wohl mit der Enge der weiblichen Stimmrize, nicht aber mit der größern Weichheit der Bänder übereinstimmt.

§. 2286.

Ungeachtet übrigens die Stimme im Kehlkopf, und namentlich in der Stimmrize gebildet wird, haben doch auch die vor demselben liegenden Theile, der Kehldedeel, die Mund- und Nasenhöhle Antheil an ihrer Entstehung.

Unstreitig hat zwar der Kehldedeel, wie schon oben erwähnt wurde, vorzüglich die Function des Verschließens des Kehlkopfes beim Schlingen, allein höchst wahrscheinlich auch auf die Stimmbildung Einfluß.

Zwar

1) Ferrein a. a. O.

Portal Exp. sur la voix. In dessen Mém. T. II. p. 306.

2) Ferrein a. a. O. S. 558.

3) Liskovius S. 34.

Zwar hat Haller diesem Theile, nicht weil er schon beim Fötus vor der Stimme vorhanden sey <sup>1)</sup>, sondern weil die Stimme schon im Kehlkopf, also der Stelle nach vor ihm gebildet sey, und weil die Vögel ohne ihn singen <sup>2)</sup>, gegen die von L'auvry <sup>3)</sup> und Santorini <sup>4)</sup> vorgetragne Meinung allen Antheil abgesprochen, und eigends angestellte Versuche bestätigen diese Meinung insofern, als die Stärke der Stimme unverändert blieb, ungeachtet durch einen, zwischen Kehlkopf und Zungenbein angebrachten Querschnitt der Kehlideckel hervorgezogen, befestigt, und die Stimmröhre dadurch unmittelbar der Hautöffnung gegenüber gebracht wurde, auch Wegnahme des obern Theiles des Kehlideckels überhaupt <sup>5)</sup> keinen Einfluß auf die Stimme, so wie Niederdrückung, Aufhebung, selbst Abschneiden des ganzen Kehlideckels insbesondere auf die Höhe und Tiefe derselben hatte <sup>6)</sup>; allein diese Thatfachen sagen theils nur aus, daß der Kehlideckel nicht durchaus nothwendig zur Bildung der Stimme überhaupt sey, theils beweist der von der Stimme der Vögel entlehnte Grund nichts, da ihre Stimme im untern Kehlkopfe gebildet wird, und hier die ganze Luftröhre, so wie die obere Stimmröhre sehr wohl die Stelle des Kehlideckels vertreten können; theils machen es mehrere  
genau

1) Mayer a. a. D. S. 185. 186.

2) Epiglottis equidem nihil facit ad vocem, cum ea (vox) nata sit et perfecta, quam primum aer ex glottidis rima prodit et absque epiglottide aves suavissime canant. Elem. physiol. L. IX. p. 1. §. V. p. 572.

3) L'auvry nov. anat. Ulm. 1694. p. 408.

4) Santorini de larynge §. 10.

5) Bichat anat. descr. T. II. p. 402. 404.

6) Liskovius a. a. D. S. 34.

genau angestellte Versuche und Beobachtungen höchst wahrscheinlich, daß der Kehlkopf theils allein, theils besonders in Verbindung mit dem weichen Gaumen einen nicht unbeträchtlichen Antheil an den Verschiedenheiten der Stimme in Hinsicht auf Stärke, Ton und Gliederung habe <sup>1)</sup>, da sich Lage, Richtung und Gestalt derselben auf bestimmte, mit bestimmten Abänderungen jener Bedingungen parallelauffende Weise abändern, und kein Grund zu der Annahme vorhanden ist, daß diese Erscheinungen nur die Folge von andern, im Kehlkopfe Statt findenden, und diese letztern allein die Ursache jener Veränderungen der Stimme seyen, eine Meinung, die höchst wahrscheinlich schon Ferrein <sup>2)</sup> hatte, indem sein als neu angekündigtes Stimmorgan kaum der weiche Gaumen seyn kann <sup>3)</sup>, da diese schon Galen vortrug <sup>4)</sup>.

In Bezug auf die Mund- und Nasenhöhle kann man bemerken, daß zunächst die Stärke und der Klang derselben durch den Wiederhall in der Mund- und Nasenhöhle vermehrt wird, wie sich aus der Dämpfung derselben bei zugehaltner Nase und angeschwollner Schleimhaut derselben ergibt.

Außerdem werden gemeinschaftlich durch den Kehlkopf und die verschiednen Theile des Mundes die Buchstaben oder die einzelnen Laute der Sprache gebildet.

Ec 2

Die

---

1) Greiné bei Magendie. *Physiol.* T. I. p. 221.

Mayer a. a. O.

Mende a. a. O.

2) Sur la formation de la voix. *Mém. de Paris.* 1741. p. 574.

3) Haller a. a. O. S. 455.

4) De usu part. L. VII. C. 5.

tung desselben<sup>1)</sup>; Mangel der obern Hörner des Schildknorpels<sup>2)</sup>, des Ringknorpels und der Siebbeckenknorpel<sup>3)</sup>, der ganz besonders merkwürdig ist, weil dadurch der Kehlkopf der Luftröhre mehr als gewöhnlich verähnlicht wurde; schiefe Stellung und Krümmung des Kehldeckels<sup>4)</sup>; unvollkommene Theilung des Kehlkopfes durch einen, von unten nach oben verlaufenden Strang<sup>5)</sup>.

Weit häufiger sind zufällig entstehende Formfehler<sup>6)</sup>, vorzüglich in Folge von mechanischen Verletzungen. Hieher gehören Schnittwunden des Kehlkopfes bei beabsichtigtem Selbstmorde. Wunden des Kehldeckels werden im Allgemeinen für tödtlich gehalten, doch habe ich einen Fall vor mir, wo der Kehldeckel in seiner ganzen Höhe, außerdem die rechte Hälfte desselben in quere Richtung durchschnitten wurde, und der Tod nicht erfolgte. Ein Fall, der auch für die oben bemerkte nicht unumgängliche Nothwendigkeit des Kehldeckels zur Verschließung der Stimmrinne wichtig ist.

Leicht sind indeß Verwundungen des Kehlkopfes durch die, hiedurch veranlaßte Reizung und Entzündung der sehr empfindlichen Stelle tödtlich.

Bis

1) Meckel a. a. O.

2) Sandifort exerc. academ. L. II. C. VII. p. 64.

3) Röderer de foetu parasitico. Comm. loc. Gotting. T. 4. p. 136 ff.

4) Atti di Siena. Vol. III. p. 252.

5) Meckel's path. Anat. II. 2. p. 140.

Der von Otto angeführte Fall, wo der Kehlkopf in drei Kanäle getheilt werden sollte (Path. Anat. 223.) ist nicht dies, sondern die Theilung der Luftröhre in drei, statt zweier Aeste. (Sandifort Exerc. ac. p. 65.)

6) C. Bell cases of diseases and wounds of the larynx. In dessen Surgic. observations. London. 1817. Part. 1.

Disseilen wird der Tod indessen erst später durch, in Folge der Verwundung und Vereiterung entstandne, die Stimmritze anfüllende Fleischwarzen veranlaßt <sup>1)</sup>).

Eben so kann der durchschnittne und in die Stimmritze hängende Sießbeckenknorpel als fremder Körper durch Erstickung tödten <sup>2)</sup>).

Bei Erhängten sind die Kehlkopfsknorpel nicht nothwendig, wenn gleich disseilen <sup>3)</sup>), zerbrochen.

## II. Texturveränderungen <sup>4)</sup>.

§. 229.

Eine entweder die Schleimhaut des Kehlkopfes allein, oder in Verbindung mit derselben in andern Theilen, namentlich der Mundhöhle, besonders aber der Luftröhre, nicht selten betreffende Krankheit ist die Entzündung derselben, in welcher oft mit Ausschüßung Bildung einer Entzündungshaut verbunden ist, die sie mehr oder weniger anfüllt, und Erstickung verursacht.

Noch weit häufiger bilden sich in ihr, vorzüglich syphilitische Geschwüre bei der Kehlkopfschwindsucht, wodurch der Kehlkopf mehr oder weniger zerstört und regelwidriger Zusammenhang zwischen ihm und dem Schlundkopf

Ec 4

ges

1) Bell a. a. D. S. 44.

2) Ebendas.

3) Einen Fall vom Zerbrechen des Ringknorpels bei Morgagni. Ep. Anat. med. XIX. 15.

4) Bell a. a. D.

Howship on the affections of the larynx. In Practical obs. on surgery. London. 1816. p. 14.

Die Selbstlauter werden vorzüglich in dem Kanal zwischen der Zunge und dem Gaumen erzeugt, und ihre Verschiedenheiten hängen fast ganz von Verschiedenheiten seines Durchmessers ab, welche durch die Bewegungen der Zunge bestimmt werden.

Dagegen haben auf die Bildung der Mitlauter außer dem Kehldeckel die übrigen Mundtheile, namentlich die Lippen und der weiche Gaumen einen bedeutenden Einfluß.

## II. Geschlechtsverschiedenheiten.

§. 2287.

Der Kehlkopf ist eines von den Organen, in welchem sich der Geschlechtsunterschied am deutlichsten ausspricht. Gewöhnlich ist der weibliche Kehlkopf um ein Drittheil, bisweilen fast um die Hälfte, kleiner als der männliche. Alle Knorpel sind bedeutend dünner. Der Schildknorpel ist zugleich weit platter, indem sich seine beiden Seitenhäften unter einem weniger spitzen Winkel vereinigen. Daher bildet der männliche Kehlkopf einen starken Vorsprung am Halse, der dem weiblichen fehlt. Der Einschnitt des obern Randes ist aus demselben Grunde beim weiblichen weit flacher als dem männlichen. Die weibliche Stimmrinne ist bedeutend kleiner als die männliche, und die Bänder derselben weniger straff.

## III. Altersverschiedenheiten.

§. 2288.

Die erwähnten Geschlechtsverschiedenheiten treten erst mit der Mannbarkeit ein. Bis zu dieser Periode ist dieses Organ in beiden Geschlechtern fast ganz nach demselben Typus gebildet, mithin auch die Stimme fast gleich. Bei Kastraten bleibt der  
Kehl-



Kehlkopf weiblich klein<sup>1)</sup>. Er entwickelt sich weit langsamer, nicht in demselben Verhältniß, und, wie es scheint, in Hinsicht auf die Zeit weniger regelmäßig als die übrigen Organe, so daß er bisweilen bei ältern Kindern kleiner als bei jüngern ist, ungeachtet der Wuchs beider ihrem Alter entspricht.

Ueberhaupt bleibt der Kehlkopf und besonders die Stimmrinne lange klein; so daß zwischen denen eines dreijährigen und eines zwölfjährigen Kindes beinahe gar keine Verschiedenheiten Statt finden; die um die Zeit der Mannbarkeit plötzlich so bedeutend eintreten, daß die Stimmrinne in einem Jahr um das Doppelte an Breite und Länge zunimmt<sup>2)</sup>.

## Zweite Unterabtheilung.

### Regelmäßige Beschaffenheit.

#### I. Stimmrinne.

§. 2289.

Nur selten weicht der Kehlkopf im Ganzen oder seinen einzelnen Theilen durch ursprüngliche Bildungsfehler von der Regel ab.

Doch gehören hieher ungewöhnliche Kleinheit desselben, als Stehenbleiben auf einer frühern Bildungsstufe, welche mit Zerstörung oder unvollkommner Entwicklung der Hoden zusammenfällt<sup>3)</sup>; ferner Mangel des Kehlschloßes<sup>4)</sup>; Spal-

Ec 3 tung

1) Dupuytren Bullet. de la soc. philom. Vol. II. p. 193.

2) A. Richerand recherches sur la grandeur de la glotte et sur l'état de la tunique vaginale dans l'enfance. Mém. de la soc. méd. d'émulat. T. III. p. 326 ff.

3) Dupuytren Bullet. de la soc. philom. Vol. II. p. 195. Méd. et path. Anat. Bd. I. S. 485.

4) Targioni Tozzetti prima raccolta etc. Firenze. 1752.

tung desselben<sup>1)</sup>; Mangel der obern Hörner des Schildknorpels<sup>2)</sup>; des Ringknorpels und der Siebbeckenknorpel<sup>3)</sup>; der ganz besonders merkwürdig ist, weil dadurch der Kehlkopf der Luftröhre mehr als gewöhnlich verähnlicht wurde; schiefe Stellung und Krümmung des Kehlschneiders<sup>4)</sup>; unvollkommene Theilung des Kehlkopfes durch einen, von unten nach oben verlaufenden Strang<sup>5)</sup>.

Weit häufiger sind zufällig entstehende Formfehler<sup>6)</sup>, vorzüglich in Folge von mechanischen Verletzungen. Hieher gehören Schnittwunden des Kehlkopfes bei beabsichtigtem Selbstmorde. Wunden des Kehlschneiders werden im Allgemeinen für tödtlich gehalten, doch habe ich einen Fall vor mir, wo der Kehlschneider in seiner ganzen Höhe, außerdem die rechte Hälfte desselben in quere Richtung durchschnitten wurde, und der Tod nicht erfolgte. Ein Fall, der auch für die oben bemerkte nicht unumgängliche Nothwendigkeit des Kehlschneiders zur Verschließung der Stimmrinne wichtig ist.

Leicht sind indessen Verwundungen des Kehlkopfes durch die, hiedurch veranlaßte Reizung und Entzündung der sehr empfindlichen Stelle tödtlich.

Die

1) Meckel a. a. O.

2) Sandifort exerc. academ. L. II. C. VII. p. 64.

3) Röderer de foetu parasitico. Comm. soc. Götting. T. 4. p. 136 ff.

4) Atti di Siena. Vol. III. p. 232.

5) Meckel's path. Anat. II. 2. p. 140.

Der von Otto angeführte Fall, wo der Kehlkopf in drei Kanäle getheilt werden sollte (Path. Anat. 223.) ist nicht dies, sondern die Theilung der Luftröhre in drei, statt zweier Aeste. (Sandifort Exerc. ac. p. 65.)

6) C. Bell cases of diseases and wounds of the larynx. In dessen Surgic. observations. London. 1817. Part. 1.

Bisweilen wird der Tod indeßten erst später durch, in Folge der Verwundung und Vereiterung entstandne, die Stimmritze anfüllende Fleischwarzen veranlaßt <sup>1)</sup>.

Eben so kann der durchschnittne und in die Stimmritze hängende Gießbeckenknorpel als fremder Körper durch Erstickung tödten <sup>2)</sup>.

Bei Erhängten sind die Kehlkopfsknorpel nicht nothwendig, wenn gleich bisweilen <sup>3)</sup>, zerbrochen.

## II. Texturveränderungen <sup>4)</sup>.

### §. 2290.

Eine entweder die Schleimhaut des Kehlkopfes allein, oder in Verbindung mit derselben in andern Theilen, namentlich der Mundhöhle, besonders aber der Luftröhre, nicht selten betreffende Krankheit ist die Entzündung derselben, in welcher oft mit Ausschüßung Bildung einer Entzündungshaut verbunden ist, die sie mehr oder weniger anfällt, und Erstickung verursacht.

Noch weit häufiger bilden sich in ihr, vorzüglich syphilitische Geschwüre bei der Kehlkopfschwind sucht, wodurch der Kehlkopf mehr oder weniger zerstört und regelwidriger Zusammenhang zwischen ihm und dem Schlundkopf

Ec 4

ges

1) Bell a. a. D. S. 44.

2) Ebendas.

3) Einen Fall vom Zerbrechen des Ringknorpels bei Morgagni. Ep. Anat. med. XIX. 15.

4) Bell a. a. D.

Howship on the affections of the larynx. In Practical obs. on surgery. London. 1816. p. 14.

gebildet werden kann. Auch dieser Zustand kann auf mehr als eine Weise Erstickung bewirken. Zu dieser aber reicht, auch ohne vorhandne Ausschwülgung und Verschwärung, die bloße Anschwellung der entzündeten Theile hin.<sup>1)</sup>

Die Knorpel des Kehlkopfes sind vor allen besonders zur Verhärtung, und somit zu allen Krankheiten der Knorpeln geneigt.

Als neue Bildungen erscheinen auch nicht selten, doch verhältnißmäßig weit seltner als die erwähnten, *Bälge*, welche durch Verschließung der Stimmritze mehr oder weniger Erstickungsgefahr bringen, und die bisweilen *Hydatiden* sind.

### III. Fremde Körper.

§. 2291.

Da Substanzen, welche aus der Mundhöhle in den Magen gelangen, über den Kehlkopf weggehen müssen, so gelangen nicht selten fremde Körper in ihn, und durch ihn in die Luftröhre, vorzüglich, wenn während des Schlingens gesprochen, die Stimmritze daher nicht verschlossen wird. Gewöhnlich veranlassen sie schnell Erstickung, doch blieb in einem Falle ein Dufaten zwei Jahre<sup>2)</sup>, eine Haselnußschale von der Größe eines Nagels sieben Jahre lang im Kehlkopfe<sup>3)</sup>.

Zweite

1) Howship a. a. O. S. 133.

2) Höchstetter obl. med. Dec. VI. cal. X.

3) Tulpinus obl. med. L. II. C. 7.

Zweite Abtheilung.

Von den Athmungswerkzeugen <sup>1)</sup>.

Erste Unterabtheilung.

Regelmäßige Beschaffenheit.

I. Lungen.

A. Vollkommener Zustand im Allgemeinen.

§. 2292.

Die Organe des Athmens (*Systema respiratorium*) sind die Lungen (*Pulmones*), welche durch die Luftröhre (*Trachea et arteria aspera*) mit dem umgebenden Medium in Verbindung gesetzt werden. Sie selbst bestehen, außer der Fortsetzung der Luftröhre, aus den Lungenpulsa und Blutadern, Lymphgefäßen, Nerven, Schleimgewebe, welches sich zwischen den genannten Theilen verbreitet, und einer äußern, serösen Hülle, dem Brustfell.

Ec 5

a. Neu

1) M. Malpighi de pulmonibus Epist. I. et II. ad Alph. Borellum. Bonon. 1661.

Th. Bartholinus de pulmonum substantia et motu distrib. Acc. M. Malpighii de pulm. obl. anat. L. B. 1672.

Helvetius Observations sur le poulmon de l'homme. Mémoires de Paris. 1718.

Wildrik de fabrica pulmonum. Franequerae. 1761.

Wohlfahrt de bronchiis vasisque bronchialibus. Halae. 1748.

Hildebrandt de pulmonibus. Gottingae. 1786.

Reisfeissen de pulmon. structura. Argent. 1805.

Schmerring und Reisfeissen über die Structur, die Richtung und den Gebrauch der Lungen. Berlin. 1808. 2.

## I. L u f t r ö h r e.

§. 2298.

Die Luftröhre ist ein Kanal, von ungefähr vier Zollen Länge und neun Linien Weite, der in der Gegend des fünften Halswirbels unter dem Kehlkopfe anfängt, und nur durch einige Muskeln, namentlich den Niederzieher des Zungenbeins und des Kehlkopfes bedeckt, genau in der Mittellinie liegend, dicht vor der Speiseröhre, zwischen den großen Gefäßen des Kopfes gerade in die Brusthöhle herabsteigt. Hier wendet sie sich allmählich etwas nach der rechten Seite, so daß der linke Theil ihres Umfangs vor der Mitte der Wirbelsäule liegt, und theilt sich hinter dem Bogen der Aorte, ungefähr dem dritten Brustwirbel gegenüber, unter einem stumpfen Winkel in zwei seitliche Äste, die Luftröhrenäste (Bronchi s. Bronchiae), wovon der rechte, unter einem stumpfern Winkel abgehende, bedeutend, fast um einen Zoll kürzer, und außerdem weiter als der linke ist, indem dieser gewöhnlich acht Linien weit, einen Zoll lang, jener ungefähr einen halben Zoll weit, zwei Zoll lang ist, und jener zugleich weniger steil absteigt. Der rechte Luftröhrenast liegt zwischen der obern Hohlader und der unpaarigen Blutader, der linke wendet sich unter dem Bogen der Aorte nach vorn.

Jeder tritt, von dem Brustfell bekleidet, schief von oben und innen nach unten und außen an die Lunge seiner Seite, und spaltet sich, indem er dieselbe erreicht, in zwei Äste, einen obern und einen untern, für jeden Lappen einen. Der untere der rechten Lunge spaltet sich bald wieder von neuem in einen obern kleinern und untern größern für den mittlern und untern Lappen.

Innerhalb der Lunge verästeln sie sich äußerst fein, und stellen einen vielfach verzweigten, an der ganzen Oberfläche der Lungen blind geendigten Baum dar, längs welchem sich die übrigen Theile, welche zur Zusammensetzung der Lunge eingehen, verbreiten. Die letzten, feinsten, blind geendigten Verzweigungen erhalten den Namen der Lungenzellen (Cellulae pulmonares).

§. 2299.

Zur Bildung der Luftröhre treten sehr verschiedenartige Theile zusammen, namentlich 1) Fasergewebe; 2) Knorpel; 3) Muskelfasern und 4) Schleimhaut.

a. Fasergewebe.

§. 2300.

Das Fasergewebe besteht aus longitudinalen Bündeln (Lacerti), welche keine völlig zusammenhängende Ringe bilden, sondern durch eine Menge länglicher Lücken unterbrochen sind. Es bildet den äußern Umfang der Luftröhre, und ist an die darunter liegende Schleimhaut sehr eng geheftet. Seine Gefäße sind zahlreicher als in andern faserigen Theilen, und es kommt daher vielleicht mit der Faserhaut der Pulsadern überein.

Durch die bedeutende Elasticität dieses Fasergewebes wird die in der Längsrichtung ausgedehnte Luftröhre wieder auf ihren ersten Durchmesser verkürzt.

b. Knorpel.

§. 2301.

In das Fasergewebe der Luftröhre und ihrer Verzweigungen sind von oben nach unten auf einander folgende Knorpel:

## 2. Äußere Gestalt

§. 2293.

Die Lungen haben die Gestalt eines unregelmäßigen Kegels, dessen Grundfläche nach unten, die Spitze nach oben gerichtet ist. Ihre Grundfläche, welche auf dem Zwerchfell ruht, ist ausgehöhlt, die äußere, gegen die Rippen gewandte Fläche stark gewölbt, die innere, gegen das Herz gekehrte, ausgehöhlt.

Der hintere Rand ist stumpf, der vordere scharf.

Jede Lunge ist durch einen, schief von oben und hinten nach unten und vorn absteigenden Einschnitt, welcher durch ihre ganze Dicke dringt, in zwei dreieckige Lappen, einen obern kleineren und einen untern größern getheilt. Zwischen diesen beiden befindet sich an der rechten Lunge vorn ein dritter, weit kleinerer, von vorn nach hinten beträchtlich zugespitzter. Die linke Lunge unterscheidet sich von der rechten durch einen, an ihrem untern Rande befindlichen Ausschnitt für den untern Theil des Herzens.

Außer dieser Verschiedenheit der äußern Form ist die rechte Lunge zugleich größer, und zwar etwas niedriger, aber breiter als die linke, die etwas länglicher ist.

Die ganze Lunge zerfällt wieder in mehrere, in Hinsicht auf Gestalt und Größe unregelmäßige, drei- fünf- sechseckige Läppchen, in deren Zwischenräumen Blut- und Lymphgefäße verlaufen, die aber keine, oder nur sehr unbedeutende Ungleichheiten an der Oberfläche bilden.

§. 2294.

Der hintere Rand jeder Lunge ist in seinem untern größern Theile der Länge nach gespalten, und bildet eine Vertiefung



tiefung, in deren obere Hälfte sich die Luftröhrenäste, die Blutgefäße und Nerven der Lunge senken, an deren untern Theil sich die Wänder der Lunge heften.

Die Lungenpulsader liegt anfänglich am meisten nach oben, vor dem Luftröhrenaste, giebt auch hier einen ansehnlichen Ast in die Lunge, wendet sich aber bald nach hinten, so daß sie hinter den Luftröhrenast zu liegen kommt.

Die Lungenblutadern liegen am meisten nach unten und vorn, die kleinsten, untersten Aeste ausgenommen, welche hinter den untersten Zweigen der Luftröhrenäste verlaufen.

#### b. Lage und Befestigung.

##### §. 2295.

Die Lungen liegen zu beiden Seiten des Herzens, jede in einem eignen serösen Sack, dem Brustfelle, enthalten, welches sie überall genau berühren, ohne mit ihm an einer andern Stelle als da, wo es sich, um ihre äußere Fläche zu bekleiden, gegen sich selbst umschlägt, verbunden zu seyn.

Ihr oberes Ende überragt die erste Rippe etwas.

#### c. Farbe.

##### §. 2296.

Die Farbe der Lungen ist beim gesunden Erwachsenen rothgrau, mehr oder weniger schwarz gefleckt.

#### d. Zusammensetzung.

##### §. 2297.

Von allen oben (§. 2292.) genannten Theilen ist die Luftröhre der, welcher die Grundlage aller übrigen bildet, und insofern der wichtigste, als durch ihn die Luft ein- und ausgeleitet wird.

#### I. Luft.

## I. L u f t r ö h r e.

S. 2298.

Die Luftröhre ist ein Kanal, von ungefähr vier Zollen Länge und neun Linien Weite, der in der Gegend des fünften Halswirbels unter dem Kehlkopfe anfängt, und nur durch einige Muskeln, namentlich den Niederzieher des Zungenbeins und des Kehlkopfes bedeckt, genau in der Mittellinie liegend, dicht vor der Speiseröhre, zwischen den großen Gefäßen des Kopfes gerade in die Brusthöhle herabsteigt. Hier wendet sie sich allmählich etwas nach der rechten Seite, so daß der linke Theil ihres Umfangs vor der Mitte der Wirbelsäule liegt, und theilt sich hinter dem Bogen der Aorte, ungefähr dem dritten Brustwirbel gegenüber, unter einem stumpfen Winkel in zwei seitliche Äste, die Luftröhrenäste (Bronchi s. Bronchiae), wovon der rechte, unter einem stumpfern Winkel abgehende, bedeutend, fast um einen Zoll kürzer, und außerdem weiter als der linke ist, indem dieser gewöhnlich acht Linien weit, einen Zoll lang, jener ungefähr einen halben Zoll weit, zwei Zoll lang ist, und jener zugleich weniger steil absteigt. Der rechte Luftröhrenast liegt zwischen der obern Hohlader und der unpaarigen Blutader, der linke wendet sich unter dem Bogen der Aorte nach vorn.

Jeder tritt, von dem Brustfell bekleidet, schief von oben und innen nach unten und außen an die Lunge seiner Seite, und spaltet sich, indem er dieselbe erreicht, in zwei Äste, einen obern und einen untern, für jeden Lappen einen. Der untere der rechten Lunge spaltet sich bald wieder von neuem in einen obern kleinern und untern größern für den mittlern und untern Lappen.

Jns

## I. Erweiterer der Stimmrige.

## a. Ring- und Schildknorpelmuskel.

S. 2276.

Der Ring- und Schildknorpelmuskel, vorderer Erweiterer der Stimmrige (*M. Crico-thyreoideus* s. *Dilatator glottidis anterior*), ein kleiner, ungefähr rautenförmiger, doch etwas ungleichseitigviereckiger Muskel, liegt, vom Brustbein: Schildmuskel bedeckt, zwischen den Seitenflächen des Schildknorpels und dem untern Rande des Ringknorpels, entspringt vom untern Rande und der Seitenfläche des letztern, steigt, mit schrägen, nach hinten und oben gerichteten Fasern, welche nicht selten in zwei völlig getrennte Bündel, ein vorderes und ein hinteres, zerfallen, empor, und heftet sich durch eine kurze Sehne an den untern Rand und das untere Horn des Schildknorpels.

Er zieht die Seitenhälften des Schildknorpels nach unten und außen, und erweitert dadurch die Stimmrige.

## b. Hinterer Ring- und Stießbeckenmuskel.

S. 2277.

Hinterer Ring- und Stießbeckenmuskel, hinterer Erweiterer der Stimmrige (*M. Crico-arytaenoides* s. *dilatator glottidis posticus*), ein rautenförmiger Muskel, welcher den größten Theil der hintern Fläche des Ringknorpels anfüllt, von der ganzen Ausbreitung desselben entsprungen, schräg von unten und innen nach oben und außen emporsteigt, und sich mit einer kurzen Sehne unten an den äußern Rand des Stießbeckenknorpels heftet.

pelstücke so eingeschoben, daß dasselbe über ihre äußere und innere Fläche, genau an sie geheftet, weggeht. Doch bedeckt es nicht unmittelbar die Substanz der Knorpel, sondern diese werden außerdem noch überall von einer eignen Knorpelhaut bekleidet.

Die Gestalt, Größe, Stellung dieser Knorpelstücke sind nicht in der ganzen Ausbreitung der Luftröhre und ihrer Aeste genau dieselben.

In der Luftröhre selbst bilden sie unvollkommene, in dem hintern Theile ihres Umfangs offene, den vordern und die Seitentheile umgebende Ringe, die ungefähr zwei Linien Höhe, eine halbe Linie Dicke und anderthalb Zoll Länge haben, und, wenn die Luftröhre am stärksten ausgedehnt ist, ungefähr zwei Dritttheile, im zusammengefallnen Zustande über drei Viertel theile ihres Umfangs einschließen.

Ihre Zahl variirt von sechs zehn bis zwanzig.

Ihre Gestalt ist im Allgemeinen in dem bei weitem größten, mittlern Theile der Luftröhre am regelmässigsten und beständigsten, weniger in dem obern und untern. In dem größten Theile derselben bilden sie meistens einfache, in ihrer ganzen Ausbreitung gleiche Ringe von ungefähr gleicher Höhe.

Der oberste dagegen ist gewöhnlich der bei weitem höchste, namentlich in seinem vordern Theile beträchtlich höher als in seinem hintern, und entspricht dadurch auf eine nicht unmerkwürdige Weise von vorn nach hinten dem Ringknorpel, welcher sich auf entgegengesetzte Weise verhält.

Zugleich ist er meistens an den hintern Enden mit dem zweiten Ringe verwachsen, wodurch unverkennbar Annäherung an den Typus der Kehlkopfbildung ausgesprochen ist.

Dis:

Hiaweilen findet eine ähnliche Verwachsung auch zwischen dem dritten und vierten Ringe auf beiden, häufiger nur auf einer Seite, Statt.

Dagegen sind die untern Ringe häufig auf einer Seite in einer kürzern oder längern Strecke mehr oder weniger vollständig, d. h. so gespalten, daß entweder die Spaltung bis zu ihrem Ende besteht, oder sie vor demselben wieder zu einem zusammentreten. Auf der entgegengesetzten Seite findet sich dann oft, aber nicht immer, ein sehr kurzer, unvollkommener, einer der beiden, durch die Spaltung entstandnen Hälften entsprechender Kreisabschnitt, oder ein, auf der andern Seite gespaltnen Ring, wodurch die unsymmetrische Bildung einigermaßen symmetrischer wird, eben so häufig aber ein gewöhnlicher, vollkommener, ja selbst ein auf dieselbe Weise auf derselben Seite zur Hälfte gespaltnen Ring.

In dem freien Theile der Luftröhrendäste kommen die Ringe im Allgemeinen mit den letzten Ringen der Luftröhre überein.

In dem rechten finden sich gewöhnlich nur acht, im linken elf bis zwölf. Sie werden in dem Maasse unregelmäßiger, spalten sich oder fließen mit benachbarten zusammen, als sie sich den Lungen näher befinden.

Innerhalb der Lunge nimmt die Zahl der Knorpelstücke plötzlich bedeutend ab, so daß die Reste hier mehr häutig werden, zugleich verlieren sie ihre regelmäßige Gestalt, sie stellen keine Ringe, sondern ungleichseitige Vierecke, Dreiecke u. s. n. dar, und finden sich in allen Theilen des Umfangs der Luftröhrendäste.

*pressor epiglottidis*), entspringt vom mittlern Theile der innern Fläche des Schilddrüsen, und setzt sich an den Stimmband und untern Theil des Kehlkopfs.

Darneben findet sich ein kleinerer, weiter nach innen und oben entspringender.

Beide ziehen den Kehlkopf herab.

## V. Nerven des Kehlkopfs.

§. 2282.

Die, von dem Lungenmagennerven stammenden Nerven des Kehlkopfs sind der obere und der untere oder zurücklaufende Kehlkopfsnerv. Beide verbreiten sich in der Schleimhaut, und in den Muskeln des Kehlkopfs, der erstere ganz oder wenigstens fast ganz nur in dem Ring- und Schildknorpelmuskel und dem Siegfleckenmuskel; dieser dagegen in den hintern und seitlichen Ring- und Siegfleckenmuskeln und dem Schild- und Siegfleckenmuskel, so daß also sowohl die verschiedenen Verengerer als Erweiterer der Stimmritze von einem dieser beiden Nerven versehen werden.

Durchschneidung oder vollständige Unterbindung eines von beiden schwächt daher die Stimme, die ganz verloren geht, wenn alle auf beiden Seiten zerstört werden.

## VI. Lebenserscheinungen des Kehlkopfs.

§. 2283.

Die Schleimhaut des Kehlkopfs ist, wegen ihres ansehnlichen Nervenreichthums, vorzüglich in der Gegend der Stimmritze.

riße im hohen Grade empfindlich. Hierdurch wird das Einfallen fremder Körper in die Luftröhre verhindert, und das durch der sehr leicht eintretenden Erstickung vorgebeugt. Sehr merkwürdig ist es, daß nur diese Stelle, nicht auch die Schleimhaut der Luftröhre, diese bedeutende Empfindlichkeit besitzt.

Das Leben des Kehlkopfes äußert sich vorzüglich durch Bewegung, welche in mehrfacher Beziehung doppelter Art ist, sofern sie sich 1) theils auf den ganzen Kehlkopf, theils auf die einzelnen in seine Zusammensetzung eingehenden Theile erstreckt; 2) unter mehrern Bedingungen Statt findet, mit mehrern Functionen in Beziehung steht.

Durch die erste, allg e m e i n e Bewegung des Kehlkopfes verändert der Kehlkopf sein Ortsverhältniß zu den benachbarten Theilen, indem er ab- und aufwärts, vor- und rückwärts gezogen wird; durch die letztere verändern die verschiedenen, ihn zusammensetzenden Theile ihre Lage gegen einander, und sie bewirkt besonders Verschiedenheiten in der Gestalt und dem Umfange der Stimmriße.

Allgemeine Bewegungen kommen sowohl beim Schlingen als bei der Bildung der Stimme vor.

Beim Schlingen wird der Kehlkopf auf die oben (S. 251.) angegebne Weise so nach vorn und oben gezogen, daß dadurch das Einfallen von Speisen verhütet wird.

In Bezug auf die Bildung der Stimme wird der Kehlkopf bei hohen Tönen in die Höhe gezogen, sowohl um den Schildknorpel vom Ringknorpel zu entfernen, und dadurch die Stimmriße zu verengen, ihre Bänder zugleich zu spannen, als um zugleich die Luftröhre zu verlängern und zu verengern.

Bei

tenden Systeme vereinigende Schleimgewebe über. Die Luftröhre bildet einen hohlen Baum, dessen Zweige nur durch die Aeste, diese durch die Stämme, zu welchen sie zusammenstießen, nicht aber durch die Continuität des, zwischen ihnen befindlichen Schleimgewebes zusammenhängen. Dies ergiebt sich theils aus der anatomischen Untersuchung, theils aus einer Menge von Versuchen.

Die mit Luft oder einer andern Flüssigkeit angefüllten freistehenden Verzweigungen der Luftröhrenäste haben immer, sowohl mit bloßem Auge, als unterm Mikroskop angesehen, dieselbe Gestalt und feste Begrenzung. Wird Luft oder eine andre Flüssigkeit in einen Luftröhrenast getrieben, dadurch z. B. ein ganzer Lungenlappen aufgeblasen, hierauf einer der untergeordneten Aeste desselben unterbunden, so bleibt der Theil der Lunge, in welchen er sich entfaltet, stehend von Luft, während der andre, dessen Ast nicht unterbunden wurde, sogleich zusammenfällt.

## 2. Blutgefäße der Lunge.

### §. 2305.

Die Blutgefäße der Lunge sind doppelter Art. Die bei weitem größten, den ansehnlichsten Theil der Lunge bildenden, sind die Lungenpuls- und Blutadern, von welchen jene das venöse Blut den Lungen zuführen, diese das, an den Gränzen beider Systeme durch die Berührung der Luft arteriell gewordene zum linken Herzen zurückführen.

Die Stämme beider treten an derselben Stelle zu und aus den Lungen.

Innerhalb der Lungen begleiten die Blutadern die Luftröhrenäste näher als die Pulsadern.

### §. 2306.



## §. 2306.

Das zweite System von Blutgefäßen sind die, mit der Ernährung der Lungensubstanz in Beziehung stehenden Luftschleimnastgefäße (Vasa bronchialia), deren Ursprung schon oben (Th. 3. S. 197.) angegeben worden ist, und die sich längs den Lufttröhrenästen, dicht an sie geheftet, und sie vielfach umschlingend, in der Substanz der Lungen verbreiten. Sie dringen, nachdem sie das Muskel- und Fasergewebe versehen haben, an die Schleimhaut, in welcher sie sich vielfach verzweigen, an die Häute der Lungengefäße, die Nerven der Lunge, und bilden an der Oberfläche derselben, unter dem Brustfelle, ein äußerst feines, vielfach verschlungnes Netz.

Sehr merkwürdig ist es, daß nicht bloß in diesem feinen Gefäßnetze, sondern auch zwischen den größern Zweigen und Ästen der Lungen- und Lufttröhrengefäße bedeutende Anastomosen Statt finden.

Die Bronchialvenen senken sich sogar größtentheils in die Lungenblutadern, nur die an der Wurzel der Lungen befindlichen treten zu kleinen Stämmen zusammen, welche sich in die unpaarige Vene, oder die obere Hohlader, oder untergeordnete Äste des Körpervenensystems einsenken.

Aus dieser Anordnung ergiebt sich daher: 1) daß auch im normalen Zustande in den Lungen sehr bedeutende Communicationen zwischen dem Systeme des rothen und dem des schwarzen Blutes Statt finden; 2) daß die als Abweichungen bisweilen erscheinenden, wo größere Gefäße der entgegengesetzten Systeme sich auf dieselbe Weise verhalten, z. B. die Kranzblutadern des Herzens sich in die linke Vorkammer, eine oder mehrere Lungenvenen in die Hohlvene einsenken, eine große

überzählige Lungenpulsader von der absteigenden Aorte entsprang u. s. w., nur weitere Entwicklungen dieses Typus sind, und 3) die wichtige Bemerkung, daß diese Anastomosen in den Fällen, wo die Lungenpulsader verschlossen oder beträchtlich verengt war, und dennoch das Leben bedeutend hoch gebracht wurde, höchst wahrscheinlich die Wege sind, durch deren Erweiterung das Blut in die Lungenpulsadern geführt wurde.

In der That werden auch unter dieser Bedingung die Luftröhrenäste erweitert gefunden <sup>1)</sup>.

### 3. Saugadern und Drüsen.

#### §. 2307.

Die Saugadern und die in der Substanz der Lungen, so wie die an den Luftröhrenästen befindlichen Drüsen sind schon oben <sup>2)</sup> nach den wichtigsten Bedingungen, welche sie darbieten, betrachtet worden.

### 4. Nerven.

#### §. 2308.

Die Nerven der Lungen stammen vom pneumogastrischen Paare (Bd. 2. S. 691.), sind verhältnismäßig nicht groß, aber zahlreich, und lassen sich weit auf den Luftröhrenästen verfolgen. Sie zerfallen in zwei Ordnungen, von welchen die eine die Luftröhrenäste, die andre die Gefäße der Lungen versieht. Die erstern bringen in Begleitung der Luftröhrenastgefäße zur Muskel- und Schleimhaut, die letztern ausstricken theils

<sup>1)</sup> Jacobson in Meckel's deutschem Archiv für die Physiologie. Bd. 2. Hft. 1.

<sup>2)</sup> Bd. 2. S. 379 ff.

theils die Gefäße, theils bringen sie in die Substanz der Lungen, theils in das Haargefäßsystem, selbst in das Brustfell.

### 5. Brustfell.

§. 2309.

Das Brustfell (Pleura) ist eine seröse Haut, welche durch ihren äußern Abschnitt, das Rippenbrustfell (Pleura costalis), die innere Fläche des Brustkastens, durch ihren innern umgeschlagenen, das Lungenbrustfell (Pleura pulmonalis), die äußere der Lungen bekleidet.

Es ist an die Wände des Brustkastens lockerer als an die Lunge geheftet, doch auch von dieser leicht trennbar.

Das Brustfell besteht in einem rechten und linken Sacculus (Sacci Pleurae), welche völlig von einander getrennt sind.

Die innern Wände des äußern Abschnittes sind nicht an die Wände des Brustkastens geheftet, sondern einander entgegengewandt, und bilden eine von oben nach unten, und von vorn nach hinten verlaufende Scheidewand, wodurch der Brustkasten in eine rechte und eine linke Hälfte getheilt wird.

Indessen berühren sie einander nirgends, sondern werden ihrem mittlern, größern Theile der Scheidewand, welche sie bilden, durch das Herz, hinten durch die Aorta, die Speiseröhre, die unpaarige Vene und den Milchbrustgang, vorn durch die Thymus, Fett und die großen Gefäßstämme voneinander entfernt. An alle genannten Theile sind sie durch Lockeres Zellgewebe geheftet. In ihrem mittlern Theile liegen sie am weitesten von einander. Der vor und hinter dem Herz.

zen liegende Theil dieser Scheidewand erhält den Namen des vordern und des hintern Mittelfelles (*Mediastinum anterius et posterius*).

Das vordere Mittelfell steigt zwischen dem Herzen und dem vordern mittlern Theile der Brusthöhle, doch nicht gerade, sondern schräg von links und oben nach rechts und unten herab, liegt auch außerdem nicht genau in der Mitte, sondern etwas weiter nach der linken Seite, indem das rechte Blatt sich mit seinem vordern Rande an den linken Rand des Brustbeins, das linke an die Knorpel der linken Rippen heftet. Von hier aus steigt es an der vordern Fläche des Herzbrusts herab.

Das hintere Mittelfell steigt gerader von oben nach unten herab, und liegt zwischen der vordern Fläche der Wirbelsäule und der Grundfläche des Herzens.

Zwischen dem vordern und hintern Mittelfelle schlägt sich der äußere Sack des Brustfelles jeder Seite gegen sich selbst in den innern untern, und an die obere Fläche der Lungen, indem es sich um die Lungengefäße und die Luftröhrenäste zusammenzieht, und von der Mitte des hintern Randes an die Lunge tritt. Oben, vorn und hinten zieht es sich von allen Seiten plötzlich gegen diese Stelle zusammen, unten dagegen befindet sich auf jeder Seite eine vom Zwerchfell anfangende, mit einem halbmondförmigen untern Rande geendigte, dreieckige, ansehnliche Verdopplung, welche sich an den hintern Rand des untern Lungenlappens heftet, das rechte und linke Lungenband (*Ligamentum pulmonis dextrum et sinistrum*), von welchen das linke bei weitem ansehnlicher als das rechte ist.

Das

Das Lungenbrustfell bekleidet die Lunge in ihrem ganzen Umfange, und überzieht auch die größten Abtheilungen oder Lappen derselben überall, dringt aber nicht zwischen die kleinern Lappchen, welche nur durch Zellgewebe gesondert werden.

a. Gewicht der Lunge.

1. Absolutes Gewicht.

§. 2310.

Die gesunde Lunge des erwachsenen Mannes wiegt im Durchschnitt, im Zustande des Ausathmens aus dem Körper genommen, wodurch noch ein bedeutender Theil, der auch nach dem letzten Ausathmen noch in ihr befindlichen Luft, durch den, nach Wegnahme des Schutzes der Brusthöhlenwände frei auf ihre äußere Oberfläche einwirkenden Druck der äußern Luft herausgestoßen wird, mit der darin noch enthaltenen Luft und Blut ungefähr vier Pfund.

Das Verhältniß des Gewichtes der Lunge zum Körper würde also ungefähr wie 1:35 seyn.

2. Specifisches Gewicht.

§. 2311.

Die Substanz der Lunge an und für sich ist specifisch schwerer als Wasser, indem die Lungen des Kindes, welche noch nicht geathmet haben, in demselben untersinken. Nach eingetreteneem Athmen aber ist die Lunge specifisch leichter als das Wasser, weil die einmal eingedrungene Luft durch das Ausathmen bei weitem nicht vollständig wieder heraus befördert wird. Selbst aus einzelnen Stücken der Lunge treibt diese ein äußerst starker Druck nicht hervor, indem sie aus den

dadurch zerrissenen Lungenbläschen in das Zellgewebe tritt, so daß auch darin die Lungensubstanz, wenn gleich wenig, speckfisch leichter als das Wasser ist \*).

### E. Capacität der Lunge.

#### §. 2312.

Die Capacität der Lunge ist nicht in allen Zuständen derselben gleich, sondern, je nachdem sie sich im Zustande der Ausdehnung, am Ende des Einathmens (Inspiratio) oder der Zusammenziehung, am Ende des Ausathmens (Expiratio) befindet, bedeutend verschieden.

Die Angaben variiren bedeutend, was theils von der wirklichen Verschiedenheit der Größe der Lunge, theils von der verschiedenen Art des Messens herrühren kann.

In ersterer Hinsicht finden bedeutende individuelle Verschiedenheiten Statt, die größtentheils angeboren, zum Theil, wenn die Lungenthätigkeit, fortdauernd, z. B. bei anhaltender geistiger Beschäftigung wenig geübt wird, erworben seyn können.

Die Capacität der Lungen wird durch die Addition der Menge von Luft, welche durch das Einathmen in sie tritt, und durch das Ausathmen ausgestoßen wird, zu der, welche nach dem Ausathmen noch in ihnen verweilt, bestimmt.

Diese Momente können auf verschiedene Weise gemessen werden.

Die Luftmenge eines jeden Athemzuges kann vorzüglich auf dreifache Weise bestimmt werden.

Ents

1) Allen und Pepys (second paper) on respiration in phil. Tr. 1809. p. 410. Daraus in Medel's Archiv f. die Phys. iologie. Bd. 3. Hft. 1.

Entweder mißt man die Vergrößerung der Brusthöhle beim Einathmen, und ihre Verkleinerung beim Ausathmen;

oder die Veränderungen, welche im Stande einer den Athmenden umgebenden Flüssigkeit, beim Aus- und Einathmen Statt finden;

oder endlich die aus- und eingeathmete Luftmenge selbst wird gemessen, indem aus einem Gefäß von einem bestimmten Inhalt eingeathmet, und in ein anderes gleichfalls von bestimmtem Inhalt ausgeathmet wird, oder bloß das letztere geschieht <sup>1)</sup>.

Die Angaben nun über die bei einem jeden Athemzuge eingenommene und ausgestoßene Luftmenge variiren sehr bedeutend, von 3 bis über 40 Cubikpfe.

In der That geben Abildgaard 3 <sup>2)</sup>, Wurzer <sup>3)</sup>, de la Metherie 8—10 <sup>4)</sup>, Reutsch zwischen 6—12 <sup>5)</sup>, Abernethy <sup>6)</sup>, Lapoissier und Seguin <sup>7)</sup>, Davy 13 <sup>8)</sup>,

Ob 5

Ob 5

1) Järin bei Haller Elem. Physiol. L. VIII. S. III. 8.

2) Neue Versuche über das Athmen und den Nutzen desselben. Im Nord. Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft. Bd. 1. Hft. 1. S. 2. Indessen räumt er an einer andern Stelle ein, daß 4—7 zuweilen auch 15 Cubikzoll eindrängen, (Ebend. Hft. 2. S. 206.)

3) Günther's Darstellung u. s. w. S. 28.

4) Journal de physique. T. 46. p. 108.

5) De act. Gas oxygenii per pulm. respir. Hafn. 1800. Im Nord. Archiv. Bd. 2. Hft. 2. S. 184.

6) Essais. London. 1795. II. p. 144.

7) Mém. sur la respiration u. s. w.

8) Researches concerning nitrous oxyde, London, 1800. p. 435.

Borelli<sup>1)</sup> und Goodwyn<sup>14)</sup>, Rite<sup>1)</sup>, Allen und Penn<sup>17—18)</sup>, Herboldt zwischen 25—29<sup>2)</sup>; Cappello<sup>3)</sup>, Fürin<sup>7)</sup>, Sauvages<sup>8)</sup>, Hales<sup>9)</sup>, Haller<sup>10)</sup>, Chaptal<sup>11)</sup>, Bell<sup>12)</sup>, Fontana<sup>13)</sup>, Menzies<sup>14)</sup>, Richerand<sup>15)</sup>, dieselbe zwischen 30 und 40 Cubikoll an.

Zur Bestimmung der, auch nach dem Ausathmen in den Lungen bleibenden Luft muß bemerkt werden, daß:

1) die Lungen nach dem Ausathmen, so lange die Brusthöhle noch nicht geöffnet ist, und sie noch nicht herausgenommen wurden, eine größere Menge von Luft enthalten als nach dem jene Veränderungen erfolgt sind, indem sie beim Öffnen der Brusthöhlenwände zusammenfallen, und eine ansehnliche Menge von Luft aus ihnen hervorgepreßt wird;

2) die

1) De motu animal. P. II, propos. 81.

2) Erfahrungsm. Unters. der Wirkung des Ertrinkens u. s. w. Leipzig. S. 33.

3) Ueber Wiederherstellung scheinbar tochter Menschen. S. 19.

4) A. a. O.

5) Nord. Archiv. Bd. 1. Hft. 2. S. 207.

6) Ueber Anwendung der Gasarten.

7) Diss. physio. mathem. Lond. 1752. Diss. IV. p. 4. bei Haller de part. c. h. fabr. T. VI. p. 525.

8) Bei Haller. Elem. physiol. T. III. p. 254.

9) Statical Essays. I. p. 258.

10) Elem. physiol. T. III. a. a. O.

11) Chemie. Bei Boström über das Athmen. S. 129.

12) Anatomy. Vol. 2. p. 165.

13) Phil. Transact. 1779. p. 349.

14) De respir. Edinb. 1790. Grew's Journal d. Physik. Bd. 4.

15) Physiologie. T. I. p. 574.



2) die noch übrige Luft sehr schwer, ja gar nicht vollständig herausgepreßt wird, selbst kaum durch die größten Gewichte im luftleeren Raume.

Nach um die Menge der nach dem Ausathmen noch in den Lungen befindlichen Luft auszumitteln, hat man verschiedene Methoden angegeben.

Entweder wurde der Raum zwischen den Brusthöhlenwänden und der Lunge, nachdem diese durch Oeffnung der Brusthöhlenwände zum Zusammensinken gebracht wurden, beim, durch Binden des Unterleibes möglichst fixirtem Zwerchfelle, mit Wasser angefüllt, dessen Cubikinhalte dem der Luft, welche theils durch dasselbe, theils schon vorher durch die Brustwunden eindrang und die Lunge zusammendrängte; und der dadurch aus der Lunge getriebenen gleich zu setzen seyn mußte <sup>1)</sup>.

Oder die aus den Lungen in dem Augenblicke der Oeffnung der Brusthöhle tretende Luft wurde in einer, an dem vordern Ende der Luftröhre angebrachten Blase aufgefangen und selbst gemessen <sup>2)</sup>, hierauf die Lunge, deren specifisches Gewicht vorher als dem des Wassers ungefähr gleich, und deren absolutes Gewicht bekannt war, in ein Gefäß mit Wasser getaucht, das dadurch aus seiner Stelle verdrängte Wasser gewogen, und dadurch der Cubikinhalte der noch in den Lungen vorhandenen Luft bestimmt.

Nach beiden Methoden kann man als die Mittelzahl der nach einem vollkommenen Ausathmen noch in den Lungen eines Erwachsenen vorhandenen Luftmenge ungefähr 110 ansehen, indem Woodwyn an 90 — 120 Cubizoll Wasser in jenen Raum

1) Woodwyn über Urs. des Ertrinkens. Leipzig 1790. S. 27.

2) Eline bei Allen und Pepys a. a. M.

Raum einbringen konnte, in den Versuchen von Allen und P e p p s die zuerst aufgefangene Luft 31,580 Cubitzoll betrug, die eingetauchten Lungen, welche 4 Pfund wogen, und wegen Gleichheit des specifischen Gewichtes denselben Raum als gleich viel Wasser einnahmen, 6 Pfund Wasser aus der Stelle verdrängten, mithin noch eine Luftmenge, welche 1 Unze Wasser, d. h. 59,554 Cubitzollen gleich kam, in den Lungen vorhanden seyn mußte. Diese beiden Summen würden etwas über 91 Cubitzolle für die nach dem Ausathmen in den Lungen übrig bleibende Luft geben, die, wegen des auf die Lungen im Wasser angebrachten Druckes und der höhern Temperatur während des Lebens, sehr wohl auf ungefähr 110 Cubitzolle vermehrt werden können.

Rechnet man zu diesen 110 Cubitzollen Luft, welche sich in der Lunge noch nach dem gewöhnlichen Ausathmen finden, ungefähr 30 Cubitzolle, welche bei einem gewöhnlichen Athemzuge eines gesunden Mannes eintreten, indem sich diese Zahl als die Mittelzahl ergibt, und die weit niedrigeren wahrscheinlich einer ungewöhnlichen Kleinheit der Lungen, oder einer nicht ganz genauen Art zu experimentiren zuzuschreiben sind, die weit höhern in ungewöhnlicher Entwicklung der Brusthöhle und besonderer Tiefe des Athmens begründet seyn dürften, und bemerkt, daß diese durch die Wärme des Körpers ungefähr um  $\frac{2}{3}$  erhöht wird, so würden sich für die Capacität der Lunge beim gewöhnlichen Einathmen 145 Cubitzolle ergeben, mithin die Differenz der Capacität der ausgedehnten und der zusammengezogenen Lunge ungefähr 35 seyn.

Allein dieser Unterschied vergrößert sich bei mehr als gewöhnlicher Ausdehnung und Zusammenziehung durch ungewöhn-

gewöhnlich tiefe Athemzüge weit bedeutender, indem man sowohl eine weit größere Luftmenge ein- als ausathmen kann.

So zog Seguin bei einem sehr tiefen Einathmen 130 Cubikzoll ein <sup>1)</sup>, welche durch die Wärme des Körpers sich auf 150 ausdehnen mußten, so daß die Lungencapacität bis auf 260 Cubikzolle stieg. Rite setzt die Capacität der Lunge 300 Cubikzollen gleich <sup>2)</sup>.

Jürin dagegen athmete 220 <sup>3)</sup>, Herholdt 208 <sup>4)</sup> Cubikzolle aus. Nimmt man hier an, daß diese Ausathmungen nach einem vollen Einathmen geschehen, so würde die Capacität der Lunge bis auf 52, ja selbst auf 40 Cubikzolle vermindert werden, eine Angabe, die sehr genau mit der von Davy auf einem andern Wege erhaltenen <sup>5)</sup> übereinstimmt, zwischen der höchsten Ausdehnung und Zusammenziehung der Lunge, wenn man die Maaße von Seguin und Jürin einander entgegensezt, und die Volumsverminderung der ausgeathmeten Luft auch gar nicht berücksichtigt, eine Differenz von 220 entstehen, und die Lunge im höchst zusammengezogenen Zustande sich zu der im höchst ausgedehnten wie 1:6,5 verhalten.

g. Kräfte.

1) Observat. gén. sur la respiration et sur la chaleur animale, Journal de physique. 1790. p. 467. Bei Herholdt im Nord. Archiv. Bd. 2. Hft. 1. S. 40.

2) Ueber die Wiederherst. scheinbar tochter Menschen. Leipzig. 1790.

3) Bei Haller a. a. D. S. 326.

4) A. a. D. S. 41.

5) A. a. D. S. 409.

## g. Kräfte der Lunge.

## §. 2313.

Die Lunge besitzt keine sehr hoch-gesteigerte Empfindlichkeit, vermöge ihrer queren Muskelfasern und der muskelfähnlichen Längenfaseru kommt ihr Zusammenziehungsvermögen zu, welches auch nach Versuchen \*) durch Reizung sowohl ihrer äußern als innern Oberfläche in Thätigkeit tritt, und selbst ohne Reizung Bewegungen hervorbringt \*\*), welche nicht von den Bewegungen der Brusthöhlenwände abhängen können, da sie auch nach Zerstörung derselben Statt finden und nicht mit ihnen synchronisch sind \*\*). Die Luftwege verengen sich daher beim Ausathmen thätig; dagegen lassen sich alle Erscheinungen, welche man für ein Ausdehnungsvermögen, welches thätige Erweiterung beim Einathmen bewirkte, angeführt hat, völlig befriedigend auf andre Weise erklären \*).

## h. Verrichtung der Lunge.

## §. 2314.

Die Function der Lungen ist das Athmen, dessen Wesen Umwandlung des venösen Blutes in arteriöses durch Ausstoßung von Kohlen säure und Aufnahme von Sauerstoff ist. Die atmosphärische Luft dringt beim Einathmen in

1) Varnier in Mém. de la Soc. roy. de médec. ann. 1779.

2) Rudolphi über das Athemholen. In dessen anat. ph. Abh. S. 111. Flormann ebendas. S. 110.

3) Brémont Expériences sur la respiration. M. de Paris. 1759. p. 455 ff. Der indessen mehrere Erscheinungen als Beweise anführt, die in der That keine Kraft haben.

4) J. D. Herholdt über die chirurgische Behandlung der Brustwunden, veranlaßt durch neue Versuche über den Mechanismus des Athemholens. Pfaff's und Scheel's Nord. Archiv. Bd. 2. St. 1. S. 44—60.

in die Lunge; und die mit Kohlenäure beladene wird beim Ausathmen ausgestoßen. Diese Umwandlung des Blutes, und die zugleich durch das Verdunsten des ausgehauchten Wassers bewirkte Abkühlung sind die wichtigsten Functionen der Lunge. Außerdem ist der Wechsel ihres Umfangs für den Blutlauf nicht gleichgültig, sofern beim Einathmen das Blut sich in den Lungenpulsadern freier von dem rechten Herzen aus bewegt, und beim Ausathmen durch die Lungenblutadern stärker zum Herzen getrieben wird.

B. Geschlechtsverschiedenheiten.

§. 2315.

Die männliche Lunge ist mehr oder weniger größer als die weibliche, und die Gestalt der letztern etwas länglicher.

C. Periodische Verschiedenheiten \*).

§. 2316.

Die Lunge bietet in Hinsicht auf 1) Anwesenheit, 2) Lage, 3) Gewebe, 4) Farbe, 5) enthaltene Substanzen, 6) Größe, 7) absolutes und relatives Gewicht bedeutende periodische Verschiedenheiten dar.

1) Anwesenheit. Die Lunge ist eines von den am spätesten erscheinenden Organen, indem sie erst am Ende des zweiten Embryomonates mit Bestimmtheit sichtbar wird.

2) Lage.

1) a. Für die Entwicklungsverschiedenheiten der Lunge überhaupt:  
F. Meckel Beiträge zur Bildungsgeschichte des Herzens und der Lunge. Deutsches Archiv. II. 402.

b. Für die Verschiedenheit zwischen den Lungen des Kindes vor und nach dem Athmen insbesondere:

W. J. Schmitt neue Versuche und Erfahrungen über die Ploucquet'sche und hydrostatische Lungenprobe. Wien. 1806.

2) Lage. Wegen verhältnißmäßig ansehnlicherer Größe des Herzens, eigner geringerer Entwicklung liegt die Lunge vor der Geburt und vor dem Eintritte des Athmens weiter nach hinten als nachher, so daß sie bisweilen bei Oeffnung der Brusthöhle gar nicht wahrgenommen wird, bedeckt daher den Herzbeutel weniger, und füllt gewöhnlich den Brustfellsack nicht ganz aus, ist daher mit den Wänden der Brusthöhle nicht in Berührung.

3) Gewebe. Schon im Anfange des dritten Monats ist das Knorpelgewebe in dem luftführenden Theile der Lunge sehr deutlich. Anfangs werden die Lappchen durch ein weiches Zellgewebe lockerer zusammengehalten als in spätern Perioden, allein aus weniger feinen untergeordneten Lappchen zusammengesetzt, so daß also auch hier, wie in andern Theilen, z. B. den Muskeln, die homogene Masse früher in die größern, und erst allmählich in die kleinern Abtheilungen zerfällt.

4) Farbe. Die Farbe der Lunge ist beim Fötus anfangs weißröthlich, desto weißlicher, je näher er seinem Ursprunge ist. Allmählich wird sie in demselben Verhältniß dunkelroth, als mehr Blut in sie tritt. Nach der Geburt verändert sich in Folge des Athmens die dunkle Röthe in eine hellere, die allmählich wieder dunkler wird. Um das zwanzigste Jahr wird sie grau, bläulich und schwärzlich gesprenkelt, und diese dunklere Färbung nimmt allmählich so zu, daß sie im höhern Alter mehr oder weniger allgemein schwarz oder schwarzblau ist.

5) Enthaltene Substanzen. Die Luftröhre und ihre Verzweigungen enthalten nach der Geburt bloß Luft, und eine geringe Menge wässerigen Dunstes und Schleimes. Anders verhält es sich beim Fötus, indem hier die Luftröhre mit Schafwasser angefüllt ist, welches nach hydraulischen

Gefäßen, sofern der Fötus in ihm schwimmt, in sie, ohne Athembewegungen eindringt, und gewöhnlich während der Geburt ausfließt, seltner länger verweilt und dann Ursache des Scheintodes des Neugeborenen seyn kann <sup>1)</sup>.

6) Größe. Eben so ist die Lunge anfänglich weit kleiner, so daß sie einen weit geringern Raum als das Herz einnimmt, und die stark ausgedehnten Vorhöfe des letztern leicht für sie gehalten werden. Erst um den Eintritt der Mannbarkeit gelangt sie ihre normale verhältnismäßige Größe.

7) Absolutes und relatives Gewicht. Das absolute Gewicht der Lungen nimmt von ihrem Sichtbarwerden bis zur vollendeten Ausbildung des Körpers zu; nach der Geburt und durch das Athmen aber werden sie, wegen des in größerer Menge eindringenden Blutes gewöhnlich plötzlich, also im Verhältniß zum Körper, schwerer, nach mehreren Angaben doppelt so schwer, so daß das Verhältniß sich von 70:1 in 35:1 umwandelt.

8) Specifisches Gewicht. Das specifische Gewicht der Lungen bietet die auffallendste periodische Verschiedenheit dar, die von dem Eintritte ihrer Function nach  
der

---

1) P. Scheel commentatio de liquoris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura et usu ejusque in Asphyxiam neonatorum et medicinam forensam influxu, cui adjectus est appendix sistens quaedam generaliora de liquore amnii. Hafniae. 1799.

Herholdt in Reil's Archiv. Vol. III. 5. 168.

Derselbe ein Beitrag zur Geschichte der Entdeckung des Schafwassers in der Luftröhre des Fötus in Pfaff's und Scheel's Nord. Archiv. Bd. I. S. 212 ff.

Meckel's Anat. 4. Th.

der Geburt abhängt. Die, vor dem Athmen specifisch schwerern Lungen werden durch die ersten vollkommenen Athemzüge, indem die eingeathmete Luft nie ganz ausgestoßen wird, von nun an für das ganze Leben specifisch leichter als das Wasser, schwimmen daher, statt daß sie vorher zu Boden sanken.

§. 2317.

Die meisten der angegebenen Verschiedenheiten, namentlich die in Hinsicht auf Lage, Größe, Farbe und specifisches Gewicht Statt findenden, treten mehr oder weniger mit der Geburt und durch das Athmen ein. Die durch die eingetretene und nicht völlig wieder ausgestoßene Luft leichter gewordene Lunge nimmt auch nach dem Ausathmen einen größern Raum ein, liegt daher weiter nach vorn, bedeckt den Herzbeutel größtentheils, und steht mit den Wänden der Brusthöhle in Berührung; die vor dem Athmen durch das venöse Blut dunkelrothe Lunge wird hellerroth, die, im zusammengefallnen Zustande weniger blutreiche und daher leichtere Lunge wird, wenn sie, durch das Athmen ausgedehnt, dem Blute zugängiger geworden ist, schwerer.

Hiernach hat man diese Verschiedenheiten als Prüfungsmittel angesehen, um auszumitteln, ob ein Kind geathmet habe, also lebend geboren worden sey oder nicht, und auf das verminderte specifische Gewicht, und die dadurch bewirkte Schwimmfähigkeit der Lungen; die hydrostatische Lungenprobe <sup>1)</sup>, auf das durch den Bluteintritt vermehrte absolute und zum Körper relative Gewicht

des

<sup>1)</sup> F. Olberg de docimasia pulmonum hydrostatica. Halae. 1791.



derselben die Blutungenprobe <sup>1)</sup> gegründet und festgestellt, daß ein Kind, dessen Lungen im Wasser schwimmen, und das angegebne oder ein ähnliches relatives Gewicht zum Körper haben, gelebt und geathmet habe.

Im Allgemeinen sind auch diese Schlüsse in der That richtig, sie werden aber insofern bedeutend eingeschränkt, als:

1) die Lungen durch das Athmen ohne Statt gesunde Geburt specifisch leichter werden können;

2) die Lungen auch auf andre Weise als durch das Athmen schwimmfähig werden können;

3) nicht nothwendig durch diesen Proceß diese Veränderung erleiden;

4) auch ohne Statt gesundnes Athmen bisweilen jene größere Schwere haben;

5) auf entgegengesetzte Weise nach dem Athmen absolut so schwer, als, der angegebenen Annahme nach, vor dem Eintritte desselben sind.

Wirklich findet:

1) bisweilen während der Geburt hinlänglich tiefes Athmen Statt, um die Lungen zum Schwimmenfähig zu machen, ungeachtet das Kind bei Beendigung der Geburt todt seyn kann <sup>2)</sup>.

Ferner werden 2) die Lungen, außer dem Athmen

a) durch Einblasen von Luft durch Mund und Nase, sowohl so lange sie sich noch im Körper befinden, als nachdem sie herausgenommen worden sind, völlig schwimmfähig;

b) bringt Fäulniß dieselben Erscheinungen hervor.

§ 2

3) Daß

1) G. G. Ploucquet commentar. med. in processus criminales super homicidio, infanticidio et embryoctonia. Argent. 1787.

2) Fälle bei Schmitt a. a. O. über das Athmen unter der Geburt. S. 150 — 176.

3) Daß andrerseits die Lungen nicht nothwendig durch das Athmen diese Veränderung erleiden, ergiebt sich aus mehreren Beobachtungen, wo einzelne Theile der Lunge einer Seite, selbst die ganze eine Lunge, durchaus nicht schwimmfähig waren, ungeachtet Leben, Athmen und Schreien nicht nur mehrere Tage <sup>1)</sup>, sondern selbst bis auf sechs Wochen Statt gefunden hatte. Ich selbst habe einmal bei einem sechswochenlichen Kinde den ganzen mittlern Lappen der rechten Lunge, und bei einem andern vierwöchentlichen große Abtheilungen derselben zwar dem Anschein nach gesund, aber durchaus nicht schwimmfähig gefunden.

Am gewöhnlichsten bleibt auf diese Weise die linke Lunge in der Entwicklung gehemmt, unstreitig weil der rechte Luftröhrenast beträchtlich kürzer und weiter als der linke ist, so daß man auch gewöhnlich bei bald nach der Geburt gestorbenen Kindern mit vollkommener Schwimmfähigkeit dieser Lunge die linke nicht oder nur unvollkommen schwimmfähig findet <sup>2)</sup>.

Wenigstens findet nur höchst selten das Gegentheil Statt.

a) Am seltensten ist krankhafte Veränderung des Gewebes der Lunge, Auschwüzung, Verhärtung, die Veranlassung, da vor der Geburt diese Umwandlungen sehr selten eintreten, und  
auch

1) Kalt Schmied de exper. pulm. infant. sq. injectis. Jene. 1751.

2) A. Portal Mém. dans lequel on démontre l'action du poumon sur l'Aorte pendant le temps de la respiration, et où l'on prouve que dans l'enfant qui vient de naître, le poumon droit respire avant le gauche. Mém. de Paris 1769. Daraus in Portal Mém. T. I. Mit Unrecht schreibt man Petit hin und wieder diese Entdeckung zu, da er (M. de Paris 1733.) nur von einem einzelnen Fall redet, und gar nicht die wahre Ursache auffindet.

auch ein hoher Grad derselben die Lungen nicht specifisch schwerer als das Wasser macht.

b) Häufiger sind Anwesenheit fremder Körper, namentlich Schleim oder Fruchtwasser in den Luftröhrenästen, oder Schwäche, wodurch Unvollkommenheit des Einathmens, mithin der Ausdehnung der Lunge bewirkt wird, Ursache.

c) Zu bemerken ist auch, daß diese Veränderung des specifischen Gewichtes nur allmählich und bei völlig energischem Athmen eintritt, anfangs und bei nicht ganz kräftigem Athmen dagegen sich nur über einzelne Theile der Lunge erstreckt, ja durch die ersten Athemzüge bisweilen selbst gar nicht bewirkt wird.

4) Daß, auch ohne Statt gesundnes Athmen bisweilen die Lungen absolut und dadurch relativ zum Körper auf ähnliche Weise so schwer sind als sie durch das Athmen werden, ergiebt sich aus Beobachtungen, wo das Verhältniß der Lunge zum Körper sogar günstiger, namentlich wie  $1:15\frac{1}{2}$ ;  $29\frac{1}{2}$ ;  $3\frac{1}{2}$ ;  $32\frac{1}{2}$ ;  $34\frac{1}{2}$  war <sup>1)</sup>, ungeachtet kein Athmen Statt gefunden hatte.

Dies ist besonders bemerkenswerth, sofern zugleich die Lungen blutvoller als gewöhnlich waren.

5) Eben so beweisen Beobachtungen, daß bisweilen die Lungen lebendgeborener Kinder verhältnißmäßig selbst leichter sind als die Lungen todtgeborener nach der frühern Angabe <sup>2)</sup>, indem es sich wie  $1:77\frac{1}{2}$ ;  $77\frac{1}{2}$ ; 104 fand.

1) Schmitt a. a. O. S. 138.

2) Derselbe ebend.

## II. Regelwidrige Beschaffenheit 2).

## L u n g e n.

## §. 2318.

I. Formfehler. A. Ursprüngliche. Die Lungen weichen verhältnismäßig nur selten durch einen Fehler der ersten Bildung vom Normal ab; doch finden sich sowohl quantitative als qualitative Mißbildungen derselben.

1) Die quantitativen erscheinen auch hier gewöhnlich

a) als Hemmungsbildungen.

Hieher gehört namentlich

a) Mangel der Luftröhre oder einer, auch beider Lungen. Die letztere Bedingung findet gewöhnlich bei der wahren Kopflosigkeit Statt, die erstere, in der That weit seltener, kommt auch in übrigens regelmäßig gebildeten Körpern vor, und erinnert lebhaft an die bei mehreren Schlangen normale Einfachheit der Lunge.

Der Mangel der Luftröhre kommt häufiger mit, seltener ohne Mangel der Lungen vor, wo diese dann, gleichfalls wie bei mehreren Amphibien, unmittelbar auf den Kehlkopf folgen.

β) Enge und Verschließung der Luftröhre, die mit Schädellosgkeit beobachtet wurde 2).

γ) Kleinheit einer oder beider Lungen. Die erstere wird gewöhnlich mechanisch durch ein äußeres Hinderniß, namentlich die Anwesenheit von Unterleibsorganen in der Brust-

1) Van den Bosch commentatio exhibens anatomiam systematicam respirationi inservientis pathologicam. Haarlem. 1801.

2) Otto Monstr. sex disq. p. 10. 11.

Brusthöhle beim Zwerchfellsbruch, veranlaßt, die letztere, welche mit Kleinheit des Brustkastens vereinigt zu seyn pflegt, ist in einer ursprünglichen dynamischen Abweichung der bildenden Thätigkeit von der Regel begründet, und kommt sowohl mit übrigen regelmäßiger Anordnung, als andern Hemmungen auf einer frühern Bildungsstufe vor.

a) Das bisweilen beobachtete Freiliegen der Lunge oder Luftröhre gehört, sofern es in einer Hemmung der Brusthöhlenwände auf einer frühern Bildungsstufe begründet ist, gleichfalls hieher.

b) Folge eines Uebermaßes der bildenden Thätigkeit ist die, gewöhnlich mit Mangel einer Lunge vergesellschaftete regelwidrige Größe der andern.

2) Qualitative Bildungsabweichungen sind:

a) ungewöhnliches Zerfallen, welches sich an den Lungen durch Anwesenheit mehrerer Lappen, oder stärkere Trennung der gewöhnlich vorhandnen, an der Luftröhre durch Theilung derselben in drei Äste ausdrückt. Das letztere kommt nach den vorhandnen Beobachtungen nur auf der rechten Seite vor und ist merkwürdig, weil es eine Wiederholung des Baues der Wiederkäuer und Cetaceen ist.

b) Auf entgegengesetzte Weise ist bisweilen die gewöhnliche Abtheilung in größere Lappen nicht, oder undeutlich vorhanden.

c) Seitliche Umkehrung, so daß die rechte Lunge nur aus zwei, die linke aus drei Lappen besteht, eine Anordnung, die gewöhnlich nur mit allgemeiner seitlicher Umkehrung vorkommt.

B. Erworbne. Später, zufällig entstandne, reine Formfehler sind besonders Verwundungen, welche

## II. Regelwidrige Beschaffenheit 2).

## L u n g e n.

## §. 2318.

I. Formfehler. A. Ursprüngliche. Die Lungen weichen verhältnismäßig nur selten durch einen Fehler der ersten Bildung vom Normal ab; doch finden sich sowohl quantitative als qualitative Mißbildungen derselben.

1) Die quantitativen erscheinen auch hier gewöhnlich

a) als Hemmungsbildungen.

Hieher gehört namentlich

a) Mangel der Luftröhre oder einer, auch beider Lungen. Die letztere Bedingung findet gewöhnlich bei der wahren Kopflosgkeit Statt, die erstere, in der That weit seltener, kommt auch in übrigens regelmäßig gebildeten Lungen vor, und erinnert lebhaft an die bei mehreren Schlangen normale Einfachheit der Lunge.

Der Mangel der Luftröhre kommt häufiger mit, seltener ohne Mangel der Lungen vor, wo diese dann, gleichfalls wie bei mehreren Amphibien, unmittelbar auf den Kehlkopf folgen.

β) Enge und Verschiebung der Luftröhre, die mit Schädellosgkeit beobachtet wurde 2).

γ) Kleinheit einer oder beider Lungen. Die erstere wird gewöhnlich mechanisch durch ein äußeres Hinderniß, namentlich die Anwesenheit von Unterleibsorganen in der Brust.

1) Van den Bosch commentatio exhibens anatomiam systematicam respirationi inservientis pathologicam. Haarlem. 1801.

2) Otto Monstr. lax disq. p. 10. 11.

Brusthöhle beim Zwerchfellsbruch, veranlaßt, die letztere, welche mit Kleinheit des Brustkastens vereinigt zu seyn pflegt, ist in einer ursprünglichen dynamischen Abweichung der bildenden Thätigkeit von der Regel begründet, und kommt sowohl mit übrigen regelmäßiger Anordnung, als andern Hemmungen auf einer frühern Bildungsstufe vor.

a) Das bisweilen beobachtete Freiliegen der Lunge oder Luftröhre gehört, sofern es in einer Hemmung der Brusthöhlenwände auf einer frühern Bildungsstufe begründet ist, gleichfalls hieher.

b) Folge eines Uebermaßes der bildenden Thätigkeit ist die, gewöhnlich mit Mangel einer Lunge vergesellschaftete regelwidrige Größe der andern.

2) Qualitative Bildungsabweichungen sind:

a) ungewöhnliches Zerfallen, welches sich an den Lungen durch Anwesenheit mehrerer Lappen, oder stärkere Trennung der gewöhnlich vorhandenen, an der Luftröhre durch Theilung derselben in drei Äste ausspricht. Das letztere kommt nach den vorhandenen Beobachtungen nur auf der rechten Seite vor und ist merkwürdig, weil es eine Wiederholung des Baues der Wiederkäuier und Cetaceen ist.

b) Auf entgegengesetzte Weise ist bisweilen die gewöhnliche Abtheilung in größere Lappen nicht, oder undeutlich vorhanden.

c) Seitliche Umkehrung, so daß die rechte Lunge nur aus zwei, die linke aus drei Lappen besteht, eine Anordnung, die gewöhnlich nur mit allgemeiner seitlicher Umkehrung vorkommt.

B. Erworbne. Später, zufällig entstandne, reine Formfehler sind besonders Verwundungen, welche

wegen Größe der Blutgefäße, oft sogleich, wegen Wichtigkeit des Organs in Folge der dadurch veranlaßten Entzündung und Vereiterung, außerdem auch später, aber durchaus nicht nothwendig und immer tödtlich sind.

Hierher gehört auch regelwidriger Zusammenhang mit andern Höhlen, der sich bisweilen in Folge vorangegangener Zerstörung der Wände bildet, namentlich mit der aneurysmatischen Aorta <sup>1)</sup>, wobei die Oeffnung gewöhnlich, wegen der Ortsverhältnisse der Theile, in den untern Theil der Luftröhre oder in den linken Ast derselben geschieht.

#### §. 2319.

II. Fehler des Gewebes sind:

1) Entzündung, welche sich in Hinsicht auf den Sitz vorzüglich auf dreifache Weise unterscheidet, sofern sie entweder die ganze Substanz der Lunge, (Lungenentzündung, Pneumonia), oder die Schleimhaut der Luftröhre (Tracheitis l. Bronchitis), oder das Brustfell (Plauritis) betrifft.

Die gewöhnlichsten Folgen der erstern sind

a) Verdichtung und Verhärtung des Gewebes der Lunge in Folge von Ausschwitzung, welche oft einen bedeutend hohen Grad erreicht, und dann den Namen der Leberumwandlung (Hepatisatio) erhält. Hierbei ist die Substanz der Lungen gewöhnlich zugleich homogen, brüchig, bröcklig, die Farbe grauweiß, das Gewicht bedeutend vermehrt, so daß sie bisweilen specifisch schwerer als Wasser sind;

b) Ver-

1) A. Richerand obs. sur l'ouverture des anévrismes de l'aorte dans la trachée artère et les bronches. Mém. de la Soc. médic. d'émulation. T. IV. p. 545.



b) Vereiterung, wo sich dann der Eiter unter den gewöhnlichen Bedingungen einen Weg in die Luftröhrendäste, seltner in die Brusthöhle (Empyema), oder in benachbarte Organe, z. B. den Schlund<sup>1)</sup>, die Niere, bahnt.

Die Entzündung der Luftröhrenschleimhaut geht entweder in Bildung von soliden oder hohlen Membranen durch Ausschüßung, welche ihre Höhle anfüllen, selten mit ihrer innern Fläche verwachsen, oder in Vereiterung über. Höchst wahrscheinlich entstehen indessen jene Membranen nicht nothwendig immer in Folge vorangegangener Luftröhrenentzündung.

Folgen von Brustfellentzündung sind 1) Verdickung, Verhärtung desselben; 2) Ausschüßung von Serum, welche, wenn die Gerinnbarkeit desselben nicht erhöht ist, Brustwassersucht (Hydrothorax) oder, im entgegengesetzten Falle, Verwachsung der einander entgegengewandten Flächen des Brustfelles bewirkt.

2) Als neue Bildungen kommen in den Lungen besonders Tuberkeln vor.

3) Wiederholungen regelmäßiger Gewebe sind eine seltne Erscheinung; doch gehören hieher die in Folge der Brustfellentzündung entstandnen Pseudomembranen als Wiederholungen des Zellgewebes und regelwidrige Knochenbildungen, welche nicht selten in Gestalt länglicher, dünner Platten an der äußern Fläche des Brustfelles, seltner an seiner innern Fläche rundliche, anfangs festigende, dann sich trennende Körper darstellt. Die angebliche Verknoorpelung der Lungen-

Ge 5 sub

1) G. Kunze de dysphagia, imprimis oesophages, a causis organicis, adjecta nova morbi historia tabulaque aenea. Lips. 1819.

Substanz ist wahrscheinlich meistens nur Verhärtung durch Auschwüzung; doch erzeugt sich bisweilen in der That regelwidrig Knochengewebe in ihr.

§. 2320.

### III. Als fremde Körper kommen

1) Entozoen vor, namentlich a) in der Substanz der Lunge und an ihrer Oberfläche Hydatiden; b) in der Luftröhre der Fühlwurm (*Hamularia subcompressa*);

2) häufiger zufällig von außen in sie gelangte Substanzen, wozu besonders metallische, steinige Concremente gehören.

## Zweite Unterabtheilung.

### Brusthöhle.

#### I. Regelmäßige Beschaffenheit.

##### a. Vollkommener Zustand im Allgemeinen.

§. 2321.

Die Brusthöhle, welche, außer den Lungen und ihren Gefäßen, das Herz, den Anfang der Aorta, die Stämme der obern und untern Hohlader, die unpaarige Blutader, den Milchbrustgang, die Speiseröhre und das Bruststück des Gangliennerven enthält, und, auf die schon früher (Bd. 2. S. 5.) angegebene Weise zusammengesetzt wird, hat eine sackförmige Gestalt, und ist in ihrem obern Ende am engsten, in ihrem untern gewöhnlich am weitesten, wenigstens hier immer viel weiter als oben, an den Seiten am stärksten gewölbt, vorn am plattesten, von oben nach unten am längsten, von vorn nach hinten am kürzesten, hinten beträchtlich tiefer als vorn, und unten mit einer,  
durch

durch das Zwerchfell gebildet, mehr oder weniger gewölbten Grundfläche versehen. Hinten wird sie durch die Körper der Rückenwirbel unvollkommen in zwei Hälften getheilt. Auf der rechten Seite ist sie, wegen der emporragenden Leber, etwas kürzer als auf der linken.

Die innere Fläche ihrer Wände ist in dem bei weitem größten Theile ihrer Ausbreitung von dem äußern Blatte des Brustfelles bekleidet, welches an sie durch kurzes Zellgewebe geheftet wird. Von den in ihr enthaltenen Theilen werden die, Lungen und das Herz durch die sie umkleidenden serösen Häute, die übrigen unmittelbar durch Zellgewebe mit ihr verbunden.

Die, schon in der knöchernen Brusthöhle durch die Wirbelskörper angedeutete Abtheilung in eine rechte und linke Hälfte wird durch die Mittelfelle vervollständigt.

#### b. Bewegungen der Brusthöhle.

##### §. 2322. /

Die Brusthöhle befindet sich in einem beständigen Wechsel von Ausdehnung, Erweiterung, Zusammenziehung und Verengerung. Der erstere Zustand findet beim *Ei n a t h m e n*, der letztere beim *A u s a t h m e n* Statt, und die Bewegungen der Brusthöhle, welche diese Veränderungen hervorbringen, bewirken vorzüglich die gleichzeitig Statt findende Erweiterung und Verengerung der Luftwege, indem die Lungen durch die sich zusammenziehenden Brusthöhlenwände zusammengedrückt werden, so die Luft austreiben, diese dagegen durch die Mund- und Nasenhöhle in sie eindringt, wenn bei Ausdehnung der Brusthöhlenwände der Widerstand, welchen diese im zusammengezogenen Zustande leisteten, vermindert wird.

Die

Die beim Einathmen eintretende Erweiterung, und die ihr entgegengesetzte beim Ausathmen vorhandne Verkleinerung der Brusthöhle findet nach allen Richtungen Statt. Am auffallendsten ist die Verschiedenheit in der Längsrichtung, welche theils durch das beim Einathmen herabtretende, beim Ausathmen sich heraufhebende Zwerchfell, theils durch das Aufsteigen der Rippen mittelst der Zwischenrippenmuskeln und Rippenheber bewirkt wird.

Dieser Vergrößerung zunächst steht die Erweiterung in der Richtung der Breite, welche durch Auswärtsziehen der Rippen hervorgebracht wird.

Bei den Athmungsbewegungen folgen die Wände der Brusthöhle den Lungen genau, und beide bleiben, wenigstens im regelmäßigen Zustande, beim Aus- und Einathmen mit einander in Berührung, so daß man auch nach dem stärksten Ausathmen im Tode diese Ortsbeziehung findet.

#### c. Geschlechtsverschiedenheiten.

##### §. 2323.

Die männliche Brusthöhle erscheint bedeutend geräumiger als die weibliche, indem sie länger, breiter und tiefer ist. Zugleich ist diese überall mehr gleichförmig, daher oben verhältnismäßig etwas weiter, rundlicher und beweglicher, durch die schwächer vorspringenden Rückenwirbelskörper hinten weniger in zwei Hälften abgetheilt.

#### a. Entwicklungsverschiedenheiten der Brusthöhle.

##### §. 2324.

Die Brusthöhle ist verhältnismäßig zu den übrigen Abtheilungen des Körpers in den frühesten Lebensperioden am kleinsten, was vorzüglich mit der sehr unbedeutenden Entwicklung und der Unthätigkeit der Lungen zusammenhängt.

Das

Dagegen ist sie in demselben Maaße elastischer, weil die Rippenknorpel im Verhältniß zu den Rippen weit größer als in spätern Perioden sind \*).

Die Bewegungen der Brusthöhle treten erst mit der Geburt und dem Athmen ein.

## 2. Regelwidrige Beschaffenheit.

§. 2325.

Die Brusthöhle ist in Folge eines Fehlers der Urbildung bisweilen in einem größern oder geringern Theile ihres Umfangs nicht völlig verschlossen, wovon die Folge, wenn diese Abweichung die vordere oder Seitenfläche trifft, Blossliegen der in ihr enthaltenen Theile, wenn die untere Wand auf diese Weise von der Regel abweicht, regelwidriger Zusammenhang zwischen ihr und der Bauchhöhle, gewöhnlich Eindringen einiger der in dieser enthaltenen Theile in sie ist.

Derselbe Zustand kann auch später in Folge von Verletzungen, Geschwüren u. s. w. eintreten.

Ein nicht seltner, angeborener Fehler ist die regelwidrige Kleinheit der Brusthöhle, welche mit Anlage zur tuberkulösen Lungenschwindsucht und analoger unvollkommener Ausbildung der Lungen verbunden zu seyn pflegt.

Die Legerveränderungen, welche die Brusthöhle darstellt, sind vorzüglich Geschwülste verschiedner Art in den Mittelfellen, die bisweilen einen bedeutenden Umfang erreichen, und die in ihr enthaltenen Organe so zusammendrücken, daß

der

---

\*) Vergl. Messungen hierüber bei Lobstein sur la première inspiration de l'enfant nouveau-né. In Leroux J. de méd. T. 55. p. 511. 512.

der Tod in Folge von Erstickung, Hemmung des Kreislaufes und der Ernährung eintritt.

### Dritte Abtheilung.

#### Drüslige Organe in der Gegend der Stimm- und Athmungswerkzeuge<sup>1)</sup>.

§. 2326.

In der Gegend der Stimm- und Athmungswerkzeuge befinden sich zwei unvollkommene Drüsen (Th. I. S. 646.) die Schilddrüse und die Brustdrüse, welche mit einander nicht nur durch die allgemeinen Merkmale der unvollkommenen Drüsen, sondern auch durch ihre Lage in der Mitte, dicht hinter der vordern Fläche des Körpers, vor den Athmungswerkzeugen, übereinkommen, und einander beim frühen Fötus selbst erreichen.

Beide enthalten eine ansehnliche Menge von Blut- und Lymphgefäßen, haben aber keinen Ausführungsgang, sondern aber, vorzüglich die letztere sehr deutlich, in Räume, welche sie enthalten, eine, von ihrer Substanz verschiedene Flüssigkeit ab. Die Umwandlung einer ansehnlichen Menge von Blutes, welches hiedurch wahrscheinlich auf eine bestimmte Weise abgeändert wird, und die Bildung jener Flüssigkeiten sind daher die einzigen mit Bestimmtheit nachzuweisenden Verrichtungen derselben, und man sieht sie hiernach unstreitig an  
rich

1) P. H. Boeckler de thyreoideae, thymi et glandularum suprarenalium functionibus. Argent. 1753.

J. J. Meckel über die Schilddrüse, Nebennieren und einige ihnen verwandte Organe.

In dessen Abhandlungen aus der menschl. und vergl. Anat. Halle, 1806. S. 1 — 277.

richtigsten als, den Saugaderdrüsen im Blutgefäßsystem analoge Organe an, welche zu der Vervollkommnung der Blutbildung beitragen.

Für diese Ansicht spricht die angeführte Thatsache besonders insofern, als das in ihnen umgewandelte Blut und die abgesonderte Flüssigkeit auf einem sehr kurzen Wege in das Venenblut, kurz vor seinem Eintritt in die Lungen, gelangt.

### Erste Unterabtheilung.

#### Schilddrüse 1).

#### I. Regelmäßiger Zustand.

##### A. Vollkommener Zustand im Allgemeinen.

§. 2327.

Die Schilddrüse (Gl. thyreoidea) liegt vor und neben dem obern Theile der Luftröhre und des Schlundes.

Sie

---

1) P. Eversæ de glandula thyreoidea. L. B. 1708. rec. in Haller coll. Diff. T. IV. p. 701—714.

Santorini obs. anat. Cap. VI. 17.

Duvernoi observ. anat. 2. 3. 4. in Comment. Petrop. T. VII. 1740. p. 216—218.

Lauth de glandula thyreoidea. Argent. 1742. 4.

Morgagni Ep. an. Venet. 1763. IX. §. 30—40.

Uttini de glandulae thyreoideae usu. In Comm. Bonon. T. VII. p. 15—23.

Lalouette recherches anat. sur la glande thyroide. In Mém. prés. T. I. 1750. p. 159—175.

Günz obs. anat. I. Sur la glande thyroide. Ebenb. p. 283. 284.

Schmidt Müller über die Ausführungsgänge der Schilddrüse. Landshut. 1804.

Boerhaave<sup>1)</sup> und Goodwyn<sup>14)</sup>, Rite<sup>1)</sup>, Allen Perod<sup>17—18)</sup>, Perboldt zwischen 25—29<sup>1)</sup>; Gallo<sup>6)</sup>, Järin<sup>7)</sup>, Sauvages<sup>8)</sup>, Hales<sup>9)</sup>, Haler<sup>10)</sup>, Chaptal<sup>11)</sup>, Bell<sup>12)</sup>, Fontana<sup>13)</sup>, Riles<sup>14)</sup>, Richerand<sup>15)</sup>, dieselbe zwischen 30 und 40<sup>1)</sup> bis 32.

Zur Erklärung der, auch nach dem Ausathmen in Lungen bleibenden Luft muß bemerkt werden, daß:

1) Die Lungen nach dem Ausathmen, so lange die Brüste noch nicht geöffnet ist, und sie noch nicht herausgenommen wurden, eine größere Menge von Luft enthalten als nach den Veränderungen erfolgt sind, indem sie beim Drücken der Brustwand zusammenfallen, und eine ansehnliche Menge von Luft aus ihnen hervorgepreßt wird;

2) b

1) De motu animal. P. II. propos. 81.

2) Erfahrungen. Unters. der Wirkung des Ertrinkens u. s. w. Kurze, S. 11.

3) Ueber Wiederherstellung scheinbar tochter Menschen. S. 19.

4) N. u. D.

5) Werk, Rubin, Bd. 1. Hft. 2. S. 207.

6) Ueber Anwendung der Gasarten.

7) Diss. physio. mathem. Lond. 1732. Diss. IV. p. 4. de Haler  
1<sup>a</sup> de part. c. h. fabr. T. VI. p. 325.

8) Wei Haller. Elem. physiol. T. III. p. 254.

9) Medical Essays. I. p. 258.

10) Klem. physiol. T. III. a. a. D.

11) Chemie. Bei Boström über das Athmen. S. 139.

12) Anatomy. Vol. 2. p. 195.

13) Phil. Transact. 1779. p. 349.

14) De respir. Edinb. 1790. Owen's Journal d. physiol. u. d. pathol. Anat. T. I. p. 374.



## §. 2328.

Gewöhnlich wird es von einem eignen, unpaaren Muskel, dem Heber oder Aufwärtszieher der Schilddrüse (*Levator gl. thyreoideae*) umgeben, der sich im Allgemeinen mit seinem obern Ende an das mittlere Zungenbein heftet, bisweilen aber auch nicht so hoch reicht, sondern sich an den untern Rand des Schildknorpels heftet. Unter dieser Bedingung ist auch das mittlere Horn nur schwach entwickelt.

Dieser Muskel nimmt an der unsymmetrischen Anordnung des mittlern Hornes Theil, gehört daher gewöhnlich mehr der linken Hälfte der Schilddrüse an, heftet sich aber dennoch nicht immer an dieselbe Seite des Zungenbeines oder des Schildknorpels, sondern streicht, dem Halschein nach unsymmetrischer, in der That aber auf eine mehr symmetrische Weise, schräg vor der Luftröhre oder dem Kehlkopf nach der entgegengesetzten Seite, vorzüglich, wenn er sich an den Schildknorpel heftet, wo er sich dann am untern Rande nach außen vom Ring- und Schildknorpelmuskel befestigt.

## §. 2329.

Jedes Horn ist gewöhnlich zwei, der mittlere Theil einen Zoll hoch, die Breite der ganzen Schilddrüse beträgt gegen drei Zoll, die Dicke eines jeden Hornes neun Linien, das Gewicht ungefähr eine Unze.

## §. 2330.

Die Schilddrüse hat eine schmutzigrothe Farbe, ziemliche Härte und Festigkeit, eine glatte Oberfläche, ist nur von einem verdichteten Schleimgewebe, keiner eignen Hülle umgeben, und besteht aus größern und kleinern rundlichen, unregelmäßigen, durch Hüllen von Schleimgewebe umgränzten Läppchen, zwischen welchen sich die Gefäße der Drüse verbreiten. Eine

Höhle enthält sie im regelmäßigen Zustande nicht, doch dringt auf der Durchschnittsfläche sowohl aus den Läppchen, als zwischen ihnen eine reichliche Menge einer blutwasserähnlichen Flüssigkeit hervor.

§. 233 I.

Seit langer Zeit ist die Frage, ob die Schilddrüse Ausführungsgänge besitze, Gegenstand des Streites.

Mehrere Anatomen, namentlich Vater<sup>1)</sup>, Santorini<sup>2)</sup>, Koschwig<sup>3)</sup>, Schmidtmüller<sup>4)</sup>, haben ein- oder mehrfache aus der Drüse in den Kehlkopf, oder die Luftröhre dringende Ausführungsgänge mit mehr oder weniger Bestimmtheit nachweisen zu können geglaubt; vorzüglich ist man geneigt, das mittlere Horn, theils wegen seiner Gestalt, theils wegen gerade in der Gegend seines obern Endes vorkommenden Oeffnungen im Kehlkopfe dafür zu halten; allein offenbar sind die Beobachtungen, welche für diese Meinung angeführt werden, so wenig erweisend, und die Vessern unter den Anatomen, welche sie machten, haben daher selbst so wenig Werth darauf gelegt, daß man unstreitig für jetzt mit Duvornot, Morgagni u. m. A., an der Anwesenheit eigener Ausführungsgänge dieser Drüse zu zweifeln, und am richtigsten die Ganga dera als die einzigen anzusehen hat.

Vielleicht ist der Ausführungsgang, da die Schilddrüse in den frühern Lebensperioden verhältnißmäßig beträchtlich  
groß

1) De nov. duct. subl. in lingua hum. 1724. rec. in Halleri coll. Diss. I. p. 63.

2) A. a. D. S. 115.

3) Ductus saliv. novus plurib. observ. illustr. etc. Halae. 1729. p. 10.

4) A. a. D. S. 45 — 57.

größer, und namentlich das mittlere Horn weit stärker entwickelt ist, anfänglich vorhanden, verschleißt sich aber nachher in dem Maas, als die Drüse in ihrer Entwicklung zurücktritt, wie ursprüngliche unvollkommene Entwicklung der Drüsen sich oft durch Mangel oder Verschließung ihrer Ausführungsgänge ausdrückt.

### B. Geschlechtsverschiedenheiten.

§. 2332.

Eine merkwürdige Geschlechtsverschiedenheit ist die stärkere Entwicklung der Schilddrüse im weiblichen als männlichen Geschlecht.

### C. Periodische Verschiedenheiten.

§. 2333.

Die Schilddrüse ist anfangs aus zwei von einander getrennten Lappen gebildet, und verhältnismäßig beträchtlich größer als bei vollendeter Ausbildung, weicher, blutreicher, und daher röther, das mittlere Horn besonders stärker entwickelt.

### II. Regelwidriger Zustand.

§. 2334.

Die Schilddrüse ist bisweilen, doch, wie schon Morgagni \*) richtig bemerkt hat, sehr selten, völlig in zwei ganz von einander getrennte Hälften zerfallen, eine, wegen der Uebersinkunft dieser Bildung mit dem frühen Embryozustande, und des Vorkommens der bei den meisten Säugthieren normale Gestalt, sehr merkwürdige Abweichung, an welche die beträchtliche Schmalheit des mittlern Theiles eine Annäherung ist.

8 f 2

Pls.

1) Ep. IX. a. 50.

Manchmal ist nur ein Theil eines Lappens von der übrigen Substanz getrennt<sup>1)</sup>).

Eine gewöhnliche, später entstehende, sehr selten angeborene Formveränderung derselben ist die oft ungeheure, in engen Thälern, bergigten Gegenden einheimische Vergrößerung, der Kropf (Struma), der aber sehr häufig keineswegs reine Vergrößerung, sondern bloß Folge von Entwicklung neuer Bildungen oder wenigstens aus beiden Zuständen zusammengesetzt ist.

Die Vergrößerung der Schilddrüse kommt da, wo sie nicht endemisch ist, beim weiblichen Geschlechte weit häufiger als beim männlichen vor, und tritt besonders zur Zeit der Pubertät<sup>2)</sup>, der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes ein.

Die regelwidrigen, in der Schilddrüse vorkommenden Bildungen sind vorzüglich Wiederholungen normaler Systeme, selber, mit verschiedenartigen Flüssigkeiten angefüllter Bälge, Knorpel, Faserknorpel und Knochen, die häufig zugleich vorkommen.

#### §. 2335.

Durch die in diesem Abschnitte angeführten Bedingungen ist die obige Bemerkung, daß die Schilddrüse durch alle diese regelwidrigen Zustände sowohl, als durch ihre Lage und Gestalt die Vorsteherdrüse und Gebärmutter in der obern Körperhälfte wiederholt<sup>3)</sup>,

Hoffent-

1) Haller. Elem. physiol. Tom. III. p. 396.

2) S. einen merkwürdigen Fall, wo sich bei einem Knaben von seinem 14ten Jahre an die Schilddrüse ohne äußere Veranlassung so vergrößerte, daß sie Erstickung verursachte, bei Winslow in Sedillot's Journ. de méd. 57. p. 416 ff.

3) Bd. I. S. 41.

hoffentlich hinlänglich bestätigt, dies um so mehr, da dieselben Abnormitäten oft in demselben Körper an beiden Stellen zugleich gefunden werden.

### Zweite Unterabtheilung.

#### Brustdrüse<sup>2)</sup>.

#### I. Regelmäßiger Zustand.

§. 2336.

Die Brustdrüse (*Glandula thymus* s. *corpus thymicum*) ist ein unregelmäßig viereckiger oder dreieckiger, mit der Grundfläche nach unten, der Spitze nach oben gewandter Körper, welcher den obern und vordern Theil des vordern Mittelfelles einnimmt, dicht hinter dem Brustbein vor der Grundfläche des Herzens und den großen Gefäßstämmen liegt, und mehr oder weniger, ungefähr einen halben Zoll weit, aus der Brusthöhle, an der vordern Fläche des Halses, hier von den Herabziehern des Zungenbeines und des Kehlkopfes bedeckt, hinaufragt.

St 3

St 6

- 
- 1) G. B. Metzger hist. anat. medica Thymi. Tubing. 1679.  
 G. H. Müller Pr. Bidloo de glandula Thymo. L. B. 1705.  
 Verheyen de Thymo. L. B. 1706.  
 G. Bidloo defens. exerc. de Thymo. L. B. 1707.  
 J. G. Duvernoi. Comm. Patr. T. VII.  
 A. L. de Hugo de glandulis et speciatim de Thymo. Gotting. 1746. 4.  
 W. Hewson Experimental Inquiries. Part. III. London. 1717.  
 J. J. Meckel über die Schilddrüse, Nebennieren und einige verwandte Organe a. a. O. 1806.  
 Lucä Anatom. Untersuchungen des Thymus in Menschen und Thieren. Frankf. 1811. 1812.

Sie ist beträchtlich mehr hoch und breit als dick, gewöhnlich auch mehr hoch als breit. Nach oben zieht sie sich zwar allmählich zusammen, schwillt aber gewöhnlich in ihrem obern Ende mehr oder weniger beträchtlich an.

§. 2337.

Die Farbe der Thymus ist röthlichweiß; ihre Consistenz weich.

Ihre, nicht sehr ansehnlichen, vorn entspringenden Gefäße treten von oben, hinten und vorn in sie, so daß nicht jeder Lappen seine eigne Stämme hat, und sie immer von verschiedenen Gegenden aus versehen wird.

§. 2338.

Sie wird außer der äußersten Hülle, welche sie von dem vordern Mittelfelle erhält, von einer eignen, weniger dichten und festen, zelligen Scheide umgeben, unter welcher sich in wohlgenährten Körpern Stellenweise, doch nicht sehr reichlich Fett angelagert findet.

Wird diese Hülle weggenommen, so zerfällt die Thymus beinahe von selbst in eine rechte und linke Hälfte, Seitenlappen, welche nur durch lockeres Zellgewebe, und die in sie tretenden Gefäße zusammenhängen, so daß daher in der That richtiger zwei Thymusdrüsen angenommen werden können.

Diese beiden Hälften, welche wieder dreieckig sind, und in ihrer ganzen Länge mit ihren innern Flächen dicht an einander liegen, sind einander zwar an Gestalt und Größe ähnlich, aber nicht gleich, und bisweilen ist die eine um ein Zehntheil größer und schwerer als die andre.

Außerdem erkennt man schon durch die äußere Hülle der Thymus, daß ihre Oberfläche nicht glatt und gleichförmig,  
son-

sondern in mehrere größere und kleinere Lappen abgetheilt ist, welche wieder aus kleinern, weniger tief von einander getrennten, bestehen, zwischen welchen sich eben so wenig als zwischen den beiden großen Seitenlappen, die beiden äußern Hüllensfenken, die aber nur durch lockeres Zellgewebe und Gefäße zusammengehalten werden.

§. 2339.

Auf der Durchschnittsfläche dieses Organs erscheint von selbst oder durch den Druck eine mehr oder weniger reichliche, ziemlich dicke, weißliche, der zwischen dem mütterlichen und kindlichen Theile des Mutterkuchens der Wiederkäuer befindlichen am meisten ähnliche, von seiner eignen Substanz verschiedene Flüssigkeit.

Ueber das Verhältniß der Substanz des Organs und dieser Feuchtigkeit sind die Meinungen getheilt, und hiemit hängt zugleich die Frage zusammen, ob die Brustdrüse eine Höhle enthalte oder nicht?

Nach mehreren findet sich keine Spur dieser Bildung, und jene Feuchtigkeit ist daher in der Substanz der Drüse enthalten; nach andern sind nur die Läppchen derselben wirklich hohl; andre dagegen nehmen eine große Höhle in der Drüse an, deren Wände durch die Substanz derselben gebildet werden.

In der That glaube ich mit Gewißheit der letztern Meinung beitreten zu müssen, indem ich wiederholentlich bei Untersuchungen ganz frischer Brustdrüsen, selbst beim bloßen Einscheiden und dem leisesten Einblasen von Luft, in jedem der beiden Seitenlappen eine große Höhle fand. Diese ist mit einer dünnen, glatten Haut bekleidet, hängt mit den Höhlen der Läppchen zusammen, und enthält die erwähnte Feuchtigkeit in beträchtlicher Menge.

Einigemal fand ich diese weniger deutlich, und es ist daher möglich, daß die Anordnung nicht immer genau dieselbe ist, bisweilen namentlich die größern Seitenhöhlen durch Zwischenwände in mehrere kleinere abgetheilt sind, und selbst der nach der zweiten Ansicht immer Statt findende Bau bisweilen variiert, wozu die so eben erwähnte Anordnung den Uebergang machen würde.

### §. 2340.

Die Brustdrüse besteht nicht das ganze Leben hindurch. Die erste Spur von ihr erscheint im dritten Embryomonat. Anfangs ist sie verhältnißmäßig kleiner als späterhin, und bis zur Reife des Fötus nimmt ihre verhältnißmäßige Größe zu.

Beim reifen Fötus hat sie im Durchschnitt das Gewicht einer halben Unze, so daß es, wenn der Fötus wohl genährt ist, bis auf eine Drachme darüber beträgt.

Sie entsteht von ihrem obern Theile an, vergrößert sich nach unten:

Bis zum Ende des ersten, bisweilen auch des zweiten Lebensjahres wird sie zwar nicht mehr verhältnißmäßig größer, wächst aber doch in demselben Verhältniß als beim reifen Fötus fort.

Von jetzt an schwindet sie, indem sich ihre Gefäße verkleinern und die abgesonderte Flüssigkeit vermindert, auf entgegengesetzte Weise, als sie entstand, von unten nach oben.

Im zwölften Jahre findet sich gewöhnlich keine Spur von ihr, und die von ihr eingenommene Stelle ist mit Fett angefüllt.

Hieraus ergibt sich also, daß die Brustdrüse nur ungefähr den fünften Theil des Lebens hindurch besteht, und schon weit



weit früher die Energie ihrer Function sich bedeutend vermindert. Der Zustand ihrer vollkommensten Ausbildung fällt daher in eine ganz andere Periode als die, in welcher die meisten übrigen Organe sich auf der höchsten Entwicklungsstufe befinden.

## §. 2341.

Ihre Verrichtung ist schon oben im Allgemeinen angegeben. Mehrere Thatsachen machen es wahrscheinlich, daß sie mit dem Athmen in einer sehr nahen Beziehung steht, und sie mehr oder weniger Ersatz für dasselbe sey <sup>1)</sup>. Doch lassen sich beide Ansichten sehr wohl vereinigen, sofern auch nach der vorher aufgestellten die Thätigkeit der Thymus eine Vorbereitung zur vollkommenen Ausbildung des Blutes durch das Athmen ist.

## II. Regelwidriger Zustand.

## §. 2342.

Der regelwidrigste Zustand der Brustdrüse ist Mangel, der gewöhnlich bei gänzlicher Kopfslosigkeit Statt findet.

Kleinheit wird, bei, in Hinsicht auf Zahl der Theile vollkommner Ausbildung besonders mit bedeutend schlechter Ernährung gefunden. Einigemal sahe ich sie auch mit unvollkommner, falscher Kopfslosigkeit.

Selten erscheint sie, unter derselben Bedingung, in mehrere bis auf fünf Lappen zerfallen <sup>2)</sup>.

Tf 5

Ein

1) Meckel a. a. O. und in Cuvier's Vorles. über vergl. Anat. Bd. 4. S. 705 ff.

2) Otto Monst. lex. Francof. 1811. p. 15.

Ein Beharren derselben auf ihrer frühern, höhern Ausbildung kommt bisweilen mit Bildungsfehlern des Herzes und Zuständen der Lunge vor, welche die vollkommne Ausbildung des Blutes verhindern <sup>1)</sup>, und spricht für die angemessene Meinung.

Da die Thymus so früh verschwindet, so ist sie verhältnismäßig nur selten der Sitz von Veränderungen des Gewebes, doch gehören hieher Geschwülste verschiedner Art <sup>2)</sup>, ungeachtet sich freilich in vielen Fällen diese wohl nur an der Stelle, und nach schon Statt gefundenem Verschwinden dieses Theiles gebildet hatten,

#### Vierte Abtheilung.

#### Von dem Harnsystem und den Nebenieren.

##### Erste Unterabtheilung.

##### Harnsystem <sup>3)</sup>.

##### I. Regelmäßiger Zustand.

##### A. Vollkommner Zustand im Allgemeinen.

##### §. 2343.

Die Harnwerkzeuge (*Organa uropoetica*) bestehen aus einem harnbereitenden, einem harnabführenden,

1) Meckel's Pathol. Anat. Vb. I. S. 488.

2) Meckel's Abb. S. 234 ff.

3) G. Beudt de fabrica et usu viscerum uropoëticorum. L. B. 1744.

J. Fantoni de renibus et primum de succenturiatis, de uretribus et vesica. Diss. renov. Tauri 1745.

A. Richerand Ném. sur l'appareil urinaire in Mém. de la soc. méd. d'émul. Vol. 4. p. 505.

- den, einem harnaufbewahrenden und einem harna-  
ausführenden Theile, nämlich den Nieren, den Harn-  
leitern, der Harnblase und der Harnröhre. Die drei  
letztern kann man dem erstern entgegenstellen. Sie sind bloß  
Secretionsorgane, indem sie nichts dem Organismus heilsames  
von außen aufnehmen, führen im wesentlichsten Bestandtheile  
des Harns, dem Harnstoff, den überschüssigen Stickstoff  
aus, und entsprechen in der untern Körperhälfte den Respira-  
tionsorganen in der obern durch Gestalt und Lage,

# I. Nieren <sup>1)</sup>.

## a. Zahl und Lage.

§. 2344.

Der wesentlichste Theil des Harnsystems, die Nieren  
(Renes), sind im Normalzustande doppelt, eine rechte und  
eine linke, und durchaus von einander getrennt, nirgends  
durch

1) E. Eustachii de renibus libellus. Venet. 1545. 4. Rec. in  
Opp. anat.

J. Loefel Scrutinium renum. Regiom. 1642.

M. Malpighi de renibus. In ex. de viscerum structura.

L. Bellini de structura renum. Florent. 1662.

Bertin Mém. pour servir à l'histoire des reins. Mém. de  
Paris. 1744. p. 108 ff.

A. Ferrein sur la structure des viscères nommés glanduleux,  
et particulièrement sur celle de reins et du foie. M. de  
Paris. 1749. p. 709 ff.

J. F. Droyfen de renibus et capsulis renalibus. Gott. 1752. 4.

A. Schumlan sky de structura renum. Argent. 1785. rec.  
ibid. 1788.

C. W. Eysenhardt de structura renum observationes mi-  
croscopicae. Berol. 1818.

durch ihre Substanz unmittelbar, nur mittelbar durch die Harnblase zu einem Ganzen verbunden. Sie liegen in der Lendengegend, durch sehr lockeres, gewöhnlich viel Fett enthaltendes Zellgewebe mit benachbarten Theilen verbunden, auf beiden Seiten der Wirbelsäule hinter dem Bauchfelle.

#### b. G e s t a l t.

§. 2345.

Ihre Gestalt ist bohnenförmig, ihre vordere und hintere Fläche eben, ihr äußerer und ihr innerer Rand in seinem obern und untern Theile gewölbt, in der Mitte beträchtlich zur Bildung des Nierenauschnittes (Hilus renalis) vertieft, und hier die Niere ungefähr einen halben Zoll weit in eine vordere und eine hintere Hälfte, zwischen welchen die Blut- und Ausführungsgefäße liegen, auseinander gerissen. Die Nierengefäße liegen hier so, daß der Stamm der Vene am meisten nach vorn, hierauf der Stamm der Nierenpulsader, am meisten nach hinten der Anfang des Harnleiters folgt.

Die Nese der Nierenvene und Arterie kreuzen sich.

Alle drei Gefäße spalten sich, wenn sie den Nierenauschnitt erreichen, am innern Rande der Niere zunächst in drei, bald weiter verzweigte Hauptäste, dann die Blutgefäße abermals in eine vordere und hintere Reihe, welche die Nese des Nierenbeckens zwischen sich aufnehmen.

Alle sind im Nierenauschnitte nur durch lockeres Schleimgewebe und Fett an einander geheftet.

Drei Gefäße treten vorzüglich in den obern Theil des Nierenauschnittes und aus demselben hervor, das Nierenbecken nimmt die untere Gegend desselben ein.

a. Größe

## a. Größe und Gewicht.

## §. 2346.

Die verhältnismäßige Größe der Nieren ist nicht immer dieselbe. Im Allgemeinen sind sie desto größer, je näher der Embryo seinem Entstehen ist, doch bieten sie auch unabhängig vom Alter, in dieser Hinsicht individuelle Verschiedenheiten dar, die mit der Größe und Thätigkeit anderer Excretionsorgane in Beziehung zu stehen scheinen. Im Allgemeinen sind beide von gleicher Größe; doch variiren beide äußerst häufig, völlig unabhängig von der Seite, so daß die frühere Angabe, als sey die rechte Niere immer größer als die linke, durchaus unrichtig ist. Beim Erwachsenen sind sie gewöhnlich ungefähr vier Zoll lang, gegen zwei breit, in ihrem innern Theile einen Zoll dick, nach außen dünner. Jede Niere wiegt zwischen drei und vier Unzen.

## a. Consistenz und Farbe.

## §. 2347.

Die Nieren haben eine beträchtlichere Härte als andre Drüsen, und sind fester, weniger leicht zerreißbar als sie.

Ihre Farbe ist im Ganzen röthlich.

## c. B a u.

## §. 2348.

Sie sind zuäufferst von einem sehr lockern, meistens reichlich mit Fett angefüllten Zellgewebe, der Fetthaut oder Kapsel der Nieren (*Membrana* s. *capsula renum adiposa*), umgeben.

Auf diese folgt eine, an der äußern und innern Fläche rauhe, weißliche, nicht deutlich faserige, aber sehr feste und den faserigen ähnliche Haut, welche die Niere in ihrem ganzen

Um-

durch ihre Substanz unmittelbar, nur mittelbar durch die Harnblase zu einem Ganzen verbunden. Sie liegen in der Lendengegend, durch sehr lockeres, gewöhnlich viel Fett enthaltendes Zellgewebe mit benachbarten Theilen verbunden, auf beiden Seiten der Wirbelsäule hinter dem Bauchfelle.

#### b. G e s t a l t.

##### §. 2345.

Ihre Gestalt ist bohnenförmig, ihre vordere und hintere Fläche eben, ihr äußerer und ihr innerer Rand in seinem obern und untern Theile gewölbt, in der Mitte beträchtlich zur Bildung des Nierenauschnittes (Hilus renalis) vertieft, und hier die Niere ungefähr einen halben Zoll weit in eine vordere und eine hintere Hälfte, zwischen welchen die Blut- und Ausführungsgefäße liegen, auseinander gerissen. Die Nierengefäße liegen hier so, daß der Stamm der Vene am meisten nach vorn, hierauf der Stamm der Nierenpulsader, am meisten nach hinten der Anfang des Harnleiters folgt.

Die Aeste der Nierenvene und Arterie kreuzen sich.

Alle drei Gefäße spalten sich, wenn sie den Nierenauschnitt erreichen, am innern Rande der Niere zunächst in drei, bald weiter verzweigte Hauptäste, dann die Blutgefäße abermals in eine vordere und hintere Reihe, welche die Aeste des Nierenbeckens zwischen-sich aufnehmen.

Alle sind im Nierenauschnitte nur durch lockeres Schleimgewebe und Fett an einander geheftet.

Drei Gefäße treten vorzüglich in den obern Theil des Nierenauschnittes und aus demselben hervor, das Nierenbecken nimmt die untere Gegend desselben ein.

#### a. Größe

## a. Größe und Gewicht.

## §. 2346.

Die verhältnißmäßige Größe der Nieren ist nicht immer dieselbe. Im Allgemeinen sind sie desto größer, je näher der Embryo seinem Entstehen ist, doch bieten sie auch unabhängig vom Alter, in dieser Hinsicht individuelle Verschiedenheiten dar, die mit der Größe und Thätigkeit anderer Excretionsorgane in Beziehung zu stehen scheinen. Im Allgemeinen sind beide von gleicher Größe; doch variiren beide äußerst häufig, völlig unabhängig von der Seite, so daß die frühere Angabe, als sey die rechte Niere immer größer als die linke, durchaus unrichtig ist. Beim Erwachsenen sind sie gewöhnlich ungefähr vier Zoll lang, gegen zwei breit, in ihrem innern Theile einen Zoll dick, nach außen dünner. Jede Niere wiegt zwischen drei und vier Unzen.

## a. Consistenz und Farbe.

## §. 2347.

Die Nieren haben eine beträchtlichere Härte als andre Drüsen, und sind fester, weniger leicht zerreißbar als sie.

Ihre Farbe ist im Ganzen röthlich.

## c. B a u.

## §. 2348.

Sie sind zuäuserst von einem sehr lockern, meistens reichlich mit Fett angefüllten Zellgewebe, der Fetthaut oder Kapsel der Nieren (*Membrana l. capsula renum adiposa*), umgeben.

Auf diese folgt eine, an der äußern und innern Fläche rauhe, weißliche, nicht deutlich faserige, aber sehr feste und den faserigen ähnliche Haut, welche die Niere in ihrem ganzen

Um-

Umfange umgiebt, nur im Nierenausschnitte durch die Blutgefäße und Ausführungsgänge derselben durchlöchert, und überall genau an die darunter befindliche Nierensubstanz geheftet ist.

#### E. Innerer Bau.

##### §. 2349.

Die Nieren bestehen aus einer doppelten Substanz, welche sich von einander durch Farbe, Lage, Consistenz und Bau bedeutend unterscheiden, der Rindens- oder Drüsen-Substanz (S. corticalis f. glandulosa) und der Mark-, Röhren-, oder Faser-Substanz (S. medullaris f. tubulosa f. fibrosa).

##### §. 2350.

Die Rindensubstanz umhüllt die Marksubstanz im größten Theile ihres Umfangs nach allen Richtungen, in dem sie nicht nur die ganze äußere Oberfläche der Niere bildet, sondern auch sogar weiter als sie bis an die innere Fläche der Niere durch mehrere gewölbte Fortsätze dringt, zwischen welchen sich die Röhrensubstanz anlagert. Sie bildet daher eine Sammlung von, durch eine gemeinschaftliche Grundfläche verbundenen, mit ihrem blinden Grunde nach außen gewandten Höhlen.

Die Rindensubstanz macht daher den äußern, enthaltenden Theil der Nieren aus.

Ihre Dicke beträgt ungefähr zwei bis drei Linien.

Ihre Farbe ist röthlich als die des Markes, ihre Consistenz bedeutend geringer.

Sie



Sie besteht vorzüglich aus Blutgefäßen und drüsenartigen Körperchen, den Anfängen der harnausführenden Gänge.

Sie ist der Sitz der Harnabsonderung.

§. 2351.

Die, in der vorigen enthaltne Marksubstanz bildet eine Sammlung von rundlichen, kegelförmigen oder pyramidenförmigen Körpern (*Pyramides Malpighianae*), welche mit der Grundfläche nach außen, der stumpfen Spitze nach innen gewandt sind. Mit Ausnahme des innersten, einige Linien hohen und breiten Theiles, der Nierentwarze (*Papilla renalis*) ist sie durchaus von der Marksubstanz eingehüllt.

Hier öffnet sie sich in den Anfang des Harnleiters, oder das Nierenbecken.

Die Nierentwarzen sind gewöhnlich, aber nicht immer an der Spitze mehr oder weniger vertieft, und enthalten hier eine ansehnliche Menge von rundlichen, kleinen, aber dem bloßen Auge sichtbaren Oeffnungen. Bei den mit einer Vertiefung versehenen Warzen finden sich die Oeffnungen nur in ihr, bei den einfach zugespitzten auch am Umfange der Spitze.

Das freie Ende der Warzen ist mit einem groben Leberzuge bekleidet, welcher in die innere Haut des Nierenkelches übergeht.

Die Zahl der Warzen variiert von sieben bis zwanzig, welche in drei Reihen, einer mittlern, einer vordern und einer hintern, die alle von oben nach unten verlaufen, stehen. Die der innern Reihe sind gerade nach innen, gegen die Mittellinie des Körpers, die der vordern nach hinten, die der hintern nach vorn, also einander entgegen, die obern in allen Reihen nach unten, die untern nach oben gewandt.

Die

substanz; in wahrscheinlich meistens nur Verhärtung durch Auskalkung; doch erzeugt sich bisweilen in der That regelmäßig Knochengewebe in ihr.

§. 2320.

### III. Als fremde Körper kommen

1) Entozoen vor, namentlich a) in der Substanz der Lunge und an ihrer Oberfläche Hydatiden; b) in der Luftröhre der Luftwurm (*Hamularia subcompressa*);

2) hienüher zufällig von außen in sie gelangte Substanzen, wozu besonders metallische, steinige Concremente gehören.

### Zweite Unterabtheilung.

#### Brusthöhle.

##### 1. Regelmäßige Beschaffenheit.

###### a. Vollkommener Zustand im Allgemeinen.

§. 2321.

Die Brusthöhle, welche, außer den Lungen und ihren Gefäßen, das Herz, den Anfang der Aorta, die Räume der obern und untern Hohlader, die unpaarige Blutader, den Milchbrustgang, die Speiseröhre und das Bruststück des Gangliennerven enthält, und, auf die schon früher (Vd. 2. S. 5.) angegebene Weise zusammengesetzt wird, hat eine faßförmige Gestalt, und ist in ihrem obern Ende am engsten, in ihrem untern gewölblich am weitesten, wenigstens hier immer viel weiter als oben, an den Seiten am stärksten gewölbt, vorn am plattesten, von oben nach unten am längsten, von vorn nach hinten am flachsten, hinten beträchtlich tiefer als vorn, und unten mit einer,  
durch

Ueberall findet man ferner in der Rindensubstanz runde, kleine, indessen doch dem bloßen Auge als kleine Pünktchen erscheinende Körperchen, welche an den feinsten Zweigen der Blutgefäße, namentlich der Pulsadern hängen, und in Verbindung mit ihnen die Gestalt einer Traube oder eines Fruchtzweiges darstellen.

Diese Körperchen werden von einigen, namentlich Malpighi, Bertin, Schumlanfsky, für eigne, von den Gefäßverzweigungen verschiedne Organe, einfache Drüsen, Bälge, auf deren Wände sich die Gefäße verzweigen, angesehen; und die Beobachter unterscheiden sich nur insofern von einander, als Bertin größere Drüsen als die von Malpighi angenommenen beschreibt und abbildet, während Schumlanfsky's Angaben, mit denen auch die von Eysenhardt sich im Wesentlichen vereinigen lassen, mit den Malpighi'schen übereinkommen. Andre, namentlich Ruysh, betrachten diese Körperchen nicht als Drüsen, sondern als Gefäßbüschel.

Am wahrscheinlichsten ist es, daß die feinsten Enden der Pulsadern und Anfänge der Ausführungsgänge in der Rindensubstanz in Verbindung mit Schleimgewebe diese kleinen Körperchen bilden, diese aber durchaus nicht hohl sind, und daß sich auf diese Weise beide Ansichten vereinigen lassen.

In diesen Körperchen findet unstreitig, wenigstens vorzugsweise, die Bildung des Harnes Statt.

Sie scheinen keine eigne Hülle zu haben, und werden, wenigstens gewöhnlich, nicht durch mehrere, sondern nur durch einen Pulsaderzweig gebildet.

Eine Verbindung zwischen ihnen und den Blutadern nimmt man nicht mit Bestimmtheit wahr, ungeachtet der Uebergang der Pulsadern in die Blutadern außerdem deutlich ist.

§. 2355.

Außer diesen drüsigen Körperchen, den nachher näher zu betrachtenden Gefäßzweigen, und dem, alle vereinigenden, weißlichen, weichen Schleimgewebe, auf welches besonders Ferrein aufmerksam gemacht hat, besteht die Rindensubstanz aus einer sehr beträchtlichen Menge vielfach gewundner, weißer Kanälchen, den Ferrein'schen Rindenkanälen (*Canales corticales*). Diese bilden, unter einander vielfach anastomosirend, gewöhnlich einfach, bisweilen Paarweise verlaufend, und verschiedentlich gestaltete Räümchen umschreibend, zu einem beträchtlichen Theile die Rindensubstanz, und sind höchst wahrscheinlich Ausführungsgänge jener Körperchen.

Diese, in der Rindensubstanz gewundnen Kanäle werden in der innern Substanz gerade. Bei näherer Untersuchung ergiebt sich, daß diese Abänderung der Richtung regelmäßig streckenweise schon hoch oben in geringer Entfernung von der Oberfläche der Niere anfängt, so daß cylindrische Verlängerungen der Mark- und Rindensubstanz vielfach in einander greifen.

In der Rindensubstanz sind diese Gefäße einfach und von demselben Durchmesser, in der Marksubstanz dagegen treten sie nach und nach unter spitzen Winkeln zu mehreren, aber meistens nicht beträchtlich größern Stämmen zusammen, welche nebeneinander gegen die Spitze der Warzen verlaufen, aber sich hienach einigen, namentlich Ferrein und Eschenhardt, nicht durch die Mündungen der Warzen nach außen öffnen, sondern vorher aufhören. Die Mündungen der Warzen führen dagegen nur zu kleinen, blinden, ungefähr 1 — 2 Linien tiefen

Föb-

Höhlen, welche, wie sie, viel weiter als die erwähnten Gänge, und in weit geringerer Menge, nach Ferrein ungefähr zwanzig in einer jeden Warze, in der That aber in größerer Zahl, vorhanden sind.

Indessen habe ich wirklich bisweilen sehr deutlich durch die ganze Höhe der Nierenwarzen hohle Gänge verlaufen gesehen, und nehme daher einen unmittelbaren Höhlenzusammenhang zwischen jenen Oeffnungen in den Warzen und den Harnaussführungsgängen an, vorzüglich, da Luft durch die Warzen sehr leicht in die Gänge, ja selbst bei größern Thieren Injectionsmasse von den Harnleitern aus durch die ganze Warze \*) getrieben, und auf der andern Seite Harn durch einen Druck auf die Röhrensubstanz ausgedrückt wird.

§. 2356.

Jeder Nierenlappen besteht daher aus mehreren Sammlungen von, erst gewundenen, dann geraden, dicht an einander liegenden Gängen, welche, mit ihrer Grundfläche nach oben, ihrer Spitze nach unten gerichtet, die Gestalt des Ganzen nachahmen, nur länglicher sind.

Der gerade, in der Marksubstanz enthaltne Theil derselben wurde sehr früh, schon von Carpi, unter dem Namen kleiner, harnführender Adern, der letzten Zweige der Nierengefäße, erwähnt, vorzüglich aber von Bellini genauer dargethan, und nach ihm mit dem Namen der Bellinischen oder Nierengänge (Ductus s. tubuli Belliniani s. renales) belegt.

§ 2

Bis

\*) Krefliche, auf diese Art bereitete Einspritzungen von Pferdeieren habe ich kürzlich in dem Hunter'schen Muscum zu London, welches durch den Reichthum an Präparaten, zu deren Bereitung Fleiß und Geschicklichkeit erfordert wird, hoch über allen steht.

Bis Ferrein wurden diese Gänge, welche man deutlich mit dem bloßen Auge sieht, für einfach gehalten. Indessen ergiebt sich aus seinen und Schumlanſky's Untersuchungen, daß jeder ein Bündel von einigen hundert Gängen ist, welches man mit dem Namen der Ferrein'schen Pyramide belegt.

Jedes gewundene Kanälchen hat ungefähr  $\frac{1}{2}$  Linie im Durchmesser. Die Länge aller zusammengenommenen beträgt, nach Ferrein's Berechnungen, über 60,000 Fuß. In jedem Nierenlappen befinden sich wenigstens 700 Pyramiden, welche durch das Zusammentreten dieser, hier viel dichter zusammenliegenden Kanälchen in gerader Richtung entstehen, in der ganzen, aus 15 Lappen gebildeten Niere daher ungefähr 10,000 dieser Ferrein'schen Pyramiden.

Nach neuern Untersuchungen würden die einzelnen Gänge der Ferrein'schen Pyramiden sogar abermals aus ungefähr zwanzig kleinern bestehen <sup>1)</sup>.

Indessen findet unstreitig in allen diesen Angaben viel Unsicherheit, Willkühr und Unrichtigkeit Statt.

g. G e f ä ß e.

S. 2357.

Die beiden Reihen der Aeste der Blutgefäße treten, nachdem sie sich auf die oben angegebne Weise außerhalb der Niere im Ausschnitt derselben verhalten haben, in der Gegend der Grundfläche der Nierenwarzen in die Substanz der Niere, und steigen in den nach innen dringenden Verlängerungen der Rindensubstanz in die Höhe. Ihre Aeste bilden einander entgegengewandte Bögen, welche vorzüglich die Grundfläche der

Mal:

<sup>1)</sup> Eysenhardt S. 12.

Malpighi'schen Pyramiden, oder der einzelnen Abtheilungen der innern Substanz umgeben. Diese Bögen fließen weder durch zahlreiche noch durch große Anastomosen unter einander zusammen. Ungeachtet sie neben den Abtheilungen der innern Substanz verlaufen, verzweigen sie sich nicht in ihr, sondern fast bloß in der Rinde, zuerst in den zwischen den Warzen liegenden Abtheilungen, dann im Umfange der Niere. Aus der Wölbung der erwähnten größern Bögen treten eine beträchtliche Menge kleiner, strahlenförmig verzweigter Aeste ab, welche die Grundfläche eines jeden Nierenlappens umstreifen, und sich allmählich immer feiner, auf die oben angegebne Weise zur Bildung der kleinen Nierendrüsen vertheilen. Viele dieser Zweige dringen bis zur äußern Oberfläche der Nieren, mehrere hören früher auf.

Die Puls- und Blutadern begleiten einander genau, in dessen ist, ungeachtet man den unmittelbaren Uebergang der Puls- und Blutadern in einander deutlich sieht, bis jetzt wenigstens kein deutlicher Zusammenhang zwischen den feinsten Blutaderzweigen und den Nierendrüsen nachgewiesen, während diese mit den Pulsaderzweigen genau zusammenhängen, und an ihnen, wie Beeren an den Stielen einer Traube hängen.

Die Saugadern entstehen in beträchtlicher Menge von den Nieren, ihre Anordnung aber hat in Hinsicht auf Richtung der Klappen nichts Eigenthümliches.

## h. N e r v e n

### §. 2358.

Die verhältnismäßig kleinen Nerven stammen vom Nierengeflecht des Gangliennerven, und dringen, an die Pulsadern geheftet, nicht tief in die Substanz der Nieren.

2. Harnleiter <sup>1)</sup>.

## §. 2359.

Der Harnleiter (Ureter) nimmt im Nierenauschnitt mit mehrern rundlichen Kanälen, den Kelchen (Calices), welche die Nierenwärtchen umfassen, und sich an der Grundfläche derselben plötzlich endigen oder vielmehr schnell sehr fein werden und in die äußere Haut derselben übergehen, seinen Anfang.

Im Allgemeinen, aber nicht immer, finden sich so viel Nierenkelche als Wärtchen, bisweilen umfaßt ein, nur durch einen kleinen Vorsprung getheilter, deren zwei, welche dann dicht neben einander stehen, die erste Andeutung der Verschmelzung zweier Nierenwarzen zu einer.

Diese Kelche treten meistentheils zu zwei größern Stämmen, den Ästen des Nierenbeckens, einem oberen und einem untern zusammen. Der obere ist meistens größer und aus zwei untergeordneten Ästen zusammengesetzt. Beide werden durch einen schmälern, der Länge nach herabsteigenden Zwischengang verbunden.

Schon am untern Ende des Nierenauschnittes hat das Nierenbecken, welches sich von oben nach unten allmählich zuspitzt, sich zum Harnleiter verengt.

Dieser steigt, ungefähr zwei Linien weit, etwas gewunden, von lockerm Zellgewebe eingehüllt, hinter der hintern Wand des Bauchfelles auf dem runden Lendenmuskel herab, kreuzt sich mit dem, vor ihm liegenden Samengefäße, und schlägt sich über die gemeinschaftliche Hüftpulsader in das Becken,

---

1) Pohl observ. de ureteribus. Lipf. 1772.



Becken, wo er, mit dem der andern Seite convergirend, ungefähr anderthalb Zoll weit von ihm entfernt, in den unteren und hintern Theil der Harnblase so tritt, daß er zwischen den Fasern der Muskelhaut ungefähr drei bis vier Linien weit verläuft, und hier einen, von oben und außen nach innen und unten gerichteten Vorsprung bildet, bis er sich mit einer etwas engern, in derselben Richtung liegenden, klappenlosen Mündung in die Blase öffnet.

§. 2360.

Der Harnleiter besteht aus zwei über einander liegenden Schichten. Die äußere ist aus verdichtetem Schleimgewebe gebildet, faserähnlich, durchaus aber nicht muskulös. Die innere ist eine dünne, glatte, oben in die Bedeckung der Nierenwarzen, und unten in die innere Haut der Harnblase übergehende Schleimhaut.

Klappen finden sich an keiner Stelle seines Verlaufes <sup>1)</sup>.

### 3. Harnblase <sup>2)</sup>.

§. 2361.

Die Harnblase (*Vesica urinaria*) ist ein länglichrunder, mehr langer, als breiter und tiefer Behälter, der in der Beckenhöhle, hinter der Schambeinfuge, außerhalb des Bauchfelles, beim Manne vor dem Mastdarme, beim Weibe vor der Scheide, von lockerem Zellgewebe umgeben, liegt.

Fig 4

Man

1) Coschwitz de valvulis ureterum. Hal. 1723.

2) J. Parsons description of the human urinary bladder and the parts belonging to it. London. 1742. 8. Uebers. Münsberg. 1759. 8.

A. F. Walther de collo vesicae virilis etc. Lips. 1745.

J. Lieutaud. Obs. anat. sur la str. de la vessie. Mém. de Paris. 1753.

Man unterscheidet an ihr den obern, runden Theil, den Grund (Fundus), den mittlern Körper und den untern zusammengezogenen Theil, den Blasen-  
hals (Cervix s. collum vesicae urinae).

Sie ist die gemeinschaftliche sehr beträchtliche Erweiterung der Harnleiter, welche sich von ihnen aus nach oben biegt.

An ihrem obern Ende geht sie in einen, allmählich zugespitzten, an der vordern Wand der vordern Fläche des Bauchfelles zum Nabel verlaufenden Faden, den Harnstrang (Urachus), an ihrem untern Ende in die Harnröhre über.

#### §. 2362.

Sie besteht in ihrem ganzen Umfange aus drei, in dem obern Theile ihrer hintern Fläche aus vier über einander liegenden Schichten.

Die vierte, äußerste, nur an der angegebenen Stelle sie bekleidende, ist der vordere Theil der untern Wand des Bauchfelles, welches, hier nur durch sehr lockeres Zellgewebe an die darunter liegende Muskelhaut geheftet, herabsteigt, und sich von der Harnblase an den obern Theil der vordern Gebärmutterfläche überbiegt. Der übrige, weit größere Theil des Umfangs der Blase wird durch lockeres Schleimgewebe bekleidet und an die benachbarten Theile geheftet.

Die Muskelhaut der Harnblase hat einen sehr zusammengesetzten Bau, kann aber doch im Allgemeinen auf zwei Schichten, welche einander bedecken, sich aber auch stellenweise mit einander verflechten, zurückgeführt werden.

Die äußere, stärkere, dichtere, besteht aus Fängensfasern. Diese steigen vom untern Ende der hintern und der vordern Fläche der Blase zum Grunde auf, wo sie theils zusammenfließen, theils sich nach außen werfen.

Die

Die äußern hintern schlagen sich einige Linien unter dem Harnleiter nach unten, von hier nach vorn und oben, und gehen so von außen in die vordere Längenschicht über.

An den Seitenflächen fehlen sie größtentheils.

Die innere Schicht wird größtentheils aus schiefen Fasern, welche in entgegengesetzten Richtungen verlaufen, einander daher kreuzen, und sich vielfach verflechten, gebildet. Die untern verlaufen ganz quer, stehen dichter an einander, und bilden den Schließmuskel der Harnblase (Sphincter vesicae), die übrigen stehen bei weitem weniger dicht an einander, und bilden daher ein Netz, durch welches, bei ausgedehnter Blase, die innern Häute schimmern.

Unter dieser zweiten Haut liegen an mehreren Stellen, besonders nach unten, dünnere, der Länge nach verlaufende Muskelfasern, welche hier eine dritte Schicht bilden.

§. 2363.

Auf die Muskelhaut folgen die sehr dünne Gefäß- und Schleimhaut. Die letztere ist dem Anschein nach glatt, oder wenigstens mit nur äußerst kurzen Zotten besetzt. Gewöhnlich findet man, den Blasenhals ausgenommen, keine deutlichen Schleimdrüsen an ihrer hintern Fläche, doch erscheinen sie bisweilen, wenn sie krankhaft vergrößert sind, deutlich.

§. 2364.

Die innere Fläche der Harnblase ist, unbeständige Hervorragungen, welche häufig durch die innere Muskelschicht gebildet werden, ausgenommen, größtentheils gleich.

Indessen verläuft von der Oeffnung eines jeden Harnleiters, an der hintern Fläche des Halses nach unten und innen

eine Erhabenheit, welche sich in der Mitte unter einem stumpfen Winkel vereinigen, und einen nach unten vorspringenden Winkel, das Lieutaud'sche Dreieck (*Trigonum Lieutaudii*), bilden.

Sie wird durch einige Bündel der hier stark angehäuften innern Muskelfasern gebildet, welche sich mit ihren obern Enden an den Umfang der Harnleitermündung heften, und durch ihre Zusammenziehung diese strecken, mithin erweitern, und dadurch den Eintritt des Harnes in die Blase begünstigen <sup>1)</sup>.

#### 4. Harnstrang <sup>2)</sup>.

§. 2365.

Der Harnstrang (*Urachus*) ist ein länglicher, sehr dünner Streifen, der, von unten nach oben allmählich dünner werdend, überall vom Bauchfell umgeben, und dicht an die vordere Wand der Unterleibshöhle geheftet, von dem Grunde der Blase gegen den Nabel emporsteigt, den er häufig nicht erreicht. Seine Fasern gehen mehr oder weniger deutlich in die Muskelhaut der Harnblase über.

Sein

1) Ch. Bell account of the Muscles of the Ureters and their effects in the irritable states of the Bladder. *Med. chir. Transact.* Vol. III. p. 171 — 191.

2) J. C. Peyer observat. circa urachum. L. B. 1721. 8.

J. Noreen de mutatione luminum in vasis hominis nascentis, in specie de uracho. Gotting. 1749.

P. A. Böhmer de uracho in adulto homine aperto. *Cum ejusd. anat. ovi hum.* Halae. 1763.

A. Portal sur la structure et sur l'usage de l'ouraque de l'homme. Aus den *Mém. de Paris.* 1769. In dessen *Mém. sur plusieurs maladies.* T. I.

Sein Bau wird sehr verschiedentlich angegeben. Vorzüglich weichen die Beschreibungen insofern ab, als einige Anatomen ihn beim Erwachsenen als hohl, andre als solide darstellen. Walter<sup>1)</sup> hält ihn für hohl, Koreen, Senac<sup>2)</sup>, Portal dagegen für solide. Nach den letztern besteht er wesentlich aus vier, innerhalb jener, durch das Bauchfell gebildeten Scheibe, welche in ihrem bei weitem längsten obern Theile dicht verbunden sind, gegen den obern Theil der Blase dagegen aus einander weichen, und unter der Muskelhaut derselben, zwei an der Seite, der dritte und vierte an der hintern und vordern Fläche derselben bis zum Blasenhalse herabsteigen, und deren Verschmelzung unter einander und mit der Bauchfellscheibe mit dem Alter zunimmt.

Nach Walter dagegen besteht der Harnstrang von außen nach innen aus äußern Längs- und innern Kreisfasern, dann der Gefäß- und Schleimhaut der Blase, welche, mehrere Zoll weit hohl, eine Sonde und Quecksilber zulässt, gegen den Nabel hin verschlossen ist, und oft eine röthliche Feuchtigkeit enthält.

In der That muß ich nach meinen Untersuchungen annehmen, daß in der Regel der Harnstrang bei vollendeter Ausbildung des Körpers, oft schon weit früher, völlig verschlossen, und in einen ganz einförmigen Strang verwandelt ist, wenn ich ihn gleich mehrmals auf die von Walter angegebne Weise gebildet fand.

Von diesem Baue führen übrigens Koreen und Portal selbst mehrere Fälle an, und der erstere bildet diese Anordnung genau ab.

#### 4. Harn-

1) Essais de physique bei Portal a. a. O.

2) Observat. anatom. Berol. 1775. p. XIX.

## 5. Harnröhre.

§. 2366.

Die Harnröhre (Urethra), ist der Endtheil des Harnsystems, ein, verhältnißmäßig zur Harnblase enger Gang, der an seinem innern Ende, der Blasenmündung (Orificium vesicale) in den Blasenhals, an seinem äußern, der Hautmündung (Orificium cutaneum) in die Haut übergeht. Er wird in beiden Geschlechtern zuinnerst durch eine Schleimhaut, nach außen durch lockeres, schwammiges Zellgewebe und vielfach verschlungne Gefäße gebildet. Seine Länge ist im weiblichen Geschlechte weit geringer als im männlichen, indem sie dort nur ungefähr zwei Zoll, hier acht Zoll beträgt. Dagegen ist sie beim weiblichen Geschlecht viel weiter. In beiden liegt sie unter den zur Erregung des Wollustgefühls dienenden Organen, dort unter dem Kitzler, hier unter dem Zellkörper der Ruthe, welche durch diesen und sie gebildet wird. Wegen der verschiednen Länge beider Theile öffnet sie sich in beiden an ganz verschiednen Stellen, beim Weibe unter der Schambeinfuge, dicht vor der Scheidöffnung zwischen den beiden innern Schamlippen, beim Manne am vordern Ende der Ruthe. Da sie bei diesem zugleich als Samenröhre dient, so wird ihre Anordnung am besten im Abschnitte von den Geschlechtstheilen näher angegeben werden.

## 6. Function der Harnwerkzeuge.

§. 2367.

Die Function der Harnwerkzeuge ist die Absonderung des Harnes (Urina, Iosium).

Die

Die specifischen physischen Merkmale dieser Flüssigkeit sind gelbe Farbe, Dünne, Durchsichtigkeit, sehr geringe Klebrigkeit, vorzüglich eigenthümlicher Geruch.

Sie besteht aus einer sehr beträchtlichen Menge von Bestandtheilen, deren verhältnismäßige Menge, zum Theil auch Zahl und Beschaffenheit, hier zu verschiedenen Zeiten mehr Abweichungen als in irgend einer andern Flüssigkeit darbieten.

Ein Hauptmerkmal in ihrer Mischung ist ihr bedeutender Gehalt an Wasser, wovon sie wenigstens neun Zehnthelle enthält.

Die Bestandtheile, welche man im normalen Zustande immer oder größtentheils in dem Wasser aufgelöst findet, sind

1) Harnstoff, die stickstoffreichste Substanz im Körper, sofern er in hundert Theilen nach Fourcroy und Bausselin 32, nach Prout sogar über 46 Theile, der Faserstoff nur ungefähr 20 Stickstoff enthält;

2) eine thierische, nicht im Alkohol auflösbliche Substanz;

3) mehrere Säuren, namentlich:

a) freie Milchsäure, welche nach Berzelius den Grund der freien Säure derselben enthält;

b) Harnsäure;

4) mehrere Salze, namentlich:

a) milchsaures Ammonium,

b) schwefelsaures Kali,

c) schwefelsaures Natron,

d) phosphorsaures Natron,

e) salzsaures Natron,

f) phosphorsaures Ammonium,

g) salzsaures Ammonium,

h und i) phosphorsaure Erden mit etwas flüßsaurem Kalk;

5) etwas

5) etwas Kieselersde.

Außer diesen, regelmäßig in die Zusammensetzung des Harnes eingehenden Substanzen kommen bisweilen in demselben den Sinnen wahrnehmbare, einzelne Bestandtheile auf verschiednen Wegen eingenommener Körper vor. So erscheint der Harn z. B. durch den Rhabarber dunkelgelb gefärbt, und durch Kalialösung kann diese Substanz niedergeschlagen werden, Genuß von Spargel theilt ihm einen eigenthümlichen widrigen Geruch mit u. s. w.

Ungeachtet diese Substanzen auch mehr oder weniger in andern Auswurfsflüssigkeiten, namentlich der Lungen- und Hautausdünstung, erscheinen, auch unmittelbar durch den Darmkanal ausgeworfen werden, so kommen sie doch vorzugsweise im Harn vor, und dieser erscheint daher als das vorzüglichste Mittel, das Harnsystem als das Organ, durch welches nicht anzeigende Stoffe ausgeworfen werden. Nothwendig muß, um dies möglich zu machen, das Harnsystem eine vorzugsweise Anziehung zu diesen Stoffen äußern, um sie aus dem Blute zu entfernen.

Auf dieselbe Weise ist das Harnsystem im kranken Zustande vorzugsweise Ausscheidungswerkzeug, und bei allen allgemeinen Krankheiten daher der Harn mehr oder weniger abgeändert.

#### §. 2368.

Auch auf eine beständige Weise bietet der Harn von sich selbst Verschiedenheiten dar, je nachdem er längere oder kürzere Zeit nach genossener Speise, oder nach eingenommenem Getränk gelassen wird. Hierauf gründet sich die Unterscheidung des Getränks-, Ehylus- und des Blutharns, von denen aber in der That die beiden letzten nur unbedeutende Abänderungen sind.

Der



Der Getränksharn, der kurz nach genossenem Getränkelassen wird, ist sehr wässerig und hell; der Chylusharn, der einige Stunden nach dem Essen, während der Verdauunglassen wird, ist dunkler, weniger flüssig, riecht stärker, und hat gewöhnlich den Geruch und Geschmack von, vorzüglich erweichten Nahrungsmitteln; der nach beendigter Verdauunglassene Harn oder eigentliche, vollendete Harn ist amunkelsten, in der geringsten Menge vorhanden, und hat nicht mehr die Merkmale genossener Substanzen, dagegen den eigenthümlichen Harngeruch und Geschmack.

Nach vergleichenden Versuchen enthält der Getränksharn nur  $\frac{1}{15}$  des Harnstoffes,  $\frac{1}{16}$  der Harnsäure,  $\frac{1}{4}$  der Salze des Harnharns.

§. 2369.

Seit geraumer Zeit ist noch jetzt die Frage unentschieden, ob zu dem Harnsystem die Bestandtheile des Harns vom Darmmal aus durch das Gefäßsystem, oder auf einem kürzern Wegemittelbar gelangen, ob es daher geheime Harnwege (Viae urinariae clandestinae) gebe, oder nicht?

Als Gründe für die letztere Ansicht führt man an<sup>1)</sup>:

1) Die Schnelligkeit, womit Getränke, besonders kaltes Wasser, durch den Harn fortgeschafft werden, vorzüglich die große

1) C. G. Kratzenstein theoria fluxus diabetici ejusque sanandi methodus etc. Halae. 1746.

E. Darwin's Zoonomie. Bd. 1. Abth. 2.

Wollaston über die Nichtanwesenheit von Zucker im Blute der Harnruhrkranken. (Phil. Tr. 1811.) Daraus in Wedel's Archiv. Bd. 2. S. 672 ff.

Crevirannus Biologie Bd. 4. S. 513 — 521.

Morichini über einige Substanzen, welche unzerseht in den Harn übergehen. Mem. della Soc. Ital. T. 17. Wedel's Archiv. Bd. 2. S. 467 ff.

große Menge von Flüssigkeiten; welche in kurzer Zeit abgehen, sowohl wenn sie in den Darmkanal, als wenn sie in die Bauchhöhle eingebracht werden;

2) die unveränderte Beschaffenheit mehrerer Substanzen, wovon schon vorher Beispiele angegeben wurden;

3) das Vorkommen dieser und anderer, selbst, wie z. B. der Zucker in der Harnruhr, im Körper erzeugter Substanzen im Harn, ungeachtet das Blut keine Spuren davon enthalte, oder in den zwischen dem Gefäße und dem Harnsystem befindlichen Saugadern;

4) Anwesenheit von Harn in der Blase bei zerstörten Nieren, unterbundenen, selbst fehlenden, oder wenigstens nicht mit den Nieren zusammenhängenden Harnleitern;

5) selbst die Anwesenheit von verschluckten, oder auf irgend eine Weise an einer andern Stelle in den Körper gelangten festen Körpern in der Harnblase, und

6) die bedeutende Mitleidenschaft zwischen der Harnblase und dem Magen.

Die Art, wie die im Harn enthaltenen Substanzen, das Gefäßsystem vorbeigehend, in das Harnsystem gelangen sollen, wird verschiedentlich angegeben.

Nach Einigen giebt es keine sichtbaren Wege, sondern es findet bloß ein Durchschwigen von den übrigen Theilen, namentlich vom Darmkanal aus zur Harnblase durch das Schleimgewebe Statt<sup>1)</sup>.

Andre nehmen eine rückgängige Bewegung in den Saugadern des Harnsystems an, und stützen sich sogar auf Beobachtungen, wo die Klappen in diesen Gefäßen vom Herzen abwärts gerichtet waren.

Ende

1) Neuerlich noch Treviranus. Biologie. Bd. 4. S. 513 — 521.

Endlich setzen noch andre eigne Gänge fest, welche sich zwischen dem Magen und dem Harnsystem befinden.

§. 2370.

Allein in der That sind sowohl die Gründe als die Erklärungsmethoden zu widerlegen<sup>1)</sup>.

Die beiden letzten Gründe beweisen durchaus gar nichts, da die Mitleidenschaft der Theile nicht auf mechanischer Verbindung beruht, und die Anwesenheit fester Körper in der Harnblase in, durch ihren Druck krankhaft gebildeten Wegen begründet ist.

Der vierte Grund läßt sich durch die Bemerkung beseitigen, daß sich bei ganz zerstörten Nieren wirklich kein Harn findet, daß auch dem Anschein nach ganz zerstörte Nieren noch einen Theil von ihrer Substanz enthalten, daß bei vollkommener Unterbindung der Harnleiter und vollständiger vorangegangener Entleerung der Harnblase diese wirklich keinen Harn enthielt, und daß die Beobachtung von nicht mit den Nieren zusammenhängenden Harnleitern höchst unzuverlässig ist.

Der dritte Grund läßt sich durch die Bemerkung beseitigen, daß überhaupt die nähern Bestandtheile der thierischen Substanzen sich nicht, oder wenigstens nicht alle, und nicht genau so, wie sie im Körper vorkommen, im Blute finden; daß ja die Anwesenheit dieser im Körper erzeugten Substanzen, welche im Harn, nicht aber im Blute vorkommen, an andern Stellen,

1) P. J. Hartmann *super urinae diapedesi quaestiones*. Traj. ad Viadr. 1776.

G. G. Erhardt *de secretione lotii unica et sufficiente*. Erfordiae, 1799.

J. Jacopi *Esame della dottrina di Darwin sul moto retrogrado dei liquidi nei vasi linfatici*. Pavia, 1804.

len, von welchen aus sie erst in das Harnsystem gelangen sollten, durchaus nicht erwiesen ist; daß die Substanz schon aus dem Blute verschwunden, oder auf irgend eine Weise darin verhüllt seyn konnte; daß man sie nicht im arteriösen, sondern dem venösen Blute suchte; und eine derselben, blausaures Kali, nach Magendie<sup>1)</sup> zwar im Harn in jedem Verhältnisse, im Blut aber, selbst außerhalb des Körpers demselben beigemischt, nur dann durch Prüfungsmittel entdeckt wird, wenn sie in großer Menge vorhanden ist.

Ueberdies wurde die gleichzeitige Anwesenheit von manchen Substanzen, z. B. Rhabarber, im Blutwasser, wirklich nachgewiesen<sup>2)</sup>.

Nach Treviranus<sup>3)</sup> beweist diese Erscheinung gar nichts, weil das Blutwasser weniger Rhabarber als der Harn enthielt; allein dieser Einwurf läßt sich sehr leicht durch die Bemerkung heben, daß der Rhabarber durch das ganze Blutwasser vertheilt war, und von allen Theilen des Körpers ihm wenigstens beinahe ganz nur durch den Harn entzogen wurde.

Die Saugadern in der Nähe des Gefäßes konnten entweder jene Substanzen erst aus dem Harnsystem aufgenommen haben, oder konnten diese zufällig in einer kürzern Strecke durch eine rückgängige Bewegung in einer, der normalen entgegengesetzten Richtung in ihnen fortgeleitet worden seyn, ohne daß daraus folgte, daß sie auf diesem Wege immer in das Harnsystem gelangen, oder auch in diesen Fällen in dasselbe getreten seyn würden.

Die,

1) Deutsches Archiv für die Physiol. Bd. 3. S. 373.

2) Home phil. Transact. 1808. Reil's Archiv f. d. Physiol. Bd. 3.

3) Biologie. Bd. 4. S. 520.

Die, für den zweiten Grund angeführten Thatsachen brauchen durchaus nicht auf diese Weise erklärt zu werden, da die Abscheidung und Nichtzersehung gewisser Substanzen durch diese Annahme nicht verständlicher wird, sofern auch auf diesem nicht viel kürzern Wege dieselbe Wechselwirkung zwischen der thierischen Substanz und der eingenommenen fremden Statt findet, und Davy's Beobachtungen die Möglichkeit nachweisen, daß Substanzen durch die Einwirkung der galvanischen Electricität gegen die gewöhnlichen Verwandtschaftsgesetze von einander gerissen, und in beträchtlichen Strecken durch Flüssigkeiten geführt werden, ohne sich mit höchst nahe verwandten, darin enthaltenen Substanzen zu verbinden.

Endlich ist, was den ersten Grund betrifft, in der That die Schnelligkeit, womit Getränke und eigenthümliche Substanzen im Harnsystem vorkommen, theils nicht so groß, theils aus der Kürze des Weges, auch wenn dieser das Blutssystem ist, zu erklären.

Der Umstand, daß Rhabarber schon nach 17 Minuten im Harn vorkommt, dann nach einigen Stunden daraus verschwindet, nach 6 — 7 Stunden den Stuhlgang färbt, und nun zugleich wieder im Harn erscheint, beweist bestimmt nicht nach Treviranus<sup>1)</sup>, daß der zuerst erscheinende auf einem kürzern Wege zum Harnsystem gelangte.

Der zuerst im Harn erscheinende Rhabarber gelangte unstreitig vom Magen aus, dessen innerer, einsaugender Oberfläche er noch unzerseht dargeboten wurde, in das Blutsystem, und die Zeit von 17 Minuten ist in der That nicht zu kurz,

Ph 2

um

1) H. u. G. S. 519.

um durch dasselbe in den Harn zu gelangen. Allmählich wurde durch die Einwirkung des Rhabarbers auf die innere Fläche des Magens und Darmkanals diese zu lebhafterer Absonderung gereizt, und dadurch die Einsaugung vermindert, weil er umhüllt wurde. Nachdem diese Thätigkeit gemindert war, wurde der Rhabarber wieder von der einsaugenden Fläche des Darmes aufgenommen. Höchst wahrscheinlich trug auch zu dem eine Zeitlang Statt findenden Verschwinden des Rhabarbers im Harn die, durch die Erhöhung der Darmthätigkeit bewirkte Verminderung der Nierenthätigkeit bei.

#### §. 2371.

Was die Gänge betrifft, so hat 1) die Meinung, daß das Zellgewebe der Weg sey, in der That sehr wenig für sich, theils die Anwendung der Erscheinungen niederer Organismen auf die, welche höhere darbieten, höchst unsicher ist, theils bei dieser Annahme der vorzugsweise Uebergang zu den Nieren sehr schwer erklärlich ist.

2) Die rückgängige Bewegung in den Saugadern ist, im normalen Zustande wenigstens, eine, wegen der Anwesenheit der Klappen, höchst unwahrscheinliche Erscheinung. Die Fälle, wo die Klappen eine der gewöhnlichen entgegengesetzte Richtung hatten, sind entweder Ausnahmen von der Regel, oder nicht hinlänglich gewiß. Durchaus ist diese Bedingung nicht allgemein, indem sonst keine Einsaugung von der Harnblase aus Statt finden würde, und eben so wenig ist die Anwesenheit einiger auf diese Art, andrer auf die gewöhnliche Weise angeordneter, vom Harnsystem entspringender Klappen erwiesen.

3) Die eignen Gänge endlich sind durch keine Beobachtung erwiesen, und einige, als solche angesehene, offenbar krankhafte Bildungen.

Ende

Endlich spricht gegen diese Ansicht auf das Bestimmteste der Umstand, daß noch nie zwischen Darmkanal und Harnwerkzeugen eine in beiden, und nicht im Blutssystem vorhandne Substanz gefunden wurde, und immer würde sich diese Erscheinung, auch wenn sie Statt fände, durch die Annahme erklären lassen, daß die Substanzen erst von dem Harnsystem aus an jene Stelle, namentlich in die Saugadern, gelangt wären.

#### B. Geschlechtsverschiedenheiten.

§. 2372.

Das Harnsystem bietet, mit Ausnahme der Harnblase und der Harnröhre, keine bedeutenden Geschlechtsverschiedenheiten dar.

Die weibliche Harnblase ist rundlicher und breiter, überhaupt größer als die männliche, die eine mehr längliche Gestalt hat.

Die weibliche Harnröhre ist weiter und kürzer als die männliche, deren Anfangstheil sie in der That nur darstellt.

#### C. Periodische Verschiedenheiten.

§. 2373.

Dagegen verändert sich dieses System im Laufe des Lebens in Hinsicht auf äußere und innere Gestalt, verhältnismäßige Größe und Lage bedeutend.

## I. N i e r e n .

## §. 2374.

a) Die Nieren sind verhältnismäßig desto größer, je jünger der Fötus ist. Noch beim reifen Fötus ist das Verhältniß des Gewichtes beider zu dem ganzen Körper ungefähr wie 1:80, während dasselbe beim Erwachsenen wie 1:240 ist.

b) In Hinsicht auf ihre äußere Gestalt, sind sie

α) länglicher, das Nierenbecken liegt mehr an der vordern Fläche, der Nierenauschnitt ist daher weniger vollkommen ausgebildet.

β) Ihre Oberfläche ist nicht glatt, sie erscheinen nicht als eine zusammenhängende Masse, sondern sind aus mehreren Lappen gebildet.

Die Zahl dieser einzelnen Lappen ist desto beträchtlicher, ihre Größe desto geringer, je jünger der Embryo ist. Beim reifen Fötus sind die früher getrennten, kleinern zu den größern vereinigt, welche man auch noch beim Erwachsenen, aber nicht abgesondert erkennt. Beim Fötus sind dagegen diese Lappen nur durch lockeres Schleimgewebe an einander geheftet, daher leicht trennbar, und ihre Grundflächen auch an der Oberfläche der Niere durch beträchtliche Vertiefungen von einander getrennt.

c) Zusammensetzung. Es findet sich wenigstens beim reifen Fötus verhältnismäßig zur Nindensubstanz mehr Marksubstanz als beim Erwachsenen. Die Bündel der Harngefäße, die Ferreinschen Pyramiden, sind leichter von einander trennbar als beim Erwachsenen, und, wie alle Theile des Körpers, deutlich aus Kügelchen zusammengesetzt, welche dort nicht wahrgenommen werden. Dagegen sind die einzelnen



Gefäßen selbst weniger deutlich. Auch hier entstehen daher, wie bei den Muskeln und Lungen, die größern Abtheilungen früher als sie in sich selbst zerfallen.

2. Harnleiter.

§. 2375.

Die Harnleiter sind gleichfalls verhältnismäßig weiter als bei vollendeter Ausbildung.

3. Harnblase.

§. 2376.

a) Die Harnblase liegt, wegen Enge des Beckens, außerhalb demselben, also weit höher als späterhin, und die Harnröhre ist daher verhältnismäßig weit länger.

b) Sie ist vor der Geburt weit kleiner als nachher.

c) Ihre Gestalt ist weit länglicher, so daß sie anfangs, sowohl deshalb, als wegen ihrer Kleinheit, nur als ein Faden und eine unbedeutende Erweiterung des Harnstranges erscheint.

4. Harnstrang.

§. 2377.

Der Harnstrang ist

a) desto größer, je jünger der Mensch ist, und verkleinert sich allmählich so, daß er im Alter oft ganz verschwindet.

b) Er ist anfangs, und, nach meinen Untersuchungen, immer noch beim reifen Fötus hohl. Noch in dieser Periode besteht er sehr deutlich aus allen Häuten der Blase, und seine Höhle hängt mit der ihrigen zusammen. Sie ist verhältnismäßig desto größer, je jünger der Fötus ist. Noch beim reis-

fen Fötus, und noch deutlicher in frühern Perioden, läßt sich der Harnstrang durch die Nabelöffnung, wenn gleich als dünner Faden, in einer längern oder kürzern Strecke, immer mehrere Zolle weit, gewöhnlich selbst in der ganzen Länge der Nabelschnur <sup>1)</sup> im Nabelstrange verfolgen, und es ist, sowohl der Analogie mit den Thieren, als mehreren Beobachtungen am Menschen nach höchst wahrscheinlich, daß er anfangs durch den ganzen Nabelstrang verläuft, und sich zwischen den Fötushüllen zu einer häutigen Blase, der *Harnhaut* (*Allantois*), von welcher in der Lehre vom Eie umständlicher die Rede seyn wird, erweitert. Daß dieser Faden hohl ist, beweist die noch beim reifen Fötus, nach meinen, mit denen von Röderer <sup>2)</sup> und Koren <sup>3)</sup> übereinstimmenden Versuchen, vorhandne Möglichkeit, ihn mehr oder weniger weit im Nabelstrange von der Harnblase aus mit Quecksilber anzufüllen.

Die Annahme mehrerer Anatomen, z. B. unter den Meyern auch Treu's <sup>4)</sup>, daß der Harnstrang auch beim Fötus, wie in der Regel beim Erwachsenen, verschlossen sey, gründet sich auf die Anwesenheit einer an seinem untern Ende vorhandenen starken Biegung, welche bei Ausdehnung der Blase durch die angespannten Muskelfasern so gegen dieselbe gedrückt wird, daß sich der Eingang aus der Blase in die Höhle des Harnstranges verschließt.

## II. Kei-

1) Hunter über die schwangere Gebärmutter. Uebersetzt von Griesp. Weimar. 1812. S. 45.

2) De foetu perfecto. Argent. 1750. rec. in Halleri coll. T. VII. p. 535.

3) A. a. O. S. 13.

4) De diff. inter hom. natum et nascendum, p. 104.

II. Regelwidriger Zustand <sup>1)</sup>.

§. 2378.

Unter den zusammengesetzten Systemen ist das Harnsystem eines von denen, welche an Abweichungen von der Regel am reichsten sind. Vorzüglich gilt dies für die ursprünglichen Bildungsfehler, indem es in Hinsicht auf Gestalt, Lage, Größe und äußere Form der verschiedenen Abschnitte, woraus es besteht, und der Blutgefäße, welche es erhält, die auffallendsten Verschiedenheiten darbietet. Außerdem enthält auch die Höhle der Harnwerkzeuge, vorzüglich in Folge regelwidriger Bedingungen, welche der Harn darbietet, nicht selten fremde Körper.

I. F o r m f e h l e r.

A. N i e r e n <sup>2)</sup>.

§. 2379.

1. U r s p r ü n g l i c h e.

Die-ursprünglichen, mehr oder weniger deutlich aus frühern Formen herzuleitenden Bildungsfehler der Nieren sind <sup>3)</sup>:

§h 5

a) M a n n

1) Baillie Engravings. Lond. 1812. Fasc. VI — VIII.

Ch. Bell Engravings from specimens of morbid parts, preserved in the Authors collection, selected from the division inscribed Urethra, Vesica, Ren, morbose et laesa etc. London, 1813.

John Howship practical observations on the diseases of the urinary organs, particularly those of the bladder, prostata gland and urethra. Illustrated by cases and engravings. London, 1816. 8.

2) O. Heer de renum morbis. Halae. 1790.

3) E. über diese Formabweichungen der Nieren meine path. Anat. Bd. 1. S. 610 ff.

a) Mangel einer oder beider.

b) Kleinheit, wo unter beiden Bedingungen, wenn nur die eine Niere von der Regel abweicht, die andere oft, aber nicht immer, durch stärkere Entwicklung den Mangel ersetzt, daher

c) mehr oder weniger bedeutende Verschiedenheit der Größe beider Nieren.

d) Beträchtliche Größe beider.

e) Verschmelzung beider Nieren, welche mehreren graduelle und qualitative Verschiedenheiten darbieten. Die letztern beziehen sich vorzüglich auf die Lage, sofern entweder ohne Spur, daß jemals an der fehlenden Stelle eine Niere vorhanden war, die allein anwesende auf der einen Seite, an der normalen Stelle, in der gewöhnlichen Richtung liegt, und meistens, außer der Größe, durch Einschnürung in der Mitte, Mehrzahl der Gefäße, Ausschnitte, Becken und Harnleiter ihre Zusammensetzung bezeugt, oder die beiden Hälften der verbundenen Masse an den gewöhnlichen Stellen liegen. Die erstern Verschiedenheiten betreffen den Grad der Verschmelzung. Diese nimmt weit häufiger nur den untern Theil der Niere in einer größern oder geringern Höhe ein, wo dann die verwachsenen Nieren eine halbmondförmige Gestalt haben, mit dem concaven Rande nach oben, dem gewölbten nach unten gewandt sind; seltner erstreckt sie sich durch ihre ganze Höhe, wo die Nieren entweder eine viereckige oder rundliche Masse darstellen.

f) Längliche Gestalt.

g) Lage des Beckens an der vordern Fläche. Beide sind gewöhnlich mit regelwidriger Größe verbunden, kommen aber auch ohne diese vor.

h) Ge-

b) Gelappter Bau, der bisweilen bis zum Zerfallen der Niere geht.

1) Lage der Niere, wo man sie selbst im Becken findet.

§. 2380.

2. Von diesen Abweichungen entwickeln sich mehrere auch erst im Laufe des Lebens, namentlich gilt dies für die regelmäßige Größe und Kleinheit, indem die Nieren nicht ganz Allen; jedoch mit Veränderung der Textur, eine bisweilen ungeheure Masse erlangen, und auf entgegengesetzte Weise fast ganz verschwinden, so daß unter letzterer Bedingung entweder ihr Umfang sich außerordentlich vermindert, und die Masse solide bleibt, oder die Substanz, ohne Verminderung des Umfangs, selbst mit Vergrößerung desselben, fast ganz zerfällt, und die Niere in einen dünnhäutigen Balg verwandelt wird. Die erste Art des Schwindens wird durch vorangegangene Krankheit der Niere herbeigeführt, die letztere nicht immer, sondern hat oft ihren Grund in einem, unterhalb der Niere befindlichen Hindernisse des Harnabflusses.

## B. Harnleiter.

§. 2381.

Bei den Harnleitern sind vorzüglich die Formabweichungen merkwürdig.

Die angeborenen sind 1) Mangel; 2) Unterbrechung durch Verschließung an einer oder mehreren Stellen; 3) Mehrzahl, welche durch Nichtvereinigung der Äste des Beckens entsteht und verschiedene Grade hat<sup>1)</sup>.

Die

---

1) S. hierüber meine path. Anat. Bd. 2. S. 155.

Die häufigste, später entstehende Formabweichung derselben ist regelwidrige Vergrößerung, Ausdehnung in Folge eines entweder in ihnen selbst, oder einem andern Theile des Harnsystems, oder außerhalb demselben befindlichen Hindernisses des Harnausschlusses. Ersterer Art sind Stricturen und Verengerungen, letzterer Art Vergrößerungen der Beckendrüsen, der innern Geschlechtstheile, Verwachsungen derselben unter einander und mit den benachbarten Theilen u. s. w.

In Folge derselben zerreißt der Harnleiter endlich histeilen.

### C. Harnblase.

§. 2382.

#### I. Ursprüngliche Formabweichungen.

Die ursprünglichen Formabweichungen der Harnblase sind

a) Mangel, welcher mit oder ohne ähnliche Abweichung im übrigen Theile des Harnsystems vorkommt.

b) Kleinheit.

c) Spaltung. Diese, nicht ganz seltne, abweichende Bildung derselben führt gewöhnlich den Namen des Vorfalles, der Umkehrung, des Vorfalles der umgekehrten Harnblase (*Prolapsus vesicae urinae inversae*). Hauptsächliche Bedingungen sind folgende <sup>1)</sup>.

An dem untern Ende der vordern Unterleibsfläche über der Schambeinfuge befindet sich eine rötliche, weiche, feuchte, rundliche Stelle, die an ihrem Rande in die allgemeinen Beckendeckung

1) S. hierüber umständlich Meckel's Handb. der pathol. Anat. Bd. I. S. 715 ff., wo zugleich die vorzüglichsten allgemeinen Schriften und einzelnen Beobachtungen über diesen Gegenstand angeführt sind.

deckungen ununterbrochen übergeht und an ihrem untern Theile zwei warzenähnliche, gegen einander gerichtete Hervorragungen hat, aus welchen beständig Harn träufelt. Dies ist die Harnblase, welche hier nicht die Gestalt einer Höhle, sondern einer Platte hat, deren vordere Fläche durch die Schleimhaut der Harnblase gebildet wird. Hinter dieser liegt die Muskelhaut, und sie ist vom Bauchfelle in ihrem obern Theile bekleidet. Die vorspringenden Warzen sind die Oeffnungen der Harnleiter, welche auf die gewöhnliche Weise in die Blase einmünden, und sich gewöhnlich nur durch beträchtliche Weite vom Normal entfernen.

Nicht auf dem obern Ende der Harnblase, also beträchtlich tiefer als gewöhnlich, sitzt der Nabel auf.

Die Harnröhre ist zugleich meistens oben offen, beim Manne die Ruthe, beim Weibe der Kitzler, mehr oder weniger gespalten und unvollkommen gebildet.

Ueberhaupt erscheinen die äußern Zeugungstheile auseinander gezogen.

Nur höchstens zwei bekannte Fälle ausgenommen, ist die Schambeinfuge zugleich immer mehr oder weniger unvollkommen geschlossen, worin die scheinbare Kürze der männlichen Ruthe begründet ist.

Diese Bildungsabweichung ist nach Duncan<sup>1)</sup>, vorzüglich dem männlichen Geschlechte eigen, indessen kann man zu den von ihm angeführten Fällen, wo sie beim weiblichen Geschlechte vorkam, eine beträchtliche Anzahl setzen.

d) Zweigehörnte Gestalt der Harnblase oder Bildung derselben aus mehreren Säcken.

e) Df:

---

1) Edinb. med. and surg. Journal. 1805.

e) Offenbleiben des Harnstranges bis zum Nabel, wo dann der Harn hier ausfließt.

§. 2383.

2. Erworbne sind wenigstens meistens:

a) ungewöhnliche Größe. Diese ist entweder bloße Ausdehnung oder zugleich mit Massezunahme verbunden, und meistens Folge eines, am untern Theile der Harnblase oder in der Harnröhre befindlichen Hindernisses des Harnaussflusses.

b) Starke Entwicklung der Muskelhaut, die oft ohne Vergrößerung, selbst mit Verkleinerung der Harnblase, vorzüglich durch Anwesenheit eines in der Harnblase selbst befindlichen fremden Körpers, z. B. eines Steines, vorkommt.

c) Brüche der innern Haut der Harnblase durch die Muskelhaut<sup>1)</sup> (Appendices l. procellus), gleichfalls höchst selten angeboren, meistens Folge ähnlicher Bedingungen.

d) Zerreißung der Harnblase, meistens eine Folge vorangegangner Ausdehnung.

e) Regelwidrige Lage, Vortreten der Harnblase. Am häufigsten steigt die Harnblase nach unten herab und bildet den Mutterscheidenbruch, wenn sie entweder durch ihr Gewicht, weil sie z. B. mit Steinen angefüllt ist, die Scheide hervor- und herabdrängt, oder durch Verengung des Raumes, z. B. durch Entwicklung der Gebärmutter während der Schwangerschaft, selbst herabgedrückt wird.

Et

---

1) Ch. Bell reports on Sacs formed in the urinary bladder; on incysted calculus; on sounding for the stone; and on the method of performing lithotomy when the stone is sacculated. Surgic. observ. Part. IV. London: 1817.



Sie veranlaßt dann eine mehr oder weniger vollständige Umkehrung der Scheide, der sie aber auch, wenn diese ursprünglich war, mehr oder weniger nachfolgt.

Außerdem findet sie sich, jedoch weit seltner in Leistenbrüchen<sup>1)</sup>.

h) Tritt der Vorfall der Scheide und Harnblase schnell ein, so ist er bisweilen, doch sehr selten, mit einer Umkehrung der Harnröhre zusammengesetzt, wobei unstreitig die Harnröhre immer mehr oder weniger zerrissen ist.

## II. Legturveränderungen.

### A. Nieren.

#### §. 2384.

Die Consistenz der Nieren ist nicht immer dieselbe. Bedeutend schlaff findet man sie bisweilen bei der Harnruhr, wo zugleich der Blutsreichtum derselben oft sehr vergrößert ist.

Auf entgegengesetzte Weise ist die Consistenz der Nieren bisweilen außerordentlich vergrößert.

Nicht ganz selten tritt Umwandlung derselben in Fett ein.

Eben so entwickeln sich häufig, besonders im höhern Alter, eine oft ungeheure Menge meistens festigender, mit einer verschiedentlich gefärbten, meistentheils dünnen Flüssigkeit angefüllter seröser Bälge in ihrer Substanz, wodurch diese bisweilen ganz zerstört wird. Bisweilen scheint die Niere ursprünglich aus Bälgen dieser Art gebildet<sup>2)</sup>.

Selt:

1) S. hierüber näher Meckel's pathol. Anat. Bb. 2. S. 424 ff.

2) O. Heer de renum morbis. Halae. 1790. Tab. I.

Seltner sind die Nieren der Stg scrophulöser<sup>1)</sup> und schwammiger Geschwülste.

### B. Harnblase.

#### §. 2385.

Bei der Vergrößerung der Harnblase werden die Häute zugleich durch Entzündung meistens verdickt, fester, verwachsen enger mit einander, werden stellenweise zerstückt u. s. w.

Beim Blasencatarrh vergrößern sich die Schleimdrüsen der innern Haut oft beträchtlich.

An dieser entwickeln sich, vorzüglich im untern Theile der hintern Wand der Harnblase, mehr oder weniger große, rundliche, ungleiche, mit einer engern Grundfläche aufsteigende, röhrlische, kein deutliches Gewebe zeigende Geschwülste, Schwämme der Harnblase (*Fungus vesicae urinae*), vorzüglich im höhern Alter und beim männlichen Geschlecht.

### III. Fremde Körper.

#### §. 2386.

Als fremde Körper kommen, vorzüglich häufig in der Höhle des Harnsystems, also in den Harnleitern und der Harnblase, selten Entozoen, häufig Steine vor.

#### A. Entozoen.

#### §. 2387.

Die Entozoen sind 1) Hydatiden<sup>2)</sup>, welche sich vorzüglich in den Nieren, vielleicht unter allen Theilen des Harnsystems immer ursprünglich hier bilden;

2) Stron-

1) Baillie's Engravings. Fasc. VI. Tab. 8.

2) N. a. D. Tab. 7. 8.

2) der Pallisadenwurm (*Strongylus gigas*), der in den Nieren vorkommt;

3) eine dritte und vierte, noch unbestimmte Art, welche mit dem Harn abging<sup>1)</sup>.

B. Steine<sup>2)</sup>.

§. 2388.

Die Harnsteine bieten folgende allgemeine und besondere Betrachtungspunkte dar.

§. 2389.

1) Die allgemeinen beziehen sich a) auf das Ortsverhältniß; b) das Gewebe; c) äußere Gestalt;  
d) Größe;

1) Lawrence case of a woman who voided a large number of worms by the urethra. Med. chir. Tr. Vol. 2.

2) Tenon sur la nature des calculs. Mém. de Paris. 1764.

C. W. Scheele Unters. des Blasensteins. In den schwed. Abh. Bd. 37.

E. Sandifort de calculo renali. Obs. an. path. 1777. I. 6.  
Id. de calculis renum et vesicae. Ibid. IV. 7.

Id. de lethali urinae suppressione ex calculo, urethrae inserto, indeque nata duplici hujus canalıs ruptura. Ibid. III. 5.

Friedrich August Walter, Mitglied der Academie der Wissenschaften zu Berlin. Anat. Musaeum. Th. I. Berlin. 1796.

Wollaston on gouty and urinary concretions. Phil. Tr. 1797.

Pearson experiments etc. Ebenbas. 1798.

A. Foureroy sur les calculs des animaux etc. Annal. du Muséum. T. I.

Grande von den Verschiedenheiten der Steine u. s. w. Aus den phil. Tr. 1808. in Medel's Archiv Bd. 2.

A. Marcet essay on the chemical history and medical treatment of calculous disorders. London. 1817.

d) Größe; e) Zahl; f) Entstehungsweise; g) Einfluß auf die enthaltenden Organe.

a) Ortsverhältniß. Das Ortsverhältniß der Steine variirt in mehrern Beziehungen, namentlich a) in Hinsicht auf die Stelle; b) auf Zusammenhang mit dem Harnsystem.

a) Stelle. Die Steine kommen entweder in der Höhle, oder in den Wänden des Harnsystems vor.

Die erstere Bedingung ist die bei weitem häufigste.

Von den vier Abschnitten, in welchen Steine vorkommen können, dem Nierenbecken, dem Harnleiter, der Blase und der Harnröhre, ist die Harnblase bei weitem am häufigsten, die Harnröhre am seltensten der Sitz derselben.

Gewöhnlich ist der Theil der Höhle des Harnsystems, in welchem sie sich finden, namentlich der Harnblase, auf keine Weise von den übrigen regelwidrig getrennt, doch liegen sie bisweilen in einem eignen Behälter, der mit der gemeinschaftlichen Höhle durch eine engere Oeffnung zusammenhängt, und erhalten dann hier den Namen der eingesetzten Steine (s. oben S. 494.).

In den meisten Fällen ist unstreitig dieser Zustand die Veranlassung zur Entstehung der, in den Wänden der Blase vorkommenden Steine, indem die Verbindungsöffnung verengt, und man kann nicht annehmen, daß die Steine sich außerhalb der Höhle der Harnblase erzeugten.

b) Ortsverhältniß. Am gewöhnlichsten, fast immer, sind die Steine ganz frei; bisweilen aber hängen sie mit der innern Fläche der Blase durch verdickten und geronnenen Schleim

- Schleim oder Faserstoff zusammen, der sich zwischen ihre Ungleichheiten legt<sup>1)</sup>).

b) Gewebe. Die Harnsteine bestehen fast immer mehr oder weniger deutlich aus mehreren über einander liegenden, mehr oder weniger concentrischen Schichten. Ihr Mittelpunkt wird eben so gewöhnlich durch einen Kern gebildet, der meistens Harnsäure, seltner ein zufällig in das Harnsystem, namentlich dann die Blase, gelangter, fremder Körper ist.

Gewöhnlich, aber nicht immer, haben die verschiedenen Schichten dieselben Mischungen, und immer sind sie wenigstens aus einer doppelten Substanz, der harten, und der, die einzelnen Theile derselben zusammenleimenden, weichen, ursprünglich flüssigen, zusammengesetzt.

c) Die äußere Gestalt der Harnsteine ist mehr oder weniger länglichrundlich, meistens glatt, und etwas plattgedrückt. Dies ist theils in ihnen selbst, theils in dem Einflusse der enthaltenden Theile begründet, sofern die Harnblase diese Gestalt hat. Der Einfluß der Gestalt der enthaltenden Theile ergibt sich besonders aus der Gestalt der Steine des Nierenbeckens.

d) Die Größe variiert von dem Umfange eines kaum sichtbaren Körnchen bis zum Durchmesser mehrerer Zolle, so daß sie die ganze Blase anfüllen, und beträchtlich ausdehnen.

e) Die Zahl ist gewöhnlich einfach, oder wenigstens nicht beträchtlich. Finden sich mehrere Steine, so haben sie gewöhnlich, aber nicht immer, dieselbe Mischung.

Fi 2

f) Ues

---

1) S. außer ältern, von mir (Path. Anat. Bd. 2. Abth. 2. S. 444.) angeführten Fällen, neue Beschreibungen und Abbildungen bei Howship (a. a. O. S. 249. Taf. III. Fig. 5.) und Bell. Surgical observations. London 1817. Part. 4. p. 444. Taf. 1.

f) Ueber die Entstehung der Harnsteine läßt sich im Allgemeinen festsetzen, daß sie entweder in einer regelwidrigen Beschaffenheit des Harnsystems, oder in der Anwesenheit eines zufällig in die Harnblase gelangten, fremden Körpers begründet ist.

Die regelwidrige Beschaffenheit des Harnsystems ist mehrfacher Art. Am gewöhnlichsten leidet der harnabsondernde Theil und eine fehlerhafte Mischung des Harns ist daher die allgemeinste Ursache; seltner ist diese in einer regelwidrigen Anordnung des harnaussführenden und bewahrenden Theiles begründet; doch geben in der That mechanische Hindernisse des Heraustrittes, namentlich in der Blase Säcke, ferner Brüche, in der Harnröhre Verengerungen Veranlassung, so daß selbst zwischen der Vorhaut und der Eichel unter dieser Bedingung Steine gefunden wurden<sup>1)</sup>.

g) Der Einfluß der Harnsteine auf das Harnsystem ist nicht immer derselbe.

Ueberall bewirken sie als fremde Körper mehr oder weniger heftige Schmerzen, deren Grad und Beschaffenheit, abgesehen von der Lebensstimmung des Kranken, von ihrer Gestalt, Lage, Zahl und Größe abhängt.

Formveränderungen des Harnsystems sind unter dieser Bedingung theils Ausdehnung der membranösen Theile, namentlich der Harnleiter, theils Verdickung des muskulösen Theiles, also der Harnblase, die oft mit Vergrößerung, gewöhnlicher mit Verkleinerung ihrer Höhle verbunden ist, seltner Zerreißung, vorzüglich der Harnröhre.

§. 239a.

1) Walter Obs. anat. Berol. 1775. p. 54. Veneda bei Brera f. in. Handbuch der pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 2. S. 444.

S. 239a.

Die besondern Bedingungen der Harnsteine stehen vorzüglich und fast durchaus mit ihrer Mischung im engsten Zusammenhange, und die verschiedenen Arten derselben werden daher am besten in Beziehung auf alle diese Bedingungen zugleich betrachtet.

Nach den vorhandnen Untersuchungen gehen vorzüglich Harnsäure, phosphorsaurer Kalk, phosphorsaure Ammoniakmagnesia, kieseaurer Kalk, Blasen Säure, außerdem, aber weit unbeständiger, seltner und in geringerer Menge, Kiesel-erde, kohlensaurer Kalk, Eisen und noch zwei andre, wahrscheinlich eigenthümliche Substanzen in die Zusammensetzung der Harnsteine ein <sup>1)</sup>. Das außerdem von Fourcroy und Wauquelin angenommene harnsaure Ammonium wird zwar von Wollaston und Brande geläugnet, und als ein durch die Analyse hervorgebrachtes Product angesehen; allein ohne daß sich aus den angeführten Gründen mit Gewißheit annehmen ließe, daß es nie in den Harnsteinen vorkäme <sup>2)</sup>.

Diese sind bald einfach, bald treten sie in größerer oder geringerer Menge zur Bildung der Steine zusammen, woraus sich dann eine bedeutende Menge verschiedner Arten ergibt.

Einfache Steine sind 1) die harnsauren, welche glatt und rothbraun sind, und meistens aus concentrischen Schichten bestehen, unter allen die häufigsten;

2) die aus phosphorsaurem Kalk gebildeten, welche verhältnißmäßig selten, weiß, und aus leicht trennbaren Schichten zusammengesetzt sind;

3) die

---

1) Marceſ a. a. O. Kap. 4.

2) Ebendaſelbſt S. 94.

3) die aus klee saurem Kalk bestehenden, welche rund, meistens, allein durchaus nicht immer, zackig, braun sind, und immer in den Nieren gebildet zu werden scheinen;

4) die Blasenogdsteine (*Oxydum cysticum*), richtiger Nierenogdsteine (*Oxydum renale*), indem sie höchst wahrscheinlich immer in den Nieren entstehen<sup>1)</sup>, sind gelblich, halbdurchsichtig, nicht blätterig.

Zusammengesetzte 1) so, daß die verschiedenen Substanzen nicht in verschiedenen Schichten von einander getrennt sind.

a) Phosphorsaure Kalk und phosphorsaure Ammoniakmagnesia, Wollaston's und Marcet's schmelzbarer Stein (*Calculus fusibilis*), nächst den harnsauren der häufigste, weißer und zerreiblicher als die übrigen Arten. Oft herrscht die phosphorsaure Ammoniakmagnesia, ungeachtet sie selten oder nie einfache Steine bildet, in ihm bedeutend vor. Die Steine, welche sich um zufällig in die Blase gelangte, fremde Körper, bei Harnbeschwerden, und zwischen der Vorhaut und Eichel bilden, sind fast immer von dieser Art, weil unter diesen Bedingungen der Harn mehr oder weniger zersezt wird.

b) Mehrfach zusammengesetzte, die sich durch unbestimmte Gestalt, Farbe, Mangel an deutlicher Schichtung, gewöhnlich beträchtliche Härte unterscheiden.

2) Zusammengesetzte Steine, deren verschiedene Substanzen eigne abge sonderte Schichten bilden. Die Zahl der Substanzen variiert von zwei bis vier, gewöhnlich aber finden sich nur zwei, Harnsäure mit einem phosphorsauren Salz, oder mit klee saurem Kalk, oder die beiden letztern Substanzen mit einander, wozu bisweilen ein andres phosphorsaures Salz

oder

1) Marcet a. a. D. S. 37.



der Kieselerde tritt. In einem Falle bestand ein vierfacher geschnittener Stein von innen nach außen aus Blänsäure, phosphorsäurem Kalk, kleeäurem Kalk und schmelzbarer äußerer Hinde<sup>1)</sup>.

### Zweite Unterabtheilung.

#### Von den Nebennieren<sup>2)</sup>.

##### I. Regelmäßiger Zustand.

##### 1. Vollkommener Zustand im Allgemeinen.

###### a. Größe.

###### §. 2391.

Die Nebennieren, Obernieren, Nierendrüs-  
en (Renes succenturiati, Capsulae s. Glandulae suprarenales s. atrabilariae), liegen als dreieckige, von vorn nach hinten sehr platte Körper sehr dicht an den Nieren, mit welchen sie durch kurzes Zellgewebe verbunden sind, so daß sie sich an ihrem obern Ende und dem obern Theile ihres innern Randes befinden. Wie sie, liegen sie außerhalb dem Bauchfelle.

###### b. Gestalt und Größe.

###### §. 2392.

Die Gestalt der Nebennieren ist so eben im Allgemeinen gegeben. Sie sind von oben nach unten mehr lang als von

Seite 4 einer

1) Marcet S. 89.

2) A. M. Valsalva diss. anat. III.

B. Morgagni. Epist. anat. XX.

Duvernoi Comm. Petrop. T. II.

Böckler a. a. D. (S. oben S. 446.)

J. C. Mayer resp. Schmidt de glandulis suprarenalibus. Francof. 1784.

Riegels de usu glandularum superrenalium nec non de origine adipis. Hafn. 1790.

J. F. Meckel (a. a. D. S. 446.)

einer Seite zur andern breit. Ihre Dicke beträgt nur ungefähr eine Linie. Ihre Gestalt ist nicht auf beiden Seiten die selbe, indem die linke etwas mehr hoch, und weniger breit als die rechte ist. Die linke ist 15 — 17 Linien lang und ungefähr einen Zoll breit, die rechte gewöhnlich 14 — 15 Linien lang, und 12 — 14 breit.

An der äußern Oberfläche verlaufen Furchen, durch welche die Gefäße ein- und austreten. Gewöhnlich findet sich an der linken Nebenniere vorn eine Längenfurche, an der rechten zwei quere, eine vordere und eine hintere.

c. Gewicht.

§. 2393.

Jede Nebenniere wiegt beim Erwachsenen ungefähr eine Drachme.

d. Consistenz und Farbe.

§. 2394.

Sie sind ziemlich hart, aber brüchig.

Außerlich ist die Farbe gelblichbraun, im Innern dunkelrothbraun.

e. Bau.

§. 2395.

Sie bestehen aus einer doppelten Substanz, einer äußern, härtern, gelblichen, und einer innern, weichern, dunkelrothbraunen. Die erstere ist deutlich aus, von außen nach innen verlaufenden senkrechten Fasern zusammengesetzt. Oft sind beide unter einander gemengt, und die Nebenniere hat dadurch äußerlich ein fleckiges Ansehen. Die äußere läßt sich mehr oder weniger deutlich in rundliche Lappen, diese in Lappchen zerfallen, und wird von einer zarten, serösen, eng an sie gehefteten Haut bekleidet.

Nach

Nach mehreren Anatomen enthalten die Nebennieren eine mehr oder weniger zusammengesetzte Höhle in ihrem Innern; indessen glaube ich, wie ich schon früher angegeben habe <sup>1)</sup>, nach wiederholten Untersuchungen mit andern noch jetzt annehmen zu müssen, daß diese Höhle wenigstens im regelmäßigen Zustande nicht vorhanden ist, und erst nach dem Tode entweder durch von selbst erfolgende Zersetzung der sehr weichen innern Substanz, oder durch mechanische Zerstörung derselben bei der Untersuchung entsteht.

Mit den Blutadern hat die Substanz der Nebennieren, namentlich die innere, einen sehr nahen und unmittelbaren Zusammenhang, indem in die Venen eingespritzte Feuchtigkeiten und eingeblasene Luft sehr leicht in sie dringen, und, ihrer Weichheit wegen, den Anschein einer Höhle bewirken.

## §. 2396.

Die Nebennieren sind unvollkommne Drüsen, so fern sie keinen Ausführungsgang haben. Zwar wurde dieser von mehreren, zum Theil vorzüglichen Anatomen, z. B. Lh. Bartholin <sup>2)</sup>, Peyer <sup>3)</sup>, Balsalva <sup>4)</sup>, Ranby <sup>5)</sup>, Kulmus <sup>6)</sup>, Feuermann <sup>7)</sup>, Deudt <sup>8)</sup> angenommen, und namentlich sollte er nach Bartholin, Peyer, Balsalva,

Zi 5

salva,

---

1) Abhandl. S. 17 ff.

2) Rhodii mantissa. p. 36.

3) Obf. anat. obf. 32.

4) Diff. anat. III.

Morgagni Ep. anat. XX.

5) Phil. Tr. p. 385.

6) Bresl. Samml. 1732. Febr.

7) Physiol. Th. 4. S. 97.

8) De fabr. vile. uropoët. p. 17.

salva, Ranby die Nebenniere mit dem Hoden, nach Kulmus mit dem Saugaderstamm, nach Heuermann und Beudt dagegen mit dem Nierenbecken verbinden; allein die sorgfältigsten, an einer beträchtlichen Menge von Leichen angestellten Untersuchungen gaben mir immer ein entgegenge-setztes Resultat, und ich sehe daher den Mangel eines Ausführungsganges um so mehr als erwiesen an, da vor allen Morgagni's Nachforschungen denselben Erfolg hatten.

## 2. Racenverschiedenheiten.

§. 2397.

Nach einigen Angaben sind die Nebennieren bei den Negern größer als bei den Kaukasiern, und ihre Marksubstanz ist dunkler gefärbt<sup>1)</sup>; doch konnte ich bei Untersuchung einer männlichen äthiopischen Leiche diese Verschiedenheit nicht bemerken, ungeachtet ich sie früher bei einer weiblichen allerdings wahrnahm<sup>2)</sup>.

## 3. Periodische Verschiedenheiten.

§. 2398.

Die Nebennieren sind schon beim zweimonatlichen Embryo sehr deutlich.

Von ihrem ersten Erscheinen an nimmt ihre verhältnißmäßige, von der Zeit der Geburt an, wenigstens oft, selbst ihre absolute Größe allmählich ab. Sie werden besonders dünner, trockner, schrumpfen ein und im Alter verschwinden sie sogar bisweilen ganz<sup>3)</sup>. Noch am Ende des dritten Monates sind  
die

1) Cassan observ. med. In Hufeland's Annalen der franz. Arzneiw. Bd. 1. S. 475.

2) Handbuch der pathol. Anat. Bd. 1. S. 648.

3) Bichat anat. génér. T. V. p. 462.

Die Nebennieren etwas größer und schwerer als die Nieren. Im vierten sind sie gleich groß, aber, wegen größerer Lockersheit, etwas leichter, im Anfange des sechsten sind sie mehr als halb so groß, ihr Gewicht aber verhält sich aus demselben Grunde wie 2:5, indem jede Nebenniere 10, jede Niere 25 Gran wog. Beim reifen Fötus ist das Verhältniß ungefähr wie 1:3, indem ich jede Nebenniere gewöhnlich etwas schwerer als vier Skrupel, jede Niere etwas über eine halbe Unze wiegend fand. Dagegen ist das Verhältniß bei Erwachsenen, wo die Nebenniere 1 Drachme, die Niere  $3\frac{1}{2}$  Unze wiegt, wie 1:28.

Sie sind anfangs deutlicher und vielfacher gelappt als späterhin, enthalten aber in frühern Perioden nicht allgemein eine Höhle.

#### 4. Function.

§. 2399.

Die Angabe der Function der Nebennieren ist sehr schwierig, wenn sich gleich im Allgemeinen aus ihrer ansehnlichen Größe vor der Geburt ergibt, daß sie in dieser Periode eine vorzügliche Bedeutung haben.

Nöthigstwahrscheinlich haben sie, wie Leber, Milz, Schilddrüsen und Thymus, einen unmittelbaren Antheil an der vollkommenen Blutausbildung. Wenigstens sprechen ihre beträchtliche Entwicklung beim Fötus, ihre freie Communication mit dem Venensystem, ihre Nähe an der untern Hohlvene, für diese Ansicht.

Die Beobachter, welche einen Ausführungsgang von ihnen zu den Zeugungstheilen annahmen, setzten sie nothwendig mit diesem System in eine unmittelbare Verbindung, und ich wurde,

wurde, gänzlich unbekannt mit dieser Ansicht, durch andre Thatsachen, namentlich besonders die gleichzeitige starke Entwicklung derselben mit ansehnlicher Ausbildung der Zeugungstheile, bei mehrern Säugthierordnungen, zu derselben Ansicht veranlaßt<sup>1)</sup>, ohne jedoch die Art des Zusammenwirkens dieser Theile genauer bestimmen zu können.

Als fernern Grund für diese Meinung kann man das Zusammenfallen regelwidriger Zustände der Nebentieren und des Zeugungssystems ansehen. So fand *Vauquelin* bei einem in der Jugend verschnittenen Rater die Nebentieren versteinert<sup>2)</sup>; *Lobstein* die linke bei einem lange syphilitisch gemessenen Menschen durch eine talgartige Masse um das dreifache vergrößert<sup>3)</sup>, ich sie zweimal bei sehr wollüstigen Menschen bedeutend stärker entwickelt als gewöhnlich<sup>4)</sup>; in einem Falle durch Geschwülste bei einer kürzlich Entbundenen, wo Gebärmutter und Eierstock der einen Seite außerdem auf ähnliche Weise abweichen<sup>5)</sup>; *Otto* sah sie mit starker Entwicklung der Zeugungstheile doppelt so groß als im Normalzustande<sup>6)</sup>.

Auch spricht die gleichzeitige sehr starke Ausbildung beider beim Fötus, so wie das Zusammenfallen ihrer Kleinheit, selbst ihres Mangels mit unvollkommner Ausbildung des, mit den Zeugungstheilen so bedeutend auf antagonistische Weise sympathisirenden Gehirns sehr für diese Ansicht. Verwandt mit ihr ist die, daß sie unvollkommne Andeutung von Zeugungstheilen

zeigen,

1) Abhandlungen 1806. S. 164 ff.

2) *Fourcroy* méd. ecl. par les sc. T. I. p. 256.

3) *Rapports sur les travaux anat.* Strasbourg. 1805.

4) Abhandl. S. 185. 186.

5) Ebendaf. S. 135.

6) *Path. anat.* Beobachtungen 1816. S. 139.

seyn <sup>1)</sup>, wenn gleich die Vermuthung, daß, wären sie mit den Nieren enger verbunden, bei höher gesteigerter Thätigkeit von diesen wirkliche Begattung und Production eines neuen Individuums durch die Nebennieren Statt finden würde, allzu gewagt scheint.

Weniger wahrscheinlich ist es mir, daß sie mit den Nieren in einer mechanischen oder dynamischen-Beziehung stehen, vorzüglich, weil, wenn die Niere sich an einer ungewöhnlichen Stelle befindet, doch immer die Nebenniere, weit von ihr entfernt, ihre normale einnimmt.

Noch unwahrscheinlicher ist die Annahme, daß sie zur Forterzeugung beitragen <sup>2)</sup>.

## II. Regelwidriger Zustand.

### §. 2400.

Die Nebennieren weichen höchst selten vom normalen Zustande ab <sup>3)</sup>. Sofern diese Erscheinung Lecturfehler betrifft, ist sie höchstwahrscheinlich in dem frühen Aufhören einer bedeutenden Thätigkeit der Nebennieren begründet.

Eine sehr allgemeine, ursprüngliche Abweichung der Nebennieren von der Regel ist die *Kleinheit* oder der gänzliche Mangel derselben bei unvollkommener Ausbildung des Gehirns und der obern Körperhälfte überhaupt. Nur in zwei bis drei Fällen dieser Art waren sie regelmäßig groß. Jene  
un

1) L. E. Treviranus Untersuchungen über wichtige Gegenstände der Naturwissenschaft und Medicin. Göttingen. 1803. S. 184.

2) Kiegels a. a. D.

3) Lauth bei Lobstein a. a. D. S. 36.

Dupuytren in Meckel's Abhandl. S. 141. Ihre Angaben kann ich durch meine Untersuchungen völlig bestätigen.

unvollkommene Entwicklung derselben kommt nicht bloß mit Fehlern des Gehirns, sondern überhaupt mit Hemmung seiner Entwicklung, namentlich mit angeborener Hirnhöhlenwasser sucht, vor.

Bisweilen vermehrt sich ihre Zahl <sup>1)</sup>, eine interessante Erscheinung, weil sie an die analoge, nicht ganz selten vorkommende Anordnung in einem verwandten Organ, der Milz <sup>2)</sup>, erinnert.

Ob dieser Zustand ein bloßes Zerfallen oder wirkliche Vermehrung der Nebennierensubstanz sey, läßt sich schwer ausmitteln. Aus dem letztern Gesichtspunkte betrachtet, würde er zu der, bisweilen vorkommenden Vergrößerung <sup>3)</sup> der Nebennieren führen.

Diese ist selten, gewöhnlich wohl Folge von Texturveränderungen, und scheint vorzugsweise mit regelwidrigen Zuständen der Zeugungstheile zusammenzufallen.

#### Fünfte Abtheilung.

#### Von den Geschlechtstheilen <sup>4)</sup>.

§. 2401.

Die Geschlechtstheile oder Zeugungstheile, Schamtheile (Partes l. Organa sexualia, genitalia, l. generationi inservientia) beziehen sich vorzüglich auf die Erhaltung

1) Duvernoi a. a. O.

Morgagni. Ep. XX. a. 45.

Otto's seltne Beobacht. LXXXIV.

2) C. oben S. 375.

3) Harder Apian. Obl. 61. Oben S. 507. 508.

4) F. Plazzoni de partibus generationi inservientibus. Libris II. Patav. 1321.



tung der Art, statt daß die übrigen zunächst nur auf die Erhaltung des Individuums abzielen. Doch stehen sie auch mit dem individuellen Organismus in einer directen Beziehung, wie die Folgen des ursprünglichen, angeborenen, oder durch Zufall oder Absicht veranlaßten Mangels derselben beweisen. In ihnen spricht sich der Geschlechtsunterschied, der über den ganzen Organismus verbreitet ist, am deutlichsten aus, so daß sie die Organe sind, welche in beiden Geschlechtern die größten Verschiedenheiten darbieten. Eine oberflächliche Betrachtung hat daher häufig zu der Behauptung veranlaßt, daß die männlichen von den weiblichen Geschlechtstheilen durchaus verschieden und einander gar nicht zu vergleichen seien; allein schon die vergleichende Betrachtung beider in irgend einer Thierart und zunächst in der menschlichen, beweist, daß beiden eine und dieselbe Form zum Grunde liege, daß durchaus beide in Hinsicht auf Zahl, wesentliche Structur und Function der sie zusammensetzenden Theile genau übereinkommen, und daß Größe und Lage die einzigen Verschiedenheiten, mithin die Ähnlichkeiten weit größer als die Verschiedenheiten sind, und man beide nur als Abänderung einer und derselben Urform ansehen hat <sup>1)</sup>).

Man kann am besten die Brüste mit den Geschlechtstheilen zugleich betrachten, indem sie an der Erhaltung des  
ins

---

W. Rolfink ordo et methodus generationi dicatarum partium per anatonem cognoscendi fabricam. Jenae. 1664.

Ejusdem de sexus utriusque partibus genitalibus specimen. Lipsi. 1675. 12.

Van Horne prodromus observationum suarum circa partes genitales in utroque sexu. L. B. 1668. 12. Mehrere Aufg.

1) Bd. 1. C. 172.

fen Fötus, und noch deutlicher in frühern Perioden, läßt sich der Harnstrang durch die Nabelöffnung, wenn gleich als dünner Faden, in einer längern oder kürzern Strecke, immer mehrere Zolle weit, gewöhnlich selbst in der ganzen Länge der Nabelschnur <sup>1)</sup> im Nabelstrange verfolgen, und es ist, sowohl der Analogie mit den Thieren, als mehreren Beobachtungen am Menschen nach höchst wahrscheinlich, daß er anfangs durch den ganzen Nabelstrang verläuft, und sich zwischen den Fötushüllen zu einer häutigen Blase, der Harnhaut (Allantois), von welcher in der Lehre vom Eie umständlicher die Rede seyn wird, erweitert. Daß dieser Faden hohl ist, beweist die noch beim reifen Fötus, nach meinen, mit denen von Röderer <sup>2)</sup> und Noeren <sup>3)</sup> übereinstimmenden Versuchen, vorhandne Möglichkeit, ihn mehr oder weniger weit im Nabelstrange von der Harnblase aus mit Quecksilber anzufüllen.

Die Annahme mehrerer Anatomen, z. B. unter den Meyern auch Treu's <sup>4)</sup>, daß der Harnstrang auch beim Fötus, wie in der Regel beim Erwachsenen, verschlossen sey, gründet sich auf die Anwesenheit einer an seinem untern Ende vorhandenen starken Biegung, welche bei Ausdehnung der Blase durch die angespannten Muskelfasern so gegen dieselbe gedrückt wird, daß sich der Eingang aus der Blase in die Höhle des Harnstranges verschließt.

II. Kt.

1) Hunter über die Schwangerschaft der Mutter. Uebersetzt von G. Forcier. Weimar

2) De foetu perfect.  
p. 535.

3) N. a. D.

4) De di-

II. Regelwidriger Zustand <sup>1)</sup>).

## §. 2378.

Unter den zusammengesetzten Systemen ist das Harnsystem eines von denen, welche an Abweichungen von der Regel am reichsten sind. Vorzüglich gilt dies für die ursprünglichen Bildungsfehler, indem es in Hinsicht auf Gestalt, Lage, Größe und äußere Form der verschiedenen Abschnitte, woraus es besteht, und der Blutgefäße, welche es erhält, die auffallendsten Verschiedenheiten darbietet. Außerdem enthält auch die Höhle der Harnwerkzeuge, vorzüglich in Folge regelwidriger Bedingungen, welche der Harn darbietet, nicht selten fremde Körper.

## I. F o r m f e h l e r.

A. N i e r e n <sup>2)</sup>).

## §. 2379.

## 1. Ursprüngliche.

Die ursprünglichen, mehr oder weniger deutlich aus frühern Formen herzuleitenden Bildungsfehler der Nieren sind <sup>3)</sup>:

§h 5

a) Mann

<sup>1)</sup> Baillie Engravings. Lond. 1812. Fasc. VI — VIII.

Ch. Bell Engravings from Specimens of morbid parts, preserved in the Authors collection, selected from the division inscribed Urethra, Vesica, Ren, morbose et laesa etc. London. 1813.

Now ship practical observations on the diseases of the ~~gaze~~ <sup>gaze</sup>, particularly those of the bladder, prostate illustrated by cases and engravings.

Hahn 1792.

der Harn ~~unter~~ <sup>unter</sup> ~~part.~~ <sup>part.</sup> ~~inst.~~

individuellen Organismus wenig oder gar keinen, einen sehr bedeutenden Antheil dagegen, als Ernährungsorgane des Neugeborenen, an dem Bestehen der Art haben, und, wie die übrigen Geschlechtstheile, einen sehr deutlichen Geschlechtsunterschied darbieten, so daß man am richtigsten, statt daß gewöhnlich die Benennung Geschlechts- und Zeugungstheile gleichbedeutend gebraucht wird, die letztere Benennung bloß den, zu ersten Hervorbringung wirkenden, oder eigentlich sogenannten Geschlechtstheilen gebe.

Alle diese Theile unterscheiden sich von den meisten übrigen durch die verhältnißmäßig geringe Dauer ihrer vollen Thätigkeit, die im Allgemeinen wenig über die Hälfte des Lebens des Organismus besteht, und auch während dieser Zeit sich nur in sehr langen Zwischenräumen äußert, sehr allgemeiner, oft sehr bedeutender Umwandlungen ihrer Lebensstimmung und ihres Baues bedarf, um zum Auftritt zu kommen.

#### Erste Unterabtheilung.

#### Regelmäßige Beschaffenheit.

#### A. Eigentliche Zeugungstheile.

#### I. Vollkommener Zustand.

#### §. 2402.

Die eigentlichen Zeugungstheile nehmen den unteren Theil des Stammes ein, und befinden sich in und am Becken.

Die männlichen und weiblichen unterscheiden sich vorzüglich durch den Umstand von einander, daß die erstern mehr nach außen hervorgerreten und in die Länge ausgezogen sind, während diese mehr nach innen liegen. Theile;  
die

Die beim Manne außerhalb der Unterleibshöhle liegen, sind beim Weibe in der Beckenhöhle verborgen, und auch die, welche beim Manne innerhalb der Beckenhöhle liegen, sind so weit nach vorn getreten, daß sie dicht hinter den allgemeinen Bedeckungen liegen. Wenn daher beim Weibe die Zahl und Größe der äußern, sich ohne Verletzung dem Auge darbietenden Zeugungstheile bei weitem geringer als die der innern ist, so findet beim Manne ein gerade entgegengesetztes Verhältniß Statt. Wie aber auch diese Verschiedenheit nicht das ganze Leben hindurch Statt finde, wird sich aus dem Folgenden ergeben.

## §. 2403.

Am besten theilt man in beiden Geschlechtern die Zeugungstheile nach der Function der verschiedenen sie zusammensetzenden Organe 1) in die eigentlichen Zeugungstheile oder bildenden Theile (*Organa generationis* l. *formantia*), und 2) in die Begattungstheile (*Organa copulationis*) ein.

Die bildenden Theile sind beim Manne die Hoden mit ihren Ausführungsgängen, die Vorsteherdrüse und die Cowperschen Drüsen; beim Weibe die Eierstöcke mit ihren Ausführungsgängen, den Trompeten, und die Gebärmutter. Begattungstheile sind beim Manne die Ruthe, beim Weibe die Scheide und die Scham.

## §. 2404.

In beiden Geschlechtern liegen die Zeugungstheile am untersten Ende des Stammes, also dem Gehirn gerade entgegen-

gesetzt. In beiden unterscheiden sie sich von den übrigen Theilen des bildenden Lebens durch symmetrische Anordnung, in dem die sie zusammensetzenden Theile entweder paarweise vorhanden sind, oder, wenn sie unpaar sind, so liegen, daß eine, durch die Mittellinie des Körpers von vorn nach hinten verlaufende Fläche sie in zwei einander genau entsprechende seitliche Hälften theilen würde.

### I. Weibliche Zeugungstheile 1).

#### §. 2405.

Am zweckmäßigsten werden die weiblichen Zeugungstheile zuerst betrachtet, weil die früheste Form der Geschlechtstheile bei allen Individuen derselben Art diese ist.

#### a. Bildende Theile.

#### §. 2406.

Sowohl der Zeit der Entstehung, als ihrer Wichtigkeit nach verdienen unter ihnen die Eierstöcke mit den Trompeten die erste Stelle.

1. Die

1) R. de Graaf de mulierum organis generationi inservientibus. L. B. 1672. Saap. rec.

J. Palfyn description anatomique des parties de la femme qui servent à la génération. L. B. 1708.

D. Santorini Observat. anatomicae. Cap. XI. De mulierum partibus procreationi datis.

J. G. Günz observationes de utero et naturalibus feminarum. Lips. 1753.

1. Die Eierstöcke<sup>1)</sup>.

## a. Gestalt, Lage, Größe und Gewicht.

## §. 2407.

Die Eierstöcke, Eeilen, weiblichen Hoden (*Ovaria* s. *testes muliebres*), liegen im obern Theile der Beckenhöhle, neben der Gebärmutter, mit welcher sie bloß durch das Eierstockband (*Lig. ovarii*), einen Theil der Bauchfellalte, verbunden werden, welche die Gebärmutter mit dem Becken vereinigt, und den Namen des breiten Mutterbandes führt. Sie haben eine länglichrundliche Gestalt, eine vordere und hintere gewölbte Fläche, einen obern gewölbten freien, einen untern geraden, oder etwas ausgehöhlten Rand, einen wirklichen Gefäßauschnitt (*Hilus*), durch welchen sie auf dem obern Theile des breiten Mutterbandes aufsitzen. Gegen ihr äußeres und inneres Ende werden sie, vorzüglich gegen das letztere, dünner und niedriger.

Ihre äußere Oberfläche ist im jungfräulichen Zustande meistens glatt, in ältern Körpern meistens ungleich, eingerissen. Ihre Länge beträgt im vollkommensten Zustande ungefähr  $1\frac{1}{2}$  Zoll, ihre größte Höhe vier bis fünf Linien, ihre Dicke etwas weniger. Sie wiegen ungefähr  $1\frac{1}{2}$  Drachmen.

## b. Zusammensetzung.

## §. 2408.

Sie sind äußerlich von dem Bauchfell, und unter diesem von einer sehr festen, dicken, weißen, faserigen Haut

Kf 2

(Tu-

1) C. Bartholinus de ovariiis mulierum et generationis historia. Rom. 1677. 8.

Fasch de ovario mulierum. Jena. 1681.

Motz de structura, usu et morbis ovariorum. Jenae. 1789.

(Tunica albuginea), welche beide unzertrennlich mit einander verbunden sind, und von welchen die letztere am untern Rande von den durchtretenden Gefäßen durchbohrt wird, umgeben.

Geöffnet erscheinen sie 1) aus einem braunröthlichen, gefäßreichen, ziemlich derben und festen Gewebe,

2) aus in dasselbe eingesenkten Bläschen gebildet.

#### §. 2409.

Diese Bläschen, oder Eierchen<sup>1)</sup>, welche von de Graaf den Namen der Graaffschen (Vesiculae l. ovula Graafiana) führen, ungeachtet sie schon Besal<sup>2)</sup> und Fallopi<sup>3)</sup> bekannt waren, bestehen im normalen Zustande aus einer dünnen, zarten, serösen Haut, sind genau und fest mit der umgebenden Substanz verbunden, völlig verschlossen, und enthalten eine helle Flüssigkeit. Ihre Größe ist nicht für alle dieselbe, und es scheint, als entwickelten sie sich nach einander. Die größten haben ungefähr drei Linien im Durchmesser. Vorzüglich befinden sie sich gegen den Umfang des Eierstockes in größerer Menge. Ihre Zahl variiert in jungfräulichen Körpern von acht bis zwanzig.

#### a. Die Trompeten<sup>4)</sup>.

#### §. 2410.

Die (Fallopischen) Trompeten (Tubae Fallopianae l. meatus seminae), die Ausführungsgänge der Eierstöcke, verlaufen vor und unter denselben, durch den oberen Theil

1) Bartholinus de feminarum ovis. L. B. 1684. 12.

2) De c. h. fabrica. Lib. V. C. 15. p. 459.

3) Observ. anat. in Opp. omn. Venet. 1606. T. I. p. 106.

4) C. Bartholinus de tubis uteri. L. B. 1684. 12.



Sie veranlaßt dann eine mehr oder weniger vollständige Umkehrung der Scheide, der sie aber auch, wenn diese ursprünglich war, mehr oder weniger nachfolgt.

Außerdem findet sie sich, jedoch weit seltener in Leistenhöhlen <sup>1)</sup>).

f) Tritt der Vorfall der Scheide und Harnblase schnell ein, so ist er bisweilen, doch sehr selten, mit einer Umkehrung der Leisten zusammengefaßt, wobei unstreitig die Harnröhre immer mehr oder weniger zerrissen ist.

## II. Texturveränderungen.

### A. Nieren.

#### §. 2384.

Die Consistenz der Nieren ist nicht immer dieselbe. Bestehend schlaff findet man sie bisweilen bei der Harnruhr, zugleich der Blutreichthum derselben oft sehr vergrößert ist.

Auf entgegengesetzte Weise ist die Consistenz der Nieren bisweilen außerordentlich vergrößert.

<sup>1)</sup> Nicht ganz selten tritt Umwandlung derselben in Fett ein.

Eben so entwickeln sich häufig, besonders im höhern Alter, eine oft ungeheure Menge meistens festigender, mit einer sehr bedeutlich gefärbten, meistens dünnen Flüssigkeit angefüllter seröser Bälge in ihrer Substanz, wodurch diese bisweilen ganz zerstört wird. Bisweilen scheint die Niere ursprünglich aus Bälgen dieser Art gebildet <sup>2)</sup>).

Selt.

1) S. hierüber näher Meckel's pathol. Anat. Bb. 2. S. 424 ff.

2) O. Heer de renum morbis. Halae. 1790. Tab. I.

Die innere, glatte Schleimhaut ist vielfach der Länge nach gefaltet.

### 3. Die Gebärmutter <sup>1)</sup>.

#### §. 2412.

Die Gebärmutter, der Fruchthälter (Uterus l. matrix), hat unter den verschiedenen Theilen, welche das weibliche Zeugungssystem zusammensetzen, die bei weitem beträchtlichste Masse.

a. Hist.

- 
- 1) J. a Pratis Libri duo de utero. Antv. 1524.  
 L. Bonaccioli de uteri sectione. Argent. 1529.  
 M. A. Ulmus uterus muliebris. Bonon. 1601.  
 J. Swammerdam miraculum naturae l. uteri muliebris librica. L. B. 1672. Mehrere Ausgaben.  
 C. Drelincourt de utero etc. L. B. 1682. 12.  
 M. B. Valentinus de nova matricis anatome. Giesae. 1688.  
 C. Bartholinus de utero. L. B. 1684. 12.  
 A. Nuck adenogr. curiosa, et uteri feminei anatome nova. Laydae. 1692.  
 F. Ruysch tractatus de musculo in fundo uteri observato, antea a nemine detecto. Amst. 1726. 4.  
 A. Vater de musculo novo uteri. Amst. 1727.  
 J. J. Huber uteri muliebris partiumque ad eum facientium praecipuarum iterata explicatio. Halleri Icon. fasc. I.  
 U. Buchwald de musculo Ruyschii in fundo uteri. Havna. 1741.  
 J. Weitbrecht de utero muliebri observationes. N. C. Petrop. T. I. p. 337.  
 Sue recherches sur la matrice. In Mém. présent. de Paris. T. V.  
 J. G. Röderer Icones uteri humani observationibus illustratae. Gottingae. 1759.

Th.

a. Äußere Gestalt.

§. 2413.

Sie hat eine birnförmige Gestalt, und ist von oben nach unten beträchtlich mehr lang, als von einer Seite zur andern weit. Noch geringer ist ihre Dicke. Ihr oberer, größerer Theil, der Körper, ist dreieckig, nach unten allmählich verringert, von zwei seitlichen, geraden Rändern und einem oberen, stark gewölbten, umgeben.

Die oberste Gegend des Körpers erhält den Namen des Brundes (Fundus uteri). Der untere, weit schmalere

Th 4

Theil,

Th. Simson observations concerning the Placenta, the two cavities of the uterus and Ruych's muscles in Fundo Uteri. Edinb. med. essays. Vol. 4. No. 13.

J. G. Walter's Betrachtungen über die Geburtstheile des weibl. Geschlechtes. Berlin. 1776.

J. C. Loder resp. Haenisch de musculosa uteri structura. Jen. 1782.

J. G. Weisse praef. Böhm de structura uteri non musculosa sed cellulosa-vasculosa. Viteb. 1784.

G. Azzoguidi observationes ad uteri constructionem pertinentes. Ed. Eduard. Sandifort. L. B. 1788. 8.

Rosenberger de viribus partum efficientibus generatim et de utero speciatim, ratione substantiae musculosae et vasorum arteriosorum. Halae, 1791.

Ribbe über die Structur der Gebärmutter. Berlin. 1793.

Titius uteri structura ex ejusdem functionibus. Viteb. 1795.

L. Galza über den Mechanismus der Schwangerschaft. Aus den Atti dell' Academia di Padova in Reil's Archiv. Bd. 7.

J. F. Lohstein Fragment d'anatomie physiologique sur l'organisation de la matrice dans l'espece humaine. Paris. 1805.

Ch. Bell on the muscularity of the uterus. In med. chir. Transactions. London. Vol. 4. 1815. p. 335 ff.

Theil, der Hals (Collum l. cervix uteri), ist ungefähr cylindrisch.

Die vordere und hintere Fläche der Gebärmutter ist gewölbt, die hintere bei weitem stärker als die vordere, so daß man vorzüglich in frühern Perioden zwei seitliche hintere, in der Mittellinie unter einem stumpfen Winkel zusammenstoßende unterscheiden kann. Sie bildet eine, oben, mit Ausnahme der engen Trompetenöffnung (S. 516.) verschlossene, unten offene und in die Scheide übergehende Höhle.

#### §. 2414.

Die Wände der Gebärmutter sind im vollkommenen Zustande beträchtlich, in der mittlern Gegend des Körpers, wo sie am dicksten ist, fast  $\frac{1}{2}$  Zoll dick, fest und hart. Im Körper sind sie etwas dicker als im Halse, doch hier vielleicht immer etwas härter.

Nur nach außen wird die vordere und hintere, nach oben die innere Wand allmählich beträchtlich dünner, so daß sie sich hier nach und nach von der Dicke von vier bis fünf Linien bis auf eine zusammenziehen, und dadurch der in sie tretenden Trompete, welche einige Linien weit in ihrer Substanz von oben und außen nach unten und innen verläuft, ähnlich werden.

Die Gestalt der Höhle der Gebärmutter entspricht im Allgemeinen der äußern Gestalt derselben, wenn sie gleich verhältnißmäßig zur Dicke der Wände außerordentlich eng ist, so daß die vordere und hintere Fläche einander fast berühren, und ihre Breite im Durchschnitte nur 4 Linien beträgt. Nur sind die drei Ränder im Körper nach außen concav, nach innen gewölbt, während der obere Rand des äußern Umfangs der Gebärmutter

mutter nach außen gewölbt ist. Dagegen ist die Höhle des Halses von nach außen gewölbten Flächen umgeben, während der äußere Umfang desselben ausgehöhlt ist, weil er sich in der Mitte zusammenzieht. Auch weicht die Gestalt der Höhle von der des Umfangs dadurch ab, daß sie oben auf beiden Seiten in zwei lange, allmählich enger werdende Hörner übergeht, in deren Spitzen sich die Trompeten öffnen.

Im Halse ist die Höhle am engsten, vorzüglich an der Gränze zwischen ihm und dem Körper, wo sie beträchtlich eingeschnitten ist. Diese Stelle ist der innere Muttermund (*Ostium uteri internum*).

Von hier aus wird der Hals nach unten, bis ungefähr gegen die Mitte, weiter, und zieht sich von hier aus wieder etwas zusammen. Unten endigt er sich in das obere Ende der Scheide durch einen vordern und hintern wulstigen Vorsprung, von denen der letztere gewöhnlich länger ist, der vordere aber tiefer herabragt, und zwischen welchen sich eine, meistens quere Spalte, seltner eine kleinere, rundliche Mündung, das Schleienmaul (*Os tincae*), der äußere Muttermund (*Orificium uteri externum, os uterinum*) öffnet. Die beiden Wülste führen den Namen der Lippen (*Labia*) desselben.

Die innere Fläche der Gebärmutter ist im Körper glatt, im Halse dagegen ungleich, indem sich an der vordern und hintern Wand desselben ein nach oben und unten allmählich verschwindender, auf beiden Seiten durch schiefe Streifen sehr ungleicher Längenvulst befindet, und zwischen beiden Wülsten an den Seiten zahlreichere, neßförmig verschlungne Erhabenheiten verlaufen. Die Lippen sind glatt, zufällige, durch Geburten oft entstehende Einrisse, ausgenommen.

## b. G r ö ß e.

## §. 2415.

Die Gebärmutter ist im jungfräulichen Zustande ungefähr zwei Zoll lang, ein Raum, wovon der Mutterhals die kleinere Hälfte bildet. Die größte Breite des Körpers beträgt 16, die des Halses 9 — 10 Linien. Am Scheidentheile sind die Lippen gegen zehn Linien, die Spalte des äußern Muttermundes selbst gegen sechs Linien breit. Die Dicke des Scheidentheiles beträgt ungefähr sechs Linien, die Spalte ist in dieser Richtung sehr eng.

Die geschwängert gewesene Gebärmutter kommt gewöhnlich nie, vorzüglich, wenn sie sich öfter in diesem Zustande befunden hatte, völlig auf diese Dimensionen zurück, und zugleich erscheint die Spalte des äußern Mundermundes von vorn nach hinten etwas weiter geöffnet.

## c. G e w i c h t.

## §. 2416.

Das Gewicht der jungfräulichen, reifen Gebärmutter beträgt zwischen 7 — 8 Drachmen, das einer geschwängert gewesenen, aber wieder möglichst auf ihren Urfang außer der Schwangerschaft zurückgekommenen oft  $1\frac{1}{2}$  Unzen.

## d. L a g e.

## §. 2417.

Die Gebärmutter liegt zwischen der Harnblase und dem Mastdarm, mit ihrer obern Hälfte innerhalb der Höhle des Bauchfells, ist daher hier eng von einer Falte desselben umfaßt. Im vollkommenen Zustande befindet sie sich ganz im kleinen Becken, mit ihrem Grunde unterhalb dem obern Rande  
der

er Schambeinfuge, mit diesem Theile nach vorn und oben, in Munde nach hinten und unten gerichtet, so, daß ihr Ringendurchmesser, oder ihre Ape mit der obern Beckenapertur zusammenfällt, und die Ape des Körpers nach hinten und unten durchschneidet.

#### e. Verbindungen<sup>1)</sup>.

##### §. 2418.

Sie wird durch mehrere Verdopplungen des Bauchfelles mit den benachbarten Theilen verbunden, welche mit dem serösen Ueberzuge ihres Körpers zusammenhängen, nach innen vorn esem entspringen.

Die ansehnlichsten sind die seitlichen, oder die breiten Mutterbänder (*Ligamenta uteri lateralia* s. *lata*). Sie treten von den Seitenrändern der Gebärmutter ab, nehmen zwischen ihrer vordern und hintern Platte die Gebärmutterfalte auf, gehen senkrecht in querrer Richtung nach außen im Umfange des kleinen Beckens, welches durch sie in eine vordere und hintere Hälfte getheilt wird, von welchen die hintere kleiner ist, und setzen sich in die Seitenwand des Bauchfelles fort.

Außer den Gefäßen enthält diese Verdopplung des Bauchfelles bald mehr bald weniger deutliche quere Muskelfasern, welche

1) J. C. Schützer de fabrica et morbis ligament. uteri. Haderov. 1729.

A. Petit description anat. de deux ligamens de la matrice nouvellement observés. Mém. de Paris. 1760.

Portal Observations sur la structure des parties de la génération de la femme. Mém. de Paris. 1770. p. 185 ff.

welche von dem Seitenrande der Gebärmutter abgehen, und sich nach außen allmählich verlieren <sup>1)</sup>).

Eine zweite, weit kleinere, länglichrundliche Falte bildet auf jeder Seite das untere hintere Mutterband, die halbmondförmige Douglas'sche Falte (*Ligamentum uteri inferius posterius* s. *Plica semilunaris Douglasii*), welches sich von vorn nach hinten, von dem untern Theile der hintern Gebärmutterfläche zum Mastdarm erstreckt.

Auch dieses Band enthält in der Richtung seiner Länge verlaufende Muskelfasern <sup>2)</sup>).

Ein drittes, noch unbedeutenderes, das untere vordere Mutterband (*Lig. uteri inferius anterius*), geht auf jeder Seite von hinten nach vorn, von dem untern Theile der vordern Gebärmutterfläche zum Halsenbälge, umfaßt denselben und enthält wenigstens oft Muskelfasern.

Endlich geht auf jeder Seite vom obern Theile des Seitenrandes der Gebärmutter, dicht unter und vor dem innern Ende der Trompete, ein sehr länglichrundliches Band, das runde Mutterband (*Ligamentum uteri rotundum lateres*) ab. Es liegt anfangs zwischen den beiden Platten des breiten Mutterbandes, geht hinter der Nabelpulsader, vor den Hüftgefäßen, dicht hinter dem Bauchfelle nach oben und außen zur obern, äußern Oeffnung des Leistenkanals, schlägt sich hier um die Bauchdeckenpulsader im Leistenkanal nach unten, innen und vorn, tritt aus dem Leistenringe hervor, und verliert sich, in

1) Sue rech. sur la matrice, In Mém. pr. Tom. V. p. 248.

2) Sue a. a. D.



dem es sich in mehrere Bündel spaltet, im Fette des Schamges und dem obern Theile der äußern Schamlippen.

Es besteht vorzüglich aus Zellgewebe und Gefäßen, enthält aber außerdem sehr deutliche Längmuskelfasern, von welchen die obern von der äußern Schicht der Gebärmutter stammen, die untern von dem untern Rande der beiden inneren Bauchmuskeln stammen und sich nach oben in die Höhe begeben.

Diese Bänder befestigen theils die Gebärmutter, theils wirken die in den breiten enthaltenen Muskelfasern Annäherung der Trompeten an die Eierstöcke.

Wirken die Fasern des breiten und runden Bandes einer Seite stärker als die entgegengesetzten, so wird dadurch die entweder vorübergehende oder bleibende Lage der Gebärmutter der einen Seitenhälfte des Beckens bewirkt, welche ich, ohne Gestaltveränderung der verbindenden Theile oder anderweitige mechanische Veranlassung, mehrmals gefunden habe.

£. G e w e b e.

§. 2419.

Der Bau der Gebärmutter erscheint auf den ersten Anblick homogen; doch unterscheidet man schon im ungeschwängerten Zustande mehrere, von hinten nach vorn über einander gelegene Schichten von röthlich gelber Farbe, zwischen welchen weißliche Streifen befinden.

Sowohl an der vordern Fläche, als in der Nähe der hintern, verlaufen zwischen diesen Schichten die sehr geschlängelten und vielfach anastomosirenden Gebärmuttergefäße.

## a. Fasern.

§. 2420.

Fast über keinen Gegenstand der Anatomie weichen die Angaben so sehr ab, als über den Bau der Gebärmutter in Bezug auf Faserung; sowohl 1) auf Anwesenheit derselben überhaupt, als 2) auf die Natur; und 3) die Anordnung, den Verlauf der Fasern.

1) Mehrere, namentlich Walter, Böhmer, Blumenbach, Azzoguidi, Ribke, klugnen die Anwesenheit der Fasern durchaus; dagegen nehmen sie Vesal, Piccolomini, Malpighi, Morgagni, Diemerbroeck, Verheyen, Vieussens, Ruysch, Vater, Santorini, Buchwald, Weitbrecht, Monro, Moortwyk, Heister, Haller, Sue, Astruc, Leuret, Röderer, Meckel, Hunter, Wrisberg, Loder, Mayer, Simson, Calza, Lobstein, Bellan.

Die bei weitem meisten Autoritäten, denen ich auch die meinige beifüge, sind also für die Anwesenheit der Fasern.

Die, welche dieser Meinung sind, weichen aber insofern von einander ab, als einige sie als eine beständige, andre, und bei weitem die meisten, als eine nur unter gewissen Umständen, namentlich in der Schwangerschaft, eintretende Erscheinung ansehen. In der That sind sie außer der Schwangerschaft wenigstens nur äußerst undeutlich. Indessen bilden sie sich nicht bloß während dieses Zustandes, sondern überhaupt während jeder Erhöhung der bildenden Thätigkeit der Gebärmutter aus. Schon Lobstein fand sie sehr deutlich bei einer, durch eine Fettgeschwulst so stark als im siebenten Schwangerschaftsmonate ausgedehnten Gebärmutter. Er schreibt dieses Deutlichwerden der durch die Geschwulst bewirkten Ausdehnung

zu, allein ich habe sie mehr oder weniger deutlich auch bei nicht sehr beträchtlich ausgedehnten Gebärmüttern mit Entwicklung von ähnlichen Geschwülsten in ihnen und in den Eierhöhlen gefunden, und glaube daher richtiger anzunehmen, daß sie in einer Umstimmung der Lebensthätigkeit der Gebärmutter begründet ist.

a) Diese Fasern werden, in Hinsicht auf ihre Natur, von den meisten für Fleischfasern angesehen. Allerdings unterscheiden sie sich zwar von den rothen Fasern der willkürlichen Muskeln durch geringere Röthe, Platteit, und vielfache Verflechtung, allein sie erscheinen wirklich als Muskelfasern durch ihre äußerst energischen Zusammenziehungen, welche sowohl während der Geburt den Fötus und die Nachgeburt austreiben, und nachher sehr schnell die fast gänzliche Obliteration der Gebärmutterhöhlen bewirken. Die angeführten Bedingungen haben sie mit den meisten unwillkürlichen Muskeln gemein.

Wirklich verhalten sich die Gebärmutterfasern auf diese Weise, und die Substanz derselben stellt in verschiednen Zuständen verschiedene Abänderungen des vegetativen Muskelsystems, namentlich im ungeschwängerten Zustande die Fasern der Pulsadern, bei erhöhter Bildungsthätigkeit dagegen die der übrigen, mit Ausnahme des Herzens, dar.

Uebrigens enthält die menschliche Gebärmutter beträchtlich viel Faserstoff <sup>1)</sup>.

Hierzu kann man endlich die Analogie der Säugthiere, wo in allen Perioden die Gebärmutter deutlich muskulös ist, jedoch mit

<sup>1)</sup> Schwilgus bei Cuvier. Vorl. über vergl. Anat. Bd. 4. S. 537.

mit der Bemerkung fügen, daß sich auf merkwürdige Weise beim menschlichen Weibe die Fasern erst während erhöhter Thätigkeit dieses Organs deutlich gestalten.

3) Der Verlauf der Fasern wird nicht von allen Anatomen gleichmäßig dargestellt, doch vereinigen sich die meisten in der Angabe, daß sie wenigstens in zwei Richtungen, der Länge und Breite nach, verlaufen, und daher auch in dieser Beziehung mit den Fasern der Muskeln des vegetativen Lebens übereinkommen. Nur sind sie in der That zusammengesetzter, indem sich theils mehrere, verschiedentlich gerichtete Schichten finden, theils Schichten, die aus, in derselben Richtung verlaufenden Fasern bestehen, sich von innen nach außen mehrmals wiederholen, theils endlich die verschiedenen Schichten sich mannigfacher verflechten.

Einige, namentlich Macpighi, Monro<sup>2)</sup> läugnen die Anwesenheit regelmäßer Fasern.

Kupisch nahm nur einen, im Grunde der Gebärmutter befindlichen, unpaaren, kreisförmigen Muskel an. Ungeachtet mehrere, namentlich Vater, Monro, Simson, ihm beistimmten, so ist doch in der That die Anordnung der Fasern weit zusammengesetzter, auch seine Beschreibung dieses Muskels nicht ganz richtig.

Folgendes sind die allgemeinsten Bedingungen, welche die Anordnung der Muskelfasern darbietet.

1) Es giebt eine doppelte Lage, eine äußere und eine innere, welche durch die Gefäßsubstanz der Gebärmutter von einander getrennt werden.

2) Alle

---

2) Dissection of a woman with child, with remarks on gravid uteri. In Edinb. physl. and med. essays. I. p. 459. p. 470.

2) Alle verschiedenen Lagen und Schichten sind so eng unter einander verwebt, daß sie nur äußerst schwer von einander gesondert werden können.

3) Von ihnen ist die äußere beträchtlich dicker als die innere.

4) Die Muskelsubstanz ist im obern Theile der Gebärmutter, besonders ihrem Grunde, beträchtlich dicker als in ihren übrigen Gegenden. Sie fehlt am Halse entweder ganz <sup>1)</sup>, oder ist wenigstens sehr dünn.

5) Im Ganzen herrschen die Längensfasern bedeutend vor; doch sind am Grunde die Kreisfasern, gegen den Muttermund die Längensfasern stärker entwickelt.

6) Die äußere Lage wird zuäußerst durch Längensfasern gebildet, welche sich von der Mitte des Grundes aus über die vordere und hintere Fläche werfen, von oben nach unten ausbreiten, eine schiefe, selbst quere Richtung annehmen, und gegen den Hals verschwinden. Diese Längensfasern sind zum Theil unregelmäßig, gehen zum Theil in die runden Mutterbänder über.

7) Nach einigen z. B. Rosenberger, besteht die äußere Lage bloß aus Längensfasern, indessen finden sich in der That unter diesen quere, welche gleichfalls an die runden Bänder und Trompeten gehen.

8) Außerdem verlaufen in dieser Lage schiefe, sehr verschiedentlich gerichtete und gewundene, welche besonders die Längenschichten unterbrechen, und hauptsächlich am untern Theile des Körpers vorkommen.

9) Am

1) Zell a. a. D. S. 342.

Medel's Anat. 4. Th.

**Rittner Runzeln** an der vordern und hintern Fläche der Scheide, die vordere und hintere Runzelsäule (*Columna rugarum anterior et posterior*), eine Fortsetzung der baumförmigen Erhabenheiten im Gebärmutterhalse.

Im obern Theile befinden sich ansehnliche Schleimhöhlen.

## 2. Scheidenklappe<sup>1)</sup>.

§. 2426.

Die Scheidenklappe, das Jungfernhäutchen (*Hymen* f. *valvula vaginae*) ist eine halbmondförmige, durch zwei Platten, welche durch Zellgewebe vereinigt werden, gebildete Verdopplung der Schleimhaut der Geschlechtstheile, welche von der Seite und dem hintern Theile des Umfangs des Scheideneinganges vorspringt und zwischen ihrem vordern ausgehöhlten Rande und dem vordern Theile des Scheideneinganges eine mehr oder weniger beträchtliche Oeffnung übrig läßt. Nicht selten entsteht sie auch vom ganzen Umfange des Scheideneinganges, doch befindet sich auch dann die Oeffnung meistens mehr nach vorn, selten in der Mitte derselben.

Pl. 3.

1) A. Vater de hymene. Vitob. 1727.

J. J. Huber de hymene et vaginae rugis. L. B. 1742.

B. S. Albinus de hymene. Ann. acad. L. IV. X. 1758.

Göring de hymene. Argent. 1765.

G. Tolberg de varietate hymenum. Halae. 1791.

B. F. Oslander Abhandlung über die Scheidenklappe, durch viele neue Beobachtungen und getreue Abbildungen derselben, sowohl an lebenden als todtten Körpern verschiednen Alters erläutert. In dessen Denkwürd. für die Geburtshülfe. Bd. 2. St. 1. S. 1 ff.

9) Am Halse fehlen diese, doch wird er, wenigstens oft, aus mehreren, über einander liegenden Längen- und Quersafernschichten gebildet.

10) Die innere, dünnere Lage besteht aus einer äußern Schicht, welche aus einem doppelten, kreisförmigen Muskel zusammengesetzt wird, deren jeder sich im Umfange einer Trompetenöffnung befindet, und die an der vordern und hintern Fläche der Gebärmutter durch den innern Theil ihres Umfangs in der Mittellinie zusammenfließen. Höchst wahrscheinlich ist eine von diesen Kreisrichtungen Ruych's Muskel, indem der seitliche Theil für den mittlern gehalten, und die Trompetenmündung übersehen wurde.

11) Unter diesen liegen schiefe und Längensfasern, welche auf jeder Seite sich vorn und hinten zu einem länglichen Dreieck vereinigen, dessen Spigen in der Trompetenmündung zusammenfließen.

12) Unter und mit ihnen verwebt verlaufen, vorzüglich am untern Theil der Gebärmutter, schwache Quersafern.

#### β. Schleimfläche.

##### §. 2421.

Die innere Fläche der Gebärmutter wird von einer röhrliehen, äußerst feinzottigen, beinahe glatten Schleimhaut, welche sich nach oben auf beiden Seiten in die der Trompeten, nach unten in die der Scheide fortsetzt, bekleidet. Im frischen Zustande ist sie so fest mit der darunter befindlichen faserigen Substanz verwebt, daß sie nicht recht von derselben getrennt werden kann, wenn sie sich gleich durch ihre Structur deutlich als Schleimhaut darstellt; doch kann man sie durch die Maceration mittelst vorsichtiger Behandlung mehr oder weniger deutlich als eigne Haut rein darstellen.

Wegen ihres sehr genauen Zusammenhanges mit der übrigen Substanz der Gebärmutter wird sie von mehreren Anatomien als eigne Haut gelaugnet.

Eigne Schleimdrüsen finden sich nur am Halse, vorzüglich am untern Theile desselben. Hier verschließen sie sich nicht selten, vielleicht in Folge einer Entzündung, und bilden dann mehr oder weniger zahlreiche und beträchtliche, mit einer dünnen Flüssigkeit, einem Product der fortgehenden Absonderung, angefüllte Bälge, die sogenannten Nabothschen Eyer \*) (Ovula Nabothiana s. Ovarium secundarium), welche fälschlich mit den Graaffschen Bläschen als gleichbedeutend angesehen wurden.

## b. Begattungstheile.

### §. 2422.

Die weiblichen Begattungstheile bestehen aus der Scheide, dem Ritzler, den innern und den äußern Schamlippen. Die drei letztern nennt man auch, im Gegensatz der übrigen, oder innern, die äußern oder Schamtheile, die Scham (Pudendum s. cunnus).

## I. Scheide.

### a. Äußere Gestalt und Größe.

#### §. 2423.

Die Scheide (Vagina) folgt als ein dünnhäutiger, gewöhnlich vier Zoll langer, einen Zoll weiter Kanal, der in einem obern Theile weiter als in dem untern ist, unmittelbar auf die Gebärmutter.

Pl 2

Mit

\*) M. Naboth de sterilitate mulierum. Lipsi. 1707. res. in Halleri coll. disp. T. V. §. 15 seqq.



Mit ihrem obern blinden Ende, dem Grunde (*Fundus vaginae*), welcher in die Substanz der Gebärmutter übergeht, umfaßt sie den untern Theil, den Scheidentheil (*Portio vaginalis*) derselben, mit dem untern, ihrem engsten Theile, dem Scheideneingange (*Aditus vaginae*), öffnet sie sich nach außen, und geht hier in die äußern Geschlechtstheile über.

#### b. Lage und Richtung.

##### §. 2424.

Sie liegt zwischen dem Mastdarm, der Harnblase und Harnröhre, durch lockeres Zellgewebe mit ihnen verbunden.

Sie hat nicht dieselbe Richtung mit der Gebärmutter, sondern wendet sich von hinten und oben nach vorn und unten, so daß ihre Axe mit der untern Beckenaxe ziemlich genau zusammenfällt. Uebrigens ist ihre hintere Wand etwas gewölbt, die vordere ausgehöhlt.

#### c. Bau.

##### §. 2425.

Sie besteht aus zwei Schichten, einer äußern, sehr dünnen, festen, röthlichweißlichen, der Gefäß- und Muskehhaut entsprechenden, und in das Fasergewebe der Gebärmutter übergehenden, die von außen nach innen fester und weniger gefäßreich wird, und einer innern, röthlichen, mit ihr fest, doch trennbar verbundenen, der Schleimhaut.

Diese ist im vollkommenen, besonders jungfräulichen Zustande mehrfach gerunzelt. Vorzüglich verläuft eine Reihe über einander liegender, querrer und schiefer, mehrfach eingeschnitten

Knittner Runzeln an der vordern und hintern Fläche der Scheide, die vordere und hintere Runzelsäule (*Columna rugarum anterior et posterior*), eine Fortsetzung der räumförmigen Erhabenheiten im Gebärmutterhalse.

Im obern Theile befinden sich ansehnliche Schleimhöhlen.

## 2. Scheidenklappe<sup>1)</sup>.

§. 2426.

Die Scheidenklappe, das Jungfernhäutchen (*Hymen* f. *valvula vaginae*) ist eine halbmondförmige, durch zwei Platten, welche durch Zellgewebe vereinigt werden, gestützte Verdopplung der Schleimhaut der Geschlechtstheile; welche von der Seite und dem hintern Theile des Umfangs des Scheideneinganges vorspringt und zwischen ihrem vordern ausgehöhlten Rande und dem vordern Theile des Scheideneinganges eine mehr oder weniger beträchtliche Oeffnung übrig läßt. Nicht selten entsteht sie auch vom ganzen Umfange des Scheideneinganges, doch befindet sich auch dann die Oeffnung meistens mehr nach vorn, selten in der Mitte derselben.

Pl. 3.

1) A. Vater de hymene. Vitob. 1727.

J. J. Huber de hymene et vaginae rugis. L. B. 1742.

B. S. Albinus de hymene. Ann. acad. L. IV. X. 1758.

Göring de hymene. Argent. 1765.

G. Tolberg de varietate hymenium. Halae. 1791.

B. F. Oslander Abhandlung über die Scheidenklappe, durch viele neue Beobachtungen und getreue Abbildungen derselben, sowohl an lebenden als todtten Körpern verschiednen Alters erläutert. In dessen Denkwürd. für die Geburtshülfe. Bd. 2. St. 1. S. 1 ff.

selben. Selten ist sie sehr dick, hart, fest, mit Muskelfasern versehen.

Sie bildet die Gränze zwischen den äußern und innern Geschlechtstheilen, und zugleich zwischen diesen und den Harnwerkzeugen, indem sich vor ihr die Harnröhre, mit ähnlichen Fältchen umgeben, öffnet.

### 3. K i g l e r.

#### a. K i g l e r. an sich.

#### §. 2427.

Der Kigler, das weibliche Glied (*Clitoris* *Membrum muliebre* f. *Coles feminarum* f. *Nympha*)<sup>1)</sup>, ist ein länglichrunder, unter der Schambeinfuge liegender Körper, der mit zwei, ungefähr einen Zoll langen, und sich unter einem stumpfen Winkel vereinigenden Schenkeln, von dem obern Theile der innern Fläche des aufsteigenden Sitzbeinastrs entsteht. Er endigt sich vorn mit einer kleinen, länglichrunden Anschwellung, welche den Namen der Eichel des Kiglers (*Glans clitoridis*) führt, mit einer dünnen Schleimhaut, und einer dicken, weichen, leicht trennbaren Oberhaut bekleidet, und von einer dreieckigen, sie ganz verhüllenden Hautfalte, der Vorhaut des Kiglers (*Praeputium clitoridis*), welche oben verschlossen, unten offen oder gespalten ist, umgeben wird.

Diese ist an beiden Flächen, vorzüglich aber der innern, dünn, weich, feucht, und an der innern, hauptsächlich da, wo sich die Vorhaut in die, die Eichel des Kiglers umgebende Haut umschlägt, finden sich viel Talgdrüsen.

Bei

1) Th. Tronchin de Nympha. L. B. 1750.

Bei genauer Untersuchung findet man, daß die Eichel keine Fortsetzung der Substanz des hintern Theiles des Ritzlers ist, sondern nur durch Zellgewebe, Gefäße und Nerven mit ihr zusammenhängt, der hintere Theil des Ritzlers sich dagegen mit einer ausgeschnitten vordern Fläche endigt, welche die Eichel nur aufnimmt.

§. 2428.

Der Ritzler wird aus einer äußern, faserigen Scheide, und einem, in dieser enthaltenen, schwammigen, aus vielfach verschlungenen und weiten Venenansätzen gebildeten Gewebe gebildet. Seine Seitenhälften erhalten daher den Namen der Zellkörper (*Corpora cavernosa* l. *Spongiola clitoridis*). Auch nach der Vereinigung beider Schenkel sind seine beiden Seitenhälften durch eine senkrechte, faserige Scheldewand, eine unmittelbare Fortsetzung der äußern Hülle, von einander, doch nicht völlig, getrennt.

In der Eichel, welche aus einem ähnlichen, aber feinem Gewebe besteht, findet sich keine Spur einer solchen Scheldewand.

Vermöge dieser Bildung ist der Ritzler einer sehr starken Anschwellung fähig.

In der Rückenfläche des Ritzlers verlaufen die ansehnlichen Gefäße und Nerven desselben, von denen die letztern vorzüglich in die Eichel treten.

b. Sitzbein: Zellkörpermuskeln.

§. 2429.

Die Schenkel des Ritzlers sind in dem untern Theile ihres Umfangs von einem ansehnlichen Muskelpaar bekleidet, welches dicht unter dem untern Ende derselben von der innern Fläche des aufsteigenden Sitzbeinastes kurzsehnig entspringt, und sich bis fast zu ihrem Ende erstreckt, die Sitzbein: Zellkörper:

Pl 4

muss

muskeln, Niederziehen des Rectums (*M. Ischio-cavernosi* f. *Directores* f. *Depressores clitoridis*).

Sie ziehen den Rectum herab, und können zum Austreiben des bei der Erection in ihm angehäuften Mutes wirken.

#### 4. Innere Schamlippen.

§. 2430.

Die innern, kleinen Schamlippen, *Wassers* *Leffen* (*Labia pudendi interna* f. *minora* f. *nymphae*), sind zwei längliche, von einer Seite zur andern stark zusammengedrückte, röthliche, runzliche, hahnenkammartige Falten, welche hinten nicht mit einander vereinigt sind, in ihrem vordern Ende dagegen sich in der Eichel des Rectums vereinigen. Die sie bekleidende Haut ist sehr zart, weich, feucht, haarlos, und vorzüglich an ihrer innern Seite schleimhautähnlich. Ihre innere Fläche geht nach oben in die Scheide, ihre äußere in die äußere Schamlippe über. Sie bestehen aus einem schwammigen Gewebe, dem Zellkörper der Nymphen und der Eichel (*Corpus cavernosum nympharum et glandis*), welches zarter als das Gewebe des Rectums ist, allein mit dem der Eichel, welches eine unmittelbare Fortsetzung von ihm ist, übereinkommt. Gegen das vordere und obere Ende dieser Falten endigen sich die beiden Schenkel der Vorhaut, und gehen von außen in sie über.

Die Nymphen spalten sich daher an ihrem vordern Ende in zwei Schenkel, von denen der innere, kleinere in die Eichel, der äußere, größere in die Vorhaut übergeht, und das schwammige Gewebe derselben hängt ununterbrochen mit der Eichel zusammen.

Der Raum zwischen ihnen ist der Vorhof (*Vestibulum* f. *poros*).

5. Neu.

## 5. Äußere Schamlippen.

§. 2431.

Die äußern, großen Schamlippen (*Labia pudendi externa* s. *magna*), sind ansehnliche, von vorn nach hinten verlaufende Hautfalten, welche die übrigen äußern Schamtheile umhüllen. Ihre äußere Platte wird durch die äußere Haut, die innere durch eine zartere Schleimhaut gebildet, von welcher die, welche die Nymphen bekleidet, eine Fortsetzung ist.

Sie fließen vorn durch die vordere, hinten durch die hintere Commissur zusammen. Dort gehen sie allmählich in den Schamberg über. Hinten gehen sie über und nach innen von der hintern Commissur durch eine vorspringende quere, dünne Falte, das Lippenbändchen, Schambändchen (*Frenulum pudendi*) in einander über.

Der Raum zwischen diesem und der hintern Commissur ist die fahnenförmige Grube (*Fossa navicularis*).

## 6. Schleimhöhlen der äußern Zeugungstheile.

§. 2432.

Die äußern Zeugungstheile sind mit reichlichen und ansehnlichen Schleimhöhlen bekleidet, die sich vorzüglich im Umfange der Harnröhrenmündung und dem Scheideneingange in großer Menge befinden, und von welchen jene den Namen der Bartholin'schen Vorsteherdrüse (*Prostata Bartholiniana*)<sup>1)</sup>, führen.

## 6. Schamschnürr.

§. 2433.

Das obere Ende der weiblichen Scham wird, in der Höhe der innern Schamlippen, von einer dünnen, länglichtrun- den Muskelschicht umgeben, welche hinten mit der vordern

1) De ovaris. p. 27.

Spitze des äußern Afterschließers zusammenfließt, sich dagegen vorn an die Schenkel und den Körper des Ritzlers heftet, dem Schließer der weiblichen Scham (Constrictor: ovari). Er verengt kraftvoll den Eingang der Scheide.

#### c. Gefäße und Nerven.

##### §. 2434.

Die weiblichen Zeugungstheile erhalten ihre Gefäße vorzüglich aus einer doppelten Quelle, aus den Samenpulsadern und Zweigen der Beckenpulsader, welche sich als Gebärmutter-, Scheiden- und Ritzlerpulsadern an den Theilen, deren Namen sie führen, verbreiten. Außerdem gehen Zweige der gemeinschaftlichen Schenkelpulsader in die großen Schamlippen.

Die gleichnamigen Blutadern führen das Blut in die Schenkel-, Becken- und Nierenblutadern zurück.

Die Samengefäße bilden in der Nähe der Eierstöcke ein äußerst vielfach verflochtenes Netz, das Rankengeflecht (Plexus pampiniformis). Sie vereinigen sich in der Substanz der Gebärmutter nicht nur von einer Seite zur andern mit den gleichnamigen, sondern von oben nach unten mit den Gebärmuttergefäßen vielfach.

Die Nerven der innern Geschlechtstheile stammen vom Gangliennerven, die der äußern von dem Hüftgeflecht.

#### d. Kräfte und Verrichtungen.

##### §. 2435.

Die äußern weiblichen Zeugungstheile besitzen, wegen ihres ansehnlichen Nervenreichthums, eine sehr hoch gesteigerte Empfindlichkeit, welche dagegen in den innern nicht sehr bedeutend ist.

Die

Die Gebärmutter ist vermöge ihrer Muskelfasern Sitz eines sehr energischen Zusammenziehungsvermögens, welches bis auf einen gewissen Grad auch der Scheide zukommt \*).

Der Eierstock ist die Stelle, an welcher die Entstehung des neuen Organismus anhebt. Dies beweist unwiderleglich die nach Wegnahme desselben entstehende Unfruchtbarkeit, mit voller Integrität aller übrigen Theile;

2) die zuerst vor allen Theilen des Zeugungssystems in ihm eintretende Veränderung nach einer fruchtbaren Begattung;

3) das Vorkommen von Fötus in ihm;

4) das Vorkommen von Fötus in der Unterleibshöhle, ohne Zeichen von Verletzung solcher Theile, in welchen sie sich ursprünglich gebildet hätten, allein oder mit Verschlüßung der Trompeten.

Die Trompete führt das in dem Eierstock gebildete Product der Begattung aus ihm in die Gebärmutter.

Dies ergibt sich:

1) aus dem Vorkommen von Fötus in der Höhle des Bauchfells, und

2) der Höhle der Trompete selbst, vorzüglich mit Verschlüßung der äußern oder innern Trompetenmündung.

Die Gebärmutter ist Ausbildungsorgan des neuen Organismus.

Dies folgt:

1) aus der im Normalzustande Statt findenden Entwicklung des Fötus in ihr.

2) aus den, auch bei Schwangerschaften außerhalb derselben Statt findenden Veränderungen in ihrer Substanz und Höhle, wenn gleich die Möglichkeit dieser Schwangerschaften

bes

1) Lobstein in Corvillart's J. de médec. T. 56, p. 345.



beweist, daß sie nicht unumgänglich nothwendig zur Ausbildung des neuen Organismus sey.

Die Scheide ist bloß Leitungsorgan der Ruthe, durch sie des männlichen Samens, und des Fötus.

Die äußern Theile sind Wollustorgane, wiewohl: hoher Grad von Reizung derselben vor und während der Begattung beweist.

Diese gesteigerte Reizung derselben setzt die innern Zeugungstheile und den ganzen Organismus in den, zur Hervorbringung des neuen Organismus erforderlichen Zustand von erhöhter Thätigkeit.

## 2. Männliche Zeugungstheile \*).

### a. Bildende Theile.

#### 1. Die Hoden.

§. 2436.

Den wichtigsten Abschnitt der männlichen Zeugungstheile bilden die Hoden (Didymi s. testes s. testiculi), die den Samen absondernden Drüsen des Geschlechtsapparates.

#### a. Äußere Gestalt und Lage.

§. 2437.

Sie haben eine länglichrundliche, ungefähr eiförmige Gestalt, und liegen an dem untern Theile des Stammes, neben  
und

1) R. de Graaf de virorum organis generationi inservientibus. L. et B. 1668. 8. in Opp. omn. Amstel. 1705. 8. Mangeti bibl. anat. — Ejusd. part. genit. defensio ibid. p. 529 ff.

Leal Lealis περί των σπερματιζοντων οργανων de partibus conficientibus in viro. Patav. 1686. N. rec. in Eustachii opusc.

Santorini de virorum naturalibus in observ. anat. Cap. X.

J. G. Röderer de genitalibus virorum. Gott. 1758. 4.

und unter der Kuthe, in einer eignen beutelförmigen Verlängerung der Haut, dem Hodensacke (Scrotum), mit dem innerhalb der Unterleibshöhle befindlichen Theile des Zeugungssystems durch den aus ihrem Ausführungsgange, den Samen-gefäßen, Nerven und dem Hodenmuskel des Hoden gebildeten Samenstrange (Funiculus spermaticus s. testicularis) verbunden.

b. Größe und Gewicht.

§. 2438.

Der Hode an sich, d. h. die Substanz desselben von allen Hüllen, mit Ausnahme der innersten, getrennt, ist im Allgemeinen  $1\frac{1}{2}$  Zoll lang, 1 Zoll breit und gegen 9 Linien dick.

Sein Gewicht beträgt gewöhnlich 4 Drachmen.

c. Zusammensetzung.

a. Häute des Hoden.

§. 2439.

Die Hoden sind von mehreren über einander liegenden Schichten von verschiedner Beschaffenheit umgeben, welche den Namen der Hodenhäute führen<sup>1)</sup>.

a. Haut

1) Schriftsteller:

J. E. Neubauer de tunicis vaginalibus testis et funiculi spermatici diss. inaug. med. Giellae. 1767. rec. in ejusd. Opp. anat. coll. Francof. et Lips. 1786.

A. Monro remarks on the spermatic vessels and the scrotum with its contents. in med. ess. Vol. 5. p. 1. p. 205—222.

J. Brugnona de testium in foetu positu, eorum in scrotum descensu, tunicarum quibus continentur, numero et origine. edit. a Sandifort. L. B. 1788.

G. Tumiatì ricerche anatomiche intorno alle tonache dei testicoli. Venezia. 1790. Uebersetzt in Kühn und Weigels ital. Bibl. Bd. 2. Hft. 2. S. 139 ff.

(*T. carnea* s. *erythroides*), die vom horizontalen Schambeinaste kommt, als die dritte Schicht. Er wird durch ein äußeres Bündel, welches vom untern Rande der beiden innern breiten Bauchmuskeln abgeht, und ein inneres, gewöhnlich schwächeres, bisweilen gleich starkes, selten stärkeres, vom horizontalen Schambeinaste entstehendes gebildet, umgiebt den Samenstrang und die folgenden Hüllen des Hoden gewöhnlich, und, auch wenn er sich im ganzen Umfange findet, vorzüglich nur an der vordern Fläche, mit Muskelfasern, welche nach unten gewandte Bögen bilden, und desto mehr aus einander weichen, je tiefer sie herabsteigen.

Wo sich im ganzen Umfange Muskelfasern finden, tritt der Samenstrang durch den untern Theil des innern schiefen Bauchmuskels, nicht bloß unter seinem untern Rande hervor. Bisweilen fehlt das innere Bündel in der That oder dem Anschein nach. Daß letztere ist häufiger. Selten, in sehr stark muskulösen Körpern, gehen von dem Hodenmuskel Faserbündel mit dem Samenstrange in die Unterleibshöhle <sup>1)</sup>).

Nur in seinem obern Theile umgiebt dieser Muskel den Samenstrang ganz, nach unten weichen seine Fasern aus einander.

Er selbst wird von einer Fortsetzung der dichten Scheide, welche den äußern schiefen Bauchmuskel umgiebt, eingehüllt, und seine getrennten Fasern sind überall durch Zellgewebe zusammengehalten. Dieses und die erwähnte Hülle umgeben unten, mit einander verbunden, allein den Hoden, und fließen unterhalb desselben mit der darauf folgenden gemeinschaftlichen Scheidenhaut zu einem kurzen, festen Knoten zusammen.

Die

1) Brugnone obl. sur les vésicules séminales. Mém. de Turin 1786. p. 610, Panchienati ebendas.

Dieser Muskel, der bei den Thieren stärker entwickelt ist als beim Menschen, kann den Hoden in die Höhe ziehen.

k. Gemeinschaftliche Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges.

§. 2444.

Auf diese dritte Schicht folgt eine Schicht von Schleimgewebe, welches den Namen der gemeinschaftlichen Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges (*Tunica vaginalis testis et funiculi spermatici communis*) führt. Es stammt von dem Schleimgewebe, welches das Bauchfell umkleidet, und umgibt den ganzen Samenstrang und den Hoden. Durch dieses Schleimgewebe kann man von dem untern Ende desselben Luft durch den Bauchring bis in die Zellschicht, welche die vordere sowohl als die hintere Fläche des Bauchfelles bekleidet, und selbst bis zwischen die Gefäßplatten, treiben.

Von dem äußern Umfange dieser Schicht gehen Verdopplungen nach innen ab, welche die Gefäße des Samenstranges und den Samenabführungsgang zusammenheften, unter ihr befindet sich keine eigenthümliche, von Neubauten entnommene Scheidenhaut des Samenstranges (*t. vag. fun. sperm. propr.*), deren Höhle von der andern verschieden wäre, indem, auf der einen Seite, wenn jene nicht in ihrem äußern Umfange auch mit der größten Behutsamkeit verletzt, und nun Luft zwischen die Gefäße des Samenstranges eingeblasen wird, diese überall hervordringt, auf der andern Luft, in sie geblasen, auch zwischen die Gefäße des Samenstranges tritt. Ja, diese gemeinschaftliche Haut des Samenstranges erscheint oben nicht einmal als ein eigener, sondern als bestehender, geschlossener fester Cylinder, wenn man

## α. Haut des Hodensackes.

§. 2440.

Die äußerste Schicht ist die Haut des Hodensackes (Scrotum), eine von der Leistengegend zwischen den Schenkeln, der Ruthe und dem Mittelfleische herabhängende, in ihrem untern Theile weitere Falte der allgemeinen Bedeckungen, die sich von der übrigen Haut gewöhnlich durch etwas dunklere Farbe, längere, aber einzeln stehende Haare und Fettlosigkeit unterscheidet. Zugleich ist sie, genau in der Mitte, von vorn nach hinten zu einem etwas erhabnen, schmalen, durch eine Menge dichtstehender, querrer Falten gebildeten Streifen, der Nath (Raphe) angeschwollen. In der That aber erscheint der Hodensack hier dünner als in dem übrigen Umfange.

Die Oberhaut des Hodensackes hat eine beträchtliche Festigkeit und Dicke.

## β. Fleischhaut.

§. 2441.

Auf die Haut des Hodensackes folgt unmittelbar die Fleischhaut, besser Zellhaut des Hoden (Tunica carnea l. dartos), welche sich zu der Haut des Hodensackes wie die Fetthaut zu dem übrigen Theile der allgemeinen Bedeckungen verhält, allein, wie schon bemerkt, im Allgemeinen, sehr fette Menschen ausgenommen, fettlos ist. Sie ist sehr gefäßreich, daher röthlich und mehr oder weniger deutlich faserig. Da sie überdies beträchtlich contractil ist, so wurde sie von mehreren Anatomen, selbst von Winslow<sup>1)</sup>, für muskulös,  
und

1) Traité du bas ventre §. 499.

und namentlich den Hautmuskeln vergleichbar gehalten; allein sowohl absichtlich als zufällig entstandnes Eindringen von Luft in sie <sup>1)</sup>, und die vergleichende Maceration derselben und des breiten Halsmuskels <sup>2)</sup> zeigten in ihr durchaus bloßes Schleimgewebe. Am wahrscheinlichsten ist es indessen, daß sie den Uebergang von dem Schleimgewebe zur Muskelbildung macht, und sich zu den übrigen Muskeln ungefähr wie die Muskeln der niedern Thiere zu denen der höhern verhält, wo auch die faserige Structur undeutlicher und gewissermaßen durch die Gallert, das Element des Schleimgewebes, verdeckt ist, welche bei den höhern Thieren freier hervortretenden Faserstoff verhält, oder noch nicht in ihn umgewandelt ist.

## §. 2442.

Die Fleischhaut des Hoden bildet zwei Säcke, welche in der Mittellinie zusammentreten, und dadurch die Scheidewand des Hodensackes (Septum scroti) darstellen, welche der Nath entspricht, beide Hoden, sowohl der Lage als, bis auf einen gewissen Grad, auch ihrem Leben nach, von einander absondert, aber in der That den Zusammenhang zwischen beiden Hälften nicht vollständig aufhebt, wie das Schleimgewebe gewöhnlich, mehr oder weniger mit Feuchtigkeit getränkt ist.

## 7. Hodenmuskel.

## §. 2443.

Auf die Fleischhaut folgt der, richtiger so zu bezeichnende, dünne Hodenmuskel oder Hebemuskel des Hoden (Cremaster) auch Muskelhaut, rothe Haut  
(T. car-

1) Morgagni adv. Anat. IV. an. I.

2) Rumjati a. a. O. S. 142.

(*T. carnea* s. *erythroides*), die vom horizontalen Schambeinaste kommt, als die dritte Schicht. Er wird durch ein äußeres Bündel, welches vom untern Rande der beiden innern breiten Bauchmuskeln abgeht, und ein inneres, gewöhnlich schwächeres, bisweilen gleich starkes, selten stärkeres, vom horizontalen Schambeinaste entstehendes gebildet, umgiebt den Samenstrang und die folgenden Hüllen des Hoden gewöhnlich, und, auch wenn er sich im ganzen Umfange findet, vorzüglich nur an der vordern Fläche, mit Muskelfasern, welche nach unten gewandte Bögen bilden, und desto mehr aus einander weichen, je tiefer sie herabsteigen.

Wo sich im ganzen Umfange Muskelfasern finden, tritt der Samenstrang durch den untern Theil des innern schiefen Bauchmuskels, nicht bloß unter seinem untern Rande hervor. Bisweilen fehlt das innere Bündel in der That oder dem Anschein nach. Daß letztere ist häufiger. Selten, in sehr stark muskulösen Körpern, gehen von dem Hodenmuskel Faserbündel mit dem Samenstrange in die Unterleibshöhle \*).

Nur in seinem obern Theile umgiebt dieser Muskel den Samenstrang ganz, nach unten weichen seine Fasern aus einander.

Er selbst wird von einer Fortsetzung der dichten Scheide, welche den äußern schiefen Bauchmuskel umgiebt, eingehüllt, und seine getrennten Fasern sind überall durch Zellgewebe zusammengehalten. Dieses und die erwähnte Hülle umgeben unten, mit einander verbunden, allein den Hoden, und liegen unterhalb desselben mit der darauf folgenden gemeinschaftlichen Scheidenhaut zu einem kurzen, festen Knoten zusammen.

\*) Brugnone obl. sur les vésicules séminales. Mém. de Turin 1786. p. 610, Panchienari ebendaf.

Dieser Muskel, der bei den Thieren stärker entwickelt ist als beim Menschen, kann den Hoden in die Höhe ziehen.

Gemeinschaftliche Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges.

§. 2444.

Auf diese dritte Schicht folgt eine Schicht von Schleimgewebe, welches den Namen der gemeinschaftlichen Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges (*Tunica vaginalis testis et funiculi spermatici communis*) führt. Es stammt von dem Schleimgewebe, welches das Bauchfell umkleidet, und umgibt den ganzen Samenstrang und den Hoden. Durch dieses Schleimgewebe kann man von dem untern Ende derselben Luft durch den Bauchring bis in die Zellschicht, welche die vordere sowohl als die hintere Fläche des Bauchfelles bedeckt, und selbst bis zwischen die Gefäßplatten, treiben.

Von dem äußern Umfange dieser Schicht gehen Verdoppelungen nach innen ab, welche die Gefäße des Samenstranges und den Samenabführungsgang zusammenheften, unter ihr befindet sich keine eigenthümliche, von Neubauer genommene Scheidenhaut des Samenstranges (*vag. fun. sperm. propr.*), deren Höhle von der andern verschieden wäre, indem, auf der einen Seite, wenn jene nicht in ihrem äußern Umfange auch mit der größten Behutsamkeit verletzt, und nun Luft zwischen die Gefäße des Samenstranges eingeblasen wird, diese überall hervordringt, und der andern Luft, in sie geblasen, auch zwischen die Gefäße des Samenstranges tritt. Ja, diese gemeinschaftliche Haut des Samenstranges erscheint oben nicht einmal als ein eigener, sich bestehender, geschlossener fester Cylinder, wenn man



ermägt, daß sie nach Wegnahme des sie umgebenden Hodenmuskels nicht mehr luftdicht ist, sondern als solche nur da gestellt werden kann, so lange sie von dem Hodenmuskel und seiner Sehne umgeben ist.

Höchstens kann man ein äußeres, dem freien Blatte der serösen Häute ähnliches, und ein umgeschlagenes, die Samenstrangsgefäße überziehendes und zusammenheftendes Unterscheiden, jenes als die gemeinschaftliche, dieses als die besondere Haut des Samenstranges ansehen.

Unten aber, so weit sie die eigne Scheidenhaut des Hoden bekleidet, ist sie sehr fest, und deutlich faserig, hauptsächlich gegen das untere Ende des Hoden eng mit dieser vermischt.

Auch nach außen fließt sie an dieser Stelle sehr genau mit den beiden, nach außen folgenden Häuten zusammen.

#### 2. Eigne Scheidenhaut des Hoden.

##### §. 2445.

Vollkommen von dieser Schicht geschieden aber ist die fünfte Haut des Hoden, seine eigenthümliche Scheidenhaut (*Tunica vaginalis testis propria*).

Sie ist eine zusammengesetzte seröse Haut. Gemälich ist sie oval und entspricht der Gestalt des Hoden, ist sie beträchtlich größer, so daß ihre Höhe die seinige vollkommen um ein Drittheil übertrifft und drittheil Zoll beträgt. Bisweilen aber verläuft, nach meinen Beobachtungen, niemals von ihrer höchsten Stelle, sondern etwas tiefer, in dem vordern Theile ihres Umfangs ein weit engerer, mehr oder weniger langer Anhang in der gemeinschaftlichen Scheidenhaut nach oben, dessen Höhle ununterbrochen mit der übrigen zusammenhängt.

Die eigenthümliche Scheidenhaut enthält innerhalb ihrer Höhle nicht bloß den Hoden, sondern auch einen Theil des Samenstranges und den ganzen Nebenhoden. Da, wo sie sich gegen sich selbst umschlägt, nimmt sie zunächst diese beiden Theile in dem Anfange ihres umgeschlagenen, innern Blattes auf. Nachdem sie sie eingehüllt hat, tritt sie am obern und hintern Theile des Hoden unmittelbar, in dem größten Theile ihrer Länge aber erst nachdem sie zwischen beiden eine Falte von wenigen Linien gebildet hat, an den letztern, so daß das obere und untere Ende des Nebenhoden an dem Theile, mit welchem sie gegen den Hoden gewandt sind, nicht von ihr bekleidet werden, und wirft sich nun über seinen ganzen Umfang. In der angeführten Falte verlaufen die Samen Gefäße zum Hoden, welche durch seinen obern hintern Rand in ihn treten.

Die zwei Blätter, welche diese Falte bilden, hängen nur locker durch Schleimgewebe zusammen, und sind daher leicht voneinander zu trennen. Eben so kann man auch von der Substanz des Nebenhoden die Scheidenhaut leicht ablösen; allein schwer ist sie rein von dem Hoden selbst, die Strecken einiger Linien von dem hintern Rande ausgenommen, abzulösen.

Der den Hoden bekleidende Theil dieser Haut wird von Luschka<sup>1)</sup> ungeschicklich die verbindende Haut (Conjunctiva) genannt. Gewöhnlich führt er, noch weniger bezeichnend, den Namen des äußern Blattes der weißen Haut des Hoden.

#### 9. Faserhaut.

##### §. 2446.

Die Faserhaut oder weiße Haut (Tunica albuginea, anonyma, fibrosa) ist die letzte, innerste Haut des Hoden,

Am 2

1) N. u. D. S. 146.

Hoden, welche seine Substanz zunächst umgiebt und sein Gestalt genau bestimmt. Sie ist dick, fest, silberglänzend, faserig, kurz, eine fibröse Haut. Sie bildet eine einfache Höhle, und ist an ihrem obern Ende zum Durchgange der Samengänge, so wie in ihrem hintern Rande für die Samen-gefäße durchbohrt.

b. Substanz des Hoden. 2).

§. 2447.

Innerhalb der weißen Haut befindet sich, größtentheils nur locker mit ihr verbunden, die Substanz des Hoden selbst, eine weiche, bräunlichgelbe Masse, welche durch die Blutgefäße der Haut in mehrere, über einander liegende Lappchen (Lobuli) getheilt wird 2). Diese Substanz besteht vorzüglich aus einer außerordentlich großen Menge sehr feiner, einfacher, nicht verzweigter, vielfach zusammengeknäuelter Kanäle, die Samenröhren, geschlängelten Gefäßchen, Ge-

mer!

1) A. Haller de vasib; seminalibus observ. Gott. 1745. m. coll. diss. T. II. und Opp. minor. T. II. p. 1.

A. Monro description of the seminal Vessels. In Edinb. essays phys. and literary. Vol. I. XVI.

Idem de testibus et de semine in variis animalibus. Edinb. 1755.

Derselbe. Of the seminal ducts. In Observations anatom. and physiol. wherein D. Hunter's Claim for some discoveries is examined. Edinb. 1758.

G. Prochaska Beobachtungen über die Samengänge, ihre Klappen und einen neuen Weg, durch welchen der Samen Männern ins Geblüt geleitet wird. In Abh. d. Japh. Akad. Bd. I. S. 198—213.

2) B. S. Albinus de teste humano. In Ann. Academ. L. II. C. XII.

11 mengdungen (Canaliculi seminales, f. Vascula serpentina  
 12 K. Ductus seminiferi), deren jedes Läppchen eines enthält;  
 13 und deren Windungen, so wie sie selbst unter einander, nur  
 14 sehr locker durch zartes Schleimgewebe zusammengehalten wer-  
 15 den, so daß man sie leicht aus einander löstren, und noch  
 deutlicher durch behutsame Maceration ihre außerordentlich  
 große Zahl, die sich ungefähr auf dreihundert, deren jedes un-  
 gefäße sechszehn Fuß lang und  $\frac{3}{16}$  Zoll weit ist, so daß die  
 Länge aller zusammen genommen gegen 3000 Fuß betragen  
 würde, darstellen kann.

## §. 2448.

Diese Gänge vereinigen sich gegen das obere Ende des  
 Hoden zu mehrern größern, welche die weiße Haut durchbohren,  
 und bald wieder zu einer geringen Anzahl, ungefähr zwanzig,  
 noch ansehnlicherer zusammentreten, die den Namen der aus-  
 führenden Gänge (Vasa efferentia & excretoria) führen.  
 Diese werden durch Schleimgewebe zu einem Bündel vereinigt,  
 verlaufen geschlängelt nach oben, und bilden den rundlichen,  
 angeschwollenen Kopf des Nebenhoden.

## 2. Der Nebenhode 1).

## §. 2449.

Der Nebenhode (Epididymis) ist der Anfang des  
 Ausführungsganges des Hoden. Er nimmt am obern Ende  
 desselben mit einem dickern angeschwollenern, rundlichen Theile,  
 dem Kopfe, seinen Anfang, und steigt längs dem hintern  
 und obern Rande desselben herab.

M m 3

Im

1) B. S. Albinus de Epididymide. In Ann. acad. L. II. VI.

Im Kopfe des Nebenhoden sind die Bündel, welche die Ausführungsgefäße des Hoden bilden, noch getrennt, wenn gleich, nach meinen Untersuchungen auch durch diesen Theil, schon vom obersten Ende desselben an, ein einfacher, vielfach gewundener Gang zu verlaufen scheint, in welchen sich nach einander die Ausführungsgefäße nur einsenken.

Der dünnere, längere Theil des Nebenhoden, der Schwanz (Cauda epid.), ist ein einfacher, aber außerordentlich vielfacher, anfangs sehr enger, allmählich aber sich beträchtlich erweiternder, und größere Windungen bildender Gang, der nur locker durch eine Falte der eigenthümlichen Scheidenhaut des Hoden an diesen geheftet wird, sich an seinem untern Ende gegen sich selbst umbiegt, und dadurch Samenabführungsgang wird.

Seine Länge beträgt ungefähr dreißig Fuß.

### 3. Der Samenabführungsgang <sup>1)</sup>.

§. 2450.

Der Samenabführungsgang (Ductus deferens) steigt an dem hintern und obern Rande des Hoden, anfänglich gewunden, bald gerade, mit den Samen Gefäßen durch Zellgewebe zum Samenstrange (Funiculus spermaticus) verbunden, hinter und nach innen von ihnen liegend, erst gerade, dann schief von innen und unten nach außen und oben. Bis zum Bauchringe verläuft er gerade, von hier aus aber verändert er seine Richtung und wendet sich im Leistenkanal von innen

1) B. S. Albinus de vasis deferentibus, vesiculis seminalibus, emissariis quibus ad urethram pertinent, ostiolis in capite gallinaginis. In Academ. Annot. L. IV. C. III. p. 16 seq.

nen und unten nach außen und oben. Auch im Leistenkanal findet zwischen den Samenblut- und Saugadern auf der einen, und dem Samenabführungsgange auf der andern Seite das angegebne Verhältniß Statt. Wo er aus diesem tritt, kreuzt er sich mit der Bauchdeckenschlagader so, daß er dicht vor ihr nach oben geht, sie sich hinter ihm nach innen und oben wendet, und gelangt so in die Unterleibshöhle.

Hier entfernt er sich unter einem mehr oder weniger spitzen Winkel von den Samengefäßen, wendet sich, immer außerhalb des Bauchfelles und nur dem vordern Theile seines Umfangs nach von ihm bekleidet, nach innen und unten, und steigt, mit dem der vordern Seite beträchtlich convergirend, in das kleine Becken herab.

§. 2451.

Im Becken ist der Samenstrang an die hintere Fläche der Harnblase geheftet.

In seinem Verlauf erweitert und verdickt er sich allmählich, wird in seinem untersten, plötzlich beträchtlich erweiterten Theile zugleich wieder beträchtlich, doch nicht so bedeutend als in seinem Anfange, gewunden, und biegt sich nach außen, oben und hinten in eine ansehnliche, blinde Erweiterung, die Samenblase um.

Er besteht aus zwei sehr verschiedenen Substanzen.

Die äußere, welche eine sehr ansehnliche Dicke, bis zu einer halben Linie hat, ist bräunlichgelb und beträchtlich hart und fest. Höchst wahrscheinlich ist sie irritabler Natur, wenn sich gleich nur sehr selten deutliche Fasern in ihr nachweisen

Wm 4 lassen.

lassen. Doch habe ich einigemal mit Bestimmtheit Kreisfasern gefunden <sup>1)</sup>).

Die innere weißliche, leicht von ihr trennbare, nur locker durch Zellgewebe an sie geheftete, ist eine Schleimhaut und eine Fortsetzung der Schleimhaut der Harnröhre. In der größten Theile ihres Verlaufes ist sie glatt, unten in der Länge von 1 — 2 Zollen netzförmig.

#### 4. Die Samenblasen <sup>2)</sup>).

§. 2452.

Die Samenblasen (*Vesiculae seminales* s. *parastatae*) liegen, eine auf jeder Seite, nach außen von dem Samengange ihrer Seite, gleichfalls dicht an die hintere Fläche der Harnblase geheftet und hinten locker vom Bauchfelle bekleidet. Sie sind im Verhältniß zu ihrer Länge eng, ungefähr zwei bis drei Linien weit, vier bis fünf Zoll lang, erscheinen aber viel kürzer, weil sie beträchtlich gewunden sind.

Doch sind sie nicht immer bloß gewunden, oder ein einfacher blinder Sack, wie früher von Leal Lealis, kürzlich von Caldani <sup>3)</sup> behauptet wurde, sondern weit gewöhnlicher vielfach verästelt.

Ihre innere Haut ist durch eine beträchtliche Menge von Vorsprüngen, wodurch ein aus unregelmäßigen Maschen gebildetes Netz entsteht, sehr ungleich. Zwischen den größten

1) S. auch *Leuwenhoek* Ep. 41. Der auch Längensfasern sah. Vergl. S. 544.

2) *A. de Haller* programma etc. observationes de vasis seminalibus. Gotting. 1745. rec. in *Thes. dissert.* Vol. V. et *Opp. min.* Vol. II. p. 1.

3) *F. Caldani* Opusc. anat. Patav. 1805.

Halten befinden sich überdies eine ansehnliche Menge kleinerer, wodurch die Ungleichheit dieser Oberfläche der inneren Haut noch bedeutend vermehrt wird: eine auffallende Analogie zwischen der Samenblase und der Gallenblase.

## §. 2453.

Das untere Ende der Samenblase und des Samenganges öffnet sich in einen, einige Linien langen, beträchtlich engern Gang, den Ausprägungsgang (Ductus ejaculatorius), welcher, fernerhin mit dem gleichnamigen der andern Seite nach vorn und unten convergirend, von oben und hinten in die Substanz der Vorsteherdrüse tritt, und sich dicht neben ihm in der Mitte des Schnepfenkopfes in ihre Höhle öffnet.

5. Vorsteherdrüse<sup>1)</sup>.

## §. 2454.

Die Vorsteherdrüse (Prostata) ist ein dreieckiger Körper, der gewöhnlich ungefähr die Größe und Gestalt einer Kastanie hat, etwas über einen Zoll breit, einen Zoll hoch, einen halben dick ist, und ungefähr fünf Drachmen wiegt.

Sie liegt unter und vor der Harnblase, und umgiebt von hinten und den Seiten den Anfangstheil der Harnröhre.

Sie ist bräunlich, hart, fest, von einer festen, faserigen Membran umgeben, und besteht aus zwei seitlichen größern, und einem mittlern, hintern, kleinern Lappen.

M m 5

Dies

1) Home on the discovery of a middle lobe of the Prostata Gland. Ph. Tr. 1806. rec. in Home's practical observations on the treatment of the diseases of the Prostata Gland. London. 1811.



lassen. Doch habe ich einigemal mit Bestimmtheit Kreisfasern gefunden <sup>1)</sup>).

Die innere weißliche, leicht von ihr trennbare, nur locker durch Zellgewebe an sie geheftete, ist eine Schleimhaut und eine Fortsetzung der Schleimhaut der Harnröhre. In dem größten Theile ihres Verlaufes ist sie glatt, unten in der Länge von 1 — 2 Zollen netzförmig.

#### 4. Die Samenblasen <sup>2)</sup>).

§. 2452.

Die Samenblasen (*Vesiculae seminales* s. *parastatae*) liegen, eine auf jeder Seite, nach außen von dem Samengange ihrer Seite, gleichfalls dicht an die hintere Fläche der Harnblase geheftet und hinten locker vom Bauchfelle bekleidet. Sie sind im Verhältniß zu ihrer Länge eng, ungefähr zwei bis drei Linien weit, vier bis fünf Zoll lang, erscheinen aber viel kürzer, weil sie beträchtlich gewunden sind.

Doch sind sie nicht immer bloß gewunden, oder ein einfacher blinder Sack, wie früher von Leal Lealls, Kärlich von Caldani <sup>3)</sup> behauptet wurde, sondern weit gewöhnlicher vielfach verästelt.

Ihre innere Haut ist durch eine beträchtliche Menge von Vorsprüngen, wodurch ein aus unregelmäßigen Taschen gebildetes Netz entsteht, sehr ungleich. Zwischen den größern

Fals

1) S. auch *Leuwenhoek* Ep. 41. Der auch Längensfasern sah. Vergl. S. 544.

2) *A. de Haller* programma etc. observationes de vasis seminalibus. Götting. 1745. rec. in *Thef. dissert.* Vol. V. et *Opp. min.* Vol. II. p. 1.

3) *F. Caldani* Opusc. anat. Patav. 1805.

Falten befinden sich überdies eine ansehnliche Menge kleinerer, wodurch die Ungleichheit dieser Oberfläche der inneren Haut noch bedeutend vermehrt wird: eine auffallende Analogie zwischen der Samenblase und der Gallenblase.

## §. 2453.

Das untere Ende der Samenblase und des Samenganges öffnet sich in einen, einige Linien langen, beträchtlich engeren Gang, den Ausprägungsgang (Ductus ejaculatorius), welcher, fernerhin mit dem gleichnamigen der andern Seite nach vorn und unten convergirend, von oben und hinten in die Substanz der Vorsteherdrüse tritt, und sich dicht neben ihm in der Mitte des Schnepfenkopfes in ihre Höhle öffnet.

5. Vorsteherdrüse <sup>1)</sup>.

## §. 2454.

Die Vorsteherdrüse (Prostata) ist ein dreieckiger Körper, der gewöhnlich ungefähr die Größe und Gestalt einer Kastanie hat, etwas über einen Zoll breit, einen Zoll hoch, einen halben dick ist, und ungefähr fünf Drachmen wiegt.

Sie liegt unter und vor der Harnblase, und umgiebt von hinten und den Seiten den Anfangstheil der Harnröhre.

Sie ist bräunlich, hart, fest, von einer festen, faserigen Membran umgeben, und besteht aus zwei seitlichen größern, und einem mittlern, hintern, kleinern Lappen.

Mm 5

Dies

1) Home on the discovery of a middle lobe of the Prostata Gland. Ph. Tr. 1806. rec. in Home's practical observations on the treatment of the diseases of the Prostata Gland. London. 1811.

Der Ductus liegt hinten zwischen beiden Seitenlappen und dem Samenausführungsgänge, so wie zwischen diesen und der Harnblase, ist rundlich, kleiner als die Seitenlappen, doch von verschiedner Größe.

In der Mitte ihrer untern Fläche befindet sich eine länglich-rundliche, nach vorn in eine schmalere und längere Spitze auslaufende Erhabenheit, die von ihrer Gestalt den Namen des Schnepfenkopfes oder Bratspfannes, von ihrer Bestimmung den des Samenhügels (*Caput gallinaginis* f. *Veru montanum* f. *Colliculus seminalis*) führt.

In ihrer Mitte befindet sich die einfache oder doppelte Mündung der Ausspeisungsgänge, an den Seiten und neben ihr eine ansehnliche Menge von Öffnungen, welche zu den, in der Substanz der Drüse sich verbreitenden Ausführungsgängen derselben führen, wodurch eine gelbliche Feuchtigkeit, der Saft der Vorstehdrüse, austritt, und sich dem ausfließenden Samen bejmischt.

Die Ausführungsgänge des mittlern Lappens dringen unmittelbar durch die Haut der Harnblase und hinter dem Schnepfenkopfe nach außen.

#### b. Begattungstheile oder männliche Ruthen).

##### 1. Äußere Gestalt und Lage:

S. 2455.

Die männliche Ruthen, das männliche Glied (*Penis* f. *coles*, f. *priapus* f. *membrum virile*) liegt vor und

gan.

1) F. Ruyssch responso etc. in Epist. XV. de vas. sanguineorum extremit. etc. Hiscæ accedunt nonnulla circa penem detecta, figuris illustrata.

ganz außerhalb dem Becken, unter der Schambeinfuge zwischen den Schenkeln, hat im Ganzen eine cylindrische Gestalt. Durch sie verläuft der gemeinschaftliche Ausführungsgang des Samens und des Harnes, die Harnröhre.

Sie ist in ihrem ganzen Umfange von einer Verlängerung der äußern Haut umgeben, die an dieser Stelle dünn, haarlos und ohne Fett ist. Schon äußerlich bemerkt man durch die Haut, daß sie an ihrem vordern Ende erst plötzlich anschwillt und einen beträchtlichen Vorsprung bildet, dann sich stumpfzugespißt endigt.

§. 2455. Die Eichel.

§. 2456.

Dieser angeschwollne Theil ist die Eichel (Glans penis), ein ründlich dreieckiger Körper, welcher sich hinten mit einem wulstigen, rundlichen Rande, der Eichelkrone (Corona glandis), die ihn überall umgiebt, vorn durch eine senkrechte Spalte, die Hautmündung der Harnröhre, endigt. Die zusammengezogene engere Stelle hinter der Eichel ist der Hals derselben.

Er liegt nicht frei zu Tage, sondern wird von einer dreifachen Hautschicht bekleidet.

β. Vor:

B. S. Albinus de Ruyschiano involucro penis externo, et de tunica cellulosa penis. In Ann. Acad. L. II. C. XI.

F. Ruysch de involucro penis externo. Ibid. L. II. C. XIII.

L'Admiral Effigies penis humani etc. L. B. 1741.

1) F. Ruysch glandis in pene vera structura noviter detecta. Obs. med. chir. Cap. C.

B. S. Albinus de integumentis glandis penis. Annot. Acad. L. III. C. IX.

## β. Vorhaut.

S. 2457.

Die beiden äußern Schichten sind durch Schleimgewebe so an einander geheftet, daß die äußere nach außen, die mittlere nach innen gewandt ist, und bilden die Vorhaut (Praeputium). Diese umgiebt die Eichel nahe, allein ohne mit ihr verwachsen zu seyn, und läßt sich daher vor- und rückwärts schieben, wodurch die Eichel bedeckt oder entblößt wird.

Die innere Platte der Vorhaut ist weich, röhrlieh, feucht, schleimhautähnlich.

In der Mitte, wo beide in einander übergehen, befindet sich scheinbar eine rundliche Oeffnung in der Vorhaut, welche der vordern Oeffnung der Eichel entspricht, und durch das gänzliche Zurückstreichen der Vorhaut, die sich in demselben Maße runzelt, verschwindet.

Die innere Platte der Vorhaut schlägt sich hinter der Eichel zum zweitenmal, hier aber nach vorn um, und bekleidet die Eichel, eng an das Gewebe derselben geheftet.

Dies geschieht fast im ganzen Umfange der Eichel unmerklich, die innere Vorhautsplatte ist hier in ihrem obern Theile schlaff, und nur locker an die darunter liegende Ruthe geheftet, in der Mitte des untern Theiles ihres Umfangs dagegen ist sie straff, kurz und eng mit dem ihr entsprechenden Theile der Eichel verbunden, und bildet eine kurze senkrechte Falte.

Dieser Theil der Vorhaut erhält den Namen des Bandchens der Eichel (Frenulum glandis).

In dem ganzen Halse und an der hintern Fläche der Eichelkrone ist die innerste, sie bildende Hautschicht durch eine  
zahlr.

zahllose Menge kleiner, rundlicher Vertiefungen, der Tyson'schen Talgdrüsen (*Glandulae Tysonianae*), welche die dickliche, weißliche, leicht erhärtende, übelriechende Vorsehutschmiere (*Smegma praeputii*) absondern, besetzt.

## 2. Größe der Ruthe.

§. 2458.

Die Ruthe ist im Ruhezustande ungefähr drei bis vier Zoll lang und gegen einen Zoll dick.

## 3. Zusammensetzung.

§. 2459.

Die Ruthe ist von der sie bekleidenden Haut nur äußerst locker umgeben.

Sie besteht aus einer faserigen, dicken Hülle, welche ihre Gestalt bestimmt, und einem schwammigen, vorzüglich aus erweiterten Venen gebildeten Gewebe, welches in drei verschiedenen Anhäufungen um sie angelagert ist. Die beiden obern und seitlichen bilden die schwammigen oder Zellkörper der Ruthe (*Corpora spongiosa* s. *cavernosa* s. *nervosa penis*), die untern den schwammigen oder Zellkörper der Harnröhre (*Corpus spongiosum* s. *cavernosum urethrae*).

Gewöhnlich werden die schwammigen Körper der Ruthe und der Harnröhre vorzüglich als aus, von den Gefäßen verschiedenen Zellen gebildet beschrieben, in der That sind aber diese Zellen nur Venenerweiterungen, und die schwammigen Körper bestehen aus einem sehr vielfach verzweigten und verschlungenen Puls- und Blutaderneze, wie schon Vesal<sup>1)</sup>,

Malz

1) De c. h. fabrica. Lib. V. C. XIV. Corpora haec . . . enata ad eum fere modum, ac si ex innumeris arteriarum venarum-  
que

Malpighi<sup>1)</sup> für die menschliche Ruthe überhaupt, Hunter<sup>2)</sup> für den schwammigen Körper der Harnröhre insbesondere angegeben haben.

Genauer ist dieser Bau für die Ruthe größerer Thiere, des Elephanten, des Pferdes, zum Theil von Duvornoy<sup>3)</sup>, genauer von Cuvier<sup>4)</sup>, Ziedemann<sup>5)</sup>, für die menschliche von Ribes<sup>6)</sup>, Moreschi und Panizza<sup>7)</sup> dargethan worden.

a. Ru.

que fasciculis quam tenuissimis, simulque proxime implicatis, retia quaedam efformarentur, orbiculatim a nervae illa membranaeque substantia comprehensa.

- 1) Diff. epist. varii argum. Opp. omn. T. II. p. 221. Sinuum speciem in mammarum tubulis et in pene habemus; in his nonnihil sanguinis reperitur, ita ut videantur venarum diverticula, vel saltem ipsarum appendices.
- 2) Obsl. on certain parts of the animal oeconomy. p. 45. It may not be improper to observe, that the corpus spongiosum urethrae and glans penis are not spongy or cellular, but made up of a plexus of veins. This structure is discernible in the human subject; but much more distinctly seen in many animals, as the horse etc.
- 3) Venarum ductus solummodo cribriformes, foraminibus multique pertusi ac veluti erosi, a cellulis aegre discrimandi extra capsulam penis, venarum (seu brevium tubulorum verticalium) formam induentes, in conspectum veniunt. De pene Elephantii. In Comm. Petrop. a. II. p. 400.
- 4) Vergl. Anat. Bd. 4. S. 468.
- 5) F. Ziedemann über den schwammigen Körper in der Ruthe des Pferdes. Meckel's Archiv. Bd. 2. S. 95 ff.
- 6) Exposé sommaire de quelques recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques. In den Mém. de la Soc. méd. d'émulat. T. VIII. p. 605.
- 7) In eignen Werken, welche ich indeffen nicht zu sehen Gelegenheit hatte, ungeachtet ich die überzeugenden Präparate von Moreschi zu Bologna schon im Jahr 1812 sah; und bei meinen Untersuchungen dasselbe fand.

## a. Ruthenzellkörper.

§. 2460.

Die Ruthenzellkörper machen den bei weitem größten Theil, namentlich ihren obern und die Seitentheile der Ruthe aus, und sind mehr breit als hoch.

Sie allein werden von einer deutlich gefaserten Hülle umgeben, deren mit einander versflochtene Fasern in der Längsrichtung verlaufen.

Sie entstehen auf jeder Seite mit einem, ungefähr einen halben langen Schenkel von dem aufsteigenden Aste des Siegelbeins. Beide Schenkel steigen einander nach oben entgegen und vereinigen sich vor der Schambeinvereinigung, wo sie von einer gemeinschaftlichen Hülle in ihrem ganzen Umfange umgeben werden.

Ungeachtet sie äußerlich einfach scheinen, werden sie doch in der größten Theile ihrer Länge durch eine senkrechte Scheidewand (Septum corporum cavernosorum), eine Fortsetzung der äußern faserigen Hülle, unvollkommen in eine rechte und linke Hälfte geschieden. Diese besteht aus sehr länglichen, von einer Seite zur andern zusammengedrückten Fasern, welche durch die ganze Höhe der Zellkörper reichen, und von hinten, wo sie fast eine ununterbrochne Wand bilden, nach vorn allmählich sowohl beträchtlich dünner als weniger zahlreich werden, so daß sie überall mehr oder weniger große Lücken zwischen sich lassen.

Die am hintern Ende Stattfindende völlige Trennung beider Zellkörper verschwindet also nach vorn allmählich ganz; doch weichen beide am vordern Ende weiter, jedoch nur scheinbar und äußerlich, von einander, indem der äußere Theil ihres Um-



beweist, daß sie nicht unumgänglich nothwendig zur Ausbildung des neuen Organismus sey.

Die Scheide ist bloß Leitungsorgan der Ruthe, durch sie des männlichen Samens, und des Fötus.

Die äußern Theile sind Wollustorgane, wie der hohe Grad von Reizung derselben vor und während der Begattung beweist.

Diese gesteigerte Reizung derselben setzt die innern Zeugungstheile und den ganzen Organismus in den, zur Hervorbringung des neuen Organismus erforderlichen Zustand von erhöhter Thätigkeit.

## 2. Männliche Zeugungstheile 2).

### a. Bildende Theile.

#### 1. Die Hoden.

§. 2436.

Den wichtigsten Abschnitt der männlichen Zeugungstheile bilden die Hoden (Didymi s. testes s. testiculi), die den Samen absondernden Drüsen des Geschlechtsapparates.

#### a. Äußere Gestalt und Lage.

§. 2437.

Sie haben eine länglichrundliche, ungefähr eiförmige Gestalt, und liegen an dem untern Theile des Stammes, neben  
und

1) R. de Graaf de virorum organis generationi inservientibus. L. et B. 1668. 8. in Opp. omn. Amstel. 1705. 8. Mangei bibl. anat. — Ejusd. part. genit. defensio ibid. p. 529 ff.

Leal Lealis περί των σπερματιζοντων οργανων de partibus conficientibus in viro. Patav. 1686. N. reo. in Eustachii opusc.

Santorini de virorum naturalibus in observ. anat. Cap. X. J. G. Rüderer de genitalibus virorum. Gott. 1758. 4.

Von dieser Stelle an zieht sich die Harnröhre beträchtlich zusammen.

Von nun an bleibt sich ihr Durchmesser bis gegen das vor-  
re Ende der Ruthe ungefähr gleich; dicht hinter und in der  
selben aber erweitert sie sich wieder beträchtlich und bildet hier  
die schifförmige Grube (*Fossa navicularis*).

Der Zellkörper der Harnröhre ist bloß von einem verdich-  
ten, nicht faserigen Schleimgewebe umgeben, feiner, zarter  
als der Zellkörper der Ruthe, ohne Scheidewand, und bildet  
an seinem vordern Ende allein die Eichel.

Unter dem Zellkörper der Harnröhre befindet sich eine  
dünne, röthliche, eng mit ihm verbundene Schleimhaut, welche  
er Länge nach gefaltet ist, und eine ansehnliche Menge kleiner,  
röthlicher, in einer Reihe hinter einander stehender Höhlen, die  
Cowper'schen Drüsen enthält, die bisweilen drei Linien Tiefe  
haben, sich nur am untern Theile des Harnröhrenumfangs  
finden, und so gerichtet sind, daß die Oeffnung sich vorn, der  
Mund hinten befindet.

#### c. Cowper'sche Drüsen \*).

§. 2462.

Außer den Hoden und der Vorsteherdrüse finden sich noch  
andere, wenn gleich durchaus nicht immer, zwei oder drei  
andere, gelbliche, länglichrundliche, harte, aus mehreren Lapp-  
en gebildete, von einer dichten aponeurotischen Scheide umgebene  
Drüsen

\*) W. Cowper *Glandularum quarundam nuper detectarum  
descriptio*. Lond. 1702.

L. Terraneus *de glandulis universim et speciatim ad ure-  
thram virilem novis*. L. B. 1729.

G. A. Haase *de glandulis Cowperi mucosa*. Lips. 1805.

Meckel's Anat. 4. Th.

Drüsen von der Größe einer großen Erbse, dicht unter vordern Theile und etwas vor der Vorsteherdrüse, deren fähr  $1\frac{1}{2}$  Zoll lange Gänge sich in der Zwiebel der Harn nach vorn begeben, und von der Seite und von unten Harnröhre mit getrennten Mündungen öffnen.

Die beiden seitlichen, hintern erhalten den Namen Cowper'schen Drüsen, die vordere, unpaare, klei viel unbeständigere den der vordern Vorsteherdrüse (Antiprostata).

#### d. Muskeln des Mittelfleisches.

##### 1. Eigne Muskeln der Ruthe.

##### §. 2463.

Die Ruthe besitzt drei Muskeln, von denen einer, Sitzbeinzellkörpermuskel, den Zellkörpern der Ruthe angehört, der zweite; der Harnschneller, den der Harn der dritte, der Zusammenschnürer der Harnröhre, häutigen Theil dieses Kanals bewegt, und die sich alle an ihr hintern Ende befinden.

##### a. Sitzbein: Zellkörpermuskel.

##### §. 2464.

Der Sitzbeinzellkörpermuskel, Niederzieh unrichtig Aufrichter der Ruthe (M. Ischio-cavernosus L. director L. erector penis) kommt mit dem gleichmigen des Riglers durch Ursprung, Befestigung, Bau und Wirkung überein, ist aber etwas größer als er, und springt bisweilen mit einem doppelten Kopfe vom Sitzbein.

## β. Harnschneller.

## §. 2465.

Der Harn- und Samenschneller, Zwiebel-  
 Zellkörpermuskel (*M. accelerator urinae (et seminis)*  
*l. Bulbo-cavernosus*), ein dünner, platter, ungefähr rauten-  
 förmiger Muskel, der die Zwiebel und den hintern Theil der  
 Harnröhre umgibt, entsteht vorn von dem hintern Theile des  
 Zellkörpers der Ruthe, hinten von dem obern Theile der Sei-  
 tenwand der Harnröhrenzwiebel, endigt sich vorn mit einem,  
 schief von außen, vorn und oben nach innen, hinten und unten  
 absteigenden geraden, hinten mit einem rundlichen Rande, be-  
 steht vorn aus sehr schief, hinten aus mehr quer verlaufenden  
 Fasern, und fließt mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten  
 Seite in der Mittellinie so genau zusammen, daß beide Hälften  
 oft selbst nicht durch einen mittlern Sehnenstreifen von einan-  
 der geschieden werden.

## γ. Zusammenschnürer der Harnröhre \*)

## §. 2466.

Der Zusammenschnürer der Harnröhre, Scham-  
 beinharnröhrenmuskel (*M. constrictor urethrae l.*  
*pubo-urethralis*) ist ein länglichviereckiger, von außen nach  
 innen plattgedrückter Muskel, der mit einer kurzen Sehne  
 etwas über dem untern Rande der Schambeinfuge, einige  
 Linien unter der sehnigen Befestigung der Harnblase, dicht  
 neben der Sehne des gleichnamigen Muskels der andern Seite

N n 2

von

\*) Willson description of two muscles surrounding the mem-  
 branous part of the urethra. In medico-chirurg. transactions  
 of London. Vol. I. p. 175 ff. Mit einer Abbildung.

von der innern Fläche der Schambeinfuge entsteht, nach unten breiter werdend absteigt, anfangs den der andern Seite berührt, sich, wenn er den häutigen Theil der Harnröhre erreicht hat, von ihm entfernt und an diesen heftet, und unter demselben mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite so zusammenfließt, daß meistens in der Mittellinie ein sehniger Streif die Vereinigung beider andeutet.

An seinem vordern Ende fließt er gewöhnlich mit dem hintern des Harnschnellers zusammen.

In seinem untern Theile ist er häufig mit dem Fieber des Afters durch einige Fasern vereinigt, in dem übrigen Theile seines Verlaufes aber durch Venen, welche von der Vorstehdrüse und Harnblase nach vorn zur großen Rückenvene der Ruthe verlaufen, getrennt.

Beide Muskeln bilden einen, den häutigen Theil der Harnröhre umgebenden Ring, welcher sie zusammenschneurt, und durch seine krampfhafte Zusammenziehung die Schwierigkeiten, welche man gerade an dieser engsten Stelle der Harnröhre beim Einbringen von Instrumenten durch die Harnröhre in die Blase findet, bedeutend vermehrt.

## 2. Gemeinschaftliche Muskeln der Geschlechtstheile, des Mastdarms und der Harnwerkzeuge.

### a. Quere Mittelfleischmuskeln.

§. 2467.

Gewöhnlich finden sich zwei quere Mittelfleischmuskeln (*M. transversus perinaei*) auf jeder Seite, welche von dem Sitz- und Schambein nach innen verlaufen, und durch längliche Gestalt mit einander übereinkommen.

a. Hint

a. Hinterer Mittelfleischmuskel.

§. 2468.

Der hintere und untere entspringt von der inneren Fläche des Sigknorrens, wendet sich von außen und hinten nach innen und etwas nach vorn, fließt hier, vorzüglich im eistlichen Geschlecht, mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite, mit dem vordern Ende des äußern Asterschnürers und zu einem geringern Theile mit dem hintern des Harnschnürers und des Scheidenschnürers zusammen.

Beide gemeinschaftlich ziehen den After etwas nach hinten, und drücken ihn von vorn nach hinten zusammen, befördern so den Austritt des Kothes.

b. Vorderer Mittelfleischmuskel.

§. 2469.

Der vordere, obere Mittelfleischmuskel entspringt von der inneren Fläche des untern Theiles des absteigenden Kambeinastes, ist oft mit dem vorigen hier eng verbunden, wendet sich nach innen und etwas nach vorn, fließt hier wieder mit dem vorigen, dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite und dem äußern Asterschließer, so wie dem Harnschneller und dem Scheidenschnürer, weiter nach vorn als der vorige, zusammen.

Er wirkt diesem ähnlich, öffnet aber beim Manne gleich den hintern Theil der Harnröhre, beim Weibe die beide.

§. 2470.

Der hintere Quermuskel des Mittelfleisches fehlt oft. Im Manne liegen beide weit näher zusammen, und sind

von der innern Fläche der Schambeinfuge entsteht, nach unten breiter werdend absteigt, anfangs den der andern Seite berührt, sich, wenn er den häutigen Theil der Harnröhre erreicht hat, von ihm entfernt und an diesen heftet, und unter demselben mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite so zusammenfließt, daß meistens in der Mittellinie ein sehniger Streif die Vereinigung beider andeutet.

An seinem vordern Ende fließt er gewöhnlich mit dem hintern des Harnschnellers zusammen.

In seinem untern Theile ist er häufig mit dem Heber des After's durch einige Fasern vereinigt, in dem übrigen Theile seines Verlaufes aber durch Venen, welche von der Vorstehersdrüse und Harnblase nach vorn zur großen Rückenvene der Ruthe verlaufen, getrennt.

Beide Muskeln bilden einen, den häutigen Theil der Harnröhre umgebenden Ring, welcher sie zusammenschneurt, und durch seine krampfhaft zusammenziehende die Schwierigkeiten, welche man gerade an dieser engsten Stelle der Harnröhre beim Einbringen von Instrumenten durch die Harnröhre in die Blase findet, bedeutend vermehrt.

## 2. Gemeinschaftliche Muskeln der Geschlechtstheile, des Mastdarms und der Harnwerkzeuge.

### a. Quere Mittelfleischmuskeln.

§. 2467.

Gewöhnlich finden sich zwei quere Mittelfleischmuskeln (*M. transversus perinaei*) auf jeder Seite, welche von dem Sitz- und Schambein nach innen verlaufen, und durch längliche Gestalt mit einander übereinkommen.

a. Hin

## a. Hinterer Mittelfleischmuskel.

§. 2468.

Der hintere und untere entspringt von der inneren Fläche des Sigknorrens, wendet sich von außen und hinten nach innen und etwas nach vorn, fließt hier, vorzüglich im weiblichen Geschlecht, mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite, mit dem vordern Ende des äußern Asterschnürers und zu einem geringern Theile mit dem hintern des Harnschnürers und des Scheidenschnürers zusammen.

Beide gemeinschaftlich ziehen den After etwas nach hinten, und drücken ihn von vorn nach hinten zusammen, befördern so den Austritt des Kothes.

## b. Vorderer Mittelfleischmuskel.

§. 2469.

Der vordere, obere Mittelfleischmuskel entspringt von der inneren Fläche des untern Theiles des absteigenden Hambeinastes, ist oft mit dem vorigen hier eng verbunden, endet sich nach innen und etwas nach vorn, fließt hier wieder mit dem vorigen, dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite und dem äußern Asterschließer, so wie dem Harnschneller und dem Scheidenschnürer, weiter nach vorn als der vorige, zusammen.

Er wirkt diesem ähnlich, öffnet aber beim Manne gleich den hintern Theil der Harnröhre, beim Weibe die Scheide.

§. 2470.

Der hintere Quermuskel des Mittelfleisches fehlt oft. Beim Manne liegen beide weit näher zusammen, und sind



weit schwächer als beim Weibe, wo sich bisweilen sogar zwischen beiden ein dritter findet.

β. Heber des After's.

§. 2471.

Der Heber des After's (*Levator ani*), ein halbmondförmiger dünner, breiter Muskel, entspringt vorn und oben von dem untern Theile der Schambeinfuge, dem horizontalen Aste des Schambeines, ober- und innerhalb des obern Randes des innern Hüftbeinlochmuskels von der innern Fläche des Sitzbeinkörpers bis zum Sitzbeinstachel.

Von hier aus wendet er sich nach innen, unten und hinten, so daß seine vordern Fasern fast senkrecht, die hintern quer-verlaufen, geht hinter dem untern Theile des Mastdarms weg, und setzt sich durch kurze sehnige Fasern mit dem hintern Theile seines innern Randes an den Seitenrand der drei untern Steißbeine, durch den vordern vereinigt er sich mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite.

Beide Muskeln bilden daher eine breite Binde, welche das untere Ende des Mastdarms von hinten umgiebt, und beim Weibe, ehe sie zum Mastdarm gelangt, sehr genau an die Scheide geheftet ist.

Im weiblichen Geschlecht ist der vordere, von der Schambeinfuge entspringende Theil häufig von dem übrigen getrennt.

Er zieht den untern Theil des Mastdarms in die Höhe, schnürt ihn zugleich zusammen, hindert dadurch das Vorfallen des After's, und befördert zugleich das Austreten des Koths, zieht das, durch den Koth, oder bei der Geburt durch den Fötus zurückgedrängte Steißbein nach vorn und oben, befördert auch den Austritt des Harnes und des Samens, indem er

die

Die Hoden- und Samenblasen trägt und zusammenbrückt, hindert beim weiblichen Geschlecht den Vorfall der Scheide.

c. Kräfte und Einrichtungen der männlichen Zeugungstheile.

§. 2472.

Die Hoden sondern den Samen ab, und sind, sofern nur durch seine Einwirkung auf den weiblichen Körper die Entstehung eines vollkommenen neuen Organismus möglich wird, die wichtigsten Theile des Zeugungssystems.

Dies beweist die, durch Wegnahme oder ursprünglichen Mangel oder krankhafte Umwandlung der Hoden, bei übrigen normaler Beschaffenheit der Zeugungstheile bewirkte Unfruchtbarkeit.

Der Samen <sup>1)</sup>, eine weißliche, sehr stark riechende Feuchtigkeit besteht außer ungefähr

900 Th. Wasser
aus einer eigenthümlich thierischen Substanz 60
phosphorsaurem Kalk . . . . . 30
"      "      Natron . . . . . 10

1000.

Auch im individuellen Organismus sind sie höchst wichtige Organe, da unter den angeführten Bedingungen auch die ganze körperliche und geistige Beschaffenheit desselben mehr oder weniger von der Regel abweicht und nicht die gehörige Ausbildung erhält, der Kehlkopf und die Stimme sich nicht entwickeln, der Bart nicht wächst und der männliche Totalhabitus sich nicht ausbildet.

R n 4

Von

1) Vauquelin Ann. de Chimie. T. 9. p. 77.

Von den Hoden gelangt der Same durch den Samenabfuhrungsgang unter den gewöhnlichen Bedingungen in die Samenblasen, und wird hier auf die gewöhnliche Weise wie Flüssigkeiten in den Behältern, worin sie eine Zeitlang verweilen, vollendet, indem er durch Aufnahme des wässerigen Theiles concentrirter und vielleicht durch Zutritt einer, in den Wänden der Samenblase abgesonderten Flüssigkeit abgekühdert wird.

Zwar haben mehrere verdiente Anatomen, namentlich Wharton <sup>1)</sup>, van Hørne <sup>2)</sup>, Swammerdam <sup>3)</sup>, J. Hunter <sup>4)</sup> diese, im Allgemeinen angenommene Meinung verworfen, und dagegen die, daß die Samenblasen keinen Samen aufnehmen, sondern bloß eine eigne Feuchtigkeit, nach einigen, z. B. Wharton, einen eigenthümlichen Samen abgesonderten, welche dem in den Hoden abgesonderten Samen beigemischt wurde, aufzustellen gesucht, weil:

1) Die

- 1) De vesiculis seminalibus in dessen *Adenographia*. Cap. XXX. p. 208 ff.
- 2) *Prodromus observationum suarum circa partes genitales in utroque sexu*. L. B. 1668.
- 3) *Miraculum naturae s. uteri muliebris fabrica*. L. B. 1672. p. 10 seqq.
- 4) *Observations on the glands situated between the rectum and bladder, called vesiculae seminales*. In dessen *Observations on certain parts of the animal oeconomy*. London. 1786. 1792. p. 31.

Auch Chaptal Mém. ou l'on se propose de faire voir que les vésicules séminales ne servent point de réservoir à la semence séparée des testicules: on y établit un nouveau réservoir de cette liqueur, et l'on assigne un nouvel usage aux vésicules. *Journal de physique*. 1787. p. 101.

1) die Samenblasen und Samenabführungsgänge keinen gemeinschaftlichen Ausführungsgang hätten<sup>1)</sup>;

2) ihr Bau drüsig sey<sup>2)</sup>;

3) eine, in den Grund der Samenblase eingespritzte Flüssigkeit in den Samenabführungsgang dringe<sup>3)</sup>;

4) mehrere Thiere, namentlich die Fische, Samenblasen, aber keine Hoden besitzen<sup>4)</sup>.

5) die in den Samenblasen enthaltene Flüssigkeit sowohl beim Menschen als Thieren vom Samen verschieden, namentlich weit heller und flüssiger, und ohne den eigenthümlichen Samengeruch ist<sup>5)</sup>;

6) die bisweisen aus der Harnröhre beim starken Drängen auf den Stuhlgang fließende Ejaculation sehr nahe mit der in den Samenblasen gefundenen übereinkommt<sup>6)</sup>;

7) bei Menschen, denen der Hode einer Seite weggenommen wurde<sup>7)</sup>, oder wo der Zusammenhang zwischen ihm und der Samenblase auf einer Seite unterbrochen war, die Samenblase und selbst der untere Theil des Samenganges derselben Seite nicht kleiner und leerer, sondern selbst größer und voller, als die entgegengesetzte war<sup>8)</sup>;

N n 5

8) bei

1) Wharton p. 209.

Van Horne.

2) Eben daselbst.

3) Ewammerdam a. a. D. S. 10.

4) Derselbe bei Brugnone. M. de Turin. 1786. p. 619.

5) Hunter S. 32. 38. 39.

6) Derselbe eben das. S. 33.

7) Derselbe eben das. S. 33 — 36.

8) Derselbe eben das. S. 37.

8) bei unvollendetem Beischlaf Schmerz in den Hoden, nicht in den Samenblasen entsteht<sup>1)</sup>;

9) die Samenblasen bei lange krank gewesen und alten Personen, gleich voll als bei plötzlich gestorbenen jungen sind<sup>2)</sup>;

10) bei mehreren Thieren wirklich gar kein Zusammenhang zwischen Samenblasen und Hodenausführungsgängen Statt findet<sup>3)</sup>;

11) nach der Begattung bei mehreren Thieren, namentlich Meerschweinchen, die Samenblasen voll Feuchtigkeit sind<sup>4)</sup>;

12) bei mehreren Thieren sich keine Spur davon findet<sup>5)</sup>;

#### §. 2473.

Indessen sind wenigstens mehrere dieser Thatsachen theils durchaus nicht erweisend, theils unsichtig, und man kann daher die ältere Meinung durch Widerlegung derselben un-  
recht erhalten ).

1) Hängen in der That die Samenblasen und Ausführungsgänge der Hoden auf die oben (S. 553.) angegebene Weise zusammen;

2) be-

1) Hunter ebend. S. 37.

2) Ebendas. S. 37. 38.

3) Ebendas. S. 38 ff.

4) Ebendas. S. 39.

5) Ebendas. S. 40.

6) De Graaf partium genitalium defensio. Leidae. 1675. 8.

Needham, Croone und King bei Birch. hist. of the roy. society. Vol. III. p. 105.

Brugnone observations anatomiques sur les vésicules seminales, tendantes à en confirmer l'usage. In Mém. de Turin 1786 — 1787.

Schmerring's Anmerkungen über Hunter's Aufsatz in Blumenbach's med. Bibliothek Bd. 3. S. 87 ff.

2) beweist ihr drüsiger Bau nur, daß sie absondern, nicht, daß sie keinen Samen aufnehmen;

3) aus dem Eindringen einer in sie gespritzten Flüssigkeit den Samenabfuhrungsgang ergibt sich gerade die Richtung des Eintrittes aus diesem in sie;

4) die als Samenblasen angegebenen Theile der Fische sind wirklich Hoden;

5) die Verschiedenheit der Flüssigkeit der Samenblasen im ausgeworfnem Samen kann von der Vermischung des Hodensamens mit der Samenblasenflüssigkeit herrühren.

Uebrigens besteht der bei der Begattung u. s. w. aussehnende Samen aus der Flüssigkeit des Hoden, der Samenblasen, der Vorstehdrüse, der Cowper'schen Drüsen und der Schleimhaut der Harnröhre.

6) Aus dieser Uebereinkunft folgt nicht, daß die aussehnende Feuchtigkeit nicht aus den Hoden in die Samenblase gelangt sey. Uebrigens konnte jene auch aus der Vorstehdrüse und von andern Stellen stammen, vorzüglich, da auch die Samenblasenlosen Hunde ähnliche Erscheinungen darsetzen<sup>1)</sup>;

7) dies konnte zufällig seyn, zumal, da auch die Gallenblase, wenn der Eintritt der Galle in sie durch einen Stein verhindert wird, durch den von ihr abgesonderten Schleim sehr stark ausgedehnt wird;

8) hat in der That wenigstens oft die Erfahrung gegen sich, und würde, auch wenn dies nicht der Fall wäre, nur erweisen, daß der Begattungsfizel zugleich die Thätigkeit des Hoden erhöht, und nicht bloß Samen aus den Samenblasen, sondern auch aus den Hoden ausgeworfen wird;

9) ist

1) Brugnone S. 622.

9) ist theils nicht ganz richtig, theils beweist es nicht. Offenbar haben, nach Hunter's eigener Annahme, die Samenblasen Antheil an der Zeugungsthätigkeit und ihre gleichmäßige Anfüllung unter verschiedenen Umständen ist daher nicht auffallender, wenn man sie von den Hoden oder von ihnen selbst herleitet;

10) der Mangel an Zusammenhang bei mehreren Thieren beweist nicht, daß da, wo er sich findet, kein Eintritt des Samens in die Samenblase vorhanden sey. Ueberdies findet bei mehreren, wo Hunter es läugnet, z. B. dem Meerſchweinchen, dem Pferde, wirklich ein Zusammenhang Statt, und die, bei andern nicht mit dem Samenabfuhrungsgange zusammenhängenden Samenblasen sind Vorsteherdrüsen;

11) beweist nicht, daß nicht ein Theil des Inhalts der Samenblase bei der Begattung ausfloß;

12) auch hieraus folgt nicht, daß bei mit Samenblasen versehenen Thieren der Samen nicht in die Samenblase fließt.

Hiezu kommt noch

13) daß in jeder Lage Flüssigkeiten aller Art in den Samenabfuhrungsgang gespritzt, eher in die Samenblase als in den Ausführgang gelangen<sup>1)</sup>;

14) in die Samenblase eingespritzte Substanzen fast immer durch den Ausführungsgang hervortreten, ehe sie in den Samenabfuhrungsgang gelangen, und oft gar nicht in diesen dringen<sup>2)</sup>;

15) Luft

1) De Graaf a. a. D.  
Brugnone C. 620.

2) Derselbe a. a. D.

15) Luft und die Sonde in die Oeffnung der Ausfüh-  
rungsgänge gebracht, leicht in die Samenblase, äußerst schwer  
in den Samenabführungsgang gelangen \*).

Dieser Widerlegung jener Meinung ungeachtet, läßt sich  
doch nicht läugnen, daß auch die eigenthümliche Absonderungs-  
thätigkeit der Samenblasen einen höchst wichtigen Antheil an  
der Ausbildung des Samens zu haben scheint.

§. 2474.

Der Samen gelangt aus den angegebenen Stellen in die  
Harnröhre, und zunächst in die Vorsteherdrüse, wo die von  
dieser abgesonderte, gelblichweiße und flüssigere Feuchtig-  
keit (Liquor prostaticus) sich mit ihm vermischt, und zu  
seiner vollkommnern Ausbildung beiträgt.

Von hier aus wird er vorzüglich durch die Harn- und  
Samenschneller durch die Ruthe geworfen.

§. 2475.

Die Ruthe besitzt im hohen Grade das Vermögen, in  
Folge des erweckten Geschlechtstriebes an Masse und Umfang zu-  
zunehmen, und in demselben Verhältniß, unstreitig in Folge der  
Ausdehnung und Spannung ihrer Faserhülle, hart und steif zu  
werden. Hierzu eignet sie sich durch die Anordnung ihrer Gefäße.  
Durch die Festigkeit, welche sie auf diese Weise erlangt, wird  
sie in den Stand gesetzt, in die weibliche Scheide zu dringen,  
sie mehr oder weniger anzufüllen, und den Samen kräftiger  
in die innern Zeugungstheile, und namentlich die Gebärmu-  
ter zu leiten. Die, gegen die frühere Ansicht aufgestellte Be-  
hauptung, daß das Wesen dieser Anschwellung nicht Anhäufung  
von

1) Haller Elem. phys. T. VII. p. 454.  
Brugnone p. 620.



von Blut sey <sup>1)</sup>), welches in Folge erhöhter Thätigkeit des Nervensystems überhaupt, und der verhältnißmäßig sehr großen Ruthennerven insbesondere durch die Ruthenpulsadern in größerer Menge zufließt, und durch die weiten und zahlreichen Blutadern nicht in demselben Verhältniß schnell zurückgeführt werde, ist durch ältere <sup>2)</sup> und neuere <sup>3)</sup> Versuche, wobei man das erigirte und unterbundne Glied abschnitt und die Venenröhre desselben strogend von Blut fand, hinlänglich widerlegt.

## §. 2476.

Die erste Veränderung zum Behuf des Samenergusses geht unstreitig in der Eichel, dem nervenreichsten und empfindlichsten Theile der Ruthe und somit der ganzen Zeugungstheile, vor. Die, in diesen gesetzte Steigerung der Nerventhätigkeit pflanzt sich über das ganze Nervensystem und insbesondere die Nerven der Zeugungstheile fort, und bewirkt Steigerung der Absonderungsthätigkeit der Hoden, Samenblasen und übrigen Drüsen, so wie der Bewegungsthätigkeit der Harnschneller, wodurch der, in den hintern Theil der Harnröhre gelangte Samenstoßweise durch die gefeierte Harnröhre geworfen wird.

## III. Die

1) Langguth bei Schumann de vi imaginationis in foetum. Viteb. 1790.

2) R. de Graaf de virorum organis. In Opp. omn. p. 84.  
Swammerdam prodr. obl. de part. genit. p. 15.

3) Lb. Koele über das Antriebsvermögen des männlichen Gliedes im erigirten Zustande. Pfortei. Untersuchungen in Braunschweig. 1796. S. 17.

III. Die Brüste. (Mammae)<sup>1)</sup>.

§. 2477.

Die Brüste (Mammae) sind accessorische Organe der Geschlechtstheile, welche in der ersten Periode des Lebens nach der Geburt die körperliche Gemeinschaft zwischen dem pöblichen und mütterlichen Organismus, sowohl im menschlichen Geschlechte, als in der ganzen Klasse der wahren Säugthiere durch die Bildung der Milch unterhalten. Bei den Vögeln, vielleicht auch bei einigen Reptilien, findet sich zwar gleichfalls eine solche körperliche, über die Geburt hinaus verlängerte Abhängigkeit des kindlichen vom mütterlichen Organismus, allein das Organ, welches hier der Besondere der sie vermittelnden Nahrungsflüssigkeit für den Stern vorsteht, ist kein eigner, nur diesem Geschäft geweihter Theil, sondern ein Theil des Darmkanals, der Kropf (Intrinsicus), der sich zwar in dieser Zeit auf eine analoge Weise als die Brüste verändert, allein doch zugleich dem älterlichen Körper selbst ungefähr auf dieselbe Weise als dem kindlichen ent.

a. Zahl.

- 1) A. Nuck *Adenographia curiosa*. L. B. 1691. Cap. II.
- Mencelius de *structura mammarum*. L. B. 1720.
- Güntz de *mammarum fabrica et lactis secretione*. Lipsi. 1754.
- Böhmer de *ductibus mammarum lactiferis*. Halae. 1742.
- Kölpin de *structura mammarum*. Gryphiswald. 1764.
- Crusius de *mammarum fabrica et lactis secretione*. Lipsiae. 1785.
- Cubolo de *mammis*. In Santorini Tab. XVII. pag. 92 — 110.
- Girardi de *mammarum structura*. Ibid. p. 110 — 116.
- A. Joannides de *mammarum physiologia*. Halae. 1801.

## a. B a h l.

## §. 2478.

Sie sind drüsige Organe und namentlich conglomerirte Drüsen.

Ungeachtet sie in der Regel nur beim Weibe ihre nach außen gehende Function ausüben, kommen sie doch auch dem Manne, nur in einem weit unentwickelteren Zustande zu, wenn sie gleich durch Vergrößerung und selbst durch reichliche Milchabsonderung bisweilen auch im männlichen Geschlechte völlig den weiblichen Typus befolgen.

## b. Lage und äußere Gestalt.

## §. 2479.

Sie liegen einander gegenüber, eine auf jeder Seite der vordern Fläche der Brusthöhle, und die Gegend, welche sie beim weiblichen Geschlechte einnehmen, führt selbst den Namen der Brustgegend (Regio mammae) nach ihnen. Die drüsige Substanz, welche ihr Wesen ausmacht, ist von vielem Fett umgeben, welches zu der halbrundlichen Form dieser Organe beiträgt. Die Grundfläche derselben ist indeß nicht ganz kreisförmig, sondern mehr elliptisch. Vorzüglich verlängert sie sich nach oben und außen oft bis in die Gegend der Achselhöhle, nach unten und innen ist sie kreisförmiger. Sie reicht von der dritten bis zur siebenten Rippe, bedeckt den größten Theil des großen Brustmuskels, liegt aber mit dem äußersten Theile ihres untern Umfangs nicht selten auch auf einem Theile des großen Sägemuskels.

Ihr Rand ist weder immer glatt, noch überall von gleicher Dicke. Bei Weibern, die cit gesäugt haben, ist er sehr ungleich, indem sich die Drüse nach außen unregelmäßig vergrößert,

größert, so daß von ihrem Umfange aus unregelmäßige Fortsätze auslaufen.

Auch ist der ganze Umfang der Brustdrüse nicht glatt, sondern überall durch ähnliche Fortsätze von verschiedner Gestalt, Größe und Richtung ungleich, welche frei hervorragen, und mehr oder weniger ansehnliche Vertiefungen zwischen sich lassen.

Der untere und innere Theil der Brust ist weit dicker als der obere und äußere. Von ihrem ganzen Umfange aus verbleibt und erhebt sie sich gegen die Mitte, und trägt da, indessen nicht genau in der Mitte, sondern etwas mehr nach unten, wo sie am dicksten ist, eine mehr oder weniger ansehnliche, im Normalzustande frei hervorstehende Erhabenheit, die Brustwarze (*Mamilla*, *papilla mammae*), die von einer dunkler gefärbten, oft etwas vertieften, feineren Hautstelle, dem Hofe der Brust (*Areola mammae*), umgeben ist.

c. S a u.

§. 2480.

Der Bau der Brust ist nicht in allen Gegenden derselbe. In dem größten Theile ihrer Substanz besteht sie aus kleinen, besonders bei säugenden Weibern deutlich von einander unterscheidbaren, weißröthlichen Körnchen (*Acini*) ungefähr von der Größe eines Hirsekorns, die wieder aus kleinern, nicht rundlichen, sondern länglichen, hohlen, strahlenförmig angeordneten Bläschen zusammengesetzt sind, und durch Schleimgewebe und Gefäße zusammengehalten werden.

Gegen die Mitte dagegen, im Hofe, fehlen diese Körnchen, und es findet sich nur eine weißliche, faserige Substanz, welche durch die Maceration sich als eine Sammlung von

Gängen, die durch vieles Schleimgewebe zusammengehalten werden, darstellen läßt.

§. 2481.

Diese Gänge sind die letzten Theile der Milchgänge (Ductus galactophori, lactiferi). Die Milchgänge entstehen mit eben so vielen feinen Würzelschen als es Körnchen giebt, fließen allmählich zu größern Stämmen zusammen, und die endigen sich endlich im mittlern Theile der Brust, hinter dem Hofe in Erweiterungen (Sinus), die meistens eine kegelförmige Gestalt haben. In keiner conglomerirten Drüse sind die ersten Anfänge der Ausführungsgänge so ansehnlich weit als in der Brust. Die Größe der Stämme variiert, je nachdem sie eine größere oder geringere Anzahl von Aesten aufgenommen haben. Manche sind bedeutend klein. Die Zahl der größern Aeste, welche zuletzt zur Bildung eines Stammes zusammenfließen, variiert von vier bis zwölf. Mit der Größe der Stämme steht auch die Größe der centralen Erweiterung im geraden Verhältniß, die bisweilen zwei bis drei Linien weit ist. Immer aber sind diese Erweiterungen nur kurz, am innern Ende dicht an einander liegend, am äußern etwas von einander entfernt. Das innere Ende einer jeden Erweiterung zieht sich plötzlich zu einem sehr engen Gange zusammen, der die Mitte der Länge der Warze bis zur Spitze derselben gerade durchläuft, sich allmählich verengt, nur selten in einer Stelle seines Verlaufes erweitert, und endlich hier mit einer sehr feinen Mündung öffnet. Alle diese kleinen Kanäle, die etwa die Länge eines Quersingers haben, sind durch Schleimgewebe äußerst dicht an einander geheftet. Aus einer jeden Erweiterung tritt nur ein solcher Kanal ab.

## §. 2482.

Der ganze Milchgang, der also aus dem zuführenden, größten Theile, der Erweiterung und dem Ausführungsgange besteht, ist aus einer weichen, dünnen, durchlöcherigen, den Schleimhäuten analogen Membran gebildet.

Diese Gänge liegen im größten Theile ihres Verlaufes nicht frei zu Tage, die Stämme sind immer tief in der Substanz der Drüse verborgen, und auch die anfangs auf dem äußern Umfange verlaufenden, vorzüglich von den oben erwähnten Anhängen kommenden, senken sich sehr schnell in die Tiefe.

Sie entstehen zwar durch allmähliches Zusammentreten kleiner Zweige und Aeste, allein sie selbst hängen nicht durch Verbindungsfäste zusammen. Rucl.<sup>1)</sup> und nach ihm Berheyen<sup>2)</sup> beschreiben und bilden zwar ansehnliche anastomosirende Queräste ab, die innerhalb des Hofes, dicht an der Grundfläche der Warze, von einem Milchgange zum andern gehen, und dadurch einen Ring darstellen sollen, allein keinem der nachfolgenden Beobachter, und auch mir selbst in mehreren Fällen ist es, trotz der sorgfältigsten Untersuchungen, gelungen, seine Existenz zu erweisen. Theils sieht man ihn nicht, theils fehlt im Allgemeinen nie eine in einen Ausführungsgang eingespritzte Materie durch eine andre Oeffnung zurück, was doch nothwendig der Fall seyn müßte, wenn jene Bildung Statt fände.

Eben so wenig finden sich Klappen in den Milchgängen, die von einigen Beobachtern angenommen wurden, deren Exi-

Do 2

stenz

1) *Adenographia curiosa*. L. B. 1691. p. 16. Fig. 2.

2) *Anat. o. h.* Tom. I. Tab. 18. Fig. 4.

Von den Hoden gelangt der Same durch den Samenabfuhrungsgang unter den gewöhnlichen Bedingungen in die Samenblasen, und wird hier auf die gewöhnliche Weise wie Flüssigkeiten in den Behältern, worin sie eine Zeitlang verweilen, vollendet, indem er durch Aufnahme des wässerigen Theils concentrirter und vielleicht durch Zutritt einer, in den Wänden der Samenblase abgesonderten Flüssigkeit abgeladet wird.

Zwar haben mehrere verdiente Anatomen, namentlich Wharton <sup>1)</sup>, van Horne <sup>2)</sup>, Swammerdam <sup>3)</sup>, J. Hunter <sup>4)</sup> diese, im Allgemeinen angenommene Meinung verworfen, und dagegen die, daß die Samenblasen keinen Samen aufnehmen, sondern bloß eine eigne Feuchtigkeith, nach einigen, z. B. Wharton, einen eigenthümlichen Samen absonderten, welche beim in den Hoden abgesonderten Samen belgemischt wurde, aufzustellen gesucht, weil:

1) W

1) De vesiculis seminalibus in dessen Adenographia. Cap. XII. p. 208 ff.

2) Prodromus observationum suarum circa partes genitales in utroque sexu. L. B. 1668.

3) Miraculum naturae s. uteri muliebris fabrica. L. B. 1672. p. 10 seqq.

4) Observations on the glands situated between the rectum and bladder, called vesiculae seminales. In dessen Observations on certain parts of the animal oeconomy. London. 1784. 1792. p. 31.

Auch Chapral Mém. ou l'on se propose de faire voir que les vésicules séminales ne servent point de réservoir à la semence séparée des testicules: on y établit un nouveau réservoir de cette liqueur, et l'on assigne un nouvel usage aux vésicules. Journal de physique. 1787. p. 101.

desselben Körpers. Von den frühern Beobachtern wird sie zu gering, bis auf sechs oder sieben, angegeben. Ich habe, wie Haller, Walter und Covolo, nie unter funfzehn gefunden. Doch beweisen die Resultate meiner Untersuchungen, daß Walter mit Unrecht ihre Zahl auf funfzehn beschränkt, indem ich, wie Haller und Covolo, über zwanzig fand. Die höchste Zahl ist, nach Covolo, vier und zwanzig. Die obersten und äußersten sind, wie Walter richtig bemerkt, sehr klein und eng, was mit der geringeren Dicke der Brustdrüse in ihrem obern Theile zusammenfällt.

## §. 2485.

Außer den Oeffnungen dieser großen Ausführungsgänge in der Spitze der Warze finden sich im Hofe noch andre, die im Allgemeinen die Enden unregelmäßig verstreuter Höckerchen einnehmen, deren bisweilen zwei oder drei zu einem zusammenfließen.

Mehrere halten diese Höckerchen bloß für Talgdrüsen, doch sahen Bidloo und Morgagni bisweilen eine helle Flüssigkeit, dieser, Winslow und Covolo sogar mehr oder weniger dicke Milch bei säugenden Personen, Morgagni selbst bei Männern, aus ihnen sich ergießen. Die Menge und Beschaffenheit der ausfließenden Flüssigkeit hängt von der GröÙen oder geringern Länge der Zeit nach dem Essen und dem Säugen ab, so daß einige Stunden nach dem Essen, und wenn die Brust dem Säuglinge lange vorher dargeboten wurde, Milch in Menge hervorspritzt, umgekehrt bloß einige Tropfen einer helleren Flüssigkeit langsam ausfließen.

Diese Höckerchen sind ganz von Talgdrüsen verschieden. Die Talgdrüsen finden sich in Menge auf dem Hofe und der



Warze, ragen nicht über dessen Oberfläche hervor, wohl aber die Höckerchen, die oft selbst von mehreren Talgdrüsen bedeckt sind. Zudem zeigt eine genaue Untersuchung in diesen Höckerchen einen, bisweilen selbst vier kleine Ausführungsgänge, welche zu Drüsen führen, die völlig von derselben Beschaffenheit als die schon betrachteten, nur bedeutend kleiner sind, unmittelbar unter der Haut des Hofes liegen, und durch Schleimgewebe sowohl unter einander als mit dem Körper der Drüse selbst verbunden sind. Bisweilen, doch selten, öffnen sich diese kleinen Drüsen auch in dem Theile der die Brust bedeckenden Haut, der sich dicht im Umfange des Hofes befindet. Ihre Zahl und Größe variiert, so daß man am gewöhnlichsten zwischen fünf und zehn Höckerchen findet.

Diese kleineren Drüsen und die Höckerchen, in welchen sich ihre Ausführungsgänge vereinigen, verhalten sich also in der großen Brustdrüse genau wie die Zungendrüsen oder die Backen- und Lippendrüsen zu der Ohr- und Kieferspeicheldrüse, und sind durchaus, wenigstens meiner Ueberzeugung nach, da auch meine Untersuchungen mit denselben Resultat gaben, nicht mit Hildebrandt<sup>1)</sup> für widernatürlich zu halten.

#### §. 2486.

Die Brustdrüse ist in eine mehr oder weniger reichliche Fettschicht eingesenkt, welche nicht, wie anderwärts eine ununterbrochene Schicht bildet, indem sie sich zwischen die vorher (§. 577.) bemerkten Vertiefungen, und selbst, gegen die Mitte anderer Drüsen, bis tief in das Innerste der Substanz

der

1) Lehrbuch der Anat. des Menschen. Bd. 3. S. 399. Note 17 §. 1948.

der Drüse einsenkt, an der Grundfläche derselben aber fehlt. Eben so findet sich auch kein Fett in der Warze und hinter dem Hofe. Das Schleimgewebe, welches dieses Fett, das härter und gelblicher als an den meisten übrigen Stellen ist, enthält, dringt gleichfalls überall zwischen die verschiedenen einzelnen Drüsen. Im Umfange der Drüse verdichtet es sich zu einer eigenthümlichen Scheide, ungefähr wie die, welche die Muskeln umgeben.

Haller behauptet<sup>1)</sup>, aus dem die Grundfläche der Drüse umgebenden Fett sehr häufig Milchgänge, welche in die Brustdrüse treten, entstehen gesehen zu haben, doch fanden weder Covolo noch ich diese Beobachtung bestätigt. Wahrscheinlich war sie eine Täuschung, die sich auf die Anwesenheit der oben (S. 577.) angemerkten Anhänge gründet.

#### §. 2487.

Die Gefäße der Brüste stammen von den äußeren Brustgefäßen, ihre Nerven vom dritten und vierten Halsnerven und den fünf bis sechs obern Brustnerven.

#### a. Verrichtung.

#### §. 2488.

Die Function der Brüste ist die Absonderung der Milch, welche, weil sie im normalen Zustande erst gegen das Ende der Schwangerschaft anfängt und nach der Geburt ihre Vollendung erreicht, am besten im Abschnitt von den, durch die Begattung bewirkten Erscheinungen betrachtet wird.

1) Elem. physl. T. VII. p. 8.

9) ist theils nicht ganz richtig, theils beweist es nicht. Offenbar haben, nach Hunter's eigener Annahme, die Samenblasen Antheil an der Zeugungsthätigkeit und ihre gleichmäßige Anfüllung unter verschiedenen Umständen ist daher nicht auffallender, wenn man sie von den Hoden oder von ihnen selbst herleitet;

10) der Mangel an Zusammenhang bei mehreren Thieren beweist nicht, daß da, wo er sich findet, kein Eintritt des Samens in die Samenblase vorhanden sey. Ueberdies findet bei mehreren, wo Hunter es läugnet, z. B. dem Meerſchweinchen, dem Pferde, wirklich ein Zusammenhang Statt, und die, bei andern nicht mit dem Samenabführungsgange zusammenhängenden Samenblasen sind Vorsteherdrüsen;

11) beweist nicht, daß nicht ein Theil des Inhalts der Samenblase bei der Begattung ausfloß;

12) auch hieraus folgt nicht, daß bei mit Samenblasen versehenen Thieren der Samen nicht in die Samenblase fließt.

Hiezu kommt noch

13) daß in jeder Lage Flüssigkeiten aller Art in den Samenabführungsgang gespritzt, eher in die Samenblase als in den Ausprägungsgang gelangen<sup>1)</sup>;

14) in die Samenblase eingespritzte Substanzen fast immer durch den Ausführungsgang hervortreten, ehe sie in den Samenabführungsgang gelangen, und oft gar nicht in diesen dringen<sup>2)</sup>;

15) ist

1) De Graaf a. a. D.  
Brugnone S. 630.

2) Derselbe a. a. D.

## §. 2490.

Diese anfängliche Identität der Geschlechtstheile in allen Individuen haben schon richtig *Home<sup>1)</sup>*, *Autenrieth<sup>2)</sup>* und *Lefermann<sup>3)</sup>* erkannt, wenn sie gleich vielleicht weniger genau und richtig die Beschaffenheit der frühesten Form und die Zeit der Differenzirung derselben angegeben haben. Da sich nämlich bei allen Embryonen aus jener frühesten Periode, von denen ich wenigstens fünfzehn verglichen habe, anfänglich genau die angegebne Bildung findet, so hat man wohl richtiger die Rath des Hodensackes und der Ruthe als eine Spure einer ehemaligen wirklichen Trennung, welche allmählich durch Verschließung der Spalte von hinten nach vorn verschwindet, als, mit *Autenrieth*, für ein Zeichen einer Neigung zu einer ähnlichen Trennung als die, welche beim Weibe wirklich Statt findet, anzusehen. Ich habe deshalb schon früher theils bei den Untersuchungen einzelner Embryonen gefunden, daß die Geschlechtstheile immer nach einem und namentlich dem weiblichen Typus gebildet sind <sup>4)</sup>, theils in Folge dieser Untersuchungen bemerkt, daß anfänglich der Charakter der Bildung der Geschlechtstheile bei allen Embryonen mehr weiblich

Do 5

ist,

1) Ueber Zwitter. Aus den phil. Transact. 1799. in *Koofe's* Beitr. zur gerichtl. Arzneik. Bd. 2. S. 234.

2) *Infantis androgyni historia*. Jenae. 1805. p. 55.

3) Ueber die Verschiedenheit beider Geschlechter. In *Reils Archiv* Bd. 7. S. 88.

4) Abhandlungen a. d. menschlichen und vergleichenden Anatomie. 1806. II. wo sechs, und Beitr. zur vergl. Anat. 1808. Bd. 1. Hft. 1. No. V., wo zwölf Embryonen aus dieser Periode beschrieben sind.

ist<sup>1)</sup>, und L i e d e m a n n<sup>2)</sup> hat durch genaue Beschreibungen mehrerer Embryonen aus frühern Perioden dasselbe bestätigt. Erscheinungen, die in zwiefacher Hinsicht merkwürdig sind, so fern 1) auch bei den meisten niedrigeren Thieren im Allgemeinen entweder gar keine Geschlechtstheile vorhanden sind, oder die vorhandenen den weiblichen Geschlechtstheilen derer entsprechen, bei welchen sich ein doppeltes Geschlecht entwickelt hat, so daß also für die Entwicklung des Embryo auch hier dasselbe Gesetz als für die Entwicklung der Thierreihe gilt; 2) sich hieraus die Erklärung der größern Häufigkeit der weiblichen Mißgeburten (Th. I. S. 94.) ergibt.

Durch ansehnliche Größe des Kiglers, Kleinheit der Gebärmutter, vielleicht sogar offenen Zusammenhang zwischen den Eierstöcken und Trompeten, bei dem einen, durch die Lage der Hoden im Unterleibe bei dem andern Geschlecht, kommen zwar noch lange beide Geschlechter unter einander mehr als in spätern Perioden überein, indessen werden doch schon im dritten Monat die Eierstöcke beständig kleiner als die Hoden, sie liegen mehr wagerecht, und die Ruthe unterscheidet sich von dem Kigler durch das Verschwinden der Spalte.

#### A. Weibliche Zeugungstheile.

§. 2491.

Die Entwicklung der weiblichen Zeugungstheile unterscheidet sich von der der männlichen vorzüglich auf den ersten Anblick durch geringere Verschiedenheit und Mannichfaltigkeit der Perioden, welche sie durchlaufen.

##### I. Eier.

1) Beitr. 3. vergl. Anat. Bd. 2. Hft. 2. Leipzig. 1812. S. 170.

2) Anatomie der kopfloren Mißgeburten. 1815. S. 80 ff.

1. Eierstöcke<sup>1)</sup>.

S. 2492.

Die Eierstöcke sind anfangs verhältnißmäßig, vorzüglich zu den übrigen Geschlechtstheilen, bedeutend größer als in spätern Perioden, und machen lange die größte Masse derselben aus, wenn sie gleich, sobald sich die Geschlechtsverschiedenheit zwischen männlichen und weiblichen Embryonen bestimmt offenbart, verhältnißmäßig weit kleiner als die Hoden sind, und hierin schon früher ein Hauptunterscheidungsmerkmal enthalten ist. Bei Embryonen aus der Mitte des dritten Monates, von ungefähr 2 Zollen Länge, sind sie kaum  $1\frac{1}{2}$  Linie lang, nicht  $\frac{1}{2}$  Linie hoch und kaum  $\frac{1}{3}$  Linie dick. Beim reifen Fötus wiegen sie zwischen 5 — 10 Gran. Sie liegen fast ganz horizontal, hoch oben über dem kleinen Becken, reichen aber, wegen ihrer mehr horizontalen Lage, mit ihren obern oder äußern Enden nicht so hoch als die Hoden bei gleich alten männlichen Embryonen, so daß sie die Nieren bei weitem nicht berühren. Ihre innern Enden dagegen sind einander so nahe, daß sie nur durch den engen Mastdarm, und auch dies nicht völlig, von einander getrennt sind. Ihre Gestalt ist sehr länglich, schmal, prismatisch. Erst um die Zeit der Mannbarkeit werden sie rundlich und verhältnißmäßig zur Länge dicker, strogend. Die äußere Hülle ist nicht nur beim reifen Fötus, sondern noch in den ersten Lebensjahren sehr dünn.

Ihre Gewebe ist bis zur Mitte des ersten Lebensjahres insofern einfacher, als ich wenigstens nie vor dem sechsten Monate Spuren der Graaf'schen Bläschen wahrnehmen konnte.

Um

---

1) Rosenmüller de ovarii embryonum et foetuum, Lips. 1802.

Um diese Zeit bilden sie sich, und sind sogleich verhältnißmäßig sehr groß.

Nach Ablauf der ersten Lebenshälfte fangen die Eierstöcke härter zu werden und zu schwinden an, verlieren ihre Glätte und erscheinen mehr oder weniger ungleich, indem die eingesunkenen Stellen beträchtliche Vertiefungen bilden. Dies rührt vorzüglich von dem Verschwinden des Parenchyms, zugleich entarten aber auch die Bläschen, indem sie sich verkleinern, ihre Häute dicker werden, endlich ihre Höhle ganz verschwindet, und sie in gelbliche, schwärzliche, oft faserknorpelige oder knöcherne Körper umgewandelt werden. Vorzüglich verkleinern sich die Eierstöcke im höhern Alter so, daß man bisweilen außer den Gefäßen durchaus keine Spur von ihnen wahrnimmt. Sie wiegen dann oft kaum 20 Gran.

§. 2493.

Nach mehreren Schriftstellern, z. B. Malpighi<sup>1)</sup>, Ballisneri<sup>2)</sup>, Santorini<sup>3)</sup>, Vertrandi<sup>4)</sup>, Brugnone<sup>5)</sup>, Buffon<sup>6)</sup> bildet auch die Entstehung der gelben Körper (Corpora lutea) einen Theil der Entwicklungsgeschichte der Eierstöcke, indem sie sie sowohl bei physischen Jungfrauen als bei sehr jungen Thierweibchen fanden; allein es läßt sich theils nicht mit Bestimmtheit erweisen, daß diese Körper

1) Diff. ep. var. argum. in Opp. omm. L. B. 1687. T. II. p. 225.

2) Von d. Erz. des Menschen und d. Thiere. Th. 2. Kap. 3. S. 262. S. 319.

3) Obs. anat. Cap. XI. p. 225.

4) De glandul. ovarii corporibus. Misc. taur. T. I. p. 104.

5) De ovariiis eorumque corporibus luteis in Mém. de Turin. 1790. S. 393 ff. Uebersetzt in Kühn's und Weigel's ital. Bibl. Bd. 3. St. I. S. 9 ff.

6) Hist. natur. T. II. p. 205 ff.

Körper wirklich dieselbe Entstehung und Bedeutung als die gewöhnlichen gelben Körper hatten, theils ist es höchst wahrscheinlich, daß ihrer Entstehung auf irgend eine Weise vorausgegangene Erregung der Thätigkeit der Geschlechtstheile voranging. Sie werden daher richtiger bei den Schwangerschaftsveränderungen der weiblichen Genitalien betrachtet werden.

## 2. Trompeten, Gebärmutter und Scheide.

§. 2494.

Die Trompeten, Gebärmutter und Scheide bilden anfänglich einen einzigen, in seinem obern Theile gespaltenen Kanal, der überall von gleicher Weite ist, und ununterbrochen von dem Unterleibsende der Trompeten bis zu der äußern Scheidenöffnung verläuft.

### a. Trompeten.

§. 2495.

Die Trompeten sind anfangs verhältnismäßig bedeutend dicker und länger als in spätern Perioden.

Sie steigen anfangs sehr schief von außen und oben nach innen und unten, nach außen von den Eierstöcken, dicht an sie geheftet, und ihr oberes Ende beträchtlich überragend, herab, und vereinigen sich, bis in den dritten Monat, an ihrem innern untern Ende unter einem spitzen Winkel zu einem mittlern, senkrechten, anfangs gar nicht, dann wenig weitem Theile, der Gebärmutter. Bis weit in den vierten Monat sind sie durchaus nicht gewunden <sup>1)</sup>, erst im fünften zeigen sich schwache,

1) Mitthin ist die gewöhnliche Angabe, daß die Trompeten beim Fetus immer gewunden seyen, einzuschränken. Die anfängliche



schwache, dann allmählich stärkere Windungen, so daß sie im achten Monat und beim reifen Fötus stärker gewunden sind als bei Erwachsenen: ein Zustand, der sich auch noch in den ersten Jahren des Lebens erhält. Anfangs scheinen die Trompeten blind und angeschwollen geendigt. Im vierten Monate scheint sich ihr Unterleibsende zu öffnen, so daß sich aber die Einschnitte erst später bilden. Ihre Höhle ist immer verhältnismäßig desto größer, je jünger der Embryo ist und in jeder Periode leicht aufzufinden <sup>1)</sup>).

Zwischen ihnen und den Eierstöcken verlaufen in der Falte des Bauchfelles nicht bloß beim Embryo und Fötus, sondern auch noch in den ersten Jahren nach der Geburt eigne, höchst merkwürdige Gefäße <sup>2)</sup>, die, wenn sie gleich weder von dem Eierstocke, noch der Trompete aus eingespritzt werden können; mithin als Vermittler des Zusammenhanges der Höhle der Leptern mit der Substanz des erstern noch nicht nachgewiesen sind, doch durch Zahl, Lage und Gestalt so genau an die Samenabführungsgefäße beim Manne erinnern, daß sie wenigstens mit Bestimmtheit als ein Versuch zur Bildung derselben und des Nebenhoden überhaupt angesehen werden können, von denen es aber die anfängliche Gestalt des Unterleibsendes der Trompete höchst wahrscheinlich macht, daß sie wirklich anfangs einen offenen Zusammenhang zwischen ihr und dem Eierstock bewirken, der vermuthlich um dieselbe Zeit verschwindet, als  
 sich

---

Geradheit ist wegen der Aehnlichkeit <sup>1)</sup> mit dem Darm in den frühern Bildungsperioden, und <sup>2)</sup> mit den Eingängen mehrerer Thiere sehr wichtig.

<sup>1)</sup> Gegen Hirschel und Kößlgin.

<sup>2)</sup> Rosenmüller de ovarii embryonari et foetuum humanorum. Lipsiae. 1802.

das Unterleibsende der Trompete öffnet, und damit ein neuer Uebergangsweg gebildet wird.

## b. Gebärmutter.

### §. 2496.

Die Gebärmutter ist anfänglich, und gewöhnlich noch wenigstens bis zum Ende des dritten Monates, oft weit länger, zweigehönt. Die Hörner sind desto länger und unter einem desto spitzern Winkel unter einander verbunden, je jünger der Embryo ist. Nachdem aber dieser Winkel ganz verschwunden ist, erscheint die Gebärmutter zweigehönt. Anfangs ist sie überall gleich weit, völlig glatt und von der Scheide weder außen noch innen durch einen Vorsprung abgesondert. Erst um das Ende des vierten Monates erweitert sie sich an ihrem obern Ende. Dies geschieht, indem die anfänglich vorhandenen Hörner verschwinden und eine einfache Höhle entsteht. Dieser obere Theil ist aber in dem Maas kleiner als der Embryo jünger ist, der Hals also verhältnismäßig zum Körper dann am größten. Allmählich aber vergrößert sich der Körper, so daß um die Zeit der Mannbarkeit die, eine lange Zeit vorhandne, beinahe walzenförmige Gestalt der Gebärmutter birnförmig wird. Noch beim reifen Fötus beträgt die Länge des Körpers nur ein Viertel des Ganzen, im siebenten, selbst im dreizehnten Jahre nur ein Drittel, erst nach völlig erreichter Mannbarkeit die Hälfte. Zugleich bilden sich quere und etwas schiefe Runzeln an ihrer vordern und hintern Fläche, die nach oben gegen die Trompetenmündungen convergiren, vorzüglich an ihrem untern Theile am dichtesten stehen und hier ihren Anfang nehmen, allmählich aber die ganze Höhe der Gebärmutter einnehmen. Allmählich entwickelt sich an der hintern

und

und vordern Fläche eine längliche Erhabenheit, welche durch die ganze Länge der Gebärmutter verläuft, und gegen welche sich von beiden Seiten diese Runzeln von oben nach unten zusammenneigen. Diese vergrößern sich bedeutend. Nicht bloß beim reifen Fötus, sondern noch in den ersten Lebensjahren ist dadurch die ganze innere Fläche der Gebärmutter ungleich. Allmählich verschwinden indeffen die Runzeln im Körper, so daß nach dem fünften Jahre die innere Fläche desselben ganz glatt ist.

Der äußere Müttermund erscheint zuerst als ein kaum merklicher Vorsprung der Gebärmutter in die Scheide, der sich aber allmählich bedeutend vergrößert, so daß in spätern Perioden des Fötuslebens die Scheidenportion der Gebärmutter verhältnismäßig weit größer ist als späterhin. Dieser ganze Theil der Gebärmutter ist im siebenten und achten Monat, weniger beim reifen Fötus und in den nächsten Monaten nach der Geburt, auch an der äußern Fläche sehr ungleich, der Länge nach gerunzelt, und mit ungleichen, tief eingeschnittenen, scharfen Rändern versehen, deren Einrisse oft die ganze Höhe der Scheidenportion einnehmen. Späterhin verkürzt sich dieser vorhin gende Theil, wird äußerlich glatt, wulstig, und der Müttermund erscheint dann als eine einfache, glatte quere Spalte.

Die Wände der Gebärmutter sind verhältnismäßig zu ihrer Höhle desto dünner, je jünger der Embryo ist. Anfangs haben sie überall dieselbe Dicke, im fünften Monate werden sie im Halbe beträchtlich dicker als in dem obern Theile. Allmählich wird, ungefähr im fünften bis sechsten Jahre, die Dicke überall gleichmäßig, bis um die Zeit der Mannbarkeit der Körper den Hals mehr oder weniger an Dicke übertrifft.

Die Gebärmutter erreicht daher erst spät ihre vollkommene Gestalt und die normale Dicke ihrer Wände: weit früher dagegen wenigstens beinahe ihre vollkommene Länge. Sie ist gar in frühen Perioden, z. B. beim reifen Fötus, verhältnißmäßig größer als in spätern.

In Erwachsenen vergrößert sich vorzüglich der Körper und die Gebärmutter bekommt eine dreieckige Gestalt: im Alter wird sie unregelmäßig abgerundet, unabhängig von vorangehenden Schwangerschaften, indem sie selbst bei alten Jungfrauen diese Veränderungen erleidet. Zugleich verkleinert sie sich, namentlich bei alten Jungfern wieder.

Eben so kehrt die Consistenz und Farbe der Gebärmutter mit dem Alter wieder zum kindlichen Zustande zurück. In beiden Perioden ist sie hart, weiß, während sie in der Blüthe der Jugend locker und geröthet ist.

Im drei bis vier Monate alten Fötus liegt die Gebärmutter fast ganz außerhalb des kleinen Beckens, noch beim fetten Fötus ragt sie beträchtlich aus demselben hervor. Vom fünfzehnten Jahre an ist sie ganz in die Höhle des kleinen Beckens getreten, und bei alten Frauen liegt sie tief in demselben.

Beim Fötus steht sie fast senkrecht, allmählich verändert sich ihre Lage, so daß ihr größter Durchmesser fast gerade von vorn nach hinten verläuft.

#### §. 2497.

Nicht bloß die Gestalt, sondern auch die Function der Gebärmutter bietet bedeutende periodische Verschiedenheiten dar.

Von dem Eintritte der Mannbarkeit oder Fortpflanzungsfähigkeit an nämlich stellt sich monatlich einige Tage lang ein Erguß von Blut und Wasser aus den Zeugungstheilen ein, welcher von der Periode, in welcher er Statt findet, den Namen des Monatsflusses (Menstruatio l. *menles*) erhält, mit der Fortpflanzungsfähigkeit, gewöhnlich zwischen dem vierzigsten und fünfzigsten Jahre, verschwindet, und keinesweges dem menschlichen Weibe eigenthümlich ist <sup>1)</sup>. Der Sitz dieser Aushauchung ist die ganze innere Fläche der Gebärmutter.

Gewöhnlich dauert sie einige Tage, höchstens eine Woche.

Die Menge des Blutes beträgt gewöhnlich 6 — 8 Unzen.

Die Farbe desselben ist dunkel, und schon deshalb ist es daher höchst wahrscheinlich, gegen die gewöhnliche Meinung, vends <sup>2)</sup>.

Diese Vermuthung wird durch die Analyse desselben bestätigt, sofern Lavagna <sup>3)</sup> keinen Faserstoff darin fand, wie auch Caissy <sup>4)</sup> und Mayer <sup>5)</sup> in dem vendsen Blute weniger Faser-, mithin Stickstoff, als in dem arteriellen entdeckten.

Die

1) G. Cuvier über die Brunst. In Medel's Archiv. Bd. 1. S. 521.

2) J. F. Oslander diss. de fluxu menstruo atque uteri prolapsu. Gott. 1808. Cap. I. II.

3) Untersuchungen über das Menstruationsblut. In Medel's Archiv. Bd. 4. S. 151 ff.

4) Keil's Archiv Bd. 12. S. 347.

5) Mayer über den Unterschied des arteriellen und vendsen Blutes rücksichtlich seines Gehaltes an Faserstoff. In Medel's Archiv Bd. 3. S. 534.

Die Gebärmutter schwillt während der Menstruation aus an, ihre Gefäße erweitern sich und ragen zottenartig in ihre ganze innere Fläche hervor<sup>1)</sup>.

Das Wesen der Menstruation ist unstreitig ein entzündungsartiger Zustand erhöhter Thätigkeit der weiblichen Zeugungstheile, der durch den Blutfluß kritisch beendigt wird. Dies ergibt sich aus dem, vor dem Eintritte derselben Statt findenden gereizten Zustande dieser Theile, größerer Reizung in Begattung und Leichtigkeit der Empfängniß.

Auch erscheint sie noch näher als ein Versuch zur Bildung des neuen Organismus, sofern theils die Veränderungen der Gebärmutter zu dieser Zeit mit denen, welche bei der Empfängniß auftreten, übereinkommen, theils nicht selten, nach Beobachtungen von Denman, Brandis, Jörg mit dem Menstruationsblute häutige, der nach der Empfängniß entstehenden fötalen Haut ähnliche Gebilde ausgestoßen werden.

Zugleich kann sie den weiblichen Körper überhaupt und die Zeugungstheile insbesondere, wenn auch wahrscheinlich nicht von schädlichen Stoffen, doch von überflüssigem Blute befreien, indem sich dieses, Behufs der Bildung eines neuen Organismus, so lange die Periode der Fortpflanzungsfähigkeit steht, in den letztern von einer Menstruationszeit zur andern häuft, und während der Schwangerschaft und des Säugens in andern Bildungen verwandelt wird.

#### c. S c h e i d e.

##### §. 2498.

Die Scheide ist anfänglich nicht weiter als die Gebärmutter, und, wie sie, ganz glatt. Um dieselbe Zeit als sie wird sie

pp 2

un

1) Oslander Cap. III.

## II. Periodische Verschiedenheiten.

§. 2489.

Anfänglich, bis zur sechsten Woche fehlt jede Spur an Geschlechtstheilen. Bei ihrem ersten Erscheinen sind sie in allen Embryonen ganz nach demselben Typus gebildet, es findet mithin durchaus noch kein Geschlechtsunterschied Statt, indem Gestalt, Größe und Lage jener Theile bei allen völlig dieselben sind. Die innern Geschlechtstheile sind 1) aus zwei sehr länglichen, schmalen, schief von außen und oben nach innen und unten verlaufenden, hoch oben außerhalb des Beckens liegenden Theilen, welche sich später entweder zu Hoden oder Eierstöcken umwandeln; 2) aus eben so vielen, nicht viel engeren, aber längern und dickern, sie nach oben überragenden, an ihrer äußern Seite herabsteigenden Gängen, welche später entweder Trompeten oder Nebenhoden und Samenabführungsgänge werden, und die sich außerhalb des Beckens zu einem gemeinschaftlichen mittlern Gange, der entweder Gebärmutter und Scheide, oder Vorsteherdrüse, Samenblase und hinterer Theil der Harnröhre wird, vereinigen; 3) einem, anfangs an den untern Theil der vordern Unterleibswand gehefteten, später frei vorspringenden, ansehnlichen, dreieckigen, an seinem vordern Ende etwas angeschwollenen Körper, der aus zwei Hälften, die durch eine, an seiner untern Fläche verlaufende Furche von einander getrennt sind, und der sich später in die Ruthe oder den Kitzler umwandelt, gebildet. Neben diesem entsteht bald auch 4) auf jeder Seite eine von vorn nach hinten verlaufende Hautfalte, die hinten nicht mit einander vereinigt sind, und sich beim Manne in den Hodensack, beim Weibe in die großen Schamlippen verwandeln.

§. 2490.

2. Scheidenklappe.

§. 2499.

An ihrem untern Ende ist die Scheide beträchtlich enger als in ihrem übrigen Verlauf. Von der Scheidenklappe bedeckt sich vor der Mitte der Schwangerschaft durchaus keine Spur. Jetzt erscheint sie zuerst auf jeder Seite als ein feiner, membranöser, von vorn nach hinten verlaufender, dünner Vorsprung, die eine Längenspalte zwischen sich lassen. Dieser Vorsprung ist anfangs nach unten gerichtet, überall gleich breit, wird aber allmählich hinten breiter, und dadurch in eine halbmondförmige Falte, oder richtiger in eine länglich-runde, gegen das vorderes Ende durchbohrte Scheibe verwandelt, welche bis zu ihrer Perforation die Scheidenklappe bis zu ihrer Perforation behält. Die Unregelmäßigkeiten der Scheide setzen sich beim Fötus auch über die Scheidenklappe und die Harnröhrenöffnung hinaus auf den After und die innere Fläche der kleinen Schamlippen fort.

3. Rißler.

§. 2500.

Der Rißler ist, nachdem sich einmal Geschlechtsreife entwickelt haben, verhältnismäßig sehr beträchtlich, und in dem Maße ansehnlicher, als der Embryo jünger ist. Im Anfang des dritten Monats, bei Embryonen von höchstens zweimonatlicher Länge, ist er über eine Linie lang, eine halbe Linie dick. Dieses ansehnliche Verhältniß vermindert sich zwar bald, insofern bleibt er noch das ganze Fötusleben hindurch sehr ansehnlich, so daß, vorzüglich wegen der Kleinheit des Hodensackes, der innerhalb des Unterleibes befindlichen Hoden, leicht in oberflächlicher Ansicht noch in späteren Perioden Geschlechtsreife zu erkennen sind. Immer aber ist der Rißler nur



nach vorn und etwas nach unten gewandt, ohne jemals gegen den Nabel erigirt zu seyn <sup>1)</sup>).

Der ganze Kigler ist an seiner untern Fläche tief gespalten. Im dritten Monat sieht man sehr deutlich in der Mitte dieser untern Fläche einen longitudinalen Vorsprung verlaufen.

Die Eichel ist bis in den vierten Monat völlig unbedeckt, und ragt rundlich und scharf abgegränzt vor dem übrigen hintern Theile des Kiglers hervor. Ziemlich schnell wächst von nun an die Vorhaut so über sie hinweg, daß sie dieselbe ganz bedeckt. Dieser hintere Theil des Kiglers besteht ganz aus den innern Lefzen und der Vorhaut. Jene sind daher schon in sehr frühen Perioden sehr ansehnlich <sup>2)</sup>. Sie sind von der Vorhaut noch gar nicht unterschieden, sondern gehen ununterbrochen in sie über. Allmählich bildet sich, indem die Vorhaut sich vergrößert und über die Eichel wächst, ein Absatz zwischen ihr und den innern Lippen, und diese bekommen, statt eines geraden, einen runden Rand. Zugleich spalten sie sich nun vorn auf jeder Seite deutlich in zwei Schenkel, einen kleinen, innern, der zur Eichel, einen äußern, der zur Vorhaut geht, wovon früher keine Spur vorhanden war.

Kigler und innere Lefzen gehen also aus einer Masse hervor, machen ein Gebilde aus.

§. 250L

1) Walters Physiol. Bd. 2. S. 382.

2) Nach Oslander (Abb. über die Scheidenklappe. In den Denkw. f. d. Heilkunde. Bd. 2. S. 4. 6.) sind zwar die Nymphen noch im dritten und vierten Monat sehr unvollkommen, nicht deutlich und unterscheidend wahrzunehmen; allein diese Behauptung widerlegt der Augenschein. Die Nymphen sind nur verhältnißmäßig zu dem ungeheuren Kigler nicht so groß als späterhin, im Verhältniß zu den übrigen Theilen und dem ganzen Körper sehr groß und leicht für das zu erkennen, was sie sind.

## §. 2501.

Die äußern Schamlippen sind anfänglich, im dritten Monate, kleine und rundliche, halbmondförmige, nach außen gewölbte, niedrige Wülste, vorn beträchtlich dicker als hinten, mit ihren hintern Enden einander weit näher als den vordern, durch den sehr großen Nigler weit von einander gedrängt und hoch überragt. Allmählich vergrößern sie sich, und rücken einander näher, indem der Nigler nicht mehr so bedeutend fortwächst, zugleich werden sie höher, bekommen einen schärfern Rand, indem sie in demselben Verhältnisse dünner werden. Doch verdecken sie in den frühern Lebensperioden nie den Nigler und die Nymphen ganz, theils wegen der immer noch ansehnlichen Größe dieser Theile, theils wegen ihrer eignen geringern Entwicklung.

## B. Männliche Zeugungstheile.

## §. 2502.

Die männlichen Zeugungstheile durchlaufen in ihrer Entwicklung mehrere, sowohl in Beziehung auf Physiologie als auf Pathologie und Chirurgie sehr wichtige Perioden. Die Verschiedenheiten, welche sie darbieten, beziehen sich auf Lage, Gestalt und Größe.

I. Hoden <sup>1)</sup>.

## §. 2503.

Die Hoden verdienen, als die wichtigsten und zuerst erscheinenden Organe, zuerst betrachtet zu werden.

## P p 4

Sie

1) Haller de herniis congenitis progr. ad diss. Steding. Götting. 1749. opp. path. 1755. rec. in opp. min. T. III. p. 311 ff.

Am diese Zeit bilden sie sich, und sind sogleich verhältnißmäßig sehr groß.

Nach Ablauf der ersten Lebenshälfte fangen die Eierstöcke härter zu werden und zu schwinden an, verlieren ihre Glanz und erscheinen mehr oder weniger ungleich, indem die gesunkenen Stellen beträchtliche Vertiefungen bilden. Es rührt vorzüglich von dem Verschwinden des Parenchyms, zugleich entarten aber auch die Flüssigkeiten, indem sie sich verdicken, ihre Hüllen dicker werden, endlich ihre Höhle ganz verschwindet, und sie in gelbliche, schwärzliche, oft faserknorpelige oder knöcherne Körper umgewandelt werden. Vorzüglich im Kleinern sich die Eierstöcke im höhern Alter so, daß man meistens außer den Gefäßen durchaus keine Spur von ihnen wahrnimmt. Sie wiegen dann oft kaum 20 Gran.

§. 2493.

Nach mehreren Schriftstellern, z. B. Malpighi<sup>1)</sup>, Ballisneri<sup>2)</sup>, Santorini<sup>3)</sup>, Bertrandi<sup>4)</sup>, Brugnone<sup>5)</sup>, Buffon<sup>6)</sup> bildet auch die Entstehung der gelben Körper (Corpora lutea) einen Theil der Entwicklungsgeschichte der Eierstöcke, indem sie sie sowohl bei physischen Jungfrauen als bei sehr jungen Thierweibchen fanden; es läßt sich theils nicht mit Bestimmtheit erweisen, daß

1) Diff. ep. var. argum. in Opp. omm. L. B. 1687. T. 1. p. 225.

2) Von d. Erz. des Menschen und d. Thiere. Th. 2. Kap. E. 262. S. 319.

3) Obs. anat. Cap. XI. p. 225.

4) De glandul. ovarii corporibus. Misc. taur. T. 1. p. 104.

5) De ovarii eorumque corporibus luteis in Mém. de Turin. 1739. 393 ff. Uebersetzt in Kühn's und Weigel's ital. Natur. T. II. p. 205 ff.

6) Natur. T. II. p. 205 ff.

1. Ihre Größe ist sehr ansehnlich, indem sie bei etwas über ein Zoll langen Embryonen dieses Alters zwei Linien lang und eine Linie dick sind. Ihre Gestalt ist länglichrundlich, nach vorn gewölbt, nach hinten ausgehöhlt. Sie sitzen auf einer fleischlich breiten Falte des Bauchfelles, die erst den Nebenhoden überzieht, und dann, doch so, daß eine beträchtliche Lücke zwischen beiden bleibt, an die hintere abgeschnittene Fläche des Hoden geht, von der hintern Fläche desselben entsteht, aber bei weitem nicht so lang als der Hode ist, und mit ihm Gefäße die größte Ähnlichkeit hat, so locker an, daß ihre Lage vorzüglich nach außen und innen beliebig geändert werden kann. Der Nebenhode, der nicht höher als der Hode nach oben ragt, steigt nach hinten und etwas nach außen neben

pp 5

demis

Vieq d'Azyr recherches sur la structure et la position des testicules, considérés dans la cavité abdominale des foetus, sur leur passage hors du ventre, et sur l'oblitération de la tunique vaginale, pour servir de suite aux observations publiées en 1762; par M. J. Hunter sur le même sujet. In Mém. de Paris 1780. p. 494 — 507.

J. Brugnone de testium in foetu positu, de eorum in scrotum descensu, de tunicarum, quibus hic continentur, numero et origine. Aug. Taur. 1785. rec. cum Pallettae opere a Sandifort.

Lumiati's bei der Lehre von den Hodenhäuten (S. 341.) angeführtes Werk.

J. F. Lobstein recherches et observations anatomico-physiologiques sur la position des testicules dans le bas-ventre du foetus et leur descente dans le scrotum. In Schweighaeuser Archives de l'art des accouchemens, Strasbourg. 1801. T. I. p. 269.

B. G. Seiler Observationes nonnullae de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu et partium genitalium anomaliis. Lipsiae. 1817.

Um diese Zeit bilden sie sich, und sind sogleich verhältnißmäßig sehr groß.

Nach Ablauf der ersten Lebenshälfte fangen die Eierstöcke härter zu werden und zu schwinden an, verlieren ihre Glanz und erscheinen mehr oder weniger ungleich, indem die abgesunkenen Stellen beträchtliche Vertiefungen bilden. Dies rührt vorzüglich von dem Verschwinden des Parenchyms, zugleich entarten aber auch die Bläschen, indem sie sich verkleinern, ihre Häute dicker werden, endlich ihre Höhle ganz verschwindet, und sie in gelbliche, schwärzliche, oft faserförmige oder knöcherne Körper umgewandelt werden. Vorzüglich vorzuziehen sich die Eierstöcke im höhern Alter so, daß man bloß weißt außer den Gefäßen durchaus keine Spur von ihnen wahrnimmt. Sie wiegen dann oft kaum 20 Gran.

§. 2493.

Nach mehreren Schriftstellern, z. B. Malpighi<sup>1)</sup>, Wallisneri<sup>2)</sup>, Santorini<sup>3)</sup>, Vertrandi<sup>4)</sup>, Brugnone<sup>5)</sup>, Buffon<sup>6)</sup> bildet auch die Entstehung der gelben Körper (Corpora lutea) einen Theil der Entwicklungsgeschichte der Eierstöcke, indem sie sie sowohl bei physischen Jungfrauen als bei sehr jungen Thierweibchen fanden; auch es läßt sich theils nicht mit Bestimmtheit erweisen, daß

1) Diff. ep. var. argum. in Opp. omm. L. B. 1687. T. 1. p. 225.

2) Von d. Erz. des Menschen und d. Thiere. Th. 2. Kap. 1. S. 262. S. 319.

3) Obs. anat. Cap. XI. p. 225.

4) De anat. corporis humani. Misc. tour. T. 1. p. 104.

5) De anat. corporis humani. Misc. tour. T. 1. p. 104.

6) De anat. corporis humani. Misc. tour. T. 1. p. 104.

größerer Anhäufung die Dicke und mehr rundliche Form des Leitbandes zuzuschreiben ist.

Im fünften Monate sind die Hoden nicht länger, doch etwas, ungefähr um  $\frac{1}{2}$  Linie, dicker als im vorigen, also etwas rundlicher als bisher. Sie sind noch wenig oder gar nicht tiefer herabgestiegen, und noch über eine Linie weit von der untern Wand des Bauchfelles entfernt. Das Leitband, welches jetzt deutlich dreieckig, mit der Spitze, die viel dünner als der Bauchring ist, nach unten, der Grundfläche nach oben gewandt ist, steigt in schräger Richtung von unten und innen nach oben und außen in die Höhe. Es nimmt etwas unter dem Bauchringe aus der obern Gegend des Hodensackes mit einzelnen Fasern seinen Anfang, tritt durch denselben, erhält darauf Fasern vom innern schiefen und queren Bauchmuskel, indem es hinter denselben weggeht, und schlägt sich endlich in seinem obern Theile, auf dem Hüftbeinmuskel, gerade zum untern Ende des Nebenhoden empor. In dem größten untern Theile seiner Länge zwischen dem Bauchringe und der Stelle, wo es oben innerhalb der Bauchhöhle sichtbar wird, liegt vor ihm ein, am Bauchringe blind geendigter Fortsatz des Bauchfelles (Processus peritonei). Auch dieser steigt schief von außen und oben nach unten und innen herab. Seine obere Mündung ist beträchtlich weiter als die untere und als das durch dieselbe eintretende Leitband. Dieses ist zwar inwendig mit einer weichen, gallertartigen Masse angefüllt, aber nicht deutlich höhl. Der Nebenhode ist in seinem untern Theile sehr deutlich, der Samenabführungsgang in seinem Anfange etwas gewunden.

Im sechsten Monat liegen die Hoden noch an derselben Stelle. Sie sind jetzt nur vier Linien lang;  $1\frac{1}{2}$  dick, also verhältnißmäßig länglicher, fast ganz gerade. Der Nebenhode

ragt

schwache, dann allmählich stärkere Windungen, so daß sie im achten Monat und beim reifen Fötus stärker gewunden sind als bei Erwachsenen: ein Zustand, der sich auch noch in den ersten Jahren des Lebens erhält. Anfangs scheinen die Trompeten blind und angeschwollen geendigt. Im vierten Monate schließt sich ihr Unterleibsende zu öffnen, so daß sich aber die Einschnürung erst später bilden. Ihre Höhle ist immer verhältnismäßig desto größer, je jünger der Embryo ist und in jeder Periode leicht aufzufinden <sup>1)</sup>).

Zwischen ihnen und den Eierstöcken verlaufen in der Falte des Bauchfelles nicht bloß beim Embryo und Fötus, sondern auch noch in den ersten Jahren nach der Geburt eigne, höchst merkwürdige Gefäße <sup>2)</sup>, die, wenn sie gleich weder von dem Eierstocke, noch der Trompete aus eingespritzt werden können, mithin als Vermittler des Zusammenhanges der Höhle der Leutern mit der Substanz des Eiersterns noch nicht nachgewiesen sind, doch durch Zahl, Lage und Gestalt so genau an die Samenabfuhrungsgefäße beim Manne erinnern, daß sie wenigstens mit Bestimmtheit als ein Versuch zur Bildung derselben und des Nebenhoden überhaupt angesehen werden können, wobei es aber die anfängliche Gestalt des Unterleibsendes der Trompete höchst wahrscheinlich macht, daß sie wirklich anfangs einen offenen Zusammenhang zwischen ihr und dem Eierstock bewirken, der vermuthlich um dieselbe Zeit verschwindet, als

Geradheit ist wegen der Aehnlichkeit <sup>1)</sup> mit dem Darm in den frühern Bildungsperioden, und <sup>2)</sup> mit den Eingängen mehrerer Thiere sehr wichtig.

1) Gegen Hirschel und Abgelen.

2) Rosenmüller de ovario embryonum et foetuum humanorum. Lipsiae. 1802.

ganges angefüllt, welche auf einer kleinen Anhäufung schleimiger Substanz, die sich vom untern Ende des Bauchfellfortsatzes erhebt, mit ihrem untern Ende aufsitzend, nach hinten durch eine Falte, die von der hintern Wand des Bauchfellfortsatzes abgeht, mit demselben verbunden sind.

Im achten Monate rückt der Hode selbst gewöhnlich durch den Bauchring, und allmählich, bis zu Ende des neunten, völlig auf den Grund des Hodensackes, so daß er in Hinsicht auf seine Lage um die Zeit der Reife des Fötus gewöhnlich vollkommen ist. Der Bauchfellfortsatz ist jetzt beträchtlich verlängert, überall, mit Ausnahme seines untern blinden Endes, offen, und steht an seinem obern Ende mit der großen Höhle des Bauchfelles in freiem Zusammenhange.

Auch nachdem der Hode völlig auf den Boden des Bauchfellfortsatzes und Hodensackes gelangt ist, bleibt doch noch eine mehr oder weniger lange Zeit, bei völlig normaler Entwicklung nur wenig Wochen, diese Verbindung seiner Höhle mit der des Bauchfelles übrig. Allmählich aber verengt sich diese von der mittlern Gegend, doch etwas mehr nach oben, aus, so, daß gewöhnlich die Verschließung und Abschnürung des den Hoden umgebenden Theiles des Bauchfellfortsatzes zuerst in der Gegend des Bauchringes geschieht. Eine Zeitlang bleibt der obere Theil der Verbindungsröhre, von dem Bauchringe bis zur Mitte des Schenkelbogens oder der Stelle, an welcher sich der Samenabführungsgang mit den Samengefäßen verbindet, offen, verschließt sich aber gleichfalls bei normaler Entwicklung in den ersten Monaten nach der Geburt völlig, so daß sein ehemaliges oberes Ende höchstens durch eine leichte Vertiefung, und auch dies bei weitem nicht immer, angedeutet wird.

Der



und vordern Fläche eine längliche Erhabenheit, welche durch die ganze Länge der Gebärmutter verläuft, und gegen welche sich von beiden Seiten diese Runzeln von oben nach unten zusammenneigen. Diese vergrößern sich bedeutend. Nicht bloß beim reifen Fötus, sondern noch in den ersten Lebensjahren ist dadurch die ganze innere Fläche der Gebärmutter ungleich. Allmählich verschwinden indeffen die Runzeln im Körper, so daß nach dem fünften Jahre die innere Fläche desselben ganz glatt ist.

Der äußere Muttermund erscheint zuerst als ein kaum merklicher Vorsprung der Gebärmutter in die Scheide, der sich aber allmählich bedeutend vergrößert, so daß in spätern Perioden des Fötuslebens die Scheidenportion der Gebärmutter verhältnismäßig weit größer ist als späterhin. Dieser ganze Theil der Gebärmutter ist im siebenten und achten Monat, weniger beim reifen Fötus und in den nächsten Monaten nach der Geburt auch an der äußern Fläche sehr ungleich, der Länge nach gerunzelt, und mit ungleichen, tief eingeschnittenen, scharfen Kändern versehen, deren Einschnitte oft die ganze Höhe der Scheidenportion einnehmen. Späterhin verkürzt sich dieser vordere Theil, wird äußerlich glatt, wulstig, und der Muttermund erscheint dann als eine einfache, glatte quere Spalte.

Die Wände der Gebärmutter sind verhältnismäßig zu ihrer Höhle desto dünner, je jünger der Embryo ist. Anfangs haben sie überall dieselbe Dicke, im fünften Monate werden sie im Halse beträchtlich dicker als in dem obern Theile. Allmählich wird, ungefähr im fünften bis sechsten Jahre, die Dicke überall gleichmäßig, bis um die Zeit der Mannbarkeit der Körper den Hals mehr oder weniger an Dicke übertrifft.

ies oder beider Hoden in der Unterleibshöhle oder in der Kistengegend, woraus der Verdacht des Mangels eines oder beider Hoden entstehen kann. Unter dieser Bedingung verhalten sich die Hoden in Bezug auf ihre Hüllen völlig wie beim Normal, indem sie nackt und mit einem Leitbände versehen sind. Dem Normal näher ist die unvollkommene Verschließung des Bauchfellfortsatzes. Im höchsten Grade dieser Abweichung bleibt dieser ganz offen, und der Hode daher, wenn er gleich seine Lage verändert hat, doch mit den übrigen Unterleibsorganen in derselben gemeinschaftlichen Höhle. Bei geringerer Abweichung vom Normal kann entweder 1) am häufigsten nur der obere Theil des Bauchfellfortsatzes, der zwischen dem Bauchringe und dem innern schiefen Bauchmuskel verläuft, offen bleiben; oder 2) seltener der untere, so daß nicht bloß nur den Hoden zunächst umgebende, welches das äußere Blatt der eigenthümlichen Scheidenhaut desselben wird, eine längsbrunde Höhle bildet, sondern sich von dem obern Ende dieses Sackes dann ein mehr oder weniger langer, engerer Gang, die Verbindungsrohre, nach oben erstreckt; oder 3) am seltensten, die Verschließung geschieht regelmäßig am obern und untern Ende der Verbindungsrohre, allein ein größerer oder kleinerer Theil der zwischen beiden befindlichen Strecke bleibt offen.

Von den Krankheiten, wozu diese Abweichungen von der normalen Entwicklung Veranlassung geben, nachher.

§. 2505.

Der Hode erscheint, je nachdem er sich in der Bauchhöhle oder dem Hodensacke befindet, nicht bloß in Hinsicht auf seine Lage, sondern auch auf seine Hüllen bedeutend verschieden. So lange er im Unterleibe liegt, ist er bloß von der weißen Haut

Von dem Eintritte der Mannbarkeit oder Fortpflanzungsfähigkeit an nämlich stellt sich monatlich einige Tage lang ein Erguß von Blut und Wasser aus den Zeugungstheilen ein, welcher von der Periode, in welcher er Statt findet, den Namen des Monatsflusses (*Menstruatio* L. *menstru*) erhält, mit der Fortpflanzungsfähigkeit, gewöhnlich zwischen dem vierzigsten und fünfzigsten Jahre, verschwindet, und hi nesweges dem menschlichen Weibe eigenthümlich ist <sup>1)</sup>. Der Sitz dieser Aushauchung ist die ganze innere Fläche der Gebärmutter.

Gewöhnlich dauert sie einige Tage, höchstens eine Woche.

Die Menge des Blutes beträgt gewöhnlich 6 — 8 Unzen.

Die Farbe desselben ist dunkel, und schon deshalb ist es daher höchst wahrscheinlich, gegen die gewöhnliche Meinung vends <sup>2)</sup>.

Diese Vermuthung wird durch die Analyse desselben bestätigt, sofern Lavagna <sup>3)</sup> keinen Faserstoff darin fand, wie auch Caissey <sup>4)</sup> und Mayer <sup>5)</sup> in dem vendsen Blut weniger Faser, mithin Stickstoff, als in dem arteriellen entdeckten.

1) F. Cuvier über die Brunst. In Medel's Archiv. Bd. 4. S. 521.

2) J. F. Oslander diff. defluxu menstruo atque uteri prolapsu. Gott. 1808. Cap. I. II.

3) Untersuchungen über das Menstruationsblut. In Medel's Archiv. Bd. 4. S. 151 ff.

4) Reil's Archiv Bd. 12. S. 347.

5) Mayer über den Unterschied des arteriellen und vendsen Blutes rücksichtlich seines Gehaltes an Faserstoff. In Medel's Archiv Bd. 3. S. 534.

Das Herabtreten des Hoden wird gewöhnlich ganz mechanisch erklärt, und entweder dem durch Athemhöhlen bewirkten Drucke auf die Unterleibseingeweide <sup>1)</sup>, oder der eignen Schwere der Hoden <sup>2)</sup>, oder dem stärkern Andränge des Blutes in ihre Gefäße <sup>3)</sup>, oder endlich der Zusammenziehung und Umkehrung des Leitbandes <sup>4)</sup> zugeschrieben. Die erste dieser Meinungen widerlegt sich durch das beim normalen Gergange schon längst vor der Geburt, und im entgegengesetzten Falle oft lange nach der Geburt nicht erfolgende Herabsinken; die zweite durch die gewöhnliche Lage des Fötus, bei welcher der Hode gegen seine Schwere aufsteigt; die dritte durch den Umstand, daß der Hode unstreitig, wäre sie gegründet, in den frühesten Perioden am tiefsten liegen müßte, weil er dann verhältnißmäßig am größten ist. Die Zusammenziehung des Leitbandes bewirkt unstreitig das Herabgleiten des Hoden bis zum Bauchringe, allein sie trägt nichts zum fernern Herabgleiten in den Hodensack bei, indem es ihn vielmehr heraufziehen würde. Daß sie indessen unstreitig bedeutenden Antheil an der Ortsveränderung des Hoden hat, läßt sich schon aus der starken Entwicklung der Muskulosität des Leitbandes bei Thieren abnehmen, bei denen der Hode abwechselnd in und außer dem Unterleibe liegt. Der Mangel des Herabsteigens bei vorhandenem Leitbände beweist nichts gegen diese Annahme, indem auch aus andern Gründen entweder die Thätigkeit desselben nicht eintreten, oder in ihrer Wirkung gehindert werden kann.

Die

1) Haller.

2) Haller. Pött.

3) Haller. Tumiati.

4) Palletta, Vicq d'Azyr, Brugnone.

ungleich. Zuerst erscheint, ungefähr im fünften Monat, an der vordern und hintern Fläche eine längenerhabene. Darauf wird diese selbst durch ansehnliche, in großer Menge vorhandene, dichtstehende Quersalten ungleich. Diese verbreiten sich durch andre in schräger Richtung verlaufende verbunden, um den ganzen Umfang der Scheide, wodurch diese allmählich desto zusammengesetzteres Netz und desto ungleicher erscheint, da diese Falten vielfach eingeschnitten und gefranzt sind. So erscheint die Scheide vorzüglich im siebenten und achten Monat. Allmählich aber verkleinern sich diese Falten und sind schon beim reifen Fötus bei weitem weniger deutlich, verschwinden noch und noch immer mehr, indem sie sowohl niedriger und glatter werden, als weiter aus einander rücken, so daß um die Zeit der Mannbarkeit, auch völlig ohne vorgängigen Beischlaf, die Scheide viel glatter, und vorzüglich nur ihr unteres Ende an der hintern und vordern Fläche, hier mehr als dort, gewölbt ist.

Anfänglich ist auch die Scheide verhältnismäßig enger als in spätern Perioden. Um den siebenten bis achten Monat ist sie unstreitig weiter als in irgend einer Lebensperiode.

Ihre Länge ist beim Fötus verhältnismäßig immer beträchtlicher als in spätern Perioden. Sie ist beim achtmonatlichen und reifen Fötus, immer über zwei Zoll lang, da ihre Länge beim erwachsenen Weibe fast nie über vier Zoll beträgt. Eine Bedingung, die, zum Theil wenigstens, mit der hohen Lage der Gebärmutter, jedoch nur zum Theil, zusammenhängt, da die Scheide nicht in demselben Verhältniß enger ist.

gespalten. Doch reicht diese Spalte bei weitem nicht bis zum hintern Ende der Kuthe. Eben so ist der noch sehr kleine Hodensack, aus dem vorn die Kuthe plötzlich abgesetzt hervorsticht, völlig verschlossen.

Im vierten Monat ist die Beschaffenheit des Hodensackes dieselbe, die Gestalt der Kuthe aber hat sich insofern abgeändert, als die verhältnißmäßig etwas größere Eichel in ihrem hintern und untern Theile so von der Vorhaut bedeckt wird, daß nur der untere Theil ihres vordern Umfangs frei ist, und jetzt an dem untern Theile ihrer vordern Fläche eine senkrechte Spalte, die Harnröhrenöffnung, verläuft.

Hierauf folgt ein ganz entgegengesetzter, das ganze Fötusleben hindurch bestehender Zustand. Die Vorhaut nämlich vergrößert sich bedeutend, wächst über die ganze Eichel weg, bedeckt sie ganz und umschließt sie, da ihre Oeffnung äußerst eng ist, so genau, daß sie durchaus nicht zurückgezogen werden kann.

In den frühern Perioden findet daher *Paraphimosis*, in den spätern *Phimosis* als normaler Zustand Statt.

### C. B r ü s t e.

#### §. 2509.

Die Brüste sind schon im dritten Embryomonte deutlich, wo die Warze als eine kaum merkliche, aber mit einer sehr weiten Oeffnung versehene Erhabenheit erscheint. Merkwürdig ist, daß sie im Allgemeinen in den letzten Monaten der Schwangerschaft und beim reifen Fötus eine oft beträchtliche, milchartige Flüssigkeit enthalten. Bis zur Zeit der Mannbarkeit bieten sie in beiden Geschlechtern keine bedeutenden Verschiedenheiten dar, jetzt aber vergrößern sie sich im weiblichen mehr oder

nach vorn und etwas nach unten gewandt, ohne jemals gegen den Nabel erigirt zu seyn <sup>1)</sup>).

Der ganze Kitzler ist an seiner untern Fläche tief gespalten. Im dritten Monat sieht man sehr deutlich in der Mitte dieser untern Fläche einen longitudinalen Vorsprung verlaufen.

Die Eichel ist bis in den vierten Monat völlig unbedeckt, und ragt rundlich und scharf abgegränzt vor dem übrigen innern Theile des Kitzlers hervor. Nämlich schnell wächst nun an die Vorhaut so über sie hinweg, daß sie dieselbe ganz bedeckt. Dieser hintere Theil des Kitzlers besteht ganz aus den innern Lefzen und der Vorhaut. Jene sind daher schon in sehr frühen Perioden sehr ansehnlich <sup>2)</sup>. Sie sind von der Vorhaut noch gar nicht unterschieden, sondern gehen ununterbrochen in sie über. Allmählich bildet sich, indem die Vorhaut sich vergrößert und über die Eichel wächst, ein Abfaz zwischen ihr und den innern Lippen, und diese bekommen, statt eines geraden, einen runden Rand. Zugleich spalten sie sich nun vorn auf jeder Seite deutlich in zwei Schenkel, einen kleinen, innern, der zur Eichel, einen äußern, der zur Vorhaut geht, wovon früher keine Spur vorhanden war.

Kitzler und innere Lefzen gehen also aus einer Masse hervor, machen ein Gebilde aus.

§. 250.

1) Walters Physiol. Bd. 2. S. 382.

2) Nach Oslander (Abh. über die Scheidenklappe. In d. Denkw. f. d. Heilkunde. Bd. 2. S. 4. 6.) sind zwar die Nymphen noch im dritten und vierten Monat sehr unvollkommen nicht deutlich und unterscheidend wahrzunehmen; allein die Behauptung widerlegt der Augenschein. Die Nymphen sind nur verhältnismäßig zu dem ungeheuren Kitzler nicht so groß als späterhin, im Verhältniß zu den übrigen Theilen und dem ganzen Körper sehr groß und leicht für das zu erkennen, was sie sind.

## 7. Gleichung zwischen den weiblichen und männlichen Zeugungstheilen.

§. 2511.

Schon früher wurde bemerkt, daß die Zeugungstheile beider Geschlechter ursprünglich nach demselben Typus gebildet, und nur als Abänderungen desselben Urtypus anzusehen seien. (h. 1. S. 72.)

In der That läßt es sich sehr leicht nachweisen, daß alle Theile, welche zu ihrer Bildung an einander gereiht sind, sich bei beiden Geschlechtern wieder finden, und nur durch Größe, Lage und Bau von einander unterscheiden. Vorzüglich erscheint diese Analogie am größten, je jünger der Mensch ist, und die Begründung derselben in der Natur durch die Beobachtung, daß ursprünglich alle Embryonen nur eines Geschlechtes sind.

Die Hoden entsprechen den Eierstöcken durch Gestalt, Function, Gefäße und Nerven, welche sie enthalten, in den frühern Perioden auch durch ihre Lage vollkommen.

Die Trompeten sind deutlich die Samenabfuhrungsgänge, deren Zusammenhang mit den Eierstöcken in den frühern Perioden höchst wahrscheinlich durch eine Art von Seitenhoden und geraden Gängen, wie zwischen dem Hoden und dem Samenabfuhrungsgange bei den Männern bewirkt wird. (s. oben S. 590.)

Die Samenblasen und Vorsteherdrüsen entsprechen unstreitig der Gebärmutter durch Lage, Verhältniß zu den Samengängen und Trompeten, nur ist die Gebärmutter



mutter größer, vollkommener entwickelt, und die Mündungen der Samengänge sind weiter aus einander gerückt.

Die Kuthe und der Kigler entsprechen einander durch Lage und Bau. im Wesentlichen durchaus, und unterscheiden sich von einander nur durch Größe und den Mangel der Harnröhre im letztern; indessen verschwindet diese Verschiedenheit durch die Betrachtung, daß die unvollkommnere Entwicklung des Kiglers auf Kosten der Bildung der Scheide und der Nymphen geschehe, welche also als die theils aus einander gerissene, theils nach innen gedrungene, oder nicht hervorgetretene männliche Kuthe und Harnröhre erscheinen. Auch hier ist die Aehnlichkeit in frühern Perioden, wo die Harnröhre sich auch in der männlichen Kuthe nicht bis zum vordern Ende erstreckt, noch größer.

Auf dieselbe Weise läßt sich auch die Verschiedenheit zwischen dem Harnschneller und dem Scheidenschnäurer ausgleichen. Beide entsprechen einander, nur sind die beiden Hälften des letztern in der Mitte nicht verwachsen.

Die äußern Schamlippen stellen die beiden, gleichfalls auf ähnliche Art getrennten Hälften des Hodensackes dar.

Die Brüste unterscheiden sich nur durch Größe, und vor dem Eintritte der Pubertät auch kaum durch diese.

Auf diese Weise ist also einem jeden Abschnitte der Geschlechtstheile sein Aehnliches im entgegengesetzten Geschlecht gefunden. Die Abweichung von der normalen Form tritt einander oft noch weit mehr und so verähnlicht, daß oft die Geschlechtsbestimmung höchst schwierig ist, wird sich sogleich aus der Betrachtung der Zwitterbildungen ergeben.

Zweite Unterabtheilung.

Regelwidriger Zustand der Geschlechtstheile<sup>1)</sup>.

A. Allgemeine Abweichungen.

§. 2512.

Die Zeugungstheile bieten mehrere regelwidrige Bedingungen dar, welche beiden Geschlechtern gemein sind, andre, welche vorzugsweise nur einem zukommen. Dies gilt sowohl für die Abweichungen der äußern Bildung als des Gewebes derselben, und hier ist zu bemerken, daß die einander entsprechenden Abschnitte der Zeugungstheile auch an denselben, oder wenigstens höchst ähnlichen regelwidrigen Bedingungen zu leiden pflegen.

29 4

Reis

1) Schriftsteller:

a) Ueber die Krankheiten der Zeugungstheile überhaupt:

Vercelloni de pudendorum morbis. L. B. 1725.

b) Der weiblichen Zeugungstheile überhaupt:

J. G. Walter über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin 1776.

Justi diss. hist. observationum seriem circa genitalia muliebria. Marb. 1798.

Thamm diss. de genitalium sexus sequioris varietatibus. Halae. 1799.

c) Der äußern:

Louis de partium externarum generationi inservientium in mulieribus naturali, vitiosa et morbosa dispositione. Paris. 1754.

d) Der einzelnen Abschnitte derselben:

α. der Eierstöcke.

Krüger pathologia ovariorum muliebrum. Gott. 1782.

Motz de structura, usu et morbis ovariorum. Gieslæ. 1789.

β. Der

demselben herab, und geht an seinem untern Ende in den Samenabführungsgang über, der sich sogleich hinter dem Bauchfelle in das kleine Becken herabschlägt. An der Stelle dieses Ueberganges sitzt die ganze Masse, zunächst aber der Nebenhode und Samenabführungsgang, auf einem kurzen, sehr kleinen, aus einer Vertiefung in der untern Wand des Bauchfelles ungefähr in der Mitte des Schenkelbogens aufsteigenden, rundlichen Strange auf, der gleichfalls vom Bauchfell bekleidet ist, aber nicht so locker als der Hode aufsitzt, indem die Falte hier kürzer ist. Dieser Strang ist ohne Vergleich dünner als der Hode und Nebenhode.

Er ist *Hallers Scheide (Vagina)*, *Hunters Leithand (Gubernaculum)*, *Camper's Röhre (Cylindrus)*, *Sirardi's Stütze (Basis)*.

Die ansehnliche verhältnißmäßige Größe der Hoden vermindert sich von dieser Periode an am auffallendsten. Im vierten Monat sind sie, bei dem vom Scheitel bis zum Strichbein 4 Zoll langen Embryo kaum  $2\frac{1}{2}$  Linie lang, höchstens eine Linie dick. Der Nebenhode ist jetzt verhältnißmäßig zum Hoden beträchtlicher als in frühern und spätern Perioden. Die Hoden liegen etwas, aber nicht beträchtlich tiefer, sind aber nun von den Nieren bedeutend, wenigstens vier Linien weit entfernt, weil sich die Hüftbeine ansehnlich vergrößert haben. Der Samenabführungsgang schlägt sich jetzt etwas vom untern Ende des Nebenhoden erst nach oben, bildet also einen Bogen, ehe er in das Becken herabsteigt. Das *Leithand* ist jetzt beträchtlich größer, und steigt aus der Gegend des Bauchringes in die Höhe, ohne daß jedoch das Bauchfell an dieser Stelle durchbohrt wäre. Vielmehr schlägt sich dies nur gegen sich selbst nach oben um und bekleidet eine schleimige Masse, deren

größter

- b) regelwidrige Kleinheit;
- c) regelwidriges Beharren auf einer frühern Form.

Diese Bildungsabweichungen sind nicht selten, viel ungewöhnlicher dagegen ist 2) Mehrfachwerden.

Auch die regelwidrig zu frühe Entwicklung ist, wenn gleich häufiger als das Mehrfachwerden, doch immer eine seltne Erscheinung.

Weniger selten ist die Verschmelzung der Charaktere beider Geschlechter in demselben Körper, welche sich durch Bildung eines oder mehrerer Theile desselben nach einem, dem des ganzen Körpers oder der übrigen Theile entgegengesetzten Typus ausspricht, und das Wesen der Zwitterbildungen ausmacht.

Texturveränderungen kommen in den Geschlechtstheilen am häufigsten, und in der höchsten Entwicklung vor, und es giebt keine neue Bildung, welche sich nicht in einem oder dem andern Theile des Zeugungssystems fände, unstreitig, weil das Bildungsgeschäft in diesem unter allen organischen Systemen am höchsten gesteigert ist.

## B. Besondere Abweichungen.

### 1. Formabweichungen.

#### a. Zwitterbildungen <sup>1)</sup>.

§. 2513.

Die Zwitterbildungen, welche die zweite Klasse der qualitativen Bildungsabweichungen ausmachen, sprechen sich

Dq 5 in

1) Schriftsteller:

J. J. Meckel über die Zwitterbildungen in Reil's Archiv.  
Bd. 12.



6) durch Spaltung des Hodensackes, und Anwesenheit eines in Hinsicht auf seine Dimensionen verschiedenen, beiden ähnlichen Ganges zwischen der Ruthe und dem After, welcher zur Vorsteherdrüse führt, und mit einem in den drei vorigen Bildungsabweichungen oft vergesellschaftet ist;

7) durch weibliche Entwicklung einer oder beider Rüste in Hinsicht auf Größe und Function.

Die weiblichen Geschlechtstheile dagegen bilden sich nach dem männlichen Typus:

1) durch Vordringen der Eierstöcke durch den Eistenring;

2) vielleicht durch Verwachsung der Trompeten mit ihnen;

3) durch Kleinheit und Tieflage der Gebärmutter;

4) durch Enge und Kürze der Scheide;

5) durch Größe des Kitzlers und Fortsetzung der Harnröhre in ihn;

6) durch Verwachsung der äußern und innern Schamlefzen;

7) durch unvollkommene Entwicklung der Brüste.

Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß nicht alle diese Abweichungen in demselben Organismus nothwendig vorkommen, daß aber die Zwitterhaftigkeit und davon abhängige Unentwickeltheit des Geschlechtes desto größer ist, je mehrere von ihnen sich vergesellschaften.

Gewöhnlich sind nur einer oder einige der verschiedenen ungleichnamigen Abschnitte des Geschlechtssystems nach entgegen-

Der mittlere Theil der Verbindungsröhre schließt sich gleichfalls gewöhnlich vollständig bis in die Gegend des oberen Endes des Hoden, und verschwindet so, daß man in den meisten Fällen durchaus keine Spur von ihr findet. Wenigstens ist mir dieß, ungeachtet der genauesten Untersuchungen zu selten gelungen, und ich kann daher Brugnone und Scarpa nicht in der Behauptung beitreten, daß immer, auch beim Erwachsenen, als Ueberbleibsel der Verbindungsröhre ein eigner aus Schleimgewebe gebildeter Streifen verlaufe, der mit dem Namen des Niefchens (Habenula) belegt wird, und dessen Höhle sich immer durch Maceration darstellen lasse.

Anfänglich also verwächst, dann schwindet die Verbindungsröhre. Die Verwachsung wird durch ihre selbst Natur begründet, und, wie das Schwinden, vielleicht durch die Zerstörung durch den Hoden unterstützt.

#### §. 2504.

Diese Veränderungen der Lage des Hoden geschehen übrigens nicht auf beiden Seiten gleichzeitig und gleichmäßig, so daß oft der eine bedeutend früher als der andre in den Hodensack tritt.

Abweichungen vom normalen Entwicklungs gange des Hoden sind:

1) selten ungewöhnlich frühes Herabsteigen. So fand Wisberg die Hoden im vierten und fünften Monate im Hodensack und selbst die Verbindungsröhre verschlossen<sup>1)</sup>.

2) weit häufiger gehemmte Entwicklung, zu spätes oder gar nicht geschehendes Eintreten gewisser Perioden. Am weitesten von der Regel entfernt ist hier das gänzliche Verweilen

eind

<sup>1)</sup> Lober's Journal Bd. 1. S. 175.

6) durch Spaltung des Hodensackes, und Anwesenheit eines in Hinsicht auf seine Dimensionen verschiedenen, scheidenähnlichen Ganges zwischen der Ruthe und dem After, welcher zur Vorsteherdrüse führt, und mit einer von den drei vorigen Bildungsabweichungen oft vergesellschaftet ist;

7) durch weibliche Entwicklung einer oder beider Brüste in Hinsicht auf Größe und Function.

Die weiblichen Geschlechtstheile dagegen bilden sich nach dem männlichen Typus:

1) durch Vordringen der Eierstöcke durch den Leistenring;

2) vielleicht durch Verwachsung der Trompeten mit ihnen;

3) durch Kleinheit und Tieflage der Gebärmutter;

4) durch Enge und Kürze der Scheide;

5) durch Größe des Ritzlers und Fortsetzung der Harnröhre in ihn;

6) durch Verwachsung der äußern und innern Schamlefzen;

7) durch unvollkommne Entwicklung der Brüste.

Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß nicht alle diese Abweichungen in demselben Organismus nothwendig vorkommen, daß aber die Zwitterhaftigkeit und davon abhängige Ungewißheit des Geschlechtes desto größer ist, je mehrere von ihnen sich vergesellschaften.

Gewöhnlich sind nur einer oder einige der verschiedenen ungleichnamigen Abschnitte des Geschlechtssystems nach entgegen-



Haut und dem Theile des Bauchfelles, welches sich über die-  
 wirt, bekleidet. Die Falte des Bauchfelles, welche sich an  
 diese heftet, geht in die hintere Wand des Bauchfelles über,  
 und er ist, so wenig als ein andrer Theil der Bauchhöhle,  
 etwa wie das Herz, oder die Lungen, in dieser Periode in eine  
 eignen Hülle, in welche jenes seröse Blatt überginge, eingeschlossen.  
 Die übrigen Hüllen, welche ihn im Hodensack kleiden,  
 entwickeln sich aus dem Leitbände und dem Fortsatz  
 des Bauchfelles. Der Fortsatz des Bauchfelles wird das äußere,  
 freie Blatt der eigenthümlichen Scheidenhaut des Hoden, in  
 welches das innere Blatt jekt, wenn der Hode herabgezogen  
 ist, gerade so übergeht, wie vorher in die äußere Wand des  
 Bauchfelles. Die gemeinschaftliche Scheidenhaut des Hoden  
 und des Samenstranges bildet sich aus dem Schleimbeutel,  
 welches sich im Innern des Leitbandes befindet, und eben so  
 wenden sich nun auch die vorher aufsteigenden, von den tieferen  
 innern Bauchmuskeln kommenden Fasern nach außen, um  
 bilden den Aufhebemuskel des Hoden. Die Zellhaut oder  
 Dartos befindet sich schon vorher im Hodensack, und in die-  
 sinkt der Hode herab.

Diese Veränderungen werden vorzüglich dadurch bewirkt,  
 daß sich allmählich das Leitband so umkehrt, daß seine innere  
 Fläche zur äußern, sein unteres Ende zum obern wird, und  
 umgekehrt. Hiedurch wird nothwendig der an dasselbe befe-  
 stigte Nebenhode und mit diesem der Hode herabgezogen. In  
 dessen tritt, auch unabhängig von dieser Umkehrung, der  
 Bauchfellfortsatz eigenmächtig hervor, da er theils schon vor  
 dem Herabtreten des Hoden vorhanden ist, theils auch leicht  
 oft durch ein solches eigenmächtiges Vordringen des Bauchfells  
 völlig ohne eine ähnliche oder verschiedne mechanische Veran-  
 lassung entstehen.

1) F  
 2) F  
 3) I  
 4) P  
 2d

b. Formabweichungen der einzelnen Zeugungstheile.

1. Weibliche Zeugungstheile.

§. 2514.

I. Eierstöcke und Trompeten. Von den Bildungsabweichungen der Eierstöcke und ihrer Ausführungsgänge, der Trompeten, kommen als ursprüngliche, die namentlich Hemmungsbildungen sind, vor:

- a) Mangel eines, oder seltner, beider Eierstöcke mit oder ohne gleichzeitigen Mangel der Trompeten.
- b) Kleinheit;
- c) Mangel der Bläschen der Eierstöcke bei Unfruchtbaren.
- d) Verschiebung des Unterleibsendes der Trompete.

Die letztere ist auch eine nicht seltne, in Folge von Entzündung entstehende später sich bildende Formabweichung.

Eine gewöhnlich erworbene, aber seltner Abweichung ist das Vordringen der Eierstöcke und Trompeten aus der Unterleibshöhle durch den Leistenring, wodurch sie die Hoden nachahmen.

§. 2515.

II. Gebärmutter. Ursprüngliche Formabweichungen der Gebärmutter, deren Wesen meistens unvollkommene Entwicklung ist<sup>1)</sup>, sind:

- 1) gänzlicher oder theilweiser Mangel. Unter letzterer Bedingung fehlt entweder der obere oder der untere Theil.
- 2) Kleinheit, mit Dünne der Wände.
- 3) Stei-

---

1) S. über die angeführten Bildungsabweichungen der Gebärmutter mein Handbuch der pathol. Anat. Bd. 1.

## Fortsetzung: Harnemie.

Die Harnemie ist ein Krankheitszustand, bei dem die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre erfolgt. Dagegen durchläuft der Harn die Harnblase und die Harnröhre.

### 1. Art.

Die Harnemie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert. Sie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert.

Die Harnemie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert. Sie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert.

### 2. Art.

Die Harnemie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert. Sie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert.

### 3. Art.

### 4. Art.

Die Harnemie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert. Sie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert. Die Harnemie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert. Sie ist eine Krankheit, die sich durch die Ausscheidung des Harns durch die Harnröhre äußert.

Qualitative Bildungsabweichungen in Hinsicht auf Form und Lage sind selten ursprünglich.

Doch ist die Gebärmutter bisweilen schief, eine Beschaffenheit, welche gewöhnlich mit schiefer Lage derselben wechselt wird<sup>1)</sup>.

Erworbene Bildungsabweichungen sind:

1) Regelwidrige Lage. Die vorzüglichsten Arten derselben sind:

a) Lage der Gebärmutter außerhalb der Mittellinie, wo man sie oft ganz dicht an der einen Seitenwand des kleinen Beckens findet.

b) Schiefelage der Gebärmutter, wo sie von oben nach unten und von einer Seite zur andern gerichtet ist, ein Zustand, der, besonders, wenn er außer der Schwangerschaft vorkommt, meistens Folge von Verwachsung mit benachbarten Theilen ist.

c) Umheugung<sup>2)</sup> (*Retroversio* s. *retroflexio*), wo der Längendurchmesser der Gebärmutter in den von vorn nach hinten verlaufenden Beckendurchmesser fällt, daher der Grund nach unten und hinten, der Mund nach vorn und oben gerichtet ist, ein, besonders im vierten Schwangerschaftsmonte eintretender regelwidriger Zustand derselben.

d) Vorkalk<sup>3)</sup> (*Prolapsus*), wo die Gebärmutter mehr oder weniger tief, meistens in Folge einer Umkehrung der Scheide,

1) Boer Abb. geburtsh. Inhalts. Bd. 1. Th. 2.

2) Cuyper de retroversione uteri gravid. L. B. 1772.

Korscheck de retroverso utero. Halae. 1799.

Abbild. bei Hunter de utero gravido. T. 26.

3) Böhm de prolapsu et inversione uteri. Hal. 1745.

Abbild.

weniger bedeutend. Ihre Substanz ist mehr oder weniger hart und fest. In spätern Perioden schwinden sie, früher, wenn ihre Thätigkeit oft durch Säugen angestrengt war. Selbst wenn sich dem Anschein nach ihre Masse nicht bedeutend vermindert, selbst vergrößert, ist doch die Substanz der Brust unter dieser Bedingung in der That durch Fett ersetzt.

### III. Racenverschiedenheiten.

#### §. 2510.

Außer den bisher betrachteten sexuellen und periodischen Verschiedenheiten bieten die Geschlechtstheile auch Racenverschiedenheiten dar.

Die auffallendsten beziehen sich auf die äußern weiblichen Zeugungstheile und die Brüste.

An jenen verlängern sich, wie es jetzt, außer früher, Zeugnissen <sup>1)</sup>, durch neuere Untersuchungen von Cuvier <sup>2)</sup> und Somerwille <sup>3)</sup> erwiesen ist, die innern Schamlippen bei mehreren äthiopischen Stämmen, besonders den Buschmänninnen, sehr beträchtlich zur Bildung der Hottentottenschäube, ohne daß sich diese als ein neuer Theil anbildete.

Die Brüste sind gleichfalls vorzüglich bei den Hottentottinnen sehr stark entwickelt, länglich, beutelförmig, daß sie über die Schultern gelegt werden können.

Die ansehnliche Größe der Ruthe bei den Aethiopen schon erwähnt <sup>4)</sup>.

IV.

1) C. Bd. 1. C. 79. 80.

2) Bemerk. an der Leiche einer Hottentottin. M. den M. du M. In Meckel's Archiv. Bd. 5. Hft. 1.

3) Ueber die Hottentotten u. s. w. A. d. Med. ch. Transact. Bd. 1. In Meckel's Archiv. Bd. 5. Hft. 1.

4) Bd. 1. C. 79.

tritt. Die dadurch gebildete Geschwulst unterscheidet sich von dem Vorfalle der Gebärmutter durch den Mangel einer Oeffnung an ihrem untern Ende. Dieser Zustand tritt nur dann ein, wenn eine beträchtliche Ausdehnung der Höhle und verhältnißmäßige Verdünnung der Wände der Gebärmutter Statt gefunden hatte, und dieselbe in diesem Zustande herabgedrückt oder gezogen wird, also nach der Niederkunft, bei Gebärmutterpolypen u. s. w.

Eine Formverletzung der Gebärmutter, die unter ähnlichen Bedingungen, vorzüglich aber nur im geschwängerten Zustande eintritt, ist die Zerreißung derselben, welche, bei aus irgend einer Ursache gehinderter Geburt, vorzüglich am untern Theile und in querrer Richtung Statt findet.

Die Verschiebung der Gebärmutterhöhle ist meistens partiell, und nimmt meistens den untern Theil derselben in einer größern oder geringern Strecke ein. Sie ist bisweilen angeboren, dann vielleicht ursprüngliche Abweichung, häufiger aber entsteht sie in Folge vorangegangner Entzündung und Vereiterung.

5. 111.

§. 2516.

III. Die Scheide fehlt bisweilen als offner Kanal oder gänzlich, so daß ihre Stelle nur durch lockeres Zellgewebe ersetzt wird, meistens in Folge ursprünglicher Bildungsabweichung. Die geringste Abweichung ist Verschließung oder beträchtliche Härte und Dicke der Scheidenklappe.

Mit oder ohne ähnliche Anordnung der Gebärmutter ist sie in einer größern oder geringern Länge durch eine von vorn nach hinten verlaufende Scheidewand bisweilen in zwei Hälften gespalten, so daß, wenn die Spaltung bis an das untere Ende reicht, selbst zwei Scheidenklappen vorhanden sind.

mutter größer, vollkommner entwickelt, und die Mündungen der Samengänge sind weiter aus einander gerückt.

Die Ruthe und der Kigler entsprechen einander durch Lage und Bau. im Wesentlichen durchaus, und unterscheiden sich von einander nur durch Größe und den Mangel der Harnröhre im letztern; indessen verschwindet diese Verschiedenheit durch die Betrachtung, daß die unvollkommnere Entwicklung des Kiglers auf Kosten der Bildung der Scheide und der Nymphen geschehe, welche also als die theils auf einander gerissene, theils nach innen gedrungene, oder nicht hervorgetretene männliche Ruthe und Harnröhre erscheinen. Auch hier ist die Aehnlichkeit in frühern Perioden, wo die Harnröhre sich auch in der männlichen Ruthe nicht bis zum vordern Ende erstreckt, noch größer.

Auf dieselbe Weise läßt sich auch die Verschiedenheit zwischen dem Harnschneller und dem Scheidenschneller ausgleichen. Beide entsprechen einander, nur sind die beiden Hälften des letztern in der Mitte nicht verwachsen.

Die äußern Schamlippen stellen die beiden, gleichfalls auf ähnliche Art getrennten Hälften des Hodensackes dar.

Die Brüste unterscheiden sich nur durch Größe, und vor dem Eintritte der Pubertät auch kaum durch diese.

Auf diese Weise ist also einem jeden Abschnitte der Geschlechtstheile sein Aehnliches im entgegengesetzten Geschlechte gefunden. Die Abweichung von der normalen Form tritt einander oft noch weit mehr und so verähnlicht, daß oft die Geschlechtsbestimmung höchst schwierig ist, wird sich sogleich aus der Betrachtung der Zwitterbildungen ergeben.

§. 2518.

V. Auch die innern Schamlippen fehlen bisweilen, oder sind verwachsen, beides ursprünglich oder zufällig, in Folge vorangegangener Entzündungen.

Auf entgegengesetzte Weise sind sie bisweilen doppelt, selbst dreifach).

Ungewöhnliche Größe derselben ist meistens eine später eintretende Formabweichung.

§. 2519.

VI. Der Ritzler ist bisweilen in Folge eines fötusähnlichen Fortwachsens ursprünglich regelwidrig groß, und ahmt hiedurch die männliche Rütze nach, vorzüglich wenn sich zugleich die Harnröhre weiter als gewöhnlich nach vorn erstreckt.

Hieron ist die bisweilen erst später, vorzüglich in Folge syphilitischer Affection entstehende Vergrößerung dieses Theiles; sowohl in Hinsicht auf innere als äußere Form, bedeutend verschieden, sofern er hier härter, fester, unregelmäßig und traubenförmig wird.

Eine interessante ursprüngliche, thierähnliche Abweichung desselben ist die Spaltung oder Gedoppeltheit desselben:

2. Männliche Zeugungstheile.

§. 2520.

I. Hoden. Formfehler der Hoden sind:

1) Mangel eines oder beider, welchen man von dem Scheinbaren, dessen Wesen ein Verweilen des Hoden in der Unterleibshöhle ist, wohl unterscheiden muß.

2) Kleinheit.

3) Un-

4) Un-

1) Neubauer de triplici nympharum ordine. Jenae. 1774.



Beiden Geschlechtern gemein sind 1) Hemmungen a frühern Bildungsstufen, und Fortentwicklung nach embryonischem Typus. Hieher gehört a) der gänzliche oder theilweise Mangel der Zeugungstheile. Durch den ersten wird gänzliche Geschlechtslosigkeit bewirkt, wenn gleich bisweilen dennoch durch den übrigen Habitus der Geschlechtscharakter deutlich ausgesprochen ist;

b) 11

β. Der Trompeten.

Leonhardi quaedam de tubarum uterinarum morbis. Viteb. 1808.

γ. Der Gebärmutter und Scheide.

A. Vater de morbis uteri. Viteb. 1709.

A. de Haller de morbis uteri. Gott. 1755.

Schwarz de uteri degeneratione. Jenae. 1792.

Clarke diseases of females. London. 1814.

δ. Der Scheidenklappe.

W. Tolberg de varietate Hymenum. Hal. 1791.

Ostlander s. oben S. 533.

e) Der männlichen überhaupt:

W. Wadd cases of diseased bladder and testicle. London. 1815.

f) Der einzelnen Abschnitte.

1. Der Hoden:

Hänel diff. de morbis scroti. Argent. 1725.

J. Warner account of the testicles and the diseases to which they are liable. London. 1774.

2. Der Vorsteherdrüse.

E. Home on the treatment of the diseases of the prostatic gland. Vol. 1. London. 1811. Vol. 2. London. 1818.

3. Der Ruthe.

Broekhausen de excretionis urinae impedimentis a vitio membri virilis. Argent. 1781.

Thaut de virgae virilis statu sano et morbofo. Wirceb. 1811.

Bell's und Howship's oben beim Harnsystem angeführt.  
Schriften.

lle sie doch nicht für alle, sondern viele Vergrößerungen der Vorsteherdrüse sind in einer Entwicklung faseriger oder faserig-feststoffiger Substanz begründet, welche sich auch in der ihr entsprechenden Gebärmutter häufig bildet.

Häufig, allein auch keinesweges, nach Home's Beschreibung<sup>1)</sup>, immer, ist der mittlere Lappen der Vorsteherdrüse regelwidrig angeschwollen.

## §. 2522.

III. Die Ruthe ist vielen ursprünglichen Bildungsabweichungen unterworfen, welche vorzüglich in einem Stehenbleiben auf einer frühern Bildungsstufe, oder einer weitem Ausbildung niedrigerer Formen begründet sind.

Hieher gehört:

- 1) Mangel;
- 2) Kleinheit;
- 3) gänzliche oder theilweise Undurchbohrtheit, welche verschiedene graduelle und qualitative Verschiedenheiten, von der Verschiebung der Vorhaut an bis zur Oeffnung der Harnröhre in Mittelfleische darbietet, und entweder mit regelwidriger Feinheit der Ruthe zusammengesetzt ist oder nicht. Unter dieser Bedingung ist die Harnröhre und somit die Ruthe an ihrer internen Fläche in der That gespalten;
- 4) Enge der Vorhaut (Phimosis), die aber öfter zur Bildung eintritt;
- 5) Spaltung der Ruthe an der obern Fläche, welche mit Harnblasenspalting gemeinschaftlich vorkommt, und da, wo sie allein vorhanden ist, den Uebergang von dieser zur normalen Bildung macht;

Nr 3

6) gänz-

---

1) Home a. a. O.

in der Bildung der Geschlechtstheile, welche hier allein betrachtet wird<sup>1)</sup>, durch Bildung eines Theiles des Geschlechtsapparates nach einem, dem übrigen und dem ganzen Körper entgegengesetzten Geschlechtscharakter, ohne oder mit Verwickelung der Geschlechtstheile aus.

Die erstere Art ist bei weitem die häufigste.

Die männlichen Geschlechtstheile nehmen für den weiblichen Charakter an

1) durch Verweilen der Hoden im Unterleibe, und überhaupt durch unvollkommenes Verschwinden der frühesten Ortsverhältnisse;

2) durch Unterbrechung des Samenganges;

3) durch höhere Lage und Vergrößerung, Erweiterung der Vorsteherdrüse;

4) durch Kleinheit der Ruthe;

5) durch die verschiedenen Grade von Imperforation derselben;

6) durch

---

Burdach die Metamorphose der Geschlechter, oder Entrückung der Bildungsstufen, durch welche beide Geschlechter einander übergehen. In dessen anatomischen Untersuchungen. Hft. 1. 1814. II.

Wo sich die frühern Fälle und die Literatur über diesen Gegenstand vollständig finden.

Seiler observationes nonnullae de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu et partium genitalium anomalis. Lips. 1787.

Die Gründe, welche mich zur Feststellung dieser Klasse der Bildungsabweichungen veranlassen, habe ich schon in meiner pathologischen Anat. Bd. 1. S. 78. auseinander gesetzt.

1) S. über den Ausdruck der Zwitterbildung im Totalhabet. Bd. 2. S. 20.

Sie vervielfachen sich bisweilen nach Art der Säugthierbrüste, so daß sich, beim niedrigsten Grade, auf einer Brust zwei Warzen, allmählich über einander mehrere Brüste, zwei, selbst drei auf einer oder beiden Seiten bilden.

## 2. Texturveränderungen.

### A. Weibliche Zeugungstheile.

§. 2524.

I. Texturveränderungen kommen unter allen Theilen des Zeugungssystems bei weitem am häufigsten in den Eierstöcken vor, und sie sind es, in welchen sich auch die mannichfachsten und regelmässigsten neuen Gebilde entwickeln. In der Entstehung dieser neuen Gebilde ist auch fast immer die Vergrößerung der Eierstöcke begründet, wenn sie gleich bisweilen, vorzüglich anfänglich bloß reine Zunahme entweder der ganzen Substanz, oder, dies häufiger, eines ihrer Bestandtheile, der Bläschen ist. Diese Vergrößerung des Eierstockes ist bisweilen außerordentlich beträchtlich, so daß sein Gewicht auf 55<sup>1)</sup>; selbst 85, ja 102 Pfund<sup>2)</sup> vermehrt gefunden wurde.

Am wenigsten vom Normal entfernt ist die Eierstockswassersucht<sup>3)</sup>. Diese bietet mehrere Verschiedenheiten

Nr 4

dar,

1) Normand obs. sur la transformation d'un ovaire etc. In Sédillot's J. gén. de médec. T. 56. p. 145 seqq. Ein andrer Fall von Valentin ebendas. T. 58. S. 218.

2) Van den Bosch cit. bei Voigtel. Pathol. Anat. Bd. 3. S. 541.

3) Fehr de virgine, hydropse ovarii laborante. Argent. 1762. Huth casus virginis hydropse ovarii extinctae. Argent. 1768. Murray de hydropse ovarii. Upsal. 1780. Rossium de hydropse ovariorum. Lovae. 1782.

Scheide, im Becken herabsinkt, bei vollkommener Umkehrung der letztern um die ganze Länge derselben hervorliegt, der äußere Muttermund sich am untern Ende der dadurch gebildeten, zwischen den Schenkeln liegenden Geschwulst befindet, und gewöhnlich der Hals mehr oder weniger verlängert, die Gebärmutter mit der ursprünglich äußern Fläche der umgekehrten Scheide verwachsen ist. Wegen der Verlängerung des Halses liegt in dessen dennoch der Körper der Gebärmutter gewöhnlich außerhalb des Sackes der Scheide. In seltenen Fällen verwächst in dieser Ortsveränderung der äußere Muttermund völlig<sup>1)</sup>.

Selbst die schwangere Gebärmutter bildet ~~hierbei~~ einen Bruch.

2) Regelwidrige Gestalt. Eine erworbne ~~Veränderung~~ der Gestalt der Gebärmutter schließt sich an die eignen Formfehler, sofern sie mit Ortsveränderung derselben verknüpft ist.

Sie ist die Umkehrung (Inversio)<sup>2)</sup>, deren ~~Wirkung~~ Auswärtswendung der innern Fläche der Gebärmutter ist. Sie hat mehrere Grade, sofern der Grund der Gebärmutter sich entweder dem Munde nur nähert, oder durch ihn ~~hervorragt~~

Abbild. bei Ruysch obl. med. chir. Obl. 2. tab. 8.

Baillie Engr. Fasc. 9. F. 1.

Clarke Diseases of females. Lond. 1814. Tab. 1—5.

1) Béclard et Cloquet, in Bull. de la fac. de médec. T. 6. 1816. p. 114.

2) Van Sanden de prolapsu uteri. Lips. 1725.

Cartorff Ausg. a. d. Abb. d. Copenh. Gesellschaft. Halle 1774.

Abbild. bei Ruysch obl. anat. chir. Cent. Obl. X.

Denman Introd. to the practice of midwifery. Tab. 12.

Baillie Engravings. Fasc. 9. F. 2.

Sie vervielfachen sich bisweilen nach Art der Säugthierbrüste, so daß sich, beim niedrigsten Grade, auf einer Brust zwei Warzen, allmählich über einander mehrere Brüste, zwei, selbst drei auf einer oder beiden Seiten bilden.

## 2. Texturveränderungen.

### A. Weibliche Zeugungstheile.

§. 2524.

I. Texturveränderungen kommen unter allen Theilen des Zeugungssystems bei weitem am häufigsten in den Eierstöcken vor, und sie sind es, in welchen sich auch die mannichfachsten und regelmässigsten neuen Gebilde entwickeln. In der Entstehung dieser neuen Gebilde ist auch fast immer die Vergrößerung der Eierstöcke begründet, wenn sie gleich bisweilen, vorzüglich anfanglich bloß reine Zunahme entweder der ganzen Substanz, oder, dies häufiger, eines ihrer Bestandtheile, der Bläschen ist. Diese Vergrößerung des Eierstockes ist bisweilen außerordentlich beträchtlich, so daß sein Gewicht auf 55 <sup>1)</sup>; selbst 85, ja 102 Pfund <sup>2)</sup> vermehrt gefunden wurde.

Am wenigsten vom Normal entfernt ist die Eierstockswassersucht <sup>3)</sup>. Diese bietet mehrere Verschiedenheiten

Nr 4

dar,

- 1) Normand obs. sur la transformation d'un ovaire etc. In Sédillot's J. gén. de médec. T. 56. p. 145 seqq. Ein andrer Fall von Valentin ebendas. T. 58. S. 218.
- 2) Van den Bosch cit. bei Voigtel. Pathol. Anat. Bd. 3. S. 541.
- 3) Fehr de virgine, hydropse ovarii laborante. Argent. 1762. Huth casus virginis hydropse ovarii extinctae. Argent. 1768. Murray de hydropse ovarii. Upsal. 1780. Rossium de hydropse ovariorum. Lovae. 1782.

In Hinsicht auf Länge und Durchmesser bietet die Scheide gleichfalls ursprüngliche Bildungsfehler dar, sofern sie bisweilen äußerst eng, und, zugleich oder allein, sehr kurz ist.

Unter den später entstehenden Formabweichungen ist die häufigste die unvollkommene \*) oder vollkommene Umkehrung der Scheide, welche mit Vorfalle der Gebärmutter verbunden ist. Gewöhnlich ist zugleich die Harnblase herabgezogen, und sehr häufig sind hierbei zugleich Steine in derselben vorhanden, welche aber sowohl die Krankheit veranlassen, als die Folge derselben entstehen können \*).

Bisweilen zerreißt unter denselben Bedingungen als die Gebärmutter, doch seltner als sie, die Scheide.

#### §. 2517.

IV. Die äußern Schamlippen fehlen bisweilen ursprünglich oder sind in der Mittellinie verwachsen; beides ein Verweilen auf frühern Bildungsstufen.

Selten enthalten sie durch den Bauchring ausgetretene Unterleibseingeweide beim Leistenbruche.

Bisweilen entwickeln sie sich plötzlich, durch Uebertragung anderer Krankheiten, namentlich der Blennorrhöe, sehr langsam, zu einer äußerst beträchtlichen Größe.

#### §. 2518.

1) Naudin mém. sur les chutes partielles du vagin. In *Silvestre's Journal gén. de méd.* T. 56. 1816. p. 259 ff.

2) C. Ruyseh. *Obs. med. chir.* Obs. I. Paget in *London med. and. phys. journal.* T. 6. p. 591. wo ein Stein von 27 *lignes* und außerdem mehrere kleine in der vorgetretenen Harnblase lag. Mit einer Abbild.

holungen normaler Gewebe kommen noch andre, welche dem Eierstocke zwar nicht ganz, aber doch fast ausschließlich angehören, Haare und Zähne<sup>1)</sup>, von welchen die erstern weit häufigern, im Fett, die letztern in, mit einer gallertähnlichen Masse angefüllten Bälgen, sich entwickeln, wo also sowohl in Hinsicht auf die Entstehungsstätte, als auf die verhältnißmäßige Häufigkeit des Vorkommens genau der normale Typus befolgt wird.

Wegen der Besonderheit vorzüglich des Knochen-, Haar- und Zahngewebes, der Stelle, an welcher sie vorkommen, welche auch die Geburtsstätte des Productes der Zeugung ist, der Lebensperiode, in welcher sie sich meistentheils entwickeln, der nicht selten vorangegangnen Begattung, der nicht ganz selten, bei der Eierstockschwangerschaft, hier wirklich vor sich gehenden Bildung eines neuen Organismus in Folge einer Begattung, ist man häufig geneigt, diese regelwidrigen Bildungen für Ueberbleibsel eines solchen, im Eierstocke entstandnen Fötus zu halten; allein mit Unrecht, indem die häufig Statt findende gänzliche Unähnlichkeit der hier regelwidrig vorkommenden Gebilde in Hinsicht auf Zahl, Gestalt und Größe, das alleinige Vorkommen der angegebenen, während sich bei Extrauterinalfötus alle sehr lange vollständig erhalten, schon überzeugend beweisen, daß durch einen etwa vorangegangnen Zeugungsact wenigstens kein vollkommner Fötus, sondern nur die gefundenen Theile gebildet wurden.

Nr 5

Un-

---

1) G. Meckel über regelwidrige Haar- und Zahnbildungen in d. Archiv f. d. Physiologie. Bd. 1. St. 4. Wo sich die frühern Beobachtungen und die vollständige Literatur des Gegenstandes finden.



3) Unvollkommene Entwicklung aus den frühern Ortsverhältnissen, welche sehr verschiedene Grade hat und von dem Verweilen des Hoden unterhalb der Niere bis zu der unvollkommenen Verschließung der nach dem Heraustreten desselben aus der Unterleibshöhle noch eine Zeitlang bestehenden Verbindungsröhre variiert. In der unvollkommenen Verschließung dieser letztern ist der angeborne Bruch begründet.

4) Unterbrechung des Samenganges, blinde Endigung desselben, Mangel der Samenblasen<sup>1)</sup>.

5) Mehrzahl der Hoden, die aber sehr problematisch ist. Eben so selten sind die Samenblasen mehrfach<sup>2)</sup>.

Später entstehende Formabweichungen der Hoden sind:

1) Regelwidrig vermehrte Größe.

2) Schwinden. Beide sind aber am häufigsten mit Texturveränderungen verbunden.

#### §. 2521.

II. Die Vorsteherdrüse ist vorzüglich der regelwidrigen, mit Umwandlung ihres Gewebes verbundenen Vergrößerung unterworfen. Unter dieser Bedingung ist man im Allgemeinen geneigt, sie für scirrhus zu halten, indessen, wenn diese Ansicht gleich für die Mehrzahl der Fälle richtig ist, so

1) S. über die Hemmungsbildungen der Hoden, Abführungsgänge Samenblasen etc. Handb. der pathol. Anat. Bd. 1. S. 65 ff. Außerdem H. Boscchia Diss. sistens observationem de vasculis seminalis sinistras defectu, integris testibus, vasa vero dextera sinistro clauso L. B. 1815.

Eine treffliche Beschreibung eines Falles von Krypsoorchismus Seiler de testic. defc. Lips. 1817. p. 45.

2) S. über das regelwidrige Mehrfachwerden dieser Theile Meckel de duplicitate monstruosa und Handb. der pathol. Anat. Bd. 1. S. 32 ff.

den Knötchen bestehende Masse, welche Prochaska<sup>1)</sup> beobachtete.

Otto<sup>2)</sup> sah eine ähnliche, die aber nur die Größe einer Erbse hatte.

Ich selbst habe zwei ähnliche, kürzlich von mir gefundene Fälle vor mir. In dem einen, der in der Leiche eines ungefähr dreißig Jahr alten, Zeichen von Eierstocksentzündung gebenden, unkeuschen Weibes gefunden wurde, war mit Verdickung und beträchtlicher Verdickung der Trompeten der linke Eierstock beträchtlich vergrößert, sehr weich und in eine Menge vielfach gewundner Erhabenheiten umgewandelt; in einem zweiten, der in einer ungefähr 40 Jahr alten Leiche vorkam, enthielt der rechte Eierstock in seiner Oberfläche drei Bälge von ungefähr vier Linien Durchmesser, deren innere, vielfach gefaltete Fläche ganz ähnliche Windungen zeigte. Vorzüglich der erste Fall war höchst wahrscheinlich ein Anfang der von Prochaska beschriebenen Bildung, und diese konnte auch aus dem letztern hervorgehn, wenn die Bälge zerrissen und die innere Fläche wucherte.

§. 2525.

II. Die Texturveränderungen der Gebärmutter sind sehr häufig.

Als regelwidrige Wiederholungen normaler Gebilde müssen vorzüglich die faserigen, faserigknorpeligen oder knöchernen, steirigen Körper derselben erwähnt werden, die man sehr wohl von den Eierchen, ungeachtet sie häufig, ihrer Härte wegen, unter dieser Benennung beschrieben werden, unterscheiden muß.

Sie

1) Disquis. organismi anat. physiol. §. 58. Tab. 5.

2) Handb. der pathol. Anat. S. 378. Note 33.

3) Unvollkommene Entwicklung aus den frühern Ortsverhältnissen, welche sehr verschiedene Grade hat und von dem Verweilen des Hoden unterhalb der Niere bis zu der unvollkommenen Verschiebung der nach dem Heraustreten desselben aus der Unterleibshöhle noch eine Zeitlang bestehenden Verbindungsröhre variiert. In der unvollkommenen Verschiebung dieser letztern ist der angeborne Bruch begründet.

4) Unterbrechung des Samenganges, blinde Endigun-  
desselben, Mangel der Samenblasen <sup>1)</sup>).

5) Mehrzahl der Hoden, die aber sehr problematisch  
ist. Eben so selten sind die Samenblasen mehrfach <sup>2)</sup>).

Später entstehende Formabweichungen der Hoden sind:

1) Regelwidrig vermehrte Größe.

2) Schwinden. Beide sind aber am häufigsten mit  
Texturveränderungen verbunden.

#### §. 2521.

II. Die Vorsteherdrüse ist vorzüglich der regel-  
drigen, mit Umwandlung ihres Gewebes verbundenen Ver-  
grodherung unterworfen. Unter dieser Bedingung ist man  
Allgemeinen geneigt, sie für scirrhus zu halten, indeffen,  
diese Ansicht gleich für die Mehrzahl der Fälle richtig ist,

- 
- 1) S. über die Hemmungsbildungen der Hoden, Abführungsgänge  
Samenblasen u. Handb. der pathol. Anat. Bd. 1. S. 63 ff.  
Außerdem H. Boscha Diss. sistens observationem de vesicula  
seminalis sinistra defectu, integris testibus, vasa vero de-  
rente sinistro clauso L. B. 1815.

Eine treffliche Zergliederung eines Falles von Krypsoorchismus  
Seiler de testic. desc. Lips. 1817. p. 45.

- 2) S. über das regelwidrige Mehrfachwerden dieser Theile Mook  
de duplicitate monstruosa und Handb. der pathol. Anat. Bd. 4  
S. 32 ff.

Innerhalb der Höhle der Gebärmutter entwickeln sich auch bei ähnlichen Umständen nicht ganz selten andre Bildungen, welche als ungelungne Versuche zur Bildung eines neuen Organismus angesehen werden können, namentlich mit der hinfälligen Haut, oder wenn sie als dünne, mit einer wässrigen Flüssigkeit angefüllte Blasen erscheinen, mit den innern Hüllen des Eies Aehnlichkeit haben.

Ganz regelwidrige Texturveränderungen der Gebärmutter sind 1) die scirröse und krebssige Degeneration derselben.

Diese erscheint nicht, wie die Faserkörper, in einzelnen, von der übrigen Substanz getrennten Stellen, sondern als eine Umwandlung des ganzen Organs, die gewöhnlich von dem untern Theile anfängt, und sich von hier aus über das Ganze verbreitet. Die so veränderten Theile werden zuerst hart, schwellen mehr oder weniger beträchtlich an, verschwären dann in derselben Ordnung, und werden dadurch allmählich zerstört. In Folge hievon entstehen regelwidrige Oeffnungen entweder in der Bauchhöhle, der Harnblase, oder dem Mastdarm, oft in mehreren dieser Stellen zugleich. Wie immer wird dieser Degeneration das Lymphsystem angesteckt, und der Tod, die nothwendige Folge der Krankheit, Bedingungen, wodurch sich diese Degeneration von der Bildung faseriger und knöcherner Körper in der Gebärmutter unterscheidet.

2) Eigne, an der innern Fläche der Gebärmutter sich entwickelnde neue Bildungen, welche so häufig vorkommen, daß Portal unter 20 Zeichen sie bei 13 fand<sup>2)</sup>, sind die Pólypen,

2) Obs. sur la structure des parties de la génération dans la femme. Mém. de Paris 1770. p. 190.

6) gänzliche Spaltung der Ruthe in zwei Hälften, eine weit seltener Abweichung <sup>1)</sup>).

Auf entgegengesetzte Weise ist die Ruthe bisweilen mehr oder weniger vollkommen doppelt.

Eine Andeutung hievon ist vielleicht die, durch ihre ganze Länge Statt findende Absonderung des Samen- und Harnweges von einander, welche bisweilen beobachtet wurde.

Bei vollkommenerer Duplicität liegen beide Ruthen neben oder über einander. Die letztere Bildung ist eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Doppelstwerden der, der Ruthe entsprechenden Zunge. Die erstere möchte ich für weitere Entwicklung der Spaltung der Ruthe halten.

Später entstehende Formveränderungen der Ruthe sind regelwidrige Vergrößerung, die gewöhnlich in Folge abnormer Bildungen eintritt.

Selten kehrt sich die innere Haut der Harnröhre um <sup>2)</sup>.

### 3. B r ü s t e.

#### §. 2523.

Die Brüste fehlen bisweilen auf einer oder beiden Seiten.

Ungewöhnliche Kleinheit derselben beim weiblichen, Größe beim männlichen Geschlecht ist Andeutung von Zwitterbildung, vorzüglich, wenn sich die letztere auch mit Milchabsonderung zusammensetzt. Regelwidrige, zufällig eintretende Vergrößerung derselben.

1) Sixtus de diffisione genital. Wirceb. 1815.

2) Bamberger de intusfuso, membr. urethrae int. Wirceb. 1795.

enthäutlichen Scheidenhaut, welche sich endlich trennen, und frei in ihrer Höhle liegen.

Seltner kommen sie im Samenstrange vor.

4) Sehr selten entwickeln sich Paare.

5) Nicht selten dagegen entwickeln sich in ihrer Substanz keisigähnliche, tuberkulöse Bildungen.

6) Eierhöfe in Krebs übergehende.

7) Schwammbildung.

8) Mit blutwasserähnlicher Flüssigkeit angefüllte Bälge.

II. Bisweilen, doch selten, bilden sich Steine in den Samenblasen<sup>1)</sup> oder der Vorsteherdrüse<sup>2)</sup>, von welchen wenigstens die letztern aus phosphorsaurem Kalk bestehen.

III. Die Texturveränderungen der Ruthe sind meistens phlogistischen Ursprungs, Geschwüre, Auswüchse u.

#### C. Brüste.

§. 2527.

Die häufigste Texturveränderung der weiblichen Brüste, von der die männlichen fast gar keinen Krankheiten unterworfen sind, ist der Scirrhus. Doch werden mit dieser Benennung die Menge der verschiedensten neuen Bildungen belegt, indem ist jede, entweder allein oder mit andern verbunden, sich in der Brust entwickelt.

Sechst.

<sup>1)</sup> Hartmann de calculis in vesicula seminali. Francof. 1765.

<sup>2)</sup> Pohl de calculis in prostata inventis. Lips. 1757.

dar, sofern die Flüssigkeit bald in einer, bald in mehrern größern und kleinern, oft in ungeheurer Menge vorhanden Blasen enthalten ist, und nicht nur in Hinsicht auf *Weg*, welche bisweilen ungeheuer ist, sondern auch, und dies in den verschiednen Bälgen desselben Eierstockes, sehr bedeutend in Hinsicht auf *Farbe*, *Consistenz* u. s. w. variiert.

Die Bälge sitzen meistens fest, liegen aber oft *voll* frei, in großer Menge, in der Höhle des Eierstockes, wo sie aus der ergossenen Flüssigkeit entstanden zu seyn scheinen. Diese krankhafte Veränderung ist entweder Vergrößerung der Eierstocksbblasen oder zeugungsartige Wiederholung derselben, und damit Bildung seröser Häute. Diese serösen *Häute* halten nicht selten auch Fett oder Fettwachs.

Außer den serösen Häuten bilden sich nicht ganz selten in Eierstöcke auch regelwidrig *Schleimhäute*, gleichfalls in Balggestalt, welche eine mehr dicke Feuchtigkeit enthalten, unter dem Namen von *Breis* oder *Honiggeschwülsten* (*Atheromata* f. *Melicerides*).

Eine, nicht selten allein oder mit der oben beschriebenen vorkommende Texturveränderung des Eierstockes ist die Bildung *faseriger*, *faserknorplicher*, *knorplicher* und *knöcherner* Substanz, die sich oft in sehr beträchtlichen rundlichen *Massen* entwickelt, wodurch Umfang und Gewicht der Eierstöcke bedeutend vermehrt wird. Die unter dem Namen *Steatom*, *Sarkom*, *Scirrhus*, *Osteosteatom*, *Verknocherung* des Eierstockes beschriebenen Bildungen gehören *alle* oder wenigstens meistens hieher.

Zu diesen, auch in andern Gebilden, wenn gleich *weitern* nicht so häufig, vorkommenden, regelwidrigen *Bildungen*

enthältlichen Ektidenhaut, welche sich endlich trennen, und frei in ihrer Höhle liegen.

Seltener kommen sie im Samenstrange vor.

4) Sehr selten entwickeln sich Haare.

5) Nicht selten dagegen entwickeln sich in ihrer Substanz eiskörnliche, tuberkulöse Bildungen.

6) Scirrhe in Krebs übergehende.

7) Schwammbildung.

8) Mit blutwasserähnlicher Flüssigkeit angefüllte Bälge.

II. Bisweilen, doch selten, bilden sich Steine in den Samenblasen<sup>1)</sup> oder der Vorsteherdrüse<sup>2)</sup>, von welchen wenigstens die letztern aus phosphorsaurem Kalk bestehen.

III. Die Texturveränderungen der Ruthe sind meistens phlogistischen Ursprungs, Geschwüre, Auswüchse u.

#### C. Brüste.

§. 2527.

Die häufigste Texturveränderung der weiblichen Brüste, denen die männlichen fast gar keinen Krankheiten unterworfen sind, ist der Scirrhus. Doch werden mit dieser Benennung eine Menge der verschiedensten neuen Bildungen belegt, indem oft jede, entweder allein oder mit andern verbunden, sich in der Brust entwickelt.

Sechst.

<sup>1)</sup> Hartmann de calculis in vesicula seminali. Francof. 1765.

<sup>2)</sup> Pohl de calculis in prostata inventis. Lips. 1757.



Ungeachtet es nun unläugbar ist, daß in vielen Fällen nicht bloß die Bildung dieser vollkommenen, sondern auch aller abweichenden Bildungen im Eierstocke überhaupt, nur in Folge einer Begattung entsteht, welche, wegen durch Kränklichkeit, höheres Alter oder andre Ursachen geschwächter Zeugungsthätigkeit eines oder beider Zeugenden nicht zur Hervorbringung eines normalen Organismus hinreicht, so ist doch keineswegs erweislich, daß dazu nothwendig der Zutritt des Mannes erfordert werde, sofern sie mehrmals bei sehr zarten Mädchen, mit völliger Integrität der Geschlechtstheile vorkamen, und dieselben Gebilde auch an andern Stellen des Körpers, und dies nicht nur im weiblichen, sondern auch im männlichen Geschlecht gefunden werden.

Die weit größere Häufigkeit und Vollkommenheit dieser Bildungen im Eierstocke als in allen übrigen Organen ist offenbar nur der gerade hiet am höchsten entwickelten bildenden Thätigkeit zuzuschreiben, und kein Beweis, daß zu ihrer Entstehung nothwendig eine Begattung vorangehen muß, noch viel weniger, daß sie Ueberbleibsel zerstörter Eierstocksfötus seyen.

Völlig regelwidrige Texturveränderungen kommen weit seltner im Eierstocke vor, wahrscheinlich aus demselben Grunde, weil die hohe Steigerung der bildenden Thätigkeit das Gelingen der Versuche zu neuen Bildungen begünstigt.

Eine, in Hinsicht auf die äußere Form höchst seltne, ganz eigenthümliche, ihrer Natur nach nicht untersuchte Abweichung des Eierstockes ist die Umwandlung desselben in eine sehr groß baumförmige, aus mehreren, durch Fäden verbundenen, selbst

Die genannten Theile sind nach innen mittelbar oder unmittelbar vom Bauchfelle bekleidet.

Hiernach sind ihre Wände in ihrem hintern und untern Theile am festesten. Außerdem ergibt sich aus der Beschreibung der sie bildenden Muskeln (Th. 2. S. 462. Th. 4. S. 564 566.), daß auch diese sie vorzugsweise an einigen Stellen fester als an andern umschließen. Namentlich sind diese Stellen, wo die Fasern der Muskeln dünner, schwächer, oder sie und ihre Sehnen ganz oder beinahe fehlen.

Gegenden ersterer Art sind der untere seitliche und der mittlere Theil der vordern Wand; der letztern vorzüglich die Oeffnungen, durch welche Gefäße aus- und eintreten, der Harnkanal und die Schenkellücke.

#### b. G e s t a l t.

##### §. 2530.

Ihre Gestalt ist im Allgemeinen eiförmig. Ungeachtet in der Mitte ihrer vordern Fläche befindet sich der Nabel.

Die oberhalb desselben befindliche Hälfte ist etwas größer und breiter als die untere. Ihre vordere längste, und die niedrigen Seitenwände sind ziemlich gerade, ihre hintere durch die vorspringenden Leistenwirbel und das nach hinten abweichende Becken ungleich, oben in der Mitte gerundet, an den Seiten, vorzüglich unten, ausgehöhlt, ihre obere und untere Fläche mehr oder weniger vertieft.

#### c. G r ö ß e.

##### §. 2531.

Sie ist beträchtlich größer als die Brusthöhle, und die größte der drei Abtheilungen, welche den Namen der Höhlen haben.

## a. Gestalts- und Größeveränderungen.

## §. 2532.

Ihre Gestalt und Größe sind, da ihre Wände größtentheils aus Muskeln bestehen, sehr bedeutender Abänderungen fähig. Die vorzüglichste wird fortdauernd regelmäßig durch die abwechselnden Zusammenziehungen und Erschlaffungen des Zwerchfelles beim Athemholen bewirkt. Seltner tritt mehr oder weniger bedeutende Verengerung durch die Thätigkeit der Bauchmuskeln, um im Darmkanal und der Gebärmutter, oder auch in der Harnblase enthaltne Substanzen fortzuschaffen, ein. Am gewöhnlichsten antagonisiren das Zwerchfell und die übrigen Bauchmuskeln. Ihr Zusammenwirken bringt beim Drängen die stärkste Verengerung hervor.

Auf entgegengesetzte Weise wird die Bauchhöhle mehr als gewöhnlich ausgedehnt, 1) durch alles, was regelmäßig oder regelwidrig die Masse oder den Umfang der in ihr enthaltenen Theile vermehrt;

2) durch unmittelbare Anhäufung von Substanzen aller Art in ihr, deren Entstehungsweise die verschiedenartigste ist.

Hierbei werden alle, in die Zusammensetzung ihrer Wände eingehenden Theile meistentheils gleichmäßig ausgedehnt.

## §. 2533.

Außer den vorher (S. 640.) erwähnten Theilen enthält die Bauchhöhle den untern Theil der Aorta, der untern Hohlader, den Anfang des Saugaderstammes, die großen Hüftgefäße, den untern Theil des Gangliennerven, das Lenden- und Hüftgeflecht der untersten Rückenmarksnerven.

Alle hängen in einem kleinern oder größern Theile ihres Umfangs durch Zellgewebe mehr oder weniger, vorzüglich mit der hintern Wand, weniger mit der obern, noch weniger mit der obern und dem untern Theile der seitlichen, und der vordern Wände zusammen. Der obere Theil der seitlichen, so wie der vordern dagegen sind, mit Ausnahme einer kleinen Strecke der hintern, wo das Aufhängeband der Leber an sie gefestigt ist, ganz frei.

Auch da, wo kein Zusammenhang zwischen den enthaltenen und enthaltenen Theilen Statt findet, berühren einander nur ihre äußern Flächen und die innern der Unterleibswände in regelmäßigen Zustände unmittelbar, und gleiten auf einander.

In Hinsicht auf ihre Lage unterscheiden sich die in der Unterleibshöhle enthaltenen Theile vorzüglich insofern, als der größte Theil derselben, namentlich, mit Ausnahme des untern Theiles des Mastdarmes und der Bauchspeicheldrüse, das ganze Verdauungssystem und der obere Abschnitt der weiblichen Zeugungstheile in dem Bauchfelle enthalten sind, die übrigen aber, namentlich die großen Gefäße und Nerven, sowie die Harnwerkzeuge und der untere Theil des Zeugungssystems, außerhalb desselben liegen. (*Partes intra et extra peritoneum.*)

## 2. Das Bauchfell<sup>1)</sup>.

§. 2534.

Das Bauchfell (*Peritoneum*), die größte und in der Verbreitung zusammengesetzteste seröse, und stellenweise

§ 2

faserig

<sup>1)</sup> Wedel resp. Müller de peritoneo. Jenae. 1696.

J. Dou.

faserigsterthe Haut des Körpers, kleidet als ein überall geschlossener, nur beim weiblichen Geschlecht an den Unterleibsöffnungen der beiden Trompeten offener, und in die Schleimhaut derselben übergehender Sack fast die ganze Unterleibshöhle, mit Ausnahme des untersten Theiles des Beckens, aus, und enthält, nur den untern Theil des Mastdarms ausgenommen, den ganzen in dieser Höhle befindlichen Theil des Verdauungssystems, und beim weiblichen Geschlecht den obern Theil der Gebärmutter, die Trompeten und die Eierstöcke, wie alle seröse Hülle, auf doppelte Weise, indem sie 1) durch ihren äußern sackförmigen Theil alle genannte Organe einschließt, ohne mit ihnen in Verbindung und Berührung zu stehen, und 2) sich durch den innern Theil von mehreren Stellen aus gegen sich selbst umbiegt, und, an die äußere Fläche der Theile geklebt, sie bekleidet und ihre äußere Hülle bildet.

J. Douglas description of the peritoneum and of that part of the membrana cellularis, which lies on its outside, with an account of all the abdominal viscera. Lond. 1750. Ven. lat. E. F. Heister. Helmst. 1753.

C. G. Büttner de peritoneo. Ratiom. 1753. 4. Rec. Halleri coll. disp. T. I.

F. W. Henning de peritoneo. Gieslæ. 1742.

H. A. Wrisberg de peritonei diverticulis, illisque imprimis quae per umbilicum et lineam albam contingunt. Götting. 1780.

A. Vacca Berlinghieri Mém. sur la structure du péritoine et ses rapports avec les viscères abdominaux. In Mém. de la soc. médic. d'émulation. T. III. p. 315.

C. J. M. Langenbeck commentarius de structura peritonei, testiculorum tunicis, eorumque ex abdomine in scrotum descensu ad illustrandam herniarum indolem. Gottting. 1817.

Die Angabe mehrerer Anatomen, daß nicht bloß diese, sondern alle in der Bauchhöhle befindlichen Theile in dem Bauchfelle enthalten seyen, welches sich, um sie einzuschließen, in zwei Blätter, ein äußeres und ein inneres spalte, gründet sich auf die Ansicht, daß das an der äußern Fläche des Bauchfelles befindliche, verdichtete Schleimgewebe ein ganzes Blatt sey; indessen ist sie in der That nicht haltbar, da diese Schicht nicht serös ist, sich überall findet, und nicht durch Spaltung des serösen, eigenthümlichen Blattes des Bauchfelles entsteht, sondern künstlich durch das Messer, besonders nach vorangegangener Erhärtung durch Weingeist, gemacht wird.

§. 2535.

Das Bauchfell ist, wie alle serösen Häute, im hohen Grade ausdehnbar und zerreißt daher selbst dann nicht, wenn es allmählich oder plötzlich sehr stark ausgedehnt wird. Diese Fähigkeit verdankt es einer beträchtlichen Festigkeit, die es im normalen Zustande besitzt.

Seine Stärke ist nicht überall dieselbe. Im Allgemeinen ist der äußere Theil weit stärker, fester und dicker als der innere. In der Lendengegend und seinem untern vordern Theile ist es am stärksten, im obern am schwächsten.

Wegen seiner größtentheils lockern Verbindung mit den Unterleibswänden giebt es einer Zerrung leicht nach, und verformt daher beim Herabsteigen der Hoden, bei Bräuen, in einer höhern oder geringern Strecke seine Stelle und seine Ordnung zu den benachbarten Theilen.

## 2. Aeußerer Theil des Bauchfelles.

## §. 2536.

Man kann an dem äußern Theile des Bauchfelles eine vordere, eine obere, eine hintere und eine untere Wand unterscheiden, welche bei weitem größtentheils mit ihrer äußern Fläche an die innere der Unterleibswände geheftet sind.

## 1. Vordere Wand.

## §. 2537.

Die vordere Wand bekleidet die hintere Fläche der weißen Linie, der gemeinschaftlichen vordern Sehne der breiten Bauchmuskeln und den vordern Abschnitt des fleischigen Theiles des queren Bauchmuskels. Sie ist locker an die weiße Linie, eng an die vordere Sehne, wieder locker an den fleischigen Theil des queren Bauchmuskels geheftet. In ihrem untern Theile ist sie bloß serös, in ihrem obern äußerlich mit einer deutlichen Lage starker querer, völlig von der Sehne des queren Bauchmuskels und der weißen Linie verschiedner Sehnenfasern, welche sich gegen den Nabel mit einem halbmondförmigen Rande endigen, bekleidet.

Von der Harnblase zum Nabel verlaufen an ihrer äußern Fläche der Harnstrang, und neben ihm die Ueberbleibsel der Nabelpulsadern, die, unten getrennt, in ihrem obern Theile zu einem Strange vereinigt sind, sie nach innen vor sich her drängen und dadurch Hervorragungen nach innen bilden, welche den Namen der Fortsätze des Bauchfelles (Processus peritoneaei) erhalten.

Von der innern Fläche der vordern Wand steigt von oben und rechts nach unten und links bis zum Nabel des Aufhängeband der Leber (Lig. hepatis suspensorium)

herab

erap, eine dreieckige, fächerförmige, ansehnliche Falte, welche mit ihrem hintern Rande von vorn nach hinten an die obere Fläche der Leber, hier den rechten vom linken Lappen scheidend, heftet, in deren unterm, freien Rande das runde Band der Leber (Lig. teres) vom Nabel zur Leber verläuft.

2. Obere Wand.

§. 2538.

Die obere Wand bekleidet die untere Fläche des Zwerchfells, an welche sie locker geheftet ist.

Gegen ihren hintern Rand wendet sich von ihr aus auf der rechten Seite das Bauchfell an die Leber, und bekleidet sie in ihrem ganzen Umfange nicht nur, sondern geht aus der Pforte, das aus der Leberpulsader, der Pfortader und dem Gallengange gebildete Gefäßbündel als eine Scheide umfließend, an den obern Theil des Zwölffingerdarms, und von dort aus in das kleine, und große Netz und das Quergrümmungsgefäß über.

Die sehr kurze Falte, welche sich zwischen dem stumpfen Rande der Leber und der obern Wand des Bauchfelles befindet, das Kranzband der Leber (Ligamentum hepatis coronarium).

Rechterseits liegt zwischen der Uebergangsstelle des stumpfen hintern Leberandes in den vordern und der Gränze der obern, hintern und vordern Wand des Bauchfelles, eine kleinere Falte, das rechte dreieckige Leberband (Lig. hepatis triangulare dextrum).

Eine ähnliche, aber beträchtlich größere, erstreckt sich von dem hintern Rande des kleinen Leberlappens und seiner Spitze



## a. Äußerer Theil des Bauchfelles.

## §. 2536.

Man kann an dem äußern Theile des Bauchfelles die vordere, eine obere, eine hintere und eine untere Wand unterscheiden, welche bei weitem größtentheils mit ihrer äußern Fläche an die innere der Unterleibswände geheftet sind.

## 1. Vordere Wand.

## §. 2537.

Die vordere Wand bekleidet die hintere Fläche der weißen Linie, der gemeinschaftlichen vordern Sehne der beiden Bauchmuskeln und den vordern Abschnitt des fleischigen Theils des queren Bauchmuskels. Sie ist locker an die weiße Linie, eng an die vordere Sehne, wieder locker an den fleischigen Theil des queren Bauchmuskels geheftet. In ihrem untern Theile ist sie bloß serös, in ihrem obern äußerlich mit einer deutlichen Lage starker querrer, völlig von der Sehne des queren Bauchmuskels und der weißen Linie verschiedner Sehnenfasern, welche sich gegen den Nabel mit einem halbmondförmigen Rande endigen, bekleidet.

Von der Harnblase zum Nabel verlaufen an ihrer äußern Fläche der Harnstrang, und neben ihm die Ueberbleibsel der Nabelpulsadern, die, unten getrennt, in ihrem obern Theile zu einem Strange vereinigt sind, sie nach innen vor sich her drängen und dadurch Hervorragungen nach innen bilden, welche den Namen der Fortsätze des Bauchfelles (Processus peritoneae) erhalten.

Von der innern Fläche der vordern Wand steigt nach oben und rechts nach unten und links bis zum Nabel der Aufhängeband der Leber (Lig. hepatis suspensorium) her.

obere Platte des Quergrimmdarmgekröses, einer ansehnlichen, breiten Falte, welche vorn den Quergrimmdarm in ihre beiden Blätter aufnimmt, und durch ihr unteres Blatt in den untern Theil der hintern Wand übergeht.

Dieser untere Theil steigt vor der Aorta, der Hohlvene und den Nieren, locker an sie geheftet, herab, schlägt sich von hier aus, auf der rechten und linken Seite gar keine, oder nur sehr kurze Falten bildend, über den auf- und absteigenden Theil des Grimmdarms, auf der rechten Seite von der Niere aus auch zum Zwölffingerdarm, dessen vorderer Theil dadurch bekleidet, so wie der ganze Zwölffingerdarm mit dem obern Ende des aufsteigenden Grimmdarmes eng zusammengehalten wird, und geht, nachdem er diese Theile überzogen hat, über den hintern Theil des queren Bauchmuskels in die vordere Wand über.

Nur der untere Theil des absteigenden Quergrimmdarms und der Anfang des Mastdarms bilden eine ansehnliche, auf dem mittlern Theile des runden Lendenmuskels, und dem obern des Heiligbeins liegende Falte.

In der Mitte der hintern Wand geht eine vierte Falte schief von oben und links nach unten, und rechts vom zweiten Lendenwirbel an herab, das Dünndarmgekröse (Mesenterium), welches, von seiner schmalen Wurzel aus beträchtlich ausgebreitet, den ganzen dünnen Darm, mit Ausnahme des Zwölffingerdarms umgiebt, unten in das Gekröse des aufsteigenden dicken Darmes übergeht, und eine kleine dreieckige Falte an den Wurmfortsatz, das Gekröse desselben, abschickt.

Nach oben setzt es sich in den mittlern Theil des Quergrimmdarmgekröses fort.

zur obern Wand, das linke dreieckige Leberband (Lig. hepatis triangulare sinistrum), welches nach vorn in das Aufhängeband der Leber übergeht.

An der Stelle, wo sich die Speiseröhre durch den Speiseröhrensclitz durch das Zwerchfell begiebt, befestigt sich von allen Seiten das Bauchfell an sie und den obern Theil des Magens. Die Falten welche dadurch entstehen, werden mit dem Namen des rechten und des linken Zwerchfell-Magenbandes (Lig. phrenico-gastricum dextrum et sinistrum) belegt. Das erstere geht in das kleine Netz, das letztere in das Aufhängeband der Milz über, welches weiter nach links zwischen dem obern Ende der Milz und dem hintern Rande der obern Wand des Bauchfells liegt.

Das Aufhängeband der Milz geht in das Magenmilzband über, welches sich vom Grunde des Magens zum Gefäßauschnitt der Milz erstreckt, und sich nach unten in das große Netz und das Quergrimm darmgefäß fortsetzt.

### 3. Hintere Wand.

§. 2539.

Die hintere Wand steigt von der obern, dem hintern stumpfen Rande der Leber, dem obern Magenmunde, dem linken, bei weitem größten Theile des obern Bogens des Magens, und dem obern Ende der Milz über den Leidentheil des Zwerchfelles herab, verläßt dann die hintere Wand der Unterleibshöhle, und schlägt sich an der vordern Fläche der Bauchspeicheldrüse und des Zwölffingerdarms, nur locker an sie an, heftet, weg. Von dem untern Rande der Bauchspeicheldrüse wendet sich das Bauchfell nach unten und vorn, und bildet die

verlaufen, die halbmondförmigen Falten (*Plicae semilunares*), begrenzt.

Diese Falten sind in dem Maaße kleiner, mithin jene Vertiefung von der übrigen Höhle des Bauchfelles weniger abgegränzt, je mehr der Mastdarm, die Harnblase oder die Gebärmutter ausgedehnt sind, indem das Bauchfell dann sich zur Bekleidung dieser Theile ausdehnt.

Beim weiblichen Geschlechte geht in dem kleinen Becken von der Seitenwand des Beckentheiles eine ansehnliche Verdopplung ab, welche sich unter dem Namen des breiten Mutterbandes (*Ligamentum uteriatum*), an den obern Theil der Scheide, die ganze Seitenwand der Gebärmutter, die Trompeten und die Eierstöcke heftet, die genannten Theile eng bekleidet, und die zu ihnen gehenden Gefäße und Nerven zwischen ihren beiden Blättern enthält.

Vorzüglich wichtig ist im Beckentheile des Bauchfelles die Gegend zwischen dem innern Ende des Hüftbeinkammes und der Schambeinfuge <sup>1)</sup>).

Es bildet hier zwei Vertiefungen, welche durch das Muskelband und den dasselbe umgebenden Bauchfellfortsatz abgetheilt werden, und den Namen der äußern, größern, obern, und der innern, kleinern, untern Leistengrube (*Fossae inguinales*) führen können. An der Stelle, wo der Leistenkanal seinen Anfang nimmt, findet sich gewöhnlich eine kleine Vertiefung im Bauchfelle, die oft mit

1) Hesselbach über den Urspr. der Leistenbr. Würzb. 1806, Ders. Urspr. und Fortschr. der Leisten- und Schenkelbrüche. Würzb. 1816.

R. Liston memoir on the formation and the connexions of the crural arch and on the parts concerned in inguinal and crural hernia. Edinburgh. 1819.

In dieser Stelle weichen die beiden Blätter dieser Falte aus einander, und nehmen den untern Theil des Zwölffingerdarms zwischen sich auf.

#### 4. Untere Wand.

§. 2540.

Als die untere Wand des äußern Theiles des Bauchfells kann man am besten den Abschnitt desselben ansehen, welcher dem Beckentheile der Unterleibshöhle entspricht, und ihn mit dem Namen des Beckentheiles belegen.

Auf der Seite ist es hier locker an die Hüftbeinmuskeln und den untern Theil der Bauchmuskeln, den Heber des Harns, das Heiligbeingeflecht, vorn an den innern Hüftbeinlocher, und die hintere Fläche der Harnblase geheftet. Hinten kleidet es gleichfalls locker den obern größern Theil des Heiligbeins, und schlägt sich nach innen über den obern größern Theil des Mastdarms.

Unten überzieht es in beiden Geschlechtern locker den innern Theil des Afterhebers.

Die vordere und hintere Hälfte dieser untern Wand des Bauchfells stoßen zwischen der Harnblase und dem Mastdarm so zusammen, daß der vordere beim Manne von dieser über die Samenblasen weg, ohne sie zu berühren, beim Weibe von der Harnblase zum obern Theile der Scheide und dem untern Theile der Gebärmutter, sie locker einschließend, nach hinten gelangt, und mit dem hintern, vom Mastdarm kommenden, zwischen diesem und dem genannten Theile eine mehr oder weniger ansehnliche Vertiefung bildet.

Diese wird auf beiden Seiten durch zwei Längenfalten, welche beim Manne von dem Mastdarm zu dem untern Theile der Blase, beim Weibe zum untern Theile der Gebärmutter

Die zwischen dem äußern Theile des Bauchfelles und dem arnkanal befindlichen Falten erhalten den Namen von Mesenterien (Mesenteria) <sup>1)</sup>.

Die zwischen dem äußern Theile des Bauchfelles und andern Theilen, namentlich dem Magen, der Leber, der Milz u. s. w. befindlichen, kürzern, mehr breiten Falten heißen Bänder des Bauchfelles (Ligamenta peritonaei), und werden theils von den Theilen, zwischen welchen sie sich finden, theils von ihrer Gestalt benannt. Sie sind schon größtentheils bei der Beschreibung des äußern Theiles angegeben, und die noch fehlenden werden in der Beschreibung der Leber angeführt werden.

Die von einem Eingeweide zum andern sich erstreckenden Falten sind die Netze (Omenta s. epiploa) <sup>2)</sup>.

Die nur von einem Eingeweide frei hängenden werden netzartige Anhänge (Appendices epiploicae) genannt.

Diese

1) J. S. Henninger de mesenterio. Argent. 1714. Rec. in Halleri coll. disp. T. I.

J. Fantoni de mesenterio, vasis chyloferis et lymphaticis. Diss. anat. renov. V.

Stock de statu mesenterii naturali et praeternaturali. Jenae. 1755.

M. Malpighi de omento, pinguedine et adiposis ductibus. Opp. omn. I. p. 227.

2) Henrici resp. Buchwald diss. sistens novam descript. et iconem omenti. Hafn. 1748. Rec. in Halleri coll. disp. T. VII.

A. de Haller omenti nova icon. Omenti secunda icon. In Icon. anat. Fasc. I. et Opp. min. T. I.

Reebmann de omento sano et morbo. Argent. 1755.

Petr. van Noemer de fabrica et usu omenti. L. B. 1764.

Gröricp neue Darstellung des Gefäßes und der Netze. Weimar. 1812.

Diese beiden letztern Falten unterscheiden sich von allen übrigen wesentlich durch äußerste Feinheit, so daß mehreren Anatomen daher sogar eine durchlöcherete Beschaffenheit derselben als Regel angesehen haben.

### 1. Gekröse.

§. 2542.

Am zweckmäßigsten fängt man die Betrachtung der Falten des Bauchfelles mit den Gekrösen und namentlich dem Dünndarmgekröse an.

#### a. Dünndarmgekröse.

§. 2543.

Das Dünndarmgekröse (Mesenterium) steigt von der linken Seite des Körpers des zweiten Lendenwirbels schräg nach unten und links herab, und endigt sich auf der rechten Hüft- und Heiligbeinverbindung.

Es besteht aus zwei Blättern, einem rechten und einem linken, welche in den zwei obern Dritttheilen des Gekröses anfangs durch den dritten, aufsteigenden Theil des Zwölffingerdarms von einander entfernt sind, jenseit desselben, so wie in dem untern Dritttheil sogleich, zusammentreten.

Der auf der Wirbelsäule sitzende hintere Rand des Dünndarmgekröses, die Wurzel (Radix mesenterii) ist bei weitem kürzer als der vordere Rand, durch welchen es sich an den Dünndarm so heftet, daß seine Blätter, so wie es den Dünndarm erreicht, aus einander weichen, und ihn in seinem ganzen Umfange eng einschließen.

Es nimmt von oben und unten gegen die Mitte allmählich beträchtlich an Breite zu, so daß seine größte Breite ungefähr vier Zoll beträgt.

Zweis

Zwischen den beiden, leicht trennbaren Blättern, aus denen es besteht, befindet sich Zellgewebe, Fett, die Gefäße, Arterien- und Milchgefäße, Lymphdrüsen und Nerven.

Am seinem obern Ende geht es in das Quergrimmdarmgefäß, am untern in das dreieckige Gefäß des Wurmfortsatzes, welches sich an den linken Theil des Umfangs desselben heftet, und mit seinem linken frei verläuft, und in das Gefäß des aufsteigenden Grimmdarms über.

### β. Grimmdarmgefäße.

#### §. 2544.

Der Grimmdarm ist nicht, wie der dünne Darm, ohne eine lange, ansehnliche Falte frei, sondern im größten Theile seiner Ausbreitung viel genauer und fester durch die Grimmdarmgefäße (Mesocola) an die hintere Wand des Unterleibes befestigt.

Nachdem die hintere Wand des Bauchfelles rechtsseitig im mittlern Theile des Zwölffingerdarmes bekleidet hat, wölbt sich über den aufsteigenden Theil des Grimmdarms, überzieht diesen in dem vordern, größern Theile seines Umfangs, ist aber, oder wenigstens nur selten im hintern, welcher das Rectum frei auf der vordern Fläche der Niere liegt. Auch wenn er ganz umkleidet wird, ist doch die Falte, welche ihn anheftet, sehr kurz.

Der Blinddarm ist meistens etwas freier an dem vordern Theile des Hüftbeinmuskels geheftet.

Oft gehen von seiner Spitze zwei nach links und unten gerichtete, dreieckige Falten ab, welche eine Vertiefung zwischen sich bilden, deren Grund durch den Hüftbeinmuskel und den Blind-



Blinddarm gebildet wird, in welche, vorzüglich wenn sie aussehnlich ist, leicht ein größeres oder kleineres Darmstück treten und eingeklemmt werden kann.

Das Quergrimmdarmgefäß (Mesocolon transversum), eine ununterbrochne Fortsetzung des aufsteigenden Grimmdarmgefäßes, ist eine ungefähr vier Zoll hohe, länglichviereckige Falte, welche sich in querer Richtung ungefähr durch die Mitte des Unterleibes von der rechten zur linken Seite erstreckt, und in der Mitte beträchtlich höher als auf beiden Seiten ist.

Es entsteht rechts vom Anfange des mittlern Theiles des Zwölffingerdarms, in der Mitte von der vordern Fläche der Bauchspeicheldrüse, oft auch vom rechten Theile der hintern Fläche des Magens, weiter links vom Ende des Zwölffingerdarmes, und heftet sich mit seinem vordern Rande an den Quergrimmdarm.

Da, wo es rechterseits niedrig auf dem Zwölffingerdarm anfängt, fließt es nach oben und nach unten mit dem Theile der hintern Wand des Bauchfelles zusammen, welche den Zwölffingerdarm von vorn bekleidet, und verbindet diesen und den Grimmdarm eng mit einander.

Weiter rechts verbindet sich sein oberes Blatt eng mit einem größern oder geringern Theile des großen Netzes, so daß vom Zwölffingerdarm an bis zu einem längern oder kürzern Abschnitt der rechten Hälfte des großen Bogens des Magens dadurch eine vierfache Platte entsteht, immer aber durch diese Vereinigung der rechten Ränder des großen Netzes und des Quergrimmdarmgefäßes hier der Sack, welchen beide zusammen bilden, verschlossen wird.

Es theilt die Hälfte des Bauchfelles unvollkommen in die obere, kleinere und eine untere, größere Hälfte ab.

Das absteigende Grimmdarmgefäß; eine unmitttelbare Fortsetzung des vorigen, ist in seinem obern Theile kreuzig, und umgiebt den absteigenden Grimmdarm gewöhnlich nicht ganz. Es entsteht vom obern Theile der vorderen Fläche der linken Niere, in der Mitte aber, wo es ansehnlicher ist, von dem vorderen Blatte der hintern Sehne des ersten Bauchmuskels, unten, wo es bei weitem am beträchtlichsten, oft so breit als das Quergrimmdarmgefäß ist, vom linken runden Leidenmuskel und der linken Hüft- und Heiligbeinverbindung.

Der Mastdarm wird in seinem obern kleinern Theile durch das kurze Mastdarmgefäß (Mesorectum) links an die vordere Fläche des Heiligbeines gefestigt.

2. Netz.

a. Großes Netz.

§. 2545.

Das große Netz erstreckt sich mit seinem obern Rande von dem untern Theile des Ausschnittes der Milz und dem untern Ende dieses Organs, mit dem Magen- und Milzbande sammenhängend;

2) von dem ganzen großen Bogen des Magens;

3) von dem Anfange des Zwölffingerdarmes herab, legt an den vorderen Theil des Umfangs des Quergrimmdarms, reicht vor dem Dünndarm gewöhnlich bis in das Becken ab, wo es sich mit einem freien Rande endigt.

Mit seinem rechten Rande geht es in das Quergrimmdarmgefäß über, mit dem linken heftet es sich an das untere Ende der Milz, das linke Ende der Bauchspeicheldrüse und des Quergrimmdarms, setzt sich in die hintere Wand des Bauchfelles fort.

β. Kleines Netz.

§. 2546.

Das kleine Netz (Omentum hepatico-gastricum) erstreckt sich von der Furche des venösen Ganges, dem linken Theile der Pforte und der Glisson'schen Kapsel zum kleinen Bogen des Magens vom linken bis zum rechten Magenmund, und hängt hier vor dem Spiegel'schen Lappen herab.

Beide Netze hängen durch den Theil des Bauchfells, welcher die vordere und hintere Fläche des Magens bekleidet, zusammen, und bilden daher mit dem Magen die vordere Wand eines Beutels, dessen untere Wand durch den Quergrimmdarm und das Quergrimmdarmgefäß, die hintere durch den obern Theil der hintern Wand des Bauchfelles dargestellt wird.

Der obere Theil dieses Beutels, welcher sich zwischen der Leber und dem kleinen Bogen des Magens befindet, hängt mit dem untern, zwischen diesem und dem Quergrimmdarm befindlichen, durch eine größere oder kleinere Oeffnung zusammen, welche sich zwischen der hintern Wand des Magens und der hintern Wand des Bauchfelles da befindet, wo der kleine Bogen des Magens gegen sein rechtes Ende nicht an die hintere Wand des Bauchfelles befestigt ist.

Der ganze Beutel, oder die Höhle der Netze, hängt durch das Winslow'sche Loch oder Schlig (Foramen Winslowii)

10 wii) mit der Höhle des Bauchfelles zusammen, eine länglichrunde Oeffnung, welche sich auf der rechten Seite des Unterleibes befindet, und rechterseits von der Pforte der Leber, nach vorn von dem Bündel, welches durch die Pfortader, Leberpulsader und den Gallengang gebildet wird, linkerseits durch den ersten Winkel des Zwölffingerdarms, unten durch die hintere Wand des Bauchfelles, welche hier die aufsteigende Hohlader bekleidet, begrenzt wird.

Zieht man die Leber und den Zwölffingerdarm von einander, und dadurch den Theil des Bauchfelles, welcher, vom obern Theile des Zwölffingerdarms zur Leber gehend, das oben erwähnte Gefäßbündel scheidenartig umhüllt von diesem, so entsteht dadurch eine mehr oder weniger breite, halbmondförmige, mit dem freien Rande nach unten gerichtete Falte, das Leber-Zwölffingerdarmband (Lig. hepato-duodenale).

Eine ähnliche, dieser entgegengewandte, kann man auch auf dieselbe Weise zwischen derselben Gegend des Zwölffingerdarms und dem obern Ende der rechten Niere bilden, die dann den Namen des Nieren-Zwölffingerdarmbandes (Lig. duodeno-renal) erhält.

Zwischen diesen beiden Falten befindet sich dann im strengsten Sinne das Winslow'sche Loch.

## 7. Netzförmige Anhänge.

### §. 2547.

Die netzförmigen Anhänge (Appendices epiploicae) sind kurze, länglichrundliche, mehr oder weniger breite, in fetten Körpern mit Fett, in magern mit einer gallertähn-

Et 2

lichen

Mit seinem rechten Rande geht es in das Quergrimmdarmgefäß über, mit dem linken heftet es sich an das untere Ende der Milz, das linke Ende der Bauchspeicheldrüse und des Quergrimmdarms, setzt sich in die hintere Wand des Bauchfelles fort.

β. Kleines Netz.

§. 2546.

Das kleine Netz (Omentum hepatico-gastricum) erstreckt sich von der Furche des venösen Ganges, dem linken Theile der Pforte und der Glisson'schen Kapsel zum kleinen Bogen des Magens vom linken bis zum rechten Magenrande, und hängt hier vor dem Spigel'schen Lappen herab.

Beide Netze hängen durch den Theil des Bauchfelles, welcher die vordere und hintere Fläche des Magens bekleidet, zusammen, und bilden daher mit dem Magen die vordere Wand eines Beutels, dessen untere Wand durch den Quergrimmdarm und das Quergrimmdarmgefäß, die hintere durch den oberen Theil der hintern Wand des Bauchfelles dargestellt wird.

Der obere Theil dieses Beutels, welcher sich zwischen der Leber und dem kleinen Bogen des Magens befindet, hängt mit dem untern, zwischen diesem und dem Quergrimmdarm befestigten, durch eine größere oder kleinere Oeffnung zusammen, welche sich zwischen der hintern Wand des Magens und der hintern Wand des Bauchfelles da befindet, wo der kleine Bogen des Magens gegen sein rechtes Ende nicht an die hintere Wand des Bauchfelles befestigt ist.

Der ganze Beutel, oder die Höhle der Netze, hängt mit dem Winslow'schen Loch oder Schlitze (Foramen Winslowi) zusammen.

b) Sie erstreckt sich bis zum dritten Embryomonat durch eine Verlängerung, welche im geraden Verhältniß zur Jugend des Embryo größer und länger ist, und einen Theil des Darmkanals enthält, mit den Nabel- und Nabelgefäßgefäßen in die, durch die innerste Eihaut gebildete Nabelscheide, und diese ist daher jetzt in der That ein Theil der Unterleibshöhle. Der vorliegende Theil ist von einer Verlängerung des Bauchfelles umgeben, welche gleichmäßig mit den vorliegenden Eingeweiden zurücktritt.

Schon beim dreimonatlichen Fötus geht die vordere Wand des Bauchfells über die Nabelöffnung, durch welche die Nabelgefäße und der Harnstrang aus- und eintreten, glatt und gerade, ohne einen Vorsprung durch sie in den Nabelstrang zu bilden, weg.

Anfänglich nimmt man keine auffallende Verschiedenheit zwischen den allgemeinen Bedeckungen und der Nabelscheide wahr; allein mit steigender Ausbildung der Haut entwickelt sich diese. Beim reifen Fötus wird daher die Wurzel des Nabelstranges durch einen cylindrischen, ungefähr vier Linien hohen, gewöhnlich auf der rechten Seite längern und deutlicher von der Nabelscheide abgesetzten \*) Hautfortsatz umgeben, der an seiner innern Fläche durch Fasern von der weißen Linie verstärkt wird.

Der Nabelring ist natürlich in demselben Verhältniß weiter als der Embryo jünger ist. Allmählich verengt er sich und umschließt beim reifen Fötus die Nabelgefäße genau. Vorzüglich eng ist der untere Theil desselben mit den Nabelpulsadern durch kurzes, festes, weniger genau der obere, nur durch

Et 3

locker

\*) Edmerring über Nabelbrüche. Frankfurt 1811. S. 7.

lichen röhrliehen Feuchtigkeit angefüllte Verlängerungen der Bauchfellhaut des dicken Darmes, welche vorzüglich von den vordern Theile des Umfangs desselben entspringen.

Sie kommen am ganzen Grimmdarm vor, sind aber nicht in allen Theilen desselben genau nach demselben Typus geordnet.

Immer tritt ein ansehnlicher Gefäßzweig aus dem Gefäße des dicken Darmes in sie.

Meistentheils stehen sie in zwei Reihen.

Im untern Theile des absteigenden Grimmdarmes liegen diese am äußern und innern Theile des Umfangs des Darmes, im queren am untern, im absteigenden am innern und vordern.

Hier liegt die eine, größere Reihe dem Darmkreise des Gefäßes weit näher als am aufsteigenden Grimmdarmkreise.

Am aufsteigenden Grimmdarm senken sich die äußern und innern Zweige der Gefäßgefäße in sie, an den übrigen Theilen desselben entstehen ihre Gefäße nur von den untern und innern Zweigen der Darmgefäße.

Stellenweise bilden auch in der Nähe des Darmes im Grimmdarmkreise völlig ähnliche, nach innen und mitragende Verlängerungen.

## B. Periodische Verschiedenheiten.

### 1. Regelmäßige und Allgemeine.

#### §. 2548.

a) Die Unterleibshöhle ist in den frühern Lebensperioden verhältnismäßig zur Brusthöhle bedeutend größer als in vollendeter Ausbildung, ihr Beckentheil aber beträchtlich kleiner.

b) Es

Das große Netz erscheint im zweiten Embryomonat, und ist bis zum vierten bloß eine, nicht mit dem Quergrimm-darm verbundene Verlängerung der Bauchfellhaut des Magens.

Die netzförmigen Anhänge des Dickdarms erscheinen im fünften Embryomonat.

## 2. Zufällige.

### §. 2549.

Die Bauchhöhle wird in der Schwangerschaft beträchtlich ausgedehnt, kehrt aber nach der Niederkunft fast ganz auf ihren normalen Umfang zurück, so daß ich, übereinstimmend mit Edmerring<sup>1)</sup>, auch am Nabel, selbst bei Mehrgebärenden, keine bedeutende Verschiedenheit finden konnte. Dagegen bleiben, wegen geringern Zusammenziehungsvermögens der Haut, in den allgemeinen Bedeckungen des Unterleibes Runzeln zurück, welche im jungfräulichen Zustande nicht vorhanden sind.

## C. Geschlechtsverschiedenheiten.

### §. 2550.

Die männliche Bauchhöhle ist verhältnismäßig zur Brusthöhle kleiner als die weibliche, die länger, oben zwar enger, aber in ihrem untern oder Beckentheile viel weiter ist. Damit hängt die tiefere Lage des Nabels beim männlichen, als beim weiblichen Geschlechte zusammen. Eine äußere Verschiedenheit bietet die Anordnung der Schamhaare dar, sofern diese beim Weibe plötzlich abgeschnitten sind, und sich nur bis zur Mitte der Entfernung zwischen dem Nabel und der Schambeinfuge erstrecken, beim Manne dagegen allmählich zugespitzt bis zum Nabel reichen.

Et 4

II. K.

1) H. a. D. S. 25.



lockeres Schleimgewebe mit der Nabelblutader verbunden. Schon beim reifen Fötus ist der Nabelring von völlig ausgebildeten starken Sehnenfasern umgeben, während die weiße Linie noch in jeder Hinsicht unentwickelt, verhältnismäßig schmaler, kürzer und nicht aus deutlichen Sehnenfasern gebildet ist.

Nach der Geburt stirbt zunächst der mit dem Kinde in Verbindung gelassene Theil des Nabelstranges, so weit er von der Nabelscheide bedeckt ist, ab. An der Stelle des Hervortragens des Hautcylinders entsteht eine vertiefte Narbe, der Nabel (Umbilicus), die vorzüglich deshalb als eine Vertiefung erscheint, weil jetzt die vorher durch die Nabelgefäße und die Wharton'sche Sulze bewirkte Ausdehnung wegfällt. Außerdem geschieht diese Vertiefung auch nach dem allgemeinen Gesetze, daß bei Hautnarben mehr oder weniger Zusammenziehung Statt findet, und wird durch das Zurücksinken der Nabelgefäße unterstützt. Später nimmt die Vertiefung in demselben Verhältnisse zu, als im Umfange Fett abgesetzt wird, sofern sich dieses in der Nabelnarbe nicht bildet.

Der Nabelring und das Bauchfell verwachsen allmählich mit dem Schleimgewebe und der ihn bedeckenden Haut sehr fest. Die Veränderungen der Nabelgefäße werden in der Geschichte der Bildung des Fötus angegeben.

c) Das Bauchfell bildet beim männlichen sowohl als weiblichen Fötus eine andre blinde Verlängerung (Diverticulum Nuckii), welche sich durch den Leistenkanal und den Bauchring erstreckt, beim erstern mit der Entwicklung der Hoden in Beziehung steht, beim letztern zwar dieselbe Bedeutung hat, aber, weil kein Organ in dieselbe tritt, weit enger und kürzer ist, und oft schon vor Ablauf des letzten Fötusmonates verschwindet.

Del

Das große Netz erscheint im zweiten Embryomonat, und ist bis zum vierten bloß eine, nicht mit dem Quergrimmdarm verbundene Verlängerung der Bauchfellhaut des Magens.

Die netzförmigen Anhänge des Dickdarms erscheinen im fünften Embryomonat.

#### 2. Zufällige.

##### §. 2549.

Die Bauchhöhle wird in der Schwangerschaft beträchtlich ausgedehnt; kehrt aber nach der Niederkunft fast ganz auf ihren normalen Umfang zurück, so daß ich, übereinstimmend mit Sommering<sup>1)</sup>, auch am Nabel, selbst bei Mehrgeburten, keine bedeutende Verschiedenheit finden konnte. Das gegen bleiben, wegen geringern Zusammenziehungsvermögens der Haut, in den allgemeinen Bedeckungen des Unterleibes Runzeln zurück, welche im jungfräulichen Zustande nicht vorhanden sind.

#### C. Geschlechtsverschiedenheiten.

##### §. 2550.

Die männliche Bauchhöhle ist verhältnismäßig zur Brusthöhle kleiner als die weibliche, die länger, oben zwar enger, aber in ihrem untern oder Beckentheile viel weiter ist. Damit hängt die tiefere Lage des Nabels beim männlichen, als beim weiblichen Geschlechte zusammen. Eine äußere Verschiedenheit bietet die Anordnung der Schamhaare dar, sofern diese beim Weibe plötzlich abgeschnitten sind, und sich nur bis zur Mitte der Entfernung zwischen dem Nabel und der Scham beifügen erstrecken, beim Manne dagegen allmählich zugespitzt bis zum Nabel reichen.

Et 4

II. Net

1) H. a. D. S. 25.

## II. Regelwidriger Zustand.

## A. Abweichungen der Form.

## §. 255 I.

a) Größe. Die Unterleibshöhle ist bei unvollkommener Ausbildung der obern Körperhälfte, bei wahrer Kopflosgkeit nach oben mehr oder weniger unvollkommen entwickelt, so daß bisweilen nur der Beckentheil vorhanden ist, auch außerdem bisweilen regelwidrig klein.

Auf entgegengesetzte Weise wird durch Geschwülste, Anhäufung von Feuchtigkeit u. s. w. die Unterleibshöhle bisweilen ungeheuer ausgedehnt.

b) Durch Krümmung der Wirbelsäule, welche zwar bisweilen, aber doch sehr selten, Fehler der ersten Bildung ist, wird natürlich mehr oder weniger die Gestalt der Unterleibshöhle und damit die Lage der darin enthaltenen Theile regelwidrig abgeändert.

c) Zusammenhang. Nicht selten weicht sie durch Beharren auf einer frühern Bildungsstufe insofern von der Regel ab, als sich die anfänglich vorhandenen Oeffnungen und Verlängerungen in ihrer vordern und untern Gegend in einer längern oder kürzern Strecke nicht verschließen, wovon dann der angeborne Nabelbruch, und regelwidriger Zusammenhang zwischen der Höhle des Bauchfelles und der Scheidenhaut des Hoden, die zur Entstehung des angebornen Bruches Gelegenheit giebt, die Folge ist.

Nicht selten weicht der Zusammenhang der Unterleibswände mit den darin enthaltenen Theilen, namentlich des äußern und innern Theiles des Bauchfelles, von der Regel ab.

b. Dieser regelwidrige Zustand ist bisweilen, aber selten, Fehler der ersten Bildung, meistens entsteht er später.

Der regelwidrig vermehrte Zusammenhang ist weit häufiger, gewöhnlich Folge vorangegangener Entzündung der Bauchfellhaut, und wird durch Auschwizung bewirkt. Bisweilen sind hierdurch selbst alle im Bauchfell enthaltenen Theile zu einer Masse verschmolzen, daß sie nur unvollkommen genannt werden können. Gewöhnlicher verwachsen nur einzelne Stellen.

Der sehr seltne, regelwidrig verminderte Zusammenhang ist gewöhnlich Fehler der ersten Bildung. Findet der regelwidrig vermehrte Zusammenhang so Statt, daß dadurch ein Theil mit einem andern brückenartig verbunden wird, so können dieselben Folgen für die Unterleibshöhle entstehen, welche Trennung des Zusammenhanges unter bestimmten Bedingungen hervorbringt, indem auch so eine Oeffnung entsteht. Hieran wird am besten unter der folgenden Abtheilung in der Lehre von den innern Brüchen gehandelt werden.

a) Ortsverhältniß der Unterleibseingeweide. Das Ortsverhältniß der Unterleibseingeweide weicht nicht selten von der Regel ab. Die meisten Fälle dieser Art gehören in die Klasse der Brüche (Hernia)<sup>1)</sup>. Mit diesem Namen wird die regelwidrige Lage eines Eingeweides belegt, wobei dasselbe außerhalb der Höhle, in welcher es sich der Regel nach befindet, vorkommt, oder sich in eine, meistens regelwidrig bestehende

Et 5

hende

1) Sowohl für die pathologisch anatomische Darstellung als die Literatur der Lehre von den Brüchen glaube ich auf meine pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 1. S. 358 — 484. verweisen zu dürfen.

hende Abtheilung der Höhle begiebt, in welcher es enthalten ist.

Die erstern sind äußere, die letztern innere Brüche.

#### 1. Äußere Brüche.

§. 2552.

Die wichtigsten Momente der Geschichte der Brüche sind 1) das Verhältniß der durch ihre Lage abweichenden Theile zu den Bedeckungen; 2) die Beschaffenheit und die Veränderungen der vorliegenden Theile; 3) die Stellen, an welchen der Bruch sich ereignet und die speciellen Bedingungen, welche eine jede Bruchart in der ersten und zweiten Hinsicht darbietet.

a) Beschaffenheit der Hüllen. Außer der Integrität der allgemeinen Bedeckungen, welche anfangs beinahe bei einem jeden Bruche Statt findet, ist die Anwesenheit eines durch das verlängerte Bauchfell gebildeten Bruchsackes die allgemeine Bedingung, welche der Bruch darzubieten pflegt.

Indessen unterscheiden sich die innern Brüche in dieser Hinsicht von den äußern, sofern die durch eine regelwidrige, in der Höhle des Unterleibes befindliche Oeffnung gedruckenen Theile von keinem Bruchsack umgeben sind. Doch fehlt dieser auch bisweilen den äußern Brüchen entweder ursprünglich, oder später, indem im erstern Falle das Bauchfell zerriß, im letztern durch Druck, Verschwärung, Brand, zerstört wurde.

Durch Zerreißung fehlt der Bruchsack vorzüglich beim Zwerchfellsbruche.

Auf entgegengesetzte Weise verdickt und verhärtet sich das Bauchfell und das Zellgewebe, wodurch es äußerlich bekleidet wird, oft allmählich, selbst sehr beträchtlich, vorzüglich am

Ein

**Eingänge oder Pässe des Bruchsackes, besonders in Folge eines lange angewandten Druckes.**

Auch entstehen, in Folge von Entzündungen, nicht selten Verlängerungen von einem Theile des Bruchsackumfangs zum andern.

b) Beschaffenheit der den Bruch bildenden Unterleibstheile. Hier sind α) die Qualität; β) der Zustand; γ) die Ortsverhältnisse dieser Theile zum Bruchsacke zu betrachten.

α) Am gewöhnlichsten wird der Bruch durch einen Theil des dünnen Darmes oder des Reges gebildet, seltner durch einen Theil des dicken, seltner durch die Leber, noch weit seltner durch Theile des Harnsystems oder der Geschlechtswerkzeuge. Indessen giebt es mehrere Beobachtungen von Brüchen der Gebärmutter, der Eierstöcke, Trompeten und Harnblase. Bei einem Darmbruch liegt gewöhnlich der ganze Umfang, seltner nur ein Theil des Rohres vor, der kleine Bruch.

β) Die vorgesehnen Theile weichen entweder nur durch ihre Lage, oder auch durch den Zustand ihrer Lebensthätigkeit und ihr Gewebe von der Regel ab. Das letztere tritt vorzüglich dann ein, wenn durch ein Mißverhältniß zwischen der Höhle des Bruchsackes und dem vorliegenden Theile dieser gedrückt, eingeklemmt, dadurch entzündet, und, wenn das Mißverhältniß bleibt, brandig wird. Unter letzterer Verbindung trennt sich der vorliegende Theil von dem in der Bauchhöhle enthaltenen, und es entsteht daher in dem Darme, wenn dieser den Bruch bildet, eine Oeffnung, ein widernatürlicher After. Selbst sehr bedeutende Strecken des ganzen Darmrohres können auf diese Weise verloren gehen, ohne daß

Roth:

Kotherguß in die Unterleibshöhle erfolgte, oder die Verschließung des künstlichen After's unmöglich wäre, indem sich im ganzen Umfange der durch das Absterben entstehenden Oeffnung Luftstoff ergießt und sie erst gegen die Höhle des Bauchfells, später nach außen verschließt, ohne daß sich unter irgend einer Bedingung das obere und untere Darmstück unmittelbar verbänden.

7) Die vorliegenden Theile sind anfangs mit dem Bruchsaack gewöhnlich nicht verbunden, die Hülle ausgenommen, wie z. B. bei den Brüchen des ab- oder aufsteigenden Dickdarmes, der vortretende Theil mit einem Theil des Bruchsaackes ursprünglich verbunden ist. Später verwachsen aber, in Folge der die Entzündungen selber Häute schnell begleitenden Anschwellung, die selber Haut des Bruchsaackes und des vorliegenden Eingeweides mehr oder weniger fest, der angewachsene Bruch.

c) Es giebt vorzüglich gewisse Gegenden des Unterleibes, an welchen sich vorzugsweise Brüche ereignen. Vorzüglich sind dies abhängige und durch ihren Bau schwache Stellen. Am häufigsten sind Leisten- und Schenkelbrüche, welchen die erstern durch den Bauchring, die letztern unter dem Schenkelbogen Statt finden. Die Leistenbrüche werden Hodensackbrüche, wenn die Eingeweide bis in den Hodensack herabtreten. Jene kommen beim männlichen, diese beim weiblichen Geschlechte verhältnismäßig häufiger vor. Ihnen zunächst stehen die Nabelbrüche, dann folgen die Bauchbrüche, diesen die Brüche durch das eirunde Loch, hierauf die Zwerchfellsbrüche, zuletzt die Brüche durch den Hüftausschnitt und die Lendenbrüche.

1) Leis

1) Leistenbruch. Beim Leistenbruche treten die Eingeweide zwar immer durch den Bauchring, nehmen aber, bis zu ihm gelangen, nicht immer denselben Weg. Der äußere, schiefe Leistenbruch, der bei weitem gewöhnlichere, tritt durch den Leistenkanal hervor, und hat daher anfangs eine schiefe Richtung; der innere, gerade Leistenbruch dagegen nimmt seinen Weg gerade von oben nach unten am Bauchringe, nach innen von der ehemaligen Nabelpulsader, und durchbohrt oder dehnt den untern Theil der innern seitlichen Bauchmuskeln vor sich aus. Daher Verschiedenheiten der Hüllen und der Verhältnisse des Bruches zu den benachbarten Theilen.

Der äußere Leistenbruch ist in allen Hüllen des Samenstranges, mithin dem Hodenmuskel und der gemeinschaftlichen Scheidenhaut des Samenstranges und des Hoden enthalten.

Der Samenstrang liegt hinter dem Bruche, mit dem er dieselbe Richtung hat. Die Bauchdeckenpulsader schlägt sich unter dem Bruche nach innen und oben. Der Bruch hat, wenigstens anfangs, eine längliche Gestalt.

Der innere Leistenbruch wird gewöhnlich nicht von dem Hodenmuskel und der Scheidenhaut, sondern bloß von dem Zellgewebe des Hodensackes umgeben, liegt nach innen von dem Samenstrange, nicht vor, bisweilen selbst hinter demselben, die Bauchdeckenpulsader steigt an seiner äußern Seite empor, hat eine rundlichere Gestalt.

Indessen sind die angegebenen Verschiedenheiten, wenn sie leicht im Allgemeinen Statt finden, doch Ausnahmen unterworfen. So verlief in einem Falle der Hodenmuskel deutlich an



an der vordern Fläche eines innern Leistenbruches <sup>1)</sup>, in einem andern ging der Samenstrang quer vor dem Halse eines innern Leistenbruches weg an die innere, darauf an die hintere Seite desselben <sup>2)</sup>, in einem dritten stieg die Bauchdeckenpulsader an der innern Seite empor <sup>3)</sup>.

Eine Unterart des äußern Leistenbruches ist der angeborene (*H. congenita*), wobei die Eingeweide in dem nicht verschlossenen Bauchfellsfortsatz, also mit dem Hoden in derselben Höhle, bisweilen schon vorher mit ihm verwachsen, hervorstreigen. Eine diesem verwandte Art des äußern Leistenbruches ist die, welche man kürzlich unter dem Namen des kindlichen (*H. infantilis*) beschrieben hat, wobei der Bruch in die Scheidenhautröhre tritt. Dieser Bruch kann wieder eine doppelte Verschiedenheit darbieten, indem entweder die Scheidenhautröhre in ihrem ganzen Verlauf, sowohl gegen den Hoden als gegen die Unterleibshöhle hin, oder nur nach einer von beiden Richtungen, offen ist. Im erstern Falle ist der Bruchsack nicht, wie beim angeborenen Bruche der darin enthaltne Theil mit dem Hoden in Berührung; im zweiten ist, wenn die Scheidenhautröhre nach oben offen ist, der Bruch in einem zweiten, durch sie gebildeten Sacke, wie bei einem jeden Bruche der in Bruchsack befindliche Theil in diesem enthalten; ist dagegen hier die Scheidenhautröhre nach oben verschlossen, so ist der Bruchsack ebenfalls, aber auf eine noch zusammengesetzte Weise, in dem obern Theile der Scheidenhaut befindlich, sofern

dieser

1) Todd on Hernia. Dublin Hospital Reports. Dublin. 1817. Vol. 1. p. 251.

2) Ebendasselbst.

3) Hesselbach Leisten- und Schenkelbrüche. Würzburg. 1815. S. 45.

fer eine doppelte Hülle für ihn bildet, eine äußere und eine innere.

Die äußere verhält sich wie im zweiten Falle, und die Scheidenhautröhre ist hier durchaus nicht in ihren Ortsverhältnissen geändert, die innere dagegen ist ihr, durch den Bruch herabgedrängter und umgeschlagener oberster Theil, weshalb in diesen Falle der Bruchsaack äußerlich glatt ist. Unter allen diesen Bedingungen ist natürlich die Zahl der Hüllen des Bruches vermehrt, und er ist wirklich mit einem doppelten Bruchsaack versehen. Im ersten Falle kann dieser Bruch mit einem gleichnlichen angeborenen zusammengesetzt, und auch im zweiten können zwei Brüche vereinigt seyn \*).

Der Leistenbruch ist beim Manne weit häufiger als beim Weibe, weil der Bauchring dort größer als hier ist, und der Scheidenfortsatz sich länger offen erhält.

2) Der Schenkelbruch tritt unter dem Schenkelbogen hervor, ist rundlich, liegt im Allgemeinen nach innen von den Hüftgefäßen, vor der Bauchdeckenpulsader, gewöhnlich vor der Hüftbeinlochpulsader, selbst wenn diese aus der Bauchdeckenpulsader entspringt, bisweilen indessen hinter dieselben, mit seinem Halse beim Manne dicht unter dem obern Rande des Samenstranges, beim Weibe unter dem untern Rande des Mutterbandes. Er ist beim Weibe wegen größerer Entfernung des vordern Endes des Hüftbeinlammes von der Schambeinfuge häufiger als beim Manne.

3) Der

---

\*) Ich habe diesen Gegenstand hier etwas genauer betrachtet, weil auch das, was seit meinen Bemerkungen zu Hey's Ansicht (Path. Anat. Bd. 1. Abth. 2. S. 416.) Todd (a. a. O. S. 232 — 244) darüber gesagt hat, den Gegenstand hinsichtlich der Verschiedenheit der nahe verwandten Zustände nicht völlig zu erschöpfen schien.

3) Der Nabelbruch tritt entweder durch den Nabelring, oder in der Nähe desselben durch eine Spalte in der weißen Linie hervor, das erstere gewöhnlich, wenn er angeboren und ein Stehenbleiben auf einer frühern Bildungsstufe ist, das letztere, wenn er durch Zufall entsteht. Er hat oft eine rundliche, sehr selten eine längliche Gestalt.

4) Bauchbrüche ereignen sich vorzüglich in der Oberbauchgegend und in der Leistengegend im Umfange des Bauchringes.

5) Der Bruch durch das eirunde Loch <sup>2)</sup> nimmt seinen Weg durch die im obern und äußern Theile des Hüftbeinloches befindliche Lücke, und liegt vor den Hüftbeinlochsfasern und Nerven, sehr in der Tiefe, unter und hinter den Anziehern des Oberschenkels. Er kommt vorzüglich beim weiblichen Geschlechte, meistens mit andern zusammengesetzt, vor.

6) Der Zwerchfellsbruch <sup>2)</sup> ereignet sich an sehr verschiedenen Stellen dieses Muskels, und ist, häufiger als irgend eine Art des Bruches, ohne Bruchsacl. Er ist weit öfter angeboren als erworben, unstreitig, weil zu seiner Entstehung eine sehr große Gewalt gehört, da die Eingeweide der Richtung der Schwere entgegen aus ihrem ursprünglichen Sitze wandern.

7 und 8) Der Bruch durch den Sitzbeinausschnitt und der Lendenbruch sind äußerst selten. Beim letztern fehlt das Bauchfell und er wird gewöhnlich durch die Nerven gebildet.

2. Th.

1) Buhle de hernia obturatoria. Halae. 1819.

2) Zwanziger de hernia diaphragmatica. Halae. 1819.

1. Innere Brüche.

§. 2553.

Innere Brüche werden durch regelwidrige Deffnungen oder blinde Vertiefungen veranlaßt, welche in der Höhle des Unterleibes vorkommen.

a) Die regelwidrigen Deffnungen finden sich entweder in dem normal vorhandnen innern Theile des Bauches, oder sie entstehen durch brückenartige Verwachsung ursprünglich getrennter Theile.

Die ersten, seltneren Deffnungen kommen am gewöhnlichsten im Gefröße vor<sup>2)</sup>.

Die letztern können sich an jeder Stelle ereignen. Ich habe die meisten in Leichen gefunden und aufbewahrt, namentlich brückenartige Verwachsungen:

- a) zwischen mehreren Darmstücken;
- β) dem Dünndarm und dem vordern Leberande;
- γ) der obern Leberfläche und der obern Wand des Bauches;
- δ) der Spitze eines Krummdarmanhanges, vorzüglich mittelst des, an derselben noch befindlichen, durch die nicht ganz verschwundnen Nabelgefäßgefäße gebildeten Fadens<sup>3)</sup>;
- ε) des

1) Meyer de strangulationibus intestinorum in cavo abdominis. Argentor. 1776.

2) Fälle bei Heuermann chir. Operat. I. S. 627. Saucerotte Mém. de l'acad. de chir. T. IV. p. 239.

Monro anat. of the gullet. p. 537.

3) Fälle bei van Döveren Annöt. acad. V. bei Monro a. a. D. Taf. 20. S. 538.

3) Der Nabelbruch tritt entweder durch den Nabelring, oder in der Nähe desselben durch eine Spalte in der weißen Linie hervor, das erstere gewöhnlich, wenn er angeboren und ein Stehenbleiben auf einer frühern Bildungsstufe ist, das letztere, wenn er durch Zufall entsteht. Er hat eine rundliche, sehr selten eine längliche Gestalt.

4) Bauchbrüche ereignen sich vorzüglich in der Oberbauchgegend und in der Leistengegend im Umfange des Bauchringes.

5) Der Bruch durch das eirunde Loch<sup>1)</sup> nimmt seinen Weg durch die im obern und äußern Theile des Beckens befindliche Lücke, und liegt vor den Hüftbeinhaken und Nerven, sehr in der Tiefe, unter und hinter der Anziehern des Oberschenkels. Er kommt vorzüglich beim männlichen Geschlechte, meistens mit andern zusammenge setzt, vor.

6) Der Zwerchfellsbruch<sup>2)</sup> ereignet sich an sehr verschiednen Stellen dieses Muskels, und ist, häufiger als irgend eine Art des Bruches, ohne Bruchsacl. Er ist weit öfter angeboren als erworben, unstreitig, weil zu seiner Entstehung eine sehr große Gewalt gehört, da die Eingeweide der Schwere entgegen aus ihrem ursprünglichen Sitze wandern.

7 und 8) Der Bruch durch den Sitzbeinausschnitt und der Lendenbruch sind äußerst selten. Beim letztern fehlt das Bauchfell und er wird gewöhnlich durch die Knochen gebildet.

1) Buhle de hernia obturatoria. Halae. 1819.

2) Zwanziger de hernia diaphragmatica. Halae. 1819.

häufig, besonders in der vordern, dann umgekehrten, Wand der Scheide vor <sup>1)</sup>. (Blasenvorfall, Procidencia vesicae).

Natürlich können die durch eine Oeffnung oder in eine Vertiefung gedruckten Theile dieselben Veränderungen als in einem äußern Bruche erleiden.

### B. Abweichungen des Gewebes.

#### §. 2554.

1. Vorzüglich sind hier die Abweichungen des Gewebes zu betrachten, welche das Bauchfell <sup>2)</sup> darbietet, und die es mit den übrigen serösen Häuten gemein hat.

Es ist sehr häufig in größern oder geringern Strecken Sitz der Entzündung, welche mehr oder weniger beträchtliche und feste Verwachsungen begründet. Eine andre Folge derselben ist die, oft sehr beträchtliche, mehrere Linien tragende Verdickung und Verhärtung des äußern und innern Bauchfelles, namentlich der Rege. Diese tritt vorzüglich bei lange dauernder Entzündung ein. Analog ist es, gleichfalls der chronischen Entzündung des Bauchfells fast eine, Bildung einer beträchtlichen Menge kleiner, frieseelartiger Absonderungen an seiner innern Fläche.

U u 2

Vor

1) Clarke Diseases of females. Tab. 4.

2) J. G. Walter de morbis peritonaei. Berol. 1787.

Goelicke de mesenterii affectibus. Hal. 1742.

Stock (oben S. 653.)

Reebmann (oben S. 653.)

Halder de morbis omenti. Gott. 1786.

A. Portal Observations sur les tumeurs et engorgemens de l'épiploon. Mém. sur plusieurs maladies. T. I. 1800. p. 67.

Vorzüglich häufig ist die Unterleibshöhle Sitz der Wassersucht (Bauchwassersucht, Ascites). Am gewöhnlichsten findet sich das Wasser in der ganzen Höhle; in seltenen Fällen dagegen nur in der Höhle der Niere.<sup>1)</sup>

Bisweilen entwickeln sich, auch bei nicht fetten Menschen, beträchtliche Fettmassen an der innern Fläche des Bauchfelles; Vorzüglich ist das große Netz zu sehr beträchtlichen Fettanhäufungen geneigt, so daß das Gewicht dadurch bis auf dreißig Pfund vermehrt wurde<sup>2)</sup>.

Verhärtungen kommen selten an der äußern Fläche des Bauchfelles, stellenweise aber sehr häufig in seinem innern Theile, namentlich an der äußern Fläche der Niere vor. Bisweilen ist das Netz auf diese Weise umgewandelt<sup>3)</sup>.

Selten erzeugen sich auch an der innern Fläche des Bauchfelles rundliche, den Gekrümten ähnliche, sich von ihrer Befestigung leicht trennende, dann freiliegende Knorpel- und Knochenmassen.

Seltner bilden sich Haare im Netz.

An der innern sowohl als der äußern Fläche des Bauchfelles, eben so in den Nieren, kommen nicht ganz selten seröse Bälge und mehr oder weniger große Anhäufungen von Hydatiden vor, welche unter der erstern Bedingung sich bisweilen gleichfalls von ihren Befestigungen trennen<sup>3)</sup>.

Auch sind sowohl das äußere, als, und dies häufiger, das innere Bauchfell, besonders die Gefäße und die Niere,

nicht

1) Portal anat. méd. T. V. p. 127.

2) Mongin sur la petrification de l'épiploon. Paris. 1735.

3) Desbas de hydropie peritoneae. Lacæato. Gotting. 1761.

nicht selten der Sitz regelwidriger Gebilde, welche als weißliche, mehr oder weniger feste Substanzen erscheinen, unter dem Namen von Speckgeschwülsten, Breigeschwülsten u. s. m. beschrieben werden, und ihm bisweilen ein noch größeres Gewicht als das oben erwähnte geben.

Durch Zerreißen in der Bauchhöhle befindlicher Behälter gelangt Galle, Blut, Inhalt des Darms, der Harn u. s. w. in die Höhle desselben.

Luft, welche bisweilen die Höhle des Bauchfelles, oder auch bloß die Niere anfüllt, kommt bisweilen, aber vermuthlich nicht immer auf demselben Wege, in sie, indem sie sich in der That, wenn gleich selten, durch Abänderung der Thätigkeit der ausathmenden Gefäße zu erzeugen scheint.



## Siebentes Buch.

## Von der

Entstehung, Ausbildung und Geburt  
des menschlichen Organismus<sup>1)</sup>.

## §. 2555.

Nachdem alle Theile des Körpers ihr normales Verhältnis unter einander erhalten haben und auch die Geschlechtstheile vollkommen ausgebildet sind, tritt die Fähigkeit, durch eine fruchtbare Begattung die Art fortzupflanzen, ein. Die, in  
den

## 1) Schriftsteller.

Die hier citirten Werke betrachten mehr oder weniger vollständig sowohl die Veränderungen des mütterlichen Organismus als die Erscheinungen, welche der neuentstehende darbietet.

J. C. Arantius de humano foetu libellus. Venet. 1571.

H. Fabricius ab Aquapendente de formato foetu. Patav. 1604.

G. Harvaeus exercitationes de generatione animalium. Londin. 1651.

C. Drelincurtius de conceptu. L. B. 1685.

M. R. Besler admirandae fabricae humanae muliebris partium generationi inservientium, et foetus fidelis quinque tabulis, hactenus nunquam visis, delineatio. Norimb. 1640.

A. de Haller historia nuperae dissectionis feminae gravidae. Gotting. 1754. In ejusd. disp. anat. Vol. V.

W.

den Zeugungstheilen enthaltenen Bedingungen zu einer fruchtbaren Begattung sind schon in der Lehre von den Zeugungstheilen durch die Beschreibung ihres vollkommenen Zustandes angegeben. Sie bewirkt zunächst bestimmte Veränderungen im weiblichen Organismus überhaupt und den Zeugungstheilen insbesondere, die Empfängniß (Conceptio), welche ferner die Entstehung eines neuen Organismus begründen.

## Erster Abschnitt.

### Regelmäßige Bedingungen.

§. 2536.

Der genauen Darstellung dieser Erscheinungen kann man in zweckmäßigsten folgende allgemeine Betrachtungspunkte vorausschicken.

Uu 4

1) Zu-

W. Noortwyk uteri humani gravidi anatomic et historia. L. B. 1743.

D. Monro the dissection of a woman with child and remarks on gravid uteri. Edinb. phys. and liter. Essays Vol. I. art. XVII.

A. Monro additional observations on gravid uteri. Ebenbas. Art. XVIII.

J. G. Rüderer Icones uteri humani observationibus illustratae. Gottingae. 1759.

C. N. Jenty demonstratio uteri praegnantia mulieris cum foetu ad partum maturi. A. d. Engl. Nürnberg 1761.

Azzoguidi observationes ad uteri constructionem pertinentes. Bononiae. 1773. Rec. a Sandifort. L. B. 1788.

W. Hunter anatomia uteri gravidi tabulis illustrata. Birmingham. 1774.

E. San-

## Siebentes Buch.

Von der

Entstehung, Ausbildung und Geburt  
des menschlichen Organismus<sup>1)</sup>.

§. 2555.

Nachdem alle Theile des Körpers ihr normales Verhältniß unter einander erhalten haben und auch die Geschlechtstheile vollkommen ausgebildet sind, tritt die Fähigkeit, durch eine fruchtbare Begattung die Art fortzupflanzen, ein. Die, in

## 1) Schriftsteller.

Die hier citirten Werke betrachten mehr, oder weniger vollständig sowohl die Veränderungen des mütterlichen Organismus als die Erscheinungen, welche der neuentstehende darbietet.

J. C. Arantius de humano foetu libellus. Venet. 1571.

H. Fabricius ab Aquapendente de formato foetu Patav. 1604.

G. Harvaeus exercitationes de generatione animalium. Londin. 1651.

C. Drelincurtius de conceptu. L. B. 1685.

M. R. Besler admirandae fabricae humanae muliebris partium generationi inservientium, et foetus fidelis quinque tabulis, hactenus nunquam visis, delineatio. Norimb. 1650.

A. de Haller historia nuperae dissectionis feminae gravidae Gotting. 1754. In ejusd. disp. anat. Vol. V.

Thatsachen, welche für die erstere Ansicht sprechen, sind vorzüglich:

1) die Nothwendigkeit eines offenen Weges für den Samen, damit Befruchtung Statt finde, sofern diese bei Unterbrechung der Höhle der weiblichen Zeugungstheile nicht erfolgt;

2) das Vorkommen von Samen in der Gebärmutter und den Trompeten bei Weibern, die während oder kurz nach dem Beischlafe starben;

3) die Nothwendigkeit der Begattung durch die Zeugungstheile, damit ein neuer Organismus entstehe, indem die Vermuthung, daß jede hautdünne Stelle sich eben so gut dazu eigne<sup>1)</sup>, sich schwerlich bestätigen dürfte;

4) kann man die Analogie derjenigen Thiere anführen, bei welchen die aus dem Körper getretenen Eier durch den darauf gespritzten männlichen Samen befruchtet werden.

Indessen beweisen diese Thatsachen nicht geradezu die Richtigkeit dieser Ansicht.

1) In Hinsicht auf den ersten Grund ist es theils möglich, daß die Unfruchtbarkeit in andern Bedingungen begründet war, theils würde sich daraus nur ergeben, daß der Samen auf ein gewisses Organ, z. B. die Gebärmutter oder Scheide, einwirken muß, damit Befruchtung entstehe;

2) die unter den angeführten Bedingungen gesunde Fruchtigkeit war vielleicht nicht Samen, sondern eine, von den weiblichen Zeugungstheilen ergossene Fruchtigkeit, welche sich oft in den Höhlen der Gebärmutter und der Trompeten findet;

U u 5

3) der

1) Treviranus Biologie, Bd. 3. S. 407.

3) der dritte Grund, beweist nur, daß der Samen auf ein gewisses Organ einwirken muß;

4) der vierte beweist höchstens nur, daß bei diesen Thieren eine solche Bedingung eintritt, und selbst nicht dies, da die Eier derselben von einer beträchtlichen Schleimschicht umgeben sind.

Außerdem sprechen gegen diese Ansicht und für die zweite:

1) Versuche, wo wenigstens Entwicklung gelber Körper Statt fand, ungeachtet die Trompeten fest unterbunden wurden <sup>1)</sup>);

2) der Umstand, daß bei genau angestellten Versuchen fast nie Samen in der Gebärmutter gefunden wurde, und die Folgen der Empfängniß sich erst mehrere Tage oder Wochen nach der Begattung zeigen;

3) die Anordnung der Zeugungstheile der meisten Thiere, indem wegen beträchtlicher Länge und Windungen, ansehnlicher Vorsprünge im Gebärmutterhalse der weiblichen, Kürze der männlichen es fast unmöglich scheint, daß der Samen zu dem Eierstocke gelange;

4) das allgemeine Wellustgefühl, und eine Menge allgemeiner Zeichen, welche die Befruchtung begleiten.

Es ist die Vermischung einer männlichen und weiblichen Fruchtigkeit, und einen substantiellen Antheil der männlichen an der Bildung des neuen Organismus läßt sich auch nicht eine Thatfache anführen.

Hiernach bewirkt also der Mann bloß Erregung der Bildungsthätigkeit des Weibes auf den, zur Hervorbringung des neuen Organismus erforderlichen Grad, die sich, nach

---

1) J. Haighton über die Befruchtung der Thiere. Phil. Tr. 1797. Reil's Archiv. III. S. 51.

nach dem Folgenden, zunächst durch Bildung eines neuen Organs in dem Eierstocke, eines temporären Hoden; aus-  
spricht, dessen von ihm bereitete Fruchtbarkeit die Fähigkeit hat,  
sich auf die nachher darzustellende Weise weiter auszubilden.

### Erste Abtheilung.

Veränderungen der weiblichen Geschlechtstheile  
durch die Begattung und Empfängniß<sup>1)</sup>.

#### I. Begattungsorgane.

S. 2557.

Durch die Begattung werden zunächst die äußern  
Geschlechtstheile insofern bedeutend verändert, als die  
Scheidenklappe gewöhnlich mehr oder weniger vollkommen zer-  
stört wird. Die Auserbleibsel derselben erscheinen als drei  
oder vier, meistens dreieckige, auf der Seite und dem hintern  
Theile des Scheideneinganges befindliche, warzenförmige  
Parzen (Carunculas myrtiformes). Indessen ist die Schei-  
denklappe insofern kein sicheres Merkmal für die physische  
Jungfrauenschaft, als sie sich einerseits nicht ganz selten nicht  
nur nach mehrmaliger Begattung<sup>2)</sup>, sondern selbst nach der  
Geburt von mehr oder weniger entwickelten, selbst siebenmonats-  
lichen Fötus unverletzt erhält<sup>3)</sup>, anderntheils auch durch andre  
Veranlassungen zerstört wird, und als Folge eines ursprüng-  
lichen Bildungsfehlers mangelt.

Noch

1) S. Pinaeus de virginitatis notis, graviditate et partu. L. B.  
1854.

2) Osiander a. a. O. S. 24. nebst mehreren Fällen.

3) Tolberg de var. hymen. p. 14. Den sehr merkwürdigen Fall  
bezwahre ich noch auf.

Noch weit weniger beständig und merklich ist Erweiterung der Scheide und Blättung ihrer Runzeln.

## II. Bildungsorgane<sup>1)</sup>.

### A. Eierstöcke.

§. 2558.

Die innern Geschlechtstheile werden nicht durch die Begattung im Allgemeinen, sondern durch die Empfängniß umgewandelt.

Im Eierstock entwickelt sich ein gelber oder drüsigter Körper (*Corpus glandulosum* f. *luteum*<sup>2)</sup>), ein weißes, sehr gefäßreiches, aus mehreren Lappen zusammengesetztes, ründliches Gebilde, welches die äußere Fläche des Eierstocks überragt, ungefähr die Größe einer Kirsche erreicht, eine Höhle in seinem Innern enthält, die sich nach außen öffnet, und dessen Zahl gewöhnlich der Zahl der neugebildeten Organismen entspricht.

Nach Versuchen an Thieren entsteht dieser Körper durch Umwandlung eines, wahrscheinlich nicht mehrerer, Ovarialfächer Bläschen, die sich aus einer einfachen serösen Haut zu einem drüsigen Organ, also einem einfachen zu einem zusammengesetzten Theile, gestalten, welcher die Fähigkeit besitzt, eine

1) M. Malpighi de cornuum vegetatione, utero, viviparorum ovis etc. In Opp. omn. L. B. 1687. T. I. p. 211 seqq.

A. Bertrandi observations sur les corps glanduleux, sur la matrice dans l'état de l'ovaire et de la grossele. In Miscell. Taurin. I. 1758.

2) J. Brugnone de ovarii eorumque corpore luteo observationes anatomicae. Mém. de Turin. 1760. Uebers. in Kühn's und Weigel's ital. Biblioth. Bd. 3. St. 1.

Noose über die gelben Körper im Eierstocke. Braunsch. 1800.

eine von der serösen Flüssigkeit der Bläschen verschiedne, und sofern sich die Structur des gelben Körpers von der aller übrigen Drüsen unterscheidet, auch eine eigenthümliche Flüssigkeit, die weibliche Zeugungsflüssigkeit, oder den weiblichen Samen, abzusondern.

Die Einwirkung des männlichen Samens ist die gewöhnliche und naturgemäße Veranlassung zu einer solchen Umwandlung, indessen scheint diese auch in Folge andrer Reize, vielleicht der Phantasie oder unnatürlicher Befriedigung des Geschlechtstriebes entstehen zu können. Zwar lassen mehrere der seltenen Fälle, wo man bei Unverheiratheten und physischen Jungfrauen gelbe Körper fand, immer, in Verbindung mit den im Vorigen (§. 2557.) bemerkten Erscheinungen, die Annahme zu, daß ein fruchtbarer Vesichlaf vorangegangen war; indessen, da sie sich auch bei gewöhnlich unfruchtbaren Thieren, z. B. Mauleselinnen, fanden, so ist die vorgetragne Meinung auch für das menschliche Weib sehr wahrscheinlich. Daß aber durch andre Veranlassung als durch ungewöhnlich gesteigerten Zeugungstrieb die Graafischen Bläschen in einen gelben Körper ausarten könnten <sup>1)</sup>, hat durchaus keinen haltbaren Grund für sich. Die Beobachtungen von gelben Körpern in neugeborenen oder sehr jungen Thieren haben den Umstand wider sich, daß nicht jede gelbe Substanz im Eierstocke ein gelber Körper ist. Daß die Zahl der gelben Körper nicht immer mit der Zahl der Jungen übereinstimmt, beweist eben so wenig. Finden sich weniger gelbe Körper, so ist dies mit der angegebenen Bedeutung derselben sehr wohl verträglich, indem ein einziger gelber Körper so gut als ein Hode zur Bildung mehrerer Jungen hinreichen kann. Ueberdies konnte einer oder mehrere

der-

1) Jörg von der Zeugung. S. 151 ff.



verschwunden oder mehrere verschmolzen seyn. Finden sich mehr, so wäre 1) genau anzugeben, ob nicht die überzähligen von frühern Empfängnissen herrührten, und 2) könnte, auch wenn unter dieser Bedingung alle von derselben stammten, entweder die Zeugung ursprünglich nur zur Hervorbringung eines gelben Körpers gediehen seyn, oder es könnte das Product desselben verloren gegangen seyn. Uebrigens bin ich sehr geneigt, die Angaben von Verschiedenheit der Zahl der gelben Körper und der Jungen im Allgemeinen nur für Resultate höchst unsicherer Beobachtungen anzusehen, da ich in mehr als zweihundert Fällen in den Eierstöcken schwangeren Weiber und Säugethiere mehrerer Arten ohne Ausnahme die Zahl der gelben Körper, welche sich durch vollkommene Identität aller Eigenschaften als Producte desselben Zeugungsactes beurfundeten, immer durchaus mit der Zahl der Jungen übereinkommend gefunden habe, und die genauesten Beobachter dasselbe Resultat angeben <sup>1)</sup>, während die entgegengesetzten Zeugnisse in jeder Hinsicht oberflächlich sind.

Allmählich verschließt sich sowohl die Oeffnung als die Höhle des gelben Körpers, er verkleinert sich, sinkt von der Oberfläche zurück und verhärtet. Diese Veränderungen treten nicht genau zu derselben Zeit ein, und im Allgemeinen habe ich sowohl bei Menschen als Thieren gefunden, daß sie vorzüglich, so weit sie die Größe des Körpers betreffen, während der Schwangerschaft nicht sehr bedeutend sind, dagegen nach derselben

1) Haller Elem. physiol. T. VIII. pars 2. p. 29 — 38.

Hunter anat. Beschreibung des menschl. schwangeren Uterus. Weimar. 1802. S. 20.

selben auffallend rascher fortschreiten. Dies ist insofern merkwürdig, als sich daraus ergibt, daß, ungeachtet jetzt die Function des gelben Körpers und des Eierstocks überhaupt vorüber ist, doch die erhöhte Thätigkeit desselben in Folge des regern Lebens der Gebärmutter fort dauert. Seltener verschwindet übrigens der gelbe Körper ganz, wenn er sich gleich außerordentlich verkleinert.

Die Entdeckung der gelben Körper wird von Haller <sup>1)</sup>, und nach ihm von mehreren, Volcher Coiter <sup>2)</sup> zugeschrieben, kommt aber in der That Galloupi <sup>3)</sup> zu, da er des Gegenstandes mit denselben Worten als Volcher Coiter zwölf Jahr früher erwähnt.

Die Bedeutung derselben mittelst Malpighi <sup>4)</sup> und de Graaf <sup>5)</sup> aus.

#### §. 2559.

Nach Oslander <sup>6)</sup> stehen weder die Graaf'schen Bläschen noch die gelben Körper mit der Zeugung in Beziehung, indem jene keine Oeffnung enthalten. Durch die

1) Elem. physiol. T. VIII. p. 58.

2) Observat. Anat. 1575. p. 124. *Vesiculae quaedam continebant aquam limpidam, quaedam luteum humorem.*

3) Observat. anat. Venet. 1561. *Vidi quidem in iisdem (Ovariis) quasdam veluti vesicas aqua vel humore aequo, alias luteo, alias vero limpido turgentes.* In edit. Opp. omn. Venet. 1606. p. 106.

4) M. a. D. S. 223.

5) M. a. D. S. 231.

6) Handbuch der Entbindungskunst. Göttingen. 1802, Th. I. S. 129 und 145.

verschwunden oder mehrere verschmolzen seyn. Finden sich mehr, so wäre 1) genau anzugeben, ob nicht die überzähligen von frühern Empfängnissen herrührten, und 2) könnte, auch wenn unter dieser Bedingung alle von derselben stammten, entweder die Zeugung ursprünglich nur zur Hervorbringung eines gelben Körpers gediehen seyn, oder es könnte das Product desselben verloren gegangen seyn. Uebrigens bin ich sehr geneigt, die Angaben von Verschiedenheit der Zahl der gelben Körper und der Zungen im Allgemeinen nur für Resultate höchst unsicherer Beobachtungen anzusehen, da ich in mehr als zweihundert Fällen in den Eierstöcken schwangerer Weiber und Säugthiere mehrerer Arten ohne Ausnahme die Zahl der gelben Körper, welche sich durch vollkommene Identität aller Eigenschaften als Producte desselben Zeugungsactes bezeugten, immer durchaus mit der Zahl der Zungen übereinkommend gefunden habe, und die genannten Beobachter dasselbe Resultat angeben <sup>1)</sup>), während die entgegen gesetzten Zeugnisse in jeder Hinsicht oberflächlich sind.

Allmählich verschließt sich sowohl die Oeffnung als die Höhle des gelben Körpers, er verkleinert sich, sinkt von der Oberfläche zurück und verhärtet. Diese Veränderungen treten nicht genau zu derselben Zeit ein, und im Allgemeinen habe ich sowohl bei Menschen als Thieren gefunden, daß sie vorzüglich, so weit sie die Größe des Körpers betreffen, während der Schwangerschaft nicht sehr bedeutend sind, dagegen nach derselben

1) Haller Elem. physiol. T. VIII. pars 2. p. 29 — 38.

2) Hunter anat. Beschreibung des menschl. schwangern Uterus. Weimar. 1802. S. 20.

ngewandeltes Bläschen angesehen wird, welches nach  
zu Beobachten anfänglich eine deutliche, mit seiner Höhle zu-  
ammenhängende Oeffnung an der Oberfläche des Eierstockes  
ist, durch welche die Eifeuchtigkeit sehr wohl austreten konnte.

B. Trompeten.

§. 2560.

Die Trompeten verändern sich in Folge der Begattung  
insofern, als sie sich mehr oder weniger bald nachher so an  
Eierstöcke legen, daß sie mit ihrem gefalteten und ausge-  
streckten Unterleibsende einen größern oder geringern Theil  
selben umfassen, mithin die aus dem gelben Körper ergossene  
Eifeuchtigkeit aufnehmen können, die sie dann zur Gebärmutter  
überleiten.

Die Annäherung der Trompeten an die Eierstöcke wird  
schon den im kleinen Becken liegenden Theil der dünnen Därme  
richtert, sofern durch ihn die Bänder der Eierstöcke und die  
Hermansflügel gespannt, dadurch die Eierstöcke in ihrer Lage  
festigt, und die Trompeten so an sie gedrückt werden, daß sie  
etwas nach außen überragen <sup>1)</sup>).

C. Gebärmutter <sup>2)</sup>.

§. 2561.

Dagegen wird der Bau der Gebärmutter in mehreren  
Richtungen auffallend umgewandelt, und in ihrer Höhle ent-  
steht sich der neue Organismus.

Noch

1) Antenrieth über die eigentliche Lage der innern weiblichen  
Geschlechtstheile. In Reil's Archiv f. die Physiol. Bd. 7.  
S. 294.

2) S. außer den oben (S. 512.) angeführten Schriften:

A. Vater de utero gravido. Viteb. 1725.

Redel's Anat. 4. Th.

Er

Beyer

Noch ehe man Spuren von dem letztern wahrnimmt, findet man schon die Gebärmutter in ihrem obern Theile etwas vergrößert, ihre Substanz weicher, lockerer, blättriger, die Schichten, woraus sie besteht, deutlicher gesondert, die Gefäße vergrößert, die innere Fläche glatt, aber unregelmäßig, außerordentlich gefäßreich, außerdem mit einer Menge äußerst feiner, nur durch das Mikroskop sichtbarer Flocken bedeckt, mit einer breiigen Substanz bekleidet, in welche sich die Gefäße fortsetzen, und welche über den Hals der Gebärmutter weggeht, so daß dadurch die Höhle des Körpers verschlossen wird. Diese Substanz erscheint als geronnenes Blut, ist in ihrem obern Theile am dicksten und hier am genauesten mit der Gebärmutter verbunden, unten sehr dünn, und locker, oder gar nicht mit ihr vereinigt \*).

Außerdem ist der Gebärmuttermund und Hals mit einer zähen, klebrigen, gallertartigen Substanz angefüllt.

Diese Veränderungen vermehren sich ununterbrochen bis zum Ende der Schwangerschaft, welche im Allgemeinen zehn Mondmonate dauert.

---

Beyer utrum in gravidis totus uterus aequaliter extendatur. Paris. 1729.

P. A. Böhrmer Situs uteri gravid, foetusque ac sedes in utero. Halae. 1748. 4. Rec. in Halleri coll. disp. anat. T. V.

B. S. Albinus Tabulae uteri gravidi. L. B. 1748.

Idem de utero gravido nonnulla. Annot. acad. L. II. Cap. V.

J. Weitbrecht de utero muliebri (gravido) observationes anatomicae. In Nov. Comm. Petr. T. I. p. 337 ff.

- 1) The case of a young Woman who poisoned herself in the first month of her pregnancy by Th. Ogle. To which is added an account of the appearances after death. By the late J. Hunter. In Lond. medical transactions for the improvement of medical and chir. Knowledge. Vol. 2. p. 65.

Die faserige Structur wird immer deutlicher. In der That kann man sie nur in diesem oder in ähnlichen Zuständen der Gebärmutter, wo sie sich gleichfalls, wie z. B. bei Bildung regelwidriger Körper in ihr, vergrößert<sup>1)</sup>, deutlich nachweisen<sup>2)</sup>, und es ist daher unläugbar, daß die Fasern, wenn sie auch nicht erst während der Schwangerschaft entstehen, sich doch jetzt sehr beträchtlich vergrößern und entfalten. Ungeachtet ihrer beträchtlichen Vergrößerung und Auflockerung wird daher die schwangere Gebärmutter nicht bloß ausgedehnt, sondern nimmt vielmehr beträchtlich an Masse zu.

Das Gewicht der Gebärmutter beträgt selbst einige Tage nach der, am regelmäßigen Ende der Schwangerschaft erfolgten Niederkunft, wie ich mich durch die Untersuchung von zwölf Gebärmütern aus dieser Periode überzeugt habe, wenigstens vier und zwanzig Unzen, so daß sie also selbst jetzt, wo sie schon geschwunden ist, sich zur jungfräulichen Gebärmutter wie 24:1 verhält.

Eine andre Frage ist es, ob die Wände der Gebärmutter, sie sich nach dieser Angabe keinesweges bloß ausdehnt, zugleich in Dicke zunehmen, sich gleich bleiben, oder dünner werden? Selbst das Letztere kann, wegen des beträchtlichen Umfangs, den sie während der Schwangerschaft erhält, sehr wohl, unbeschadet der Masse- und Gewichtszunahme, Statt finden.

Diese Frage ist sehr verschieden beantwortet worden<sup>3)</sup>.

Er 2

Die,

1) Lobstein a. a. O. S. oben S. 519.

2) Dies bemerkte schon Vesal (De c. h. fabrica Lib. V. C. 15.)

Nach ihm Santorini (Observat. anat. C. XI. §. 15.)

3) S. die meisten Angaben bei Haller Elem. physiol. T. VIII. pars 2. p. 58 ff.

Noch ehe man Spuren von dem letztern wahrnimmt, so det man schon die Gebärmutter in ihrem obern Theile ausvergrößert, ihre Substanz weicher, lockerer, blättriger, in Schichten, woraus sie besteht, deutlicher gesondert, die Gefäße vergrößert, die innere Fläche glatt, aber unregelmäßig, außerordentlich gefäßreich, außerdem mit einer Menge sehr feiner, nur durch das Mikroskop sichtbarer Flocken bedeckt, mit einer breiigen Substanz bekleidet, in welche sich die Gefäße fortsetzen, und welche über den Hals der Gebärmutter wegfließt, so daß dadurch die Höhle des Körpers verschlossen wird. Diese Substanz erscheint als geronnenes Blut, ist in ihrem obern Theile am dicksten und hier am genauesten mit der Gebärmutter verbunden, unten sehr dünn, und locker, oder gar nicht mit ihr vereinigt \*).

Außerdem ist der Gebärmuttermund und Hals mit einer zähen, flebrigen, gallertartigen Substanz angefüllt.

Diese Veränderungen vermehren sich ununterbrochen bis zum Ende der Schwangerschaft, welche im Allgemeinen 9 Mondmonate dauert.

Beyer *utrum in gravidis totus uterus aequaliter extendatur*. Paris. 1729.

P. A. Böhm *Situs uteri gravid, foetusque ac loca in utero*. Halae. 1748. 4. Rec. in Halleri coll. diss. anat. T. V.

B. S. Albinus *Tabulae uteri gravidi*. L. B. 1748.

Idem *de utero gravido nonnulla*. Annot. acad. L. II. Cap. 5.

J. Weitbrecht *de utero muliebri (gravido) observationes anatomicae*. In Nov. Comm. Petr. T. I. p. 337 ff.

- 1) The case of a young Woman who poisoned herself in the 1<sup>st</sup> month of her pregnancy by Th. Ogle. To which is added an account of the appearances after death. By the late Wm Hunter. In Lond. medical transactions for the improvement of medical and chir. Knowledge. Vol. 2. p. 65.
- 2)
- 3)

als die Achselvenen sind, beide in dem Maaße weniger geschlängelt, als die Gebärmutter sich mehr vergrößert.

Die so erweiterten Venen der Gebärmutter führen den eigentlichen Namen von Höhlen (Sinus).

Die stärkste Erweiterung bieten die Blutgefäße an der Stelle dar, wo sich der mütterliche mit dem kindlichen Organismus unmittelbar verbindet, oder an der Einsenkungsstelle des Mutterkuchens.

## §. 2562.

Auch die Gestalt der Gebärmutter verändert sich beträchtlich. Da sich während des bei weitem größten Theiles der Schwangerschaft nur der Körper der Gebärmutter vergrößert, so nimmt das Verhältniß zwischen Körper und Hals keiner bedeutender zu, ja, selbst wenn endlich gegen das Ende der Schwangerschaft auch der Hals Antheil an der Ausdehnung nimmt, so wird er in demselben Verhältniß kürzer, also dieses Verhältniß noch bedeutender, die Gebärmutter daher allmählich, vorzüglich gegen das Ende, mehr eiförmig als birnförmig.

Zugleich wird die Gebärmutter von vorn nach hinten verhältnismäßig zu ihrer Breite dicker als vorher, wenn sie gleich immer noch etwas mehr breit als dick bleibt.

Der Muttermund fängt schon im ersten Monate an, rundlich zu werden.

## §. 2563.

Auch die Lage der Gebärmutter erleidet bedeutende Veränderungen.

In den beiden ersten Monaten der Schwangerschaft sinkt die Gebärmutter etwas tiefer in das Becken herab, so daß der



Die, welche annehmen, daß sie entweder gleich dick werden oder selbst an Dicke zunehmen, erklären die entgegen gesetzten Angaben durch die Bemerkung, daß die Dicke der Gebärmutter überhaupt auch im geschwängerten Zustande variiert<sup>1)</sup>, und dieselbe schwangere Gebärmutter nicht überall gleich ist<sup>2)</sup>. Außerdem könnte man sagen, daß bisweilen krankhaft sich die Gebärmutter nicht gehörig entwickelt, sondern nur eine bloße Ausdehnung erleidet, worin häufig die Ursache früherer Geburten enthalten seyn mag.

Meine, an sechszehn Gebärmütern aus allen Perioden der Schwangerschaft angestellten Untersuchungen machen es mir höchst wahrscheinlich, daß die Dicke der Wände anfangs etwas, aber nicht beträchtlich zu-, dann aber bis gegen das Ende der Schwangerschaft allmählich bedeutend abnimmt.

Ich fand in der That die Wände der Gebärmutter in der dritten Woche nach der Empfängniß 6, im Anfange des dritten Monats 5, im Anfange des vierten 4, gegen das Ende derselben in zwei Fällen 4, in einem Falle oben 3, unten 4, in einem vierten 5, im fünften in einem Falle 3, in einem andern oben 2, unten 4, im sechsten und siebenten nicht völlig 3, im achten in zwei Fällen 2 —  $2\frac{1}{2}$ , in einem dritten oben 3, unten über 4 Linien dick, im neunten noch etwas dünner.

Dagegen hat die nach der Niederkunft im siebenten, achten und neunten Monat zusammengezogene Gebärmutter gewöhnlich die Dicke eines Zolles.

Sowohl die Venen als die Arterien der Gebärmutter sind äußerst beträchtlich erweitert, so daß die Venenstämme so dick

1) J. B. F. A. Walter de polypis. In Annot. ac. Berol. 1761. p. 3.

2) Hunter a. a. D. S. 21.

gemeinen in seinem untern Theile zerreißt und das Kind vor demselben erscheint, heißt es auch die Nachgeburt (*Secundae* L. *secundinae*).

# I. Von den Eihüllen des Fötus 1).

§. 2566.

Die Eihüllen sind verhältnismäßig zum Fötus desto größer und schwerer, je näher er seinem Entstehen ist. Mit den in ihnen enthaltenen Flüssigkeiten übertrifft ihr Gewicht das seinige anfanglich sehr bedeutend, und auch ohne diese findet dies vor Ablauf des dritten Monates, wenn gleich natürlich in geringerem Verhältnisse, Statt. Am Ende des dritten Monates, also ungefähr nach Ablauf des ersten Dritttheils des

Er 5

Em:

1) S. außer den oben angeführten Schriften, namentlich von Nortwyk, Sandifort, Hunter;

A. Vater in *mus. anat. propr.* Tab. VIII. Viteb. 1701.

Russch Thes. anat. VI. Tab. I und II.

W. Vater *mola praegnans* etc. dieselbe Abbildung.

O. Borrichius. *Abortus humanus examinatus.* Act. Hafn. V. II. 49.

B. S. Albinus de *vasis placentaeparvulorum embryonum* et de *involucro*, quo edita eorum ova continentur. Annot. acad. Lib. I. XVII.

Id. *nonnulla de embryonibus humanis, ovisque*, quibus continentur. Ibid. XIX.

P. A. Böhm et *Instit. osteol.* Halae. 1751. Tab. I. F. 7. 8.

Idem resp. *Madai anatome ovi humani foecundati, sed deformis, trimestri abortu elisi.*

D. C. Burdach de *laesione partium foetus nutritioni inservientium abortus causa.* Lips. 1768.

E. Sandifort de *ovo humano, absque ullo foetus indicio, et placenta in hydatides degeneratione.* In *Observ. anat. path.* L. II. III. p. 76.

Idem

Embryonalens, ist das Gewicht beider ungefähr gleich. In dieser Periode an tritt allmählich ein entgegengesetztes Verhältniß ein, so daß sich jetzt im Durchschnitt das Gewicht der Eihüllen zu dem des Fötus wie 1:8 verhält, indem der wohlgenährte Fötus ungefähr acht bürgerliche Pfund, die Nachgeburt mit dem Nabelstrange etwas über ein Pfund wiegt.

Die erste Spur des neuen Organismus ist die Substanz, welche schon in den ersten Zeiten nach der Begattung die Eihüllen

Idem de ovo humano. Ibid. L. III. VI. p. 91.

Blumenbach in Instit. physiol. 1787. Tab. 4.

S. Th. Sömmerring Icones embryonum humanorum. Franc. 1799.

Denman practice of midwifry. London. 1801. 8. ed. Tab. 6—8.

Wrisberg Observat. anat. obstetr. de structura ovi et secundinarum humanarum in partu naturali et perfecto collectae. Gotting. 1782. Rec. in Sylloge opp. T. I. p. 512 seqq.

C. G. Krummacher Diss. sistens observat. quas. anat. cum velamenta ovi humani. Duisb. 1790. Rec. in Schlegelii syll. opp. obstetr. Lips. 1795. Tom. I. p. 469 seqq.

J. F. Lobstein essai sur la nutrition du foetus. Strasbourg. 1802.

Samuel de ovorum mammalium velamentis. Wirceb. 1816.

Dutrochet Recherches sur les enveloppes du foetus. Mémoires de la société méd. d'émulation. T. VIII. 1817. 1—60. In Medel's Archiv Bd. 5. Hft. 2.

G. Cuvier über das Ei der Säugethiere. Aus den Mém. du Muséum d'hist. nat. Vol. 5. In Medel's Archiv. Bd. 5. Hft. 2.

Dutrochet Observations sur la structure de l'œuf des mammifères et examen de la doctrine de M. Cuvier sur cette matière. p. 760—769. N. a. D.

In Medel's Archiv Bd. 5. Hft. 2.

Gebärmutterhöhle anfüllt, und nichts als geronnenes Blut zu seyn scheint. (S. 690.)

Aus ihr bildet sich die äußerste oder hinfällige Haut (*Membrana decidua*) des Eies, die man am zweckmäßigsten die mütterliche Eihaut nennen könnte.

#### A. Mütterliche Eihaut oder hinfällige Haut.

§. 2567.

Die hinfällige Haut, Haller's<sup>1)</sup> äußerste Eihaut, Hunter'sche Haut, Oslanders<sup>2)</sup> flebförmige Haut (*M. decidua* f. *caduca*, *T. exterior ovi* f. *M. Hunteri* f. *cribrosa*), welche die dem Fötus angehörenden Hüllen des Eies umgiebt, hängt an ihrer innern Fläche mit der Gefäßhaut, an der äußern mit der innern Fläche der Gebärmutter zusammen.

Sie ist von einer ganz andern Beschaffenheit als die übrigen, dicker und undurchsichtiger, allein bei weitem nicht so fest, sondern hat ungefähr die Consistenz des geronnenen Faserstoffes. Mit diesem kommt sie auch durch gelbliche Farbe überein.

Ihre Dicke ist nicht gleichförmig. Am beträchtlichsten ist sie gewöhnlich in der Gegend des Mutterkuchens, am unbedeutendsten in ihrem untern Theile, dem innern Muttermunde gegenüber.

Sie wird von ihrem ersten Entstehen an allmählich beträchtlich dünner, so daß sie zuletzt kaum eine halbe Linie dick ist. Anfänglich ist ihre äußere Fläche rauh, flockig, später wird sie, wie die innere es schon früher war, glatter. In den frühern Schwangerschaftsperioden ist sie weit lockerer mit der Gebärmutter verbunden als in spätern.

In

1) *Elem. physiol.* T. VIII. p. 185.

2) *Handb. der Entbindungskunde* Th. I. S. 191.

In einer größern oder geringern Ausbreitung ist sie mehr oder weniger vollständig durchlöchert, und hat ein netz- oder siebformiges Ansehen.

Sie erhält eine ansehnliche Menge von Gefäßen, welche Verlängerungen der Gebärmuttergefäße sind, und in schiefer Richtung in sie dringen.

§. 2568.

Die hinfällige Haut umhüllt das Ei nicht einfach, sondern bildet eine doppelte Schicht um dasselbe, ungefähr nach Art der serösen Häute.

Außer dem Theile derselben nämlich, welcher sich durch seine äußere Fläche mit der innern der Gebärmutter verbindet, findet sich ein zweiter, der sich gegen jenen, in demselben enthalten, nach unten umschlägt. Dieser ist an seiner innern Fläche mit dem Chorion verbunden, an der äußern frei, dagegen der erstere an seiner äußern Fläche mit der Gebärmutter verwachsen, an der innern frei.

Der erste Abschnitt der hinfälligen Haut erhält den Namen der äußern, oder wahren (*Decidua externa* s. *vera*), der innere ist die innere, umgeschlagene, oder das schwammige Chorion, eine wenig schickliche Benennung. (*Dec. interna* s. *reflexa* s. *Chorion fungosum*).

Von der Anordnung der serösen Häute unterscheidet sich indessen diese Anordnung der hinfälligen Haut durch den Umstand, daß die wahre sich nicht bloß umschlägt, um sich an die Gefäßhaut zu heften, sondern sich auch von der Umbiegungsstelle an äußerlich über dieselbe fortsetzt, diese also überall eng von derselben umschlossen ist.

Die

Die umgeschlagne hinfällige Haut ist besonders dünn und netzförmig, wenig dicker als die Gefäßhaut. Vorzüglich wird sie in dem Maße dünner als sich das Ei vergrößert.

In demselben Maße wird sie auch näher an die äußere hinfällige Haut gedrängt, so daß sie zuletzt mehr oder weniger mit ihr verwächst.

§. 2569.

Die äußere hinfällige Haut reicht nie weiter als bis zum innern Muttermunde. Von dieser Stelle an ist die Gebärmutter, oder der Hals, bloß mit einer gallertähnlichen Feuchtigkeit angefüllt.

Sie setzt sich, nach einigen Angaben, eine kleine Strecke weit in die Trompeten, vorzüglich auf der Seite, wo sich der gelbe Körper gebildet hat, fort <sup>1)</sup>, und ist sowohl an diesen beiden Stellen, als an ihrem untersten Theile, wo sie über den innern Muttermund weggeht, durchlöchert <sup>2)</sup>. Indessen scheint sie sich, wenn gleich sich jene Oeffnungen in den frühesten Perioden finden mögen, bald in einen völlig geschlossenen Sack zu verwandeln, da man schon im ersten Monate die untere <sup>3)</sup>, und vom zweiten Monate an auch die beiden obern Oeffnungen nicht mehr findet <sup>4)</sup>.

§. 2570.

Die Erklärung der Entstehungsweise der umgeschlagenen hinfälligen Haut ist nicht ganz leicht. Am wahrscheinlichsten ist es, daß das Ei oder die Flüssigkeit, aus welcher es sich bildet,

1) J. Hunter in transact. for the improv. T. II. p. 67.

2) W. Hunter a. a. O. S. 77.

3) J. Hunter a. a. O. S. 67.

4) Lobstein sur la nutrition du fœtus, p. 4.

det, in die Substanz der hinfälligen Haut, die beständig, vorzüglich aber in der ersten Periode, sehr weich und locker ist, dringt, daß sich die dadurch entstandne Lücke sogleich wieder verschließt, und sich nun das Ei innerhalb der Substanz der hinfälligen Haut weiter entwickelt.

Diese Vorstellung kommt mit den Beobachtungen überein, denen zu Folge die äußere und innere hinfällige Haut schon ursprünglich von einander verschieden sind, indem sich jene zuerst, und namentlich vom Grunde der Gebärmutter aus, als eine mit der Länge nach verlaufenden Blutgefäßen versehene Haut, welche daher aus in derselben Richtung verlaufenden Stämmen gebildet erscheint, diese erst nachher, von ihrer innern Fläche aus, und mit wagerechten Gefäßen versehen, bildet, so daß nothwendig das Ei, indem es in die Gebärmutter tritt, in eine Höhle gelangt, deren Decke und die Seiten von der äußern, so wie der Boden von der umgeschlagenen hinfälligen Haut gebildet werden <sup>1)</sup>).

Wenigstens gelangt das Ei nach eben diesen Beobachtungen nicht dadurch in die Substanz der hinfälligen Haut, daß es zu derselben Zeit, wo diese an der innern Fläche der Gebärmutter entsteht, in die Höhle der letztern dringt <sup>2)</sup>, indem jene Erscheinungen in Fällen gesehen wurden, wo die Eier noch in der Trompete befanden <sup>3)</sup>.

#### §. 2571.

Ungeachtet ihres frühern Erscheinens ist diese hinfällige Haut dem Embryo nicht eigen, und zur Entwicklung desselben nicht

1) J. Burns observations on the formation and structure of the human ovum. Im Edinburgh medical and surgical Journal Vol. II. p. 1—4.

2) Hunter a. a. D. S. 81.

3) Burns a. a. D. S. 3.

nicht wesentlich nothwendig, da sie bei Entstehung desselben außerhalb der Gebärmutter (*Graviditas extrauterina*) sich eben so vollständig innerhalb der Gebärmutter entwickelt, und der Embryo ohne sie sich vollkommen ausbildet.

## B. K i n d e s e i h ä u t e.

### §. 2572.

Dagegen besteht das Ei aus andern Theilen, welche in die Entstehung des Embryo wesentlich verwebt sind. Diese sind: die Gefäßhaut, die Schafhaut, die Dotterschaut und die Harnhaut, welche jetzt, ohne Rücksicht auf die Ordnung, in welcher sie entstehen, und den Antheil, den sie an dem Lebensproceß des Fötus haben, zu betrachten sind.

#### I. Gefäßhaut.

### §. 2573.

Die Gefäßhaut, äußerste Eihaut (*Chorion* f. *Chorion pellucidum* f. *membrana vasculosa* f. *extima*), die äußerste eigenthümliche Haut des Eies, ist dünn, durchsichtig, an beiden Flächen, besonders aber an der äußern Fläche durch größere und kleinere Zotten ungleich, welche an der äußern bei weitem länger und baumförmig verzweigt sind. Diese äußern Zotten sind Anhäufungen von Gefäßen, deren Stämme sich unter einander zur Bildung der Nabelgefäße vereinigen.

Anfänglich sind sie einfach, stellenweise mehr oder weniger beträchtlich, knopfförmig angeschwollen und bloß Venen<sup>1)</sup>.

Ihrer Dünne und Durchsichtigkeit ungeachtet besteht sie aus einem äußern und einem innern Blatte, zwischen welchen,  
mit

1) Lohlein Nutr. S. 65.



mit jenen Flocken zusammenhängende und aus ihnen entstehende Gefäßstämmchen verlaufen.

An der äußern Fläche ist die Gefäßhaut mit der innern der hinfalligen Haut, an der innern mit der Schafshaut in Verbindung.

Ungeachtet die Gefäßhaut an ihrer äußern Fläche nicht als eine reichliche Gefäßentwicklung ist, kann man doch in ihrer Substanz nicht mit Gewißheit Gefäße nachweisen. Zwar haben mehrere Beobachter diese angenommen, und neuerlich ist als Grund für diese Annahme der Gefäßreichthum der hinfalligen Haut aufgestellt worden, sofern die in dieser enthaltenen Gefäße höchst wahrscheinlich in die Gefäßhaut dringen, allein diese letztern scheinen mir zu den Gefäßen der Gefäßhaut in derselben Beziehung als die des mütterlichen Theiles des Mutterkuchens zum kindlichen zu stehen, und bei dieser Annahme erklärt sich der Gefäßreichthum der hinfalligen Haut sehr leicht.

Saugadern und Nerven enthält die Gefäßhaut nicht.

#### S. 2574.

Die Gestalt und Verbindungen derselben erleiden in den verschiednen Fötusperioden bedeutende Veränderungen.

Anfänglich ist sie verhältnismäßig beträchtlich dicker als in spätern Perioden, so daß sie jetzt dicker als das Amnion ist, allmählich aber dünner wird.

Auch ist ihre Structur und Dicke jetzt gleichförmig, überall an ihrer äußern Fläche gleichmäßig mit Zotten besetzt, die anfangs kleiner und einfacher, im zweiten Monate vielfacher verzweigt und verhältnismäßig länger als vorher sind. Vom dritten Monate an aber verschwinden diese Zotten allmählich  
im

Im größten Theile ihres Umfangs, meistens von unten nach oben, so daß endlich der größere Theil derselben an seiner äußern Fläche beinahe ganz glatt ist, und nur an dem Theile, welcher die Einsenkung der Nabelschnur umgiebt, die ehemaligen Zotten, dichtgedrängt und sich zur Bildung des Nabelstrangs vereinigend, übrig bleiben.

Diese Stelle bildet, in Verbindung mit der hinfälligen Haut, eine rundliche Masse, welche beim reifen Fötus ungefähr den dritten Theil des Umfangs des Eies einnimmt, und den Namen des Mutterkuchens (Placenta) führt.

An diesem ist die Gefäßhaut, welche seine innere Fläche bildet, beträchtlich dicker als in ihrem übrigen Umfange.

Anfänglich ist die Gefäßhaut weit lockerer als in spätern Perioden in die hinfällige Haut eingefest, verwächst aber allmählich so eng mit ihr, daß sie im frischen Zustande, vorzüglich im Umfange des Mutterkuchens, wo sie durch eine Menge von Fäden, den Ueberbleibseln der zottigen Gefäße, welche anfangs ihre ganze Fläche bekleiden, mit ihr verbunden ist, kaum von ihr getrennt werden kann.

## 2. Innerste Haut des Fötus oder Schafhaut.

§. 2575.

Die Schafhaut (Amnion s. tunica ovi intima) ist eine sehr zarte, durchsichtige Haut, welche den Fötus zunächst umgiebt, an ihrer äußern Fläche locker, da, wo sie die innere Fläche des Mutterkuchens bekleidet, am festesten an die Gefäßhaut geheftet, an der innern dagegen frei, an beiden, das lockere, äußere Zellgewebe ausgenommen, völlig glatt ist.

Häufig, vielleicht immer, ist in den ersten Schwangerschaftsperioden die Gefäßhaut von der Schafhaut, weil die erst beträchtlich größer als diese ist, durch einen mehr oder weniger ansehnlichen Raum getrennt, in welchem eine Flüssigkeit, welche den Namen des falschen Kindswassers (Liquor amnii spurius) führt, enthalten ist. Doch verschwindet diese und die beiden Häute vereinigen sich sehr nahe; schon im zweiten Monate<sup>1)</sup>, wenn man sie gleich bisweilen im zweiten oder dritten Monate völlig in Berührung, in andern Fällen dagegen im vierten und fünften noch von einander getrennt findet<sup>2)</sup>.

Sie schlägt sich von der Ursprungsstelle des Nabelstranges gegen sich selbst um, bekleidet die Nabelgefäße, deren äußere Hülle oder Scheide sie bildet, und setzt sich so bis zu der vordern Fläche des Unterleibes fort, wo sie in die vorragende Stelle der Haut desselben übergeht, welche nachher den Nabel bildet.

Blutführende Gefäße und Nerven sind bis jetzt in der Schafhaut noch nicht nachgewiesen, wenn es gleich sehr wahrscheinlich ist, daß die Vereinigungssubstanz zwischen ihr und der Gefäßhaut Wege enthält, in welchen die Nahrungs- und Absonderungsflüssigkeit zu ihr dringt.

§. 2576.

Sie enthält eine Flüssigkeit, welche den Namen des Fruchtwassers oder Schafwassers (Liquor amnii) führt<sup>3)</sup>, und nicht in allen Perioden des Embryolebens dieselben Bedingungen darbietet.

1) Hunter S. 67.

2) Lohstein S. 23, 24.

3) Franck de liquore amnii. Götting. 1764.

In Hinsicht auf ihre physischen Eigenschaften ist sie in den frühern Perioden hell, und ganz oder beinahe ganz durchsichtig, später wird sie trübe, und enthält mehr oder weniger deutlich Flocken. In demselben Verhältniß ist sie anfangs dünnflüssiger und weniger zähe.

Der Geruch ist stark, saamenartig, der Geschmack schwach alzig.

Sie enthält eine beträchtliche Menge Kügelchen.

Ihre specifische Schwere übertrifft die des Wassers wenig.

Ihre absolute und relative Menge varirt in den verschiedenen Schwangerschaftsperioden. Je näher der Embryo seinem Entstehen befindet, desto reichlicher ist sie verhältnißmäßig.

§ 2

Erst

F. A. König de aquis ex utero gravidarum et parturientium profluentibus. Halae. 1769.

J. P. Hettler de liquoris amnii natura ac indole. Giessae. 1776.

H. van den Bosch de natura et utilitate liquoris amnii. Traj. 1792. Rec. in Schlegel. sylloge opp. ad art. obst. T. I. p. 121 seqq.

P. Scheel diss. de liquoris amnii arteriae asperae foetuum humanorum natura et usu, cui adjectus est appendix sistens generaliora quaedam de liquore amnii. Hafniae, 1799.

Buniva et Vauquelin expériences sur les eaux de l'amnios. Ann. de chimie. T. 35. und Mémoires de la soc. médico. d'émulation. T. III. p. 229.

G. J. Neuß's und J. M. Emmert's Chemische Untersuchung des Fruchtwassers aus dem zeitigen Ei und der käsigen Materie auf der Haut der neugebornen Kinder. In O. J. Andersens Annalen u. s. w. Göttingen. 1801. Bd. 2. S. 107.

G. Egeling de liquore amnii, nec non positiones medicorum argumenti. L. B. 1813.

G. F. Fockel de liquoris amnii in foetus corporis superficiem praesione. Marburgi. 1819.

Erst um die Mitte der Schwangerschaft ist das Gewicht des Fötus und des Fruchtwassers ungefähr gleich.

Von jetzt an wird das Gewicht des letztern allmählich bedeutend geringer, so daß es, selbst wenn der Fötus mit unzerissenen Hüllen geboren wird, nicht über ein Pfund beträgt, und bei der gewöhnlichen Geburt höchstens acht Unzen abzufließen pflegen.

Die absolute Menge nimmt anfänglich zu, dann aber, wie die relative, ab, so daß sich z. B. im dritten bis vierten Monate auf 36 Unzen fanden <sup>1)</sup>).

In Hinsicht auf die chemische Beschaffenheit des Fruchtwassers ist zu bedauern, daß weder das menschliche, noch, was so leicht wäre, das thierische Fruchtwasser in den verschiedenen Schwangerschaftsperioden vergleichend untersucht worden ist. Alle Untersuchungen beschränken sich auf bei der Geburt abgessenes, also aus der letzten Schwangerschaftsperiode gewonnenes.

Nach Scheel enthält das Fruchtwasser freien Sauerstoff, indessen wurde diese Angabe durch spätere Untersuchungen <sup>2)</sup> nicht bestätigt. Es zeigt Spuren von freiem Alkali.

Der flüssige Theil besteht aus einer beträchtlichen Menge Wasser, sehr wenig Eiweiß, noch weniger Gallert, salzsaures Ammonium und Natron, und phosphorsaurem Kalk. Wein, Alkohol und Säure bringen keine, oder sehr unbedeutende Veränderungen in ihm hervor.

Der flockige kommt vorzüglich mit dem Schleim in Schleimhäute überein.

1) Van Doeveren obl. acad. C. VII. p. 105.

2) Emmert a. a. O. S. 116 ff.

Die Quelle des Fruchtwassers ist nach einigen der Fötus, nach andern der mütterliche Organismus, und nach der erstern Ansicht ist es daher Auswurfstoff, nach der letztern Ernährungssubstanz.

Einige der erstern sehen es für den Harn, andre für das Product der Hautthätigkeit des Fötus an.

Andre <sup>1)</sup> halten es, besonders in den spätern Perioden, zum Theil für einen Auswurfstoff des Fötus, zum Theil für Ernährungssubstanz.

Am wahrscheinlichsten ist es mir, daß es wenigstens seinem größten Theile nach von den mütterlichen Gefäßen abgesondert wird, wenn es gleich in den letzten Perioden zum Theil Auswurfstoff seyn kann.

Zu dieser Meinung veranlaßt die Betrachtung, daß es höchstwahrscheinlich zu der Ernährung des Fötus dient, indem es <sup>1)</sup>, sofern Wärme und Weingeist in den frühern Perioden stärkere Gerinnung bewirkte <sup>2)</sup>; anfangs mehr nährende Substanz zu enthalten scheint als in spätern Perioden, die Abnahme der letztern daher in Aufsaugung derselben in den frühern Perioden, und Ersatz durch eine andre Ernährungsweise begründet seyn kann;

2) das Fruchtwasser eben so wahrscheinlich durch die Haut eingesogen wird, indem

a) bei eigends angestellten Versuchen, wo ein Band um die Gliedmaassen, von, in Fruchtwasser gebrachten Fötus gelegt wurde, in kurzer Zeit die Hautsaugadern beträchtlich an-

U 3

schwol

1) Emmert S. 121.

2) Oslanders Annalen Bd. 1. St. 1. S. 199. 200.

Lobstein nutrition. p. 105.

Sahe ich gleichfalls immer bei Schafsembryonen.

schwollen, während die der nicht unterbundenen Gliedmaßen leer waren<sup>1)</sup>;

b) Fötus mit verschloßnem Munde und völlig von der Nachgeburt getrennter, verschlossener und abgerundeter Nabelschnur geboren wurden<sup>2)</sup>;

3) das Fruchtwasser auch durch den Mund aufgenommen wird, indem sowohl im Magen, im Schlunde, als in der Paukenhöhle und der Luftröhre Fruchtwasser, welches man an seinen physischen Eigenschaften<sup>3)</sup>, und, so wie das Kindspieß, an den Seidenhaaren des Fötus, die es enthält<sup>4)</sup>, erkannte, gefunden wurde;

4) nach bestimmten Beobachtungen der Fötus Athmungs- und Schlingbewegungen vollzieht, wodurch das Fruchtwasser an die erwähnten Stellen gelangt<sup>5)</sup>;

5) bei eigends angestellten Versuchen schon geborne Thiere mehrere Wochen lang durch Fruchtwasser ernährt wurden<sup>6)</sup>.

Außer dieser Ernährungsbeziehung steht unstreitig das Fruchtwasser insofern auf andre Weise mit dem Fötus unmittelbar und mittelbar in Erhaltungsbeziehung, als es

1) denselben vor äußerer Erschütterung und Druck sichert;

2) die

1) Brugmans bei Van den Bosch a. a. O. S. 466, 467.

2) Derselbe bei Van den Bosch.

3) Winslow, Herboltd, Rafn, Abildgaard, Scheel bei Scheel a. a. O. S. 12 ff.

4) Oslander Handb. der Entbindungsk. Bd. 1. S. 237.

5) Winslow bei Scheel a. a. O. S. 12 ff.

Beclard in Meckel's Archiv f. die Physiol. Bd. 1. S. 154.

6) Weydlich bei Pohl embryochemia. Erlang. 1805. §. 12.

- 2) die normale Ausdehnung der Gebärmutter unterstützt;
- 3) eine genauere Verbindung zwischen dem Ei und der Gebärmutter bewirkt;
- 4) auf der andern Seite den Druck des Fötus auf die Gebärmutter mindert.

Dagegen hat es bestimmt nicht die Bestimmung, die Oeffnungen und Höhlen des Körpers vor dem Verwachsen zu hüten<sup>1)</sup>, da theils einerseits häufig Verschließungen dieser Art vorkommen, theils andererseits die Schleimhäute ohne eingegangene Texturveränderung, Entblößung u. s. w. keine Neigung zu Verwachsungen haben, indem die Erfahrung, daß in künstlichem Alter viele Jahre hindurch keine Verwachsung folgt, hinlänglich beweist, daß sie durch die von ihnen abgesonderten Feuchtigkeiten hinlänglich vor derselben geschützt werden.

Behufs der Geburt nützt das Fruchtwasser, sofern es

- 1) zur Ausdehnung des Muttermundes, und
- 2) zum Schlüpfeligmachen der äußern Zeugungstheile wirkt.

### 3. Mutterkuchen und Nabelstrang.

#### a. Mutterkuchen.

##### §. 2577.

Der Mutterkuchen (Placenta) ist wesentlich ein, aus Chorion und der hinfälligen Haut gebildeter, im Allgemeinen länglich rundlicher, scheibenförmiger, weicher, aber zügig gegen seinen Umfang ziemlich fester Körper, die geeignetste Stelle des Eies, durch welche dasselbe am genauesten mit der Gebärmutter verbunden wird.

§ 4

Er

<sup>1)</sup> Luca bei Fuchel S. 10.



Er hat gewöhnlich acht Zoll im längsten, sechs im kleinsten Durchmesser, und einen Zoll Dicke, wird aber gegen den äußern Umfang allmählich dünner. Am dicksten ist er gegen die Stelle, wo der Nabelstrang abgeht. Gewöhnlich sitzt er, vorzüglich bei Erstgebärenden, am obern und hintern Theile der Gebärmutter, etwas rechterseits auf, ohne daß die mechanischen Erklärungsweisen dieser Erscheinung genügen.<sup>1)</sup>

Er besteht aus einer beträchtlichen Menge von größern und kleinern, rundlichen, unregelmäßigen Lappen (Cotyldones), welche vorzüglich an seiner äußern, gegen die Gebärmutter gewandten Fläche deutlich sind, und dieselbe ungleich machen.

Gegen die Zeit der Reife ist dieser Theil an seiner äußern Fläche mit einer der hinfälligen Haut sehr ähnlichen Schicht bekleidet, welche nicht bloß brückenartig von einem Lappen zum andern geht, sondern selbst zwischen dieselben dringt und mit seinen Gefäßen sehr eng verbunden ist. In zahlreichen Gefäße hängen mit den Gebärmuttergefäßen zusammen, und zwischen ihr und dem Mutterfuchsen finden sich stark erweiterte Venen, vorzüglich im Umfange des Mutterfuchsen eine Kreisvene, in welche mehrere Venen der hinfälligen Haut treten.

Ungeachtet diese Schicht durch ihren Bau mit dieser Haut übereinkommt, scheint sie doch später als sie zu entstehen, da der

Theil

---

1) B. F. Oslander de causa infertionis placenta in utero scilicet ex novis circa generationem humanam observationibus et hypothesebus declarata. Götting. 1792. Rec. in Schlegelii sylloge op. min. ad artem obstetr. T. II. p. 71 seq.

Theil desselben, welcher dem Mutterkuchen entspricht, verschwindet, nachdem sich dieser mit der Gebärmutter verbunden hat, und jene Schicht sich nur in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft findet <sup>1)</sup>).

Die innere Fläche des Mutterkuchens ist glatt, und wird durch die hier dickere Gefäßhaut gebildet, welche auch hier von dem Amnion an ihrer innern Fläche überzogen wird.

An ihr verlaufen die größern Aeste und Stämme der drei Nabelgefäße, welche sich zum Nabelstrange verbinden, der den Körper des Fötus mit den Eihüllen verbindet.

Der Mutterkuchen vergrößert sich von seinem ersten Entstehen an absolut, verkleinert sich aber verhältnißmäßig zum Fötus und dem übrigen Umfange des Eies, indem die Gefäße der Aderhaut allmählich einem immer größern Theile nach verschwinden. Selbst die Gefäße des Mutterkuchens verschließen sich nach und nach zum Theil, und erscheinen als solide, hin und wieder, vorzüglich gegen die äußere Oberfläche des Mutterkuchens, mit phosphorsaurem Kalk angefüllte Fäden. Diese Ablagerung findet indessen auch außerhalb der Gefäße Statt, und ist ein Zeichen der Reife, des Alterns, des Absterbens des Mutterkuchens, findet sich daher nur bei reifen Mutterkuchen. Dieses Altern des Mutterkuchens spricht sich auch durch geringern Blutreichthum und Trockenheit, selbst absolute Verminderung an Gewicht und Masse aus <sup>2)</sup>), wenn gleich beim menschlichen Weibe auch der reife Mutterkuchen weit

U 5

wenig

1) Wrisberg descr. ovi et secund. §. 186.

Lobstein a. a. O. S. 58.

2) Der selbe ebendas. S. 141. 142.

weniger auf diese Weise umgewandelt erscheint, als beim Thiere<sup>1)</sup>, und ist in der That als der Anfang der Trennung des kindlichen vom mütterlichen Organismus, als Einleitung zur Geburt, anzusehen.

b. Nabelstrang.

§. 2578.

Der Nabelstrang, die Nabelschnur (*Funiculus umbilicalis*), besteht während des ganzen Fötuslebens wenigstens:

- 1) aus der Nabelblutader (*Vena umbilicalis*) nebst den zwei Nabelpulsadern (*Arteriae umbilicales*);
- 2) einer weichen, halbflüssigen, gallertartigen, sie umgebenden Substanz, der Whartonschen Sulze (*Gelatina Whartoniana*);
- 3) dem Harnstrang;
- 4) der, diese Theile umgebenden Nabelstrangscheide (*Vagina funiculi umbilicalis*), welche von dem Amnion stammt. (S. oben S. 706.)

In frühern Perioden, namentlich bis zum dritten Monat, enthält er außerdem

- 5) einen Theil des Darmkanals, der verhältnißmäßig desto ansehnlicher ist, je jünger der Embryo ist;
- 6) das ganze Nabelbläschen oder einen Theil desselben;
- 7) die Nabelgefäßgefäße.

Er ist aus diesem Grunde anfänglich beträchtlich dicker als in spätern Perioden.

Ha:

---

1) Jörg. Dessen Zeugung. S. 220 ff.

Anfänglich, bis in den zweiten Monat, bisweilen regelwidrig in weit spätern Perioden, sind die Nabelgefäße gerade, allmählich winden sie sich nach und nach mehr oder weniger beträchtlich, und geben, zumal, da sich zugleich der Umfang des Nabelstranges vermindert, diesem gleichfalls eine gewundene Gestalt. Merkwürdig ist es, daß diese Windung sehr allgemein in derselben Richtung, von der linken zur rechten Seite, Statt findet, so daß sich die entgegengesetzte nach meinen Untersuchungen höchstens wie 1:9 verhält.

Die Sulze des Nabelstranges variirt in Hinsicht auf Menge, daher der Unterschied zwischen fetten und mageren Nabelschnüren.

Man kann, indessen nur durch mehr oder weniger lange fortgesetzten Druck, Quecksilber durch die Sulze des Nabelstranges treiben <sup>1)</sup>, ohne daß daraus mit Gewißheit die Anwesenheit von eignen Gefäßen in ihr nachgewiesen würde, in welchen eine Flüssigkeit vom Mutterkuchen aus in den Körper des Fötus gelangte. Höchstens würde sich hieraus ergeben, daß die Sulze aus heben einander liegenden, aus Schleimgewebe gebildeten Röhren und darin enthaltenen und fortbewegter Substanz besteht, welche vermuthlich zur Ernährung des Fötus dient <sup>2)</sup>. Ungeachtet schon früher von ältern und neuern Anatomen eigne, einzelne Saugadern im Nabelstrange angegeben worden sind <sup>3)</sup>, so konnte ich sie doch,

trotz

1) Uttini über die einfangenden Gefäße des Mutterkuchens. Mem. dell. Ist. it. naz. Ital. T. 1. Meckel's Archiv. Bd. II.

2) Lobstein essai etc. S. 38.

3) S. Michaelis observationes circa placentae ac funiculi umbilicalis vasa absorbentia. Götting. 1790.

troß genauer Untersuchungen, eben so wenig als Lobstein<sup>1)</sup>, entdecken.

Die Nabelstrangscheide umgibt die im Nabelstrange befindlichen Theile locker, und unterscheidet sich desto deutlicher von der Haut des Fötus, je weiter dieser von seinem Ursprunge entfernt ist.

Nerven konnte ich in dem Nabelstrange nicht mit Gewißheit ausmitteln, und nehme sie daher nicht an<sup>2)</sup>.

#### §. 2579.

Gewöhnlich entsteht der Nabelstrang nicht in der Mitte des Mutterfuchens, sondern mehr oder weniger gegen dessen Umfang hin. Er heftet sich an die vordere Fläche des Unterleibes, desto weiter nach unten, je jünger der Embryo ist, und von dieser Stelle aus weichen die ihn zusammensetzenden Theile aus einander.

Nicht bloß seine Dicke, sondern auch seine Länge variiert in den verschiedenen Fötusperioden bedeutend.

Anfänglich, bis zum Ablaufe des ersten Monats, findet er sich in der That noch gar nicht, indem der Embryo unmittelbar auf dem Amnion sitzt.

Nachdem er entstanden ist, verlängert er sich fortwährend bis zur Reife des Fötus, so daß er jetzt im Durchschnitt eine Länge von ungefähr zwei Fuß hat, und im Allgemeinen keine große Verschiedenheit zwischen seiner und des reifen Fötus Länge Statt findet.

Dr

1) A. a. D. S. 84.

2) E. F. Darr diss. sistens funiculum umbilicalem nervis careo. Tubing. 1815. 8.

L. S. Riecke utrum funiculus umbilicalis nervis polleat an careat. Tubing. 1816.

Indessen ist es merkwürdig, daß im Allgemeinen zwischen diesen beiden Perioden eine zweite eintritt, wo der Nabelstrang verhältnißmäßig länger ist, und den Fötus mehr oder weniger bedeutend an Länge übertrifft. Dies findet namentlich wenigstens vom Ende des zweiten bis zum Ende des sechsten Monats Statt.

Seine Länge schwankt indessen am Ende der Schwangerschaft zwischen einem und zwei Fuß.

§. 2580.

Der Mutterkuchen und Nabelstrang vermitteln den Zusammenhang zwischen dem mütterlichen und kindlichen Organismus, und der erstere besteht wesentlich aus zwei verschiedenen Theilen, dem kindlichen und dem mütterlichen.

Der kindliche wird durch die Verzweigungen der Nabelgefäße und die Gefäßhaut, der mütterliche durch Fortsetzungen der Gebärmuttergefäße und die hinfallige Haut gebildet. Beide sind in dem Maaße enger mit einander verbunden als der Fötus älter ist, immer aber sind die Gefäße beider Theile völlig von einander getrennt, so daß die Arterien des mütterlichen Theiles sich in die Venen desselben, die Arterien des kindlichen in die Venen eben dieses Theiles öffnen. Daher wird bei den glücklichsten Anfüllungen der Gebärmuttergefäße nur der mütterliche, bei den eben so gelungenen der Nabelgefäße nur der kindliche Theil des Mutterkuchens angefüllt. Eben so erfolgt, auch wenn der Mutterkuchen vom Körper getrennt eingespritzt wird, oder noch nicht vom Körper des lebenden und gebornen Kindes getrennt ist, mithin das Blut ununterbrochen durch ihn strömt, dennoch kein Ausfluß aus der freien Fläche desselben. Hieraus erklärt sich auch der be-

ständig

trotz genauer Untersuchungen, eben so wenig als Lobstein<sup>1)</sup>, entdecken.

Die Nabelstrangscheide umgiebt die im Nabelstrange befindlichen Theile locker, und unterscheidet sich desto deutlicher von der Haut des Fötus, je weiter dieser von seinem Ursprunge entfernt ist.

Nerven konnte ich in dem Nabelstrange nicht mit Gewißheit ausmitteln, und nehme sie daher nicht an<sup>2)</sup>.

#### §. 2579.

Gewöhnlich entsteht der Nabelstrang nicht in der Mitte des Mutterkuchens, sondern mehr oder weniger gegen dessen Umfang hin. Er heftet sich an die vordere Fläche des Unterleibes, desto weiter nach unten, je jünger der Embryo ist, und von dieser Stelle aus weichen die ihn zusammensetzenden Theile aus einander.

Nicht bloß seine Dicke, sondern auch seine Länge variiert in den verschiednen Fötusperioden bedeutend.

Anfänglich, bis zum Ablaufe des ersten Monates, findet er sich in der That noch gar nicht, indem der Embryo unmittelbar auf dem Amnion sitzt.

Nachdem er entstanden ist, verlängert er sich fortwährend bis zur Reife des Fötus, so daß er jetzt im Durchschnitt eine Länge von ungefähr zwei Fuß hat, und im Allgemeinen keine große Verschiedenheit zwischen seiner und des reifen Fötus Länge Statt findet.

Fr

1) A. a. D. S. 84.

2) E. F. Dürr diff. sistens funiculum umbilicalem nervis caren. Tubing. 1815. 8.

L. S. Riecke utrum funiculus umbilicalis nervis polleat an careat. Tubing. 1816.

Indessen ist es merkwürdig, daß im Allgemeinen zwischen diesen beiden Perioden eine zweite eintritt, wo der Nabelstrang verhältnißmäßig länger ist, und den Fötus mehr oder weniger bedeutend an Länge übertrifft. Dies findet namentlich wenigstens vom Ende des zweiten bis zum Ende des sechsten Monats Statt.

Seine Länge schwankt indessen am Ende der Schwangerschaft zwischen einem und zwei Fuß.

§. 2580.

Der Mutterkuchen und Nabelstrang vermitteln den Zusammenhang zwischen dem mütterlichen und kindlichen Organismus, und der erstere besteht wesentlich aus zwei verschiedenen Theilen, dem kindlichen und dem mütterlichen.

Der kindliche wird durch die Verzweigungen der Nabelgefäße und die Gefäßhaut, der mütterliche durch Fortsetzungen der Gebärmuttergefäße und die hinfallige Haut gebildet. Beide sind in dem Maaße enger mit einander verbunden als der Fötus älter ist, immer aber sind die Gefäße beider Theile völlig von einander getrennt, so daß die Arterien des mütterlichen Theiles sich in die Venen desselben, die Arterien des kindlichen in die Venen eben dieses Theiles öffnen. Daher wird bei den glücklichsten Anfüllungen der Gebärmuttergefäße nur der mütterliche, bei den eben so gelungenen der Nabelgefäße nur der kindliche Theil des Mutterkuchens angefüllt. Eben so erfolgt, auch wenn der Mutterkuchen vom Körper getrennt eingespritzt wird, oder noch nicht vom Körper des lebenden und gebornen Kindes getrennt ist, mithin das Blut ununterbrochen durch ihn strömt, dennoch kein Ausfluß aus der freien Fläche desselben. Hieraus erklärt sich auch der be-

ständig



ständig Statt findende Mangel an Isochronismus zwischen dem Pulse des Nabelstranges und der Mutter.

Daher leben ferner mit unverletzten Eihüllen geborne Kinder bei vollkommen bestehendem Kreislauf mehr oder weniger lange in denselben <sup>1)</sup>, und wahrscheinlich wird zunächst nur der Temperaturveränderung wegen baldige Oeffnung der Hüllen nothwendig, wenn gleich der Versuch von Wrisberg 9 Minuten, von Osiander eine Viertelstunde lang ohne Nachtheil fortgesetzt wurde.

Aus demselben Grunde fließt, auch wenn die Nachgeburt nach Durchschneidung der Nabelschnur lange mit der Gebärmutter in Verbindung bleibt, aus den Gefäßen nur der geringe Antheil von Blut aus, der sich noch in dem kindlichen Theile der Nachgeburt befindet.

Eben so leben deshalb Fötus nicht nur noch mehrere Stunden nach dem durch Verblutung bewirkten Tode der Mutter, sondern enthalten auch noch mehr oder weniger ihre gewöhnliche Blutmenge.

#### §. 2581.

Der kindliche, innere Theil des Mutterkuchens besteht bloß aus den baumförmig, äußerst vielfach verzweigten Nabelpuls- und Blutadern, welche von scheidenartigen Verlängerungen der Gefäßhaut umgeben werden.

Die Puls- und Blutadern begleiten sich und winden sich häufig, wie die Stämme, um einander. Auch die letzten Verzweigungen der Puls- und Blutadern begleiten einander genau,  
und

- 1) Bei Abterors, Wrisbergs und Osianders Versuchen (Röderer de vi imag. in foetum neganda. Gott. 1756. Rec. in Opp. p. 108. Wrisberg Obs. de structura ovi etc. rec. in Commentat. Vol. I. p. 518. Osianders Annalen Bd. I. St. I. S. 27. 28.), welche von mir an Hunden, Katzen und Kaninchen mit demselben Erfolge wiederholt wurden.

und ein Puls- und Blutaderzweig sind daher in einer scheidenartigen Verlängerung der Gefäßhaut an einander geheftet.

So verhält es sich indessen nur in den spätern Perioden, indem sie anfänglich, wie die Gefäße der Gefäßhaut überhaupt, einfach und bloß venös sind.

Außer den Gefäßen finden sich weiße, sehnenartige, von der Aderhaut entspringende und mit ihr zwischen die Gefäße bringende Fäden im Mutterkuchen, welche nichts als die verschlossenen Gefäße zu seyn scheinen, da sie oft noch halb offen sind, und die eingespritzten Substanzen aufnehmen.

Außer einer ansehnlichen, an der Grundfläche des Mutterkuchens zwischen beiden Pulsadern befindlichen schiefen Anastomose, vereinigen sich die untergeordneten Äste selbst von einem Lappen zum andern im Mutterkuchen nicht. Eben so wenig findet zwischen den Stämmen der Nabelblutadern eine andre Verbindung Statt. Dagegen hängen die Nabelpuls- und Blutadern durch verhältnißmäßig weite Anastomosen ununterbrochen zusammen.

Dieser Theil des Mutterkuchens ist sehr locker, und die Festigkeit rührt nur von dem folgenden her.

Außer den erwähnten Blutgefäßen enthält der Mutterkuchen keine Saugadern. Eben so wenig lassen sich mit Bestimmtheit Nerven nachweisen.

§. 2582.

Der mütterliche, äußere, weit festere Theil des Mutterkuchens wird durch die vorher erwähnte, der hinfälligen ähnliche Haut gebildet.

Diese bekleidet seine äußere Fläche, so daß auch bei der glücklichsten Ausprägung der Nabelgefäße die Zweige derselben nicht frei da liegen, und giebt ihr ein zottiges Ansehen.

Zu

Zugleich aber reicht sie durch eine Menge unregelmäßiger Fortsätze nach innen, welche zwischen die feinsten Verzweigungen der Nabelgefäße dringen, und mit ihnen abwechselnd Erhabenheiten und Vertiefungen bilden, in deren letztere sich die Verzweigungen der Nabelgefäße fortsetzen.

Dieser Theil des Mutterkuchens ist, so wie die ganze ihm entsprechende hinfallige Haut, ein Erzeugniß der Gebärmutter, und seine Gefäße sind Verlängerungen der Gebärmuttergefäße.

Die Arterien sind sehr gewunden und die größten haben ungefähr den Durchmesser einer Linie, die größten Venen, die weit weniger geschlängelt, aber in schlechter Richtung zum Mutterkuchen verlaufen, sind beträchtlich weiter. Von der hinfalligen Haut aus treten eine Menge von Venenästen zu Stämmen zusammen, die sich vorzüglich am Rande des Mutterkuchens ausbreiten.

Der Uebergang der Arterien in die Venen geschieht in mütterlichen Theile des Mutterkuchens nicht durch Anastomosen, sondern durch große Zellen, welche sich sowohl durch die Gebärmutterarterien als durch ihre Venen vollständig anfüllen lassen, und in welche die Masse sich immer ergießt, die sie aus den Arterien in die Venen übergeht.

Diese Zellen sind als die ersten, rohen Versuche zur Bildung von Gefäßen anzusehen, sofern sie keine eigenen Häute haben und noch große Inseln bilden.

#### §. 2583.

Ungeachtet der Trennung der beiden Kreisläufe in der Nachgeburt, findet doch eine gegenseitige Einwirkung zwischen dem mütterlichen und kindlichen Theile und ihren Gefäßen Statt, welche

welche man mit der zwischen der Luft und dem Blute in den Lungen, den Nahrungsmitteln und den Milchgefäßen im Darmkanal Statt findenden vergleichen kann.

§. 2584.

Auch ist selbst der mütterliche Theil der Nachgeburt nur ein vergängliches Erzeugniß, welches größtentheils in Verbindung mit dem kindlichen bei der Geburt abgestoßen wird, wenn gleich ein Theil der hinfälligen Haut sich erst einige Tage nachher vollständig von der innern Fläche der Gebärmutter trennt.

Wegen jenes genauen Zusammenhanges der Gebärmutter und des kindlichen Theiles erfolgt bei der Trennung der Nachgeburt, ungeachtet nach der Geburt des Kindes aus dem durchschnittenen Nabelstrange, wenn er gleich durch den Muttermund Einesweges eingeschnürt wird, nur eine kurze Zeit lang, und nur das Blut geflossen war, welches sich noch im kindlichen Theile befand, plötzlich ein mehr oder weniger beträchtlicher Blutfluß durch die Zerreißung der Gefäße derselben, aus den Geschlechtstheilen, der aber bald durch die Zusammenziehung der Gebärmutter gestillt wird.

4. Nabelblase und Harnhaut.

§. 2585.

Außer den mit Bestimmtheit vorhandnen, im Vorigen betrachteten Häuten des Eies giebt es zwei andre, deren Anwesenheit nicht so allgemein angenommen wird, die durch Gestalt und Lage unter einander übereinkommen, sich aber durch dieselben Bedingungen von den übrigen Fötushüllen unterscheiden, die Nabelblase und die Harnhaut. Beide bilden nicht Säcke, welche einander und den Fötus umschließen,

ßen, sondern liegen zwischen der Schafshaut und der Gefäßhaut. Beide haben ein weit vergänglicheres Daseyn als die beiden übrigen Häute, indem sie schon um den dritten Monat des Embryolebens verschwinden, oder wenigstens außer Thätigkeit treten. Beide dürfen indessen nicht mit einander verwechselt und etwa, z. B. mit Lobstein, die Nabelblase des Menschen für die Harnhaut der Thiere gehalten werden<sup>1)</sup>, sondern sind völlig verschieden und bei den meisten Wirbelthieren, höchst wahrscheinlich auch beim Menschen, neben einander bestehende Organe.

### a. N a b e l b l a s e<sup>2)</sup>.

#### 1. Anwesenheit.

§. 2586.

Das Nabelbläschen, die Nabelblase, der Dotterfak, die Darmblase, (*Vesicula umbilicalis*, f. *sacculus vitellarius* f. *vesica vitellaria*, f. *intestinalis* f. *prooessus infundibuliformis*, f. *hydatis funiculi*) ist ein beständiger Theil. Zwar hat Oslander die Meinung aufgestellt, daß es eine krankhafte, nur bei mißgebildeten Embryonen vorkommende Erscheinung sey<sup>3)</sup>; indessen findet es sich in der That in den ersten Monaten in allen Eiern.

Eben so wenig entspricht das Nabelbläschen des Menschen der Harnhaut (*Allantois*) der Säugethiere<sup>4)</sup> und Vögel.

1) *Essai sur la nutrition du foetus* p. 44 ff.

2) S. die Literatur derselben oben S. 295. Außerdem auch oben (S. 697.) zur Lehre von den Eihäuten überhaupt angeführten Schriften.

3) *Calz. medic. chir. Zeitung* 1814.

4) Lobstein *Essai sur la nutrition du foetus* §. 41 — 45.

denn die für diese Gleichung angeführten Gründe, namentlich:

- 1) seine Beständigkeit,
- 2) seine Durchsichtigkeit,
- 3) seine Anfüllung mit einer hellen, durchsichtigen Feuchtigkeit,
- 4) seine Lage zwischen den übrigen Eihäuten,
- 5) die Anwesenheit von Gefäßen, sind weit richtiger als

eben so viele Gleichungspunkte zwischen ihm und der Nabelblase der Säugthiere und dem Dotter der Vögel anzusehen.

Die Beschaffenheit seiner Gefäße, seine Verbindung mit dem Darmkanal bestätigt diese Gleichung noch mehr, und, da sich außerdem bei den Säugthieren und Vögeln, wahrscheinlich auch beim Menschen eine Harnhaut findet, so ist die erstere Ansicht als völlig unsstatthaft anzusehen.

## 2. O r d n u n g.

### §. 2587.

Es ist verhältnismäßig desto größer, je jünger der Embryo ist, und übertrifft ihn wahrscheinlich anfangs an Größe. Wenigstens bildet Lobstein einen Fall dieser Art ab<sup>1)</sup>, und ich habe einen sehr ähnlichen vor mir.

Das von Lobstein abgebildete ist das beträchtlichste, und es würde bei der ansehnlichen Größe, welche es erreichte, hiernach anfangs einen Durchmesser von ungefähr sechs Linien haben.

Die beträchtlichsten, welche ich vor mir habe, sind kaum halb so groß, und die Angaben der meisten übrigen Beobachter kommen hiermit überein.

1) Essai sur la nutrition du fœtus. Tab. 1.

## 3. L a g e.

§. 2588.

Es liegt anfangs dicht an der vordern Fläche des Embryo<sup>1)</sup>, rückt aber schon nach dem ersten Monate von demselben ab, und liegt dann außerhalb der Nabelscheide.

## 4. Zeit der Entstehung und Dauer.

§. 2589.

Wann das Nabelbläschen entstehe, ist noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen. Der Analogie mit den Vögeln nach würde es, als dem Dotter entsprechend, unter allen Theilen des Eies zuerst entstehen, und man hat daher ihr zu Folge angenommen, daß die leeren Eier, welche häufig vorkommen, nicht, der gewöhnlichen Ansicht zufolge, Amnion und Chorion, sondern Nabelbläschen seyen<sup>2)</sup>. Wenn es auch einleuchtet, daß die letztere Annahme nicht für alle Fälle gelte, so glaube ich doch in der That, der ersten Ansicht folgen zu müssen, bis bestimmte Erfahrungen das Gegentheil dargethan haben.

Nach Hunter<sup>3)</sup> erhält sich das Nabelbläschen bisweilen bis zum regelmäßigen Ende der Schwangerschaft, wo es dann aber nicht größer als in einem zwei- bis dreimonatlichen Eie ist und einen halben bis anderthalb Zoll weit von der Einsenkung des Nabelstranges in den Mutterkuchen liegt. Dies halte ich indessen für eine sehr seltne Erscheinung, da ich sie unter einer sehr beträchtlichen Menge von Nachgeburten nur zweimal gesehen habe.

5. 541

1) Lobstein S. 46.

2) Oken. Beitr. H. 2. S. 83.

3) Anat. des schwangern Uterus. S. 63.

## 5. B a u.

## §. 2590.

Das Nabelbläschen wird durch eine körnige Haut gebildet, welche eine beträchtliche Härte hat, indem sie, durch eingeblasene Luft völlig ausgedehnt, nicht zerreißt <sup>1)</sup>. Diese Haut schrumpft allmählich zusammen, wird runzlich und undurchsichtiger. In ihr verbreiten sich die Nabelgefäßgefäße.

Es enthält eine weißliche Flüssigkeit, die allmählich sich vermindert und zugleich verdickt und erhärtet.

## 6. Verbindung mit dem Embryo.

## §. 2591.

Ueber seine Verbindung mit dem Embryo ist schon oben in der Lehre von der Entwicklung des Darmkanals umständlich gehandelt und als höchst wahrscheinlich dargethan worden, daß es außer den Nabelgefäßgefäßen anfänglich durch einen Gang mit dem Krummdarm zusammenhängt <sup>2)</sup>.

## 7. Verrichtung.

## §. 2592.

Die Beständigkeit und die anfänglich so beträchtliche Größe, wahrscheinlich die Anwesenheit des Nabelbläschens vor allen übrigen Theilen, beweisen seine große Wichtigkeit für die Entwicklung des Embryo.

Der Analogie des Vogels nach entsteht er auf und aus ihm, und sein Inhalt wird, zum Theil wenigstens, in den

31 3

Körper

1) Lobstein a. a. O. S. 43.

2) S. 295 — 307.



Körper des Embryo geleitet, dient ihm, wie der Dotter dem Vogel, zur Nahrung. Nur verschwindet die Function der Nabelblase viel früher als die des Dotters.

### b. Harnhaut<sup>1)</sup>.

§. 2593.

Ob sich bei dem menschlichen Fötus, wie bei dem der übrigen Säugthiere, eine, mit der Harnblase durch den Harnstrang in Verbindung stehende Harnhaut, oder mittlere Haut des Eies (Allantois s. membrana media) finde, ist noch jetzt Gegenstand des Streites.

Needham<sup>2)</sup>, Hale<sup>3)</sup>, Bidloo<sup>4)</sup>, Hübner<sup>5)</sup>, de Graaf<sup>6)</sup>, Litter<sup>7)</sup>, Rouhaute<sup>8)</sup>, Neufville<sup>9)</sup>  
Hale

1) R. Hale the humane Allantois discovered. In philosoph. Tr. p. 270.

Sellius de Allantoide, Kilon. 1729.

K. de Neufville de Allantoide humana. L. B. 1750. re. id. 1756.

A. Haller de Allantoide. 1759. Id. de membrana media Opp. min. T. II.

2) De formato foetu C. 3.

3) N. a. D.

4) Tab. anat. 58. Lit. E.

5) Anat. secund. hum. rep. p. 428.

6) De mulier. organ. Cap. XV. Opp. omn. p. 285.

7) Mém. de Paris 1701. p. 115.

8) Offerv. anat. fis. Torino 1724. p. 21.

9) N. a. D.

Haller<sup>1)</sup>, Emmert<sup>2)</sup>, Jörg<sup>3)</sup>, Dütrochet<sup>4)</sup>, Euvier<sup>5)</sup>, nehmen sie an, Paré<sup>6)</sup>, Harvey<sup>7)</sup>, Ruyfch<sup>8)</sup>, Hester<sup>9)</sup>, Noortwyk<sup>10)</sup>, Treu<sup>11)</sup>, Albin<sup>12)</sup>, A. Monro<sup>13)</sup>, Danz<sup>14)</sup>, Hunter<sup>15)</sup> dagegen läugnen sie. Ich glaube, ungeachtet unstreitig viele, für die Anwesenheit der Allantois beim Menschen angeführte That-  
sachen theils falsch, theils unerweisend sind, doch der Meinung der erstern beitreten zu dürfen, indem ich bei einem ungefähr vierwöchentlichen menschlichen Embryo außer der Nabelblase zwischen der Ader- und Schafhaut eine größere, mit einer dünnen Feuchtigkeit angefüllte, zusammengefunkenne dünnhäutige Blase fand<sup>16)</sup>, und auch später ähnliche Beobachtungen machte.

314

Für

1) A. a. D.

2) Nachtrag zu den beiden Abhandlungen über das Nabelbläschen u. s. w. In Keil's Archiv. Bd. 10. S. 373.

3) Die Zeugung. 1815. S. 288 ff. Doch wird bloß von dem bekanntlich oft vorkommenden Raume zwischen Amnion und Chorion auf die Allantois geschlossen und die Haut selbst nicht angegeben.

4) A. a. D.

5) Ueber das Ei der Säugthiere. Mém. du Mus. T. 3. Medek's Archiv f. die Physiol. Bd. 4.

6) Oeuvres chirurg. L. II. C. 35.

7) Exerc. de generat. C. de membr. et humor.

8) Thesaur. 5. n. 57. Th. 9. n. 21.

9) Eph. nat. curios. Cent. II. obs. 190.

10) De utero gravido. pars III. de allantoide.

11) De diff. foet. et adulti. p. 105.

12) Annot. academ. L. I. C. XIX. p. 75.

13) Essays of a soc. of Edinb. Vol. II. Art.

14) A. a. D. Th. 1. p. 12.

15) Anat. des menschl. schw. Uterus. S. 84.

16) S. deutsches Archiv f. d. Physiol. Bd. 3. Taf. 1. Fig. 2.

Für die Anwesenheit derselben kann man anführen:

1) die Beobachtungen, wo wirklich eine, von der Nabelblase verschiedene Blase zwischen den übrigen Hüllen gefunden wurde. Zwar sind mehrere derselben sehr verdächtig, indessen habe ich mich selbst, wie bemerkt, mehrmals von der Anwesenheit einer, von den übrigen Theile des Eies verschiedenen, zarten Schicht, die anfangs, noch um die Mitte des zweiten Schwangerschaftsmonates, eine verschlossene Blase bildet, nachher bloß als ein Blatt erscheint, überzeugt;

2) den Raum, welcher sich zwischen dem Amnion und Chorion findet, in den frühern Perioden größer als in spätern ist, und durch eine Flüssigkeit angefüllt wird, welche bisweilen auch bei der Geburt in beträchtlicher Menge vorhanden ist, und den Namen des falschen Kindswassers (Liquor Amnii spurius) führt;

3) die Analogie mit den übrigen Thieren.

Sie ist immer sehr dünnhäutig, weit zarter als die übrigen Häute.

Ob sie in irgend einer Periode mit dem Harnstrange (S. oben S. 487.) und durch ihn mit der Blase zusammenhängt, ist nicht gewiß. Dütrochet nimmt es, allein ohne Beobachtungen angestellt zu haben, an. In der That wird indessen diese Verbindung, wenigstens in frühern Perioden, außer der Analogie, sehr wahrscheinlich durch das Verlaufen des Harnstranges in der Nabelschnur, und durch die Möglichkeit, ihn in einer längern oder kürzern Strecke in dieser, selbst beinahe bis zum Mutterkuchen verfolgen<sup>1)</sup>, ja mit Flüssigkeit anfüllen

ju

1) Albin bei Neufville S. 42. 43.

Hunter schw. Uterus. S. 45.

Cruijsant Ebendas.

zu können<sup>1)</sup>, selbst keine Verbindung mit der Harnhaut wenigstens äußerlich darzustellen<sup>2)</sup>. Ich selbst konnte zwar den Harnstrang in allen Perioden der Schwangerschaft mehr oder weniger deutlich fast durch die ganze Länge des Nabelstranges verfolgen, zum Theil in demselben mit Quecksilber erfüllen, allein nie einen Zusammenhang mit ihm und jenem Raume zwischen den beiden eignen Eihäuten oder der mittlern Haut ausmitteln.

Wie lange sich die Harnhaut erhält, ist gleichfalls ungewiß.

In den letzten Monaten der Schwangerschaft konnte ich fast nie deutliche Spuren derselben wahrnehmen.

#### §. 2594.

Gewöhnlich sieht man diese Haut, wie ihr Name einigermaßen andeutet, als Behälter des Harns an, welcher durch den Harnstrang aus der Blase in sie gelange.

Diese Ansicht haben in der That die meisten Physiologen und Aerzte.

Die damit verwandte von Jörg<sup>3)</sup>, daß sie selbst den Harn absondere, hat in der That, da die, den Harn das ganze Leben hindurch absondernden Nieren vorhanden und stärker als in spätern Lebensperioden entwickelt sind, sehr wenig für sich.

1) Npreen und Abberer. S. oben S. 488. Außerdem A. Monro in Edinb. physiol. essays and obs. Vol. 1. p. 485. Ridley Obs. med. pr. London. 1703.

2) Albin bei Neufville S. 43. Indessen ist hier unstreitig die Nabelblase gemeint.

3) Zeugung, S. 298.

Eine entgegengesetzte Meinung haben Harvey<sup>1)</sup>, Lobstein<sup>2)</sup>, Oken<sup>3)</sup> vorgetragen.

Nach Harvey ist die Flüssigkeit der Allantois nicht Harn, sondern Nahrungsflüssigkeit, indem sie sich

1) auch in Eiern, welche keinen Fötus enthalten, finde<sup>4)</sup>;

2) schon beim Entstehen desselben in großer Menge vorhanden sey<sup>5)</sup>;

3) die Allantois in frühen Perioden unverhältnißmäßig groß, selbst absolut größer als in spätern sey<sup>6)</sup>, da man doch annehme, daß der Harn desto reichlicher abgesondert werde, je älter der Fötus sey;

4) es nicht wohl erklärlich sey, warum die Harnabsonderung die wesentlichste Function unter allen beim Fötus sey<sup>7)</sup>;

5) die Allantois bei einigen Säugthieren fehle, und es doch unwahrscheinlich sey, daß die Fötus einiger Thierarten Harn absondern, die der andern nicht<sup>8)</sup>;

6) bei dem (fast reifen) Schweinsfötus nur mit größter Mühe Luft aus der Blase in die Harnhaut getrieben werden könne<sup>9)</sup>;

7) die

1) De generat. Amstel. 1662. p. 564 seqq.

2) H. a. D. S. 53.

3) Beitr. H. I. S. 29 ff.

4) Harvey.

5) Derselbe.

6) Lobstein S. 54.

7) Derselbe ebend.

8) Derselbe ebend.

9) Oken S. 38.

7) die Flüssigkeit keine Auswurfsflüssigkeit seyn könne, da sich eine beträchtliche Menge (einsaugender) Nabelvenen in der sie einschließenden Haut verbreiten <sup>1)</sup>;

8) die Flüssigkeit sich nicht wie der Harn verhalte <sup>2)</sup>.

Allein keiner dieser Gründe beweist etwas für diese Ansicht gegen die erstere.

1) Die Anwesenheit der Allantois und ihrer Flüssigkeit ohne Embryo beweist nichts, da das, was man dafür hält, etwas anderes seyn, oder der Embryo verloren gegangen seyn konnte;

2) und 3) die Größe der Allantois und die Menge ihrer Flüssigkeit in sehr frühen Perioden, erklärt sich sehr wohl aus dem raschern Widen in der frühesten Lebensperiode und dem höchst wahrscheinlich jetzt noch Statt findenden Fehlen, oder der wenigstens sehr schwachen Entwicklung der übrigen Auswurfsprocesse.

4) Die Größe der Allantois beweist nicht, daß jetzt die Harnabsonderung die wesentlichste Function ist, sondern nur, daß jetzt das Harnsystem die Function der übrigen Auswurfsorgane größtentheils übernimmt, aus dem sehr einfachen Grunde, daß die Producte ihrer Thätigkeit mit dem Fötus während der ganzen Schwangerschaft in Berührung und Wechselwirkung gekommen seyn würden.

5) Diese Thatsache ist völlig unrichtig, indem die Allantois ein sehr beständiges Organ ist. Uebrigens wäre es möglich, daß ihr Mangel auf irgend eine Weise ersetzt würde.

6) In

1) Harvey.

2) Nfen G. 39.

6) In diesem Falle wurde auch von der Allantois aus mit derselben Schwierigkeit Luft in die Blase getrieben <sup>1)</sup>, und in frühen Perioden gelingt der Versuch, wie ich mich davon oft überzeugt habe, mit der größten Leichtigkeit.

Aus dieser Thatsache folgt also höchstens, daß in dieser spätern Periode allmählich weniger Harn abgesondert wird, und sich in der Blase anhäuft.

7) Dieser Einwurf gründet sich auf die Verwechslung der Allantois mit der Gefäßhaut. Die Gefäße gehören nicht ihr, sondern dieser an, saugen wenigstens nicht aus ihr, sondern der Gebärmutter ein,

8) Aus der angeführten Thatsache ergibt sich aus mehreren Gründen nicht, daß die Flüssigkeit kein Harn sey.

Daß die Allantois Bildungshaut des Harn- und Zeugungssystems, oder der Harnblase sey <sup>2)</sup>, widerlegt sich durch die Bemerkung, daß sie bei den Vögeln sehr deutlich aus dem Harnsystem hervorstößt, und in den Eiern der Batrachier fehlt.

Die Harnblase wird keinesweges aus dem Harnstrange gebildet <sup>3)</sup>, sondern der anfänglich gleichmäßig enge Gang, welcher der Harnblase und dem Harnstrange entspricht, erweitert sich in seinem untern Theile, bildet sich vollkommen aus und wird Harnblase, während der obere sich nicht auf diese Weise entwickelt und Harnstrang bleibt.

Zeit

1) Oken S. 30.

2) Jörg a. a. O. S. 298.

3) Derselbe S. 290.

Zeit der Entstehung des Eies und Ordnung, in welcher die Theile desselben sich bilden.

§. 2595.

Die Zeit der ersten Entstehung des Eies ist höchst schwer zu bestimmen. Ungeachtet die Dauer der Schwangerschaft sehr genau begränzt ist, so folgt hieraus nicht nothwendig, daß die erste Entstehung des neuen Organismus immer zu derselben Zeit Statt finde, da die Entwicklung des Vogelembryo beweist, daß, ungeachtet die Vollenbung in allen Eiern eben so genau zu derselben Zeit erfolgt, dennoch Embryonen aus derselben Zeit der Bebrütung, sowohl der Entwicklung einzelner Organe als des ganzen Körpers nach, sehr bedeutend von einander verschieden sind.

Einen Versuch, nicht nur zur Bildung der hinfälligen Haut, sondern selbst des kindlichen Theiles des Eies, nahm man indessen schon am achten Tage nach der Begattung wahr<sup>1)</sup>.

Bei der Schnelligkeit, womit bei den höhern Thieren die verschiednen, sowohl vergänglichcn als bleibenden Theile des Körpers nach einander entstehen, bei der verhältnismäßig äußerst geringen Menge von vollständigen Beobachtungen über die Entwicklung des Eies insbesondere, ist es äußerst schwer, zu bestimmen, ob die verschiednen, vorher beschriebnen Theile desselben zugleich, oder zu verschiednen Zeiten, und in welcher Folge sie gebildet werden, welche Bedeutung sie ferner für die Entstehung und Ausbildung des Embryo haben.

Die Bildung der hinfälligen Haut nimmt höchst wahrscheinlich zugleich, mit der Entstehung des eigentlichen oder kind-

1) E. Home über den Uebergang des Eies aus dem Eierstocke in die weibliche Gebärmutter. Phil. Transact. 1817. p. 2. p. 252 ff.  
 Medel's Archiv. Bd. 4. S. 277.



wahrscheinlich mehr oder weniger bedeutende Verschiedenheiten Statt finden. Doch scheint die Annahme von Haller, daß er erst mit dem Ende der dritten Woche sichtbar werde <sup>1)</sup>, nicht ganz richtig, indem, außer andern, die vorher angeführte Beobachtung von Home dagegen spricht.

## 2. Art der Entstehung.

### §. 2597.

Noch schwieriger ist die Angabe der Art der Entstehung des Embryo, und die hierüber vorhandenen Ansichten sind beinahe bloß Hypothesen, keinesweges auf Erfahrung und That- sachen begründet.

Gewiß ist wohl zuvörderst, daß der Embryo von seinem ersten Entstehen an mit den Hüllen verbunden ist.

Die entgegengesetzte Annahme, daß er frei im Frucht- wasser entstehe, ist in der That schwerlich haltbar.

Die

Treu de chylo foetus. Altdorf. 1715. Rec. in Hall. coll. T. V.

Bernhardi de nutritione foetus in utero. Halae 1752.

J. de Dieft. An sui sanguinis solus opifex foetus. Paris. 1725. Rec. in Hall. coll. disp. T. V.

A. Nann everla vasorum rubrorum uteri anatomis ac commu- nicatio cum placenta. Erford. 1751.

R. Forsten quaestiones medicae. L. B. 1774. Quaestio IV. Num placenta inter et uterum vera adit vasorum anatomi- calis.

Schaeffer de commercio foetus cum matre per nervos. Erlangae 1775.

Richard de modo nutritionis foetus. Erford. 1783.

Stoy de nexu inter matrem et foetum. Halae 1786.

1) Elem. phys. T. VIII. p. 61.

Die Gründe<sup>1)</sup>, daß

1) das Nervensystem der zuerst gebildete, nie mit dem Ei verbundene Theil sey;

2) allmählich mitten in dem Fruchtwasser ein Wölkchen entstehe, welches der Fötus sey;

3) der Fötus der gewöhnlichen Ansicht nach sogleich anfänglich gekrümmt seyn müsse, da er doch gerade sey; scheinen in der That einer Widerlegung fähig zu seyn.

Theils ist es noch keinesweges bestimmt ausgemacht, welcher Theil der zuerst gebildete ist. Es ist mir 1) wahrscheinlicher, daß das zuerst sichtbare Rudiment die gemeinschaftliche Grundlage mehrerer Theile ist, wie bei den niedrigeren Thieren ein Organ, bei den niedrigsten die dem Anschein nach fast ganz homogene Substanz, zugleich mehrere Organe darstellt. Dann ist es 2) sehr wohl denkbar, daß das zuerst erscheinende Nervensystem anfangs mit den Eihüllen zusammenhängt.

Die, als zweiter Grund angeführte Thatfache findet 3) in der That nicht Statt, und man sieht 4) nicht ein, warum der Embryo nicht eben so wohl gerade als gekrümmt aus einem Theile des Eies hervordawachsen könne.

Endlich spricht gegen diese Ansicht der Umstand, daß das Amnion und die in ihm enthaltene Feuchtigkeit bei den Vögeln bestimmt später als der Embryo entsteht, und er hier von seinem ersten Entstehen an mit dem Ei im Zusammenhang erscheint.

Unstreitig also gilt dies auch für den menschlichen, und dieser entwickelt sich daher an und aus einem Eitheke.

Es fragt sich aber, aus welchem und auf welche Weise?

Der

1) C. F. Burdach de primis momentis formationis foetus. Regiom. 1814.

nach außen gerichtet, zugleich wenden sich bisweilen, durchaus aber nicht immer, die obern etwas nach unten, die untern etwas nach oben. Oft haben auch vorzüglich die letztern eine gerade entgegengesetzte Richtung.

Ungefähr in der sechsten bis siebenten Woche ist das jetzt erschienene, und sich allmählich verlängernde Stümpfchen in einen peripherischen und einen centralen Abschnitt, die Hand und den Vorderarm, den Fuß und den Unterschenkel, abgetheilt.

Eine bis zwei Wochen später erscheint die dritte, der Oberarm und der Oberschenkel.

Die später erscheinenden Abtheilungen sind anfangs beträchtlich kleiner als die früher vorhandenen, ungeachtet bei vollendeter Ausbildung das Gegentheil Statt findet.

Um die Zeit des Anfangs der ersten Sonderung des Gliedstumpfes in einen innern und einen äußern Theil wird dieser an seinem freien Ende rundlicher, breiter, und es bildet sich, wenigstens oft, um die Spitze ein einfacher, saumartiger Vorsprung, der durch eine Vertiefung von ihm abgegränzt wird.

Dieser theilt sich allmählich bald in die anfänglich verhältnißmäßig zu kurzen und dicken Finger, welche bis in den dritten Monat aber noch durch eine dünnere Substanz nach Art der Zehen bei den Cetaceen und den Schwimmdeln, der Flossen bei den Fischen, zusammen gehalten werden.

Diese dünnere, verbindende Substanz verschwindet allmählich von der Spitze gegen die Grundfläche der Finger und Zehen.

Er sitzt mit seinem untern Ende oder dicht über demselben, entweder unmittelbar oder mittelst der sehr kurzen Nabelschnur, auf der innern Eihaut auf.

Sitzt die Nabelschnur über dem untern Körperende auf, biegt sich dieses, schwanzähnlich, etwas nach vorn.

Alle später vorhandenen Oeffnungen sind vollkommen verschlossen.

Allmählich vergrößert sich der Kopf verhältnismäßig bedeutend, so daß er um den Anfang des zweiten Monates fast die Hälfte des ganzen Körpers beträgt. Vor und nach dieser Periode ist er wenigstens gewöhnlich kleiner.

Der Körper des Embryo krümmt sich sehr beträchtlich, wohl in seinem obern als untern Ende, der Kopf geht in den Stamm unter einem rechten Winkel über, und der untere, im Sinne entsprechende Theil desselben ist nur an das obere Ende der Brusthöhle geheftet. Der Stamm selbst ist dagegen ganz gerade. Es findet sich äußerlich bis zum Ende des zweiten Monates keine Spur eines Halses.

Bis um die Mitte des dritten Monates springt das untere, nach vorn und oben gekrümmte Ende der Wirbelsäule in Gestalt eines anfänglich längern, allmählich sich verkürzenden und zuletzt ganz verschwindenden Schwanzrudimentes, welches aber immer durch seine innere Fläche angeheftet ist, unter dem After hervor.

Die Gliedmaßen erscheinen, die obern gewöhnlich etwas früher als die untern, in der fünften Schwangerschaftswoche, in Gestalt kleiner, stumpfspiziger Höckerchen, die oben dicht unter dem Kopfe, die untern dicht vor dem Schwanzenende. Beide sind vom Rücken gegen die vordere Seite, wegen starker Entwicklung der Unterleibshöhle, etwas

schwer zu erweisen, da individuelle Verschiedenheiten so leicht tauschen können. Indessen ließe sich diese Erscheinung einigermaßen aus der jetzt eintretenden Verkleinerung der Lufthebelblase und dem vielleicht noch nicht vollständig vorhandenen Ersatz derselben durch einen andern Nahrungsweg erklären.

### 5. Lebenserscheinungen des Fötus.

§. 2600.

Der Fötus ist, von seinem ersten Entstehen an, nie Theil des mütterlichen Organismus, sondern steht immer nur mit ihm in demselben Verhältnisse als der geborne, unmittelbar mit den Außendingen in Beziehung getretene mit der Außenwelt, er lebt sein eignes Leben. Dies ergibt sich unzweifelhaft aus der, schon oben (§. 717.) angegebenen, und durch mehrere Thatsachen erwiesenen Art der Verbindung zwischen mütterlichem und kindlichem Organismus.

Unter allen Ausßerungen des Lebens ist die auf Bildung gerichtete auf Kosten der übrigen im höchsten Grade entwickelt. Dies ergibt sich aus der Schnelligkeit der Entwicklung und Größezunahme desselben.

Im Wesentlichen finden unstreitig die verschiedenen Functionen des bildenden Lebens auf ähnliche oder dieselbe Weise vor als nach der Geburt Statt. Schon oben (§. 731 ff.) ist die Thätigkeit des Harnsystems nachgewiesen. Eben so freilich auch der Darmkanal und die Haut nicht.

§. 2601.

In dem Darmkanal des Fötus befindet sich schon sehr früh eine Flüssigkeit, welche nicht in allen Perioden dieselben Eigenschaften hat. Bis um die Mitte des Fötuslebens ist sie weiß

Die obern Gliedmaaßen durchlaufen, so wie sie früher als die untern erscheinen, auch alle Bildungsstufen schneller als sie, sind auch noch lange absolut stärker entwickelt, so daß sie noch bis zum fünften Jahre gleich lang zu seyn pflegen.

Mit dem Hervorbrechen der Gliedmaaßen nimmt auch die Bildung der äußern Zeugungstheile, der Nase, Augen und Ohren, des Mundes, auf die, in der Lehre von diesen Organen angegebne Weise, den Anfang.

Die Insertion der Nabelschnur rückt allmählich höher nach oben, indessen befindet sich noch beim reifen Fötus diese Stelle der Schambeinfuge verhältnismäßig bedeutend näher als bei vollkommner Ausbildung, Verschiedenheiten, welche mit der allmählichen Verkleinerung der Leber in einem unmittelbaren Zusammenhange stehen.

#### 4. Wachstum.

§. 2599.

Von der Länge einiger Linien wächst der Fötus binnen 10 Monatsmonaten zu der Länge von ungefähr  $1\frac{1}{2}$  Fuß, und erlangt ein Gewicht von ungefähr acht Pfunden bürgerlichen Gewichtes.

Die Schnelligkeit des Wachsthum's ist im Anfange am größten, und mindert sich allmählich. Daß sie im zweiten Monate ab, im dritten wieder zunehme, und vorzüglich in der letzten Hälfte des vierten Monates, also gegen die Mitte der Schwangerschaft, am raschesten sey, worauf sie sich dann wieder bis zum Ende derselben vermindere<sup>1)</sup>, ist

U a a 3

schwer

1) Autenrieth Suppl. ad hist. embryon. p. 4. 5.

Sümmerring Icones embryonum p. 5.

Kindspech gefunden wurde, daß das Einklinken des Fruchtwaßers keine nothwendige Bedingung zu seiner Entstehung ist. Der Umstand, daß bisweilen in dem Darmkanal in regelwidriger Verwachsung nur oberhalb dieser Stelle Kindspech vorkommt <sup>1)</sup>, beweist daher durchaus nichts für die Verschlucken des Fruchtwaßers und die Bildung des Kindspeches aus demselben <sup>2)</sup>, sondern höchstens, daß vorzüglich in dem obern Theile des Darmkanals Absonderung Statt findet, und daher die eigenthümliche Färbung des Kindspeches bewirkt wird, die von der Galle hergeleitet werden kann, da sich die Farbe derselben gleichzeitig mit der Farbe des Kindspeches auf entsprechende Weise umwandelt <sup>3)</sup>, wie auch mit Lohsteins Angabe übereinstimmend, fand, und auch in einem reifen kopslosen Fötus der Darm einen halb durchsichtigen, klebrigen, nicht schwarzen Excrement hielt <sup>4)</sup>.

Indessen fragt es sich, ob selbst diese Annahme gegründet ist, da in den vorher angeführten Fällen ausdrücklich die Anwesenheit einer gelb gefärbten, die Eigenschaften des Kindspeches beßigenden Substanz angegeben wird, und in Versuchen keine Galle in dem Kindspech gefunden wurde <sup>5)</sup>.

Einige

1) Horch E. n. e. Dec. III. a. III. 188.

Desgranges bei Corvisart J. de méd. An X. Therm.  
Osiander neue Denkw. I. 1. S. 179.

2) Osiander's Handb. der Entbindungsk. Th. I. S. 237.

3) Lohstein S. 132.

4) Monro Transact. of the Society of Edinburgh. III. 1. p. 26.

5) Simmons a. a. D. S. 7.

weißlich, schleimig, von jetzt an aber wird sie gelblichgrün, dicker, zäher, und allmählich, vorzüglich in dem dicken Darm, dunkler gefärbt, bis sie in den letzten Monaten im ganzen Darmkanal, den sie strotzend anfüllt, dieselben Eigenschaften darbietet. Diese Flüssigkeit ist das *Kindspech* (*Meconium*), welches ungefähr aus zwei Dritttheilen Wasser, beinahe einem Dritttheil einer eigenthümlichen, pflanzenähnlichen Substanz, und einigen Hunderttheilen Schleim besteht <sup>1)</sup>.

Ueber die Entstehungsweise des Kindspeches weichen die Meinungen insofern ab, als es nach Einigen ein Erzeugniß der Verdauung des verschluckten Fruchtwassers, nach Andern dagegen nur der Absonderungsthätigkeit des Darmkanals ist.

Ungeachtet nur höchst wahrscheinlich das Fruchtwasser verschluckt und dann verdaut wird, so beweisen doch die Fälle, wo auch in dem Darmkanal von kopf- und mundlosen Fötus <sup>2)</sup>, oder in dem Darmkanal unterhalb einer regelwidrigen Verschliefungsstelle <sup>3)</sup>, oder in einem einzelnen, ganz von dem übrigen Darm getrennten, überall verschlossenen Darmstück eines, an einem regelmäßig gebildeten Kinde hängenden Rudimentes <sup>4)</sup>, oder eines vollkommen zweiten Körpers <sup>5)</sup>

§§§ 4

Kindes

1) Bouillon la Grange in den *Annales de Chimie* T. 86 u. 87.

2) R. de Graaf de mulierum org. In *Opp. omp.* p. 292.

Obbelius in den *Schw. Abb.* 1785. S. 176.

Gilibert advers. med. pract. pag. CXXXII seqq.

3) Pied. In Corvisart J. de méd. An. X. Frimaire.

4) Simmons medical facts. Vol. VIII. London, 1800. p. 7.

5) Brugmans bei Bernard quaest. var. med. argum. L. B. 1796. De Meconii origine. p. 51.



Kindspech gefunden wurde, daß das Einschlucken des Fruchtwassers keine nothwendige Bedingung zu seiner Entstehung ist. Der Umstand, daß bisweilen in dem Darmkanal bei regelwidriger Verwachsung nur oberhalb dieser Stelle Kindspech vorkommt <sup>1)</sup>, beweist daher durchaus nichts für das Verschlucken des Fruchtwassers und die Bildung des Kindspeches aus demselben <sup>2)</sup>, sondern höchstens, daß vorzüglich in dem obern Theile des Darmkanals Absonderung Statt findet, und daher die eigenthümliche Färbung des Kindspeches bewirkt wird, die von der Galle hergeleitet werden könnte, da sich die Farbe derselben gleichzeitig mit der Farbe des Kindspeches auf entsprechende Weise umwandelt <sup>3)</sup>, wie ich, mit Lobsteins Angabe übereinstimmend, fand, und da auch in einem reifen kopflosen Fötus der Darm einen halb durchsichtigen, flebrigen, nicht schwarzen Schleim enthielt <sup>4)</sup>.

Indessen fragt es sich, ob selbst diese Annahme gegründet ist, da in den vorher angeführten Fällen ausdrücklich die Anwesenheit einer gelb gefärbten, die Eigenschaften des Kindspeches besitzenden Substanz angegeben wird, und bei Versuchen keine Galle in dem Kindspech gefunden wurde <sup>5)</sup>.

Einigen

1) Horch E. n. o. Dec. III. a. III. 188.

Desgranges bei Corvisart J. de méd. An X. Therm.

Osiander neue Denkw. I. 1. S. 179.

2) Osiander's Handb. der Entbindungsk. Th. I. S. 237.

3) Lobstein S. 132.

4) Monro Transact. of the Society of Edinburgh. III. 1. p. 216.

5) Simmons a. a. D. S. 7.

Einigen Antheil scheint indessen doch die Galle zu haben, da theils in manchen Fällen, namentlich dem von Sims, wo das Kind zwei Jahr alt war, die Verschließung erst später eingetreten seyn konnte, in andern, namentlich dem von Brugmans, ausdrücklich einige Verschiedenheit zwischen dem in dem verschloßnen und dem, mit dem Gallensystem zusammenhängenden Darm enthaltenen Kindspech angegeben wird, die Galle, auch wenn man sie nicht in demselben entdeckt, dens noch Antheil an seiner Bildung haben kann, überdies die Thätigkeit der mangelnden Leber in regelwidrigen Fällen durch den Darm ersetzt werden kann.

## §. 2602.

Die äußere Oberfläche des Fötus ist mit einer eigenthümlichen Substanz, dem Kindschleim, oder Käsefirniß (*Vernix caseosa*)<sup>1)</sup> bedeckt.

Er ist gelblichweiß, klebrig und fettig.

Durch seine Mischung erscheint er als eine, zwischen dem Faserstoff und dem Fette stehende Substanz, welche besonders mit dem Wallrath viele Aehnlichkeit hat<sup>2)</sup>.

Er findet sich nicht während der ganzen Schwangerschaft, sondern erst ungefähr vom sechsten Monat an.

Ueber seinen Ursprung ist man nicht einig, sofern er nach Einigen ein, sich auf der Haut des Fötus absetzender Nieders-

Naa 5

schlag

1) J. J. G. Schulz de ortu et usu caseolae vernicis. Holmst. 1788.

2) Buniva et Vauquelin. C. oben C. 707.

Emmert und Reuß chem. Untersuchung des Fruchtwassers aus dem zeitigen Ei und der käsigcn Materie auf der Haut der neugeborenen Kinder. Oslanders Annalen Bd. 2. C. 122 ff.

Ueber den Umfang des zur Ernährung thätigen Theils des Schleimhautsystems variiren die Annahmen bedeutend.

Nach Harvey<sup>1)</sup>, El. de la Courvée<sup>2)</sup>, Haller<sup>3)</sup>, Treu<sup>4)</sup>, Darwin<sup>5)</sup>, geschieht die Einsaugung nur durch den Darmkanal;

nach Scheel<sup>6)</sup> zugleich durch die Lungen, wosin er sowohl durch die Nase als durch den Mund gelangen kann;

nach Lobstein<sup>7)</sup> auch durch die weiblichen Zeugungstheile;

nach Oken<sup>8)</sup> endlich auch durch die Brüste, mit dem Unterschiede, daß frühern Ansichten<sup>9)</sup> zu Folge, der Fetus aus sich selbst die in seinen Brüsten bereitete Milch saugt, nach Oken dagegen die Brüste das Schafwasser aufnehmen, umwandeln, und aus ihren Saugadern die Fruchttigheit in die Placenta, und von da in den Milchbrustgang beföhrt werde.

Außerdem sieht man als dritte, vierte und fünfte Nahrungsquelle 1) die Flüssigkeit der Nabelblase<sup>10)</sup>

2) W.

1) De generatione. Amst. 1662. p. 253. p. 568.

2) De nutritione foetus in utero paradoxa. Dautisci 1655.

3) Elem. physiol. T. VIII. P. 1. p. 201 seqq.

4) De chylo foetus. Altdorf. 1715 seqq.

5) Zoonomie Bd. 1. Abth. 2. S. 344 ff.

6) De liq. amnii utilitate. Hafn. 1799.

7) Essai sur la nutr. du foetus. S. 102.

8) Zeugung. Bamberg. 1805. S. 162.

9) Erwdhnt von Danz a. a. D. Th. 2. S. 71.

10) Needham de formato foetu. Lond. 1667. p. 79.

Blumenbach spec. physiol. comp. inter animalia sang. ovip. et vivip. Gott. 1789.

Ejusd. Instit. physiol. p. 449.

der Schwangerschaft fühlbar, ohne daß daraus folgte, daß sie nicht schon vorher Statt fänden, da sie durch die Kleinheit des Fötus und die beträchtliche Menge des Kindswassers unmerklich gemacht werden können.

## §. 2605.

Der Fötus schöpft aus dem mütterlichen Körper nothwendig den Stoff, aus welchem er sich fortwährend bildet, erhält, und die erwähnten Absonderungen bildet: es fragt sich indessen, ob es nur eine oder mehrere Ernährungsweisen gebe.

Mehrere, namentlich Hippokrates, Aristoteles, Galen, Monro<sup>1)</sup>, Danz<sup>2)</sup> haben die erstere Ansicht, und sehen die Nabelblutader als den einzigen Weg an, auf welchem Nahrungsstoff in den Fötus gelange; dagegen nehmen andere mehrere Wege an, namentlich 1) außerdem die Haut, oder 2) das Schleimhautsystem in einem größern oder geringern Umfange.

Die Quelle ist, dieser Ansicht nach, das den Fötus umgebende Kindswasser.

Außer frühern Schriftstellern<sup>3)</sup> nehmen Vos<sup>4)</sup>, Weugmans<sup>5)</sup>, Van den Bosch<sup>6)</sup> und Oslander<sup>7)</sup> Einsaugung durch die Haut an.

Ueber

1) Monro I. Essay on the nutrition of foetuses, Edinb. med. essays. Vol. 2. p. 102 ff.

2) Danz Zergliederungskunde des neugeb. Kindes.

3) Eitirt bei Haller Elem. physiol. T. VIII. p. 205.

4) C. J. Vos de nutritione, inprimis nervosa. Traj. 1789. Rec. in Ludwigi script. neurol. min. T. IV. p. 205.

5) Bei Van den Bosch. S. oben S. 707.

6) Ebendasselbst.

7) Handb. der Entbindungsk. Th. 1. S. 237.

Ueber den Umfang des zur Ernährung thätigen Theiles des Schleimhautsystems variiren die Annahmen bedeutend.

Nach Harvey<sup>1)</sup>, El. de la Courvée<sup>2)</sup>, Haller<sup>3)</sup>, Treu<sup>4)</sup>, Darwin<sup>5)</sup>, geschieht die Einsaugung nur durch den Darmkanal;

nach Scheel<sup>6)</sup> zugleich durch die Lungen, wohin es sowohl durch die Nase als durch den Mund gelangen kann;

nach Lobstein<sup>7)</sup> auch durch die weiblichen Zeugungstheile;

nach Oken<sup>8)</sup> endlich auch durch die Brüste, mit dem Unterschiede, daß frühern Ansichten<sup>9)</sup> zu Folge, der Fötus aus sich selbst die in seinen Brüsten bereitete Milch sauge, nach Oken dagegen die Brüste das Schafwasser aufnehmen, umwandeln, und aus ihren Saugadern die Feuchtigkeit in die Thymus, und von da in den Milchbrustgang geführt werde.

Außerdem sieht man als dritte, vierte und fünfte Nahrungsquelle 1) die Flüssigkeit der Nabelblase<sup>10)</sup>,

2) die

1) De generatione. Amst. 1662. p. 255. p. 568.

2) De nutritione foetus in utero paradoxa. Dautisci 1655.

3) Elem. physiol. T. VIII. P. I. p. 201 seqq.

4) De chylo foetus. Altdorf. 1715 seqq.

5) Zoonomie Bd. 1. Abth. 2. S. 344 ff.

6) De liq. amnii utilitate. Hafn. 1799.

7) Essai sur la nutr. du foetus. S. 102.

8) Zeugung. Bamberg. 1805. S. 162.

9) Erwähnt von Danz a. a. O. Th. 2. S. 71.

10) Needham de formato foetu. Lond. 1667. p. 79.

Blumenbach spec. physiol. comp. inter animalia al. lang. ovip. et vivip. Gott. 1789.

Ejusd. Instit. physiol. p. 449.

), die Allantois <sup>2)</sup> und die Wharton'sche Sulze <sup>3)</sup> n.

Die, welche mehrere Nahrungsweisen festsetzen, sind entweder der Meinung, daß sie zugleich, oder nach einander eintreten. Die erstere Ansicht ist die gewöhnlichere.

Am besten lassen sich sichere Resultate auffinden, wenn die Gründe für die verschiedenen Ernährungsweisen dargestellt und geprüft werden.

§. 2606.

1) Für die Ansicht, daß der Fötus durch die Nabelblutader Nahrungstoff erhalte, führt man an:

- a) die Beständigkeit und Allgemeinheit des Nabelstranges, der Aderhaut und des Mutterkuchens;
- b) ihren eigenthümlichen Bau und das Verhältniß zwischen ihnen und dem Fötus;
- c) ihre frühe Anwesenheit;
- d) den Umstand, daß anfänglich die Flocken der Aderhaut bloß wunde sind, wo sie dann bloß die Function des Einsaugens haben können <sup>1)</sup>;
- e) die nachtheiligen Folgen, welche Unterbrechung des Blutlaufes durch den Nabelstrang für das Leben und die Ernährung des Fötus haben.

2) Gründe

Edmerring zu Hallers Grundriß der Physiologie. 1796.

Bd. 2. S. 800.

Lobstein essai sur la nutrition du foetus.

Emmert über das Nabelbläschen in Reil's Archiv. X. S. 77.

Jörg. Zeugung. S. 286.

1) Harvey, Lobstein, Oken. S. oben S. 730. bei der Geschichte der Allantois.

2) Neuerlich vorzüglich Lobstein a. a. D.

3) Lobstein a. a. D. S. 117.

d) der verhältnißmäßig sehr starken Entwicklung Lymphadernsystems, sowohl der Gefäße als der Drüsen an der oberen Hälfte der vordern Fläche des Körpers vom Nabel namentlich in dem vordern Mittelfelde <sup>1)</sup>, welche ich gleich immer bestätigt gefunden habe.

#### §. 2607.

Die, welche nur einen Weg, namentlich den durch Nabelblutader, gestatten, stützen sich theils auf die Länglichkeit der für die übrigen, vorzüglich die Ernährung mittelst des Fruchtwassers durch Haut und Schleimhaut führenden Gründe, theils auf die unumgängliche Nothwendigkeit des Bestehens dieses Weges.

1) Die Ernährung durch das Fruchtwasser überhaupt wird als unwahrscheinlich dargestellt <sup>2)</sup>:

a) weil das Fruchtwasser aus dem Blute des Fötus gesondert werde;

b) wegen seines geringen Gehalts an nährenden Bestandtheilen <sup>3)</sup>;

c) die Unschädlichkeit einer sehr verdorbenen Beschaffenheit des Fruchtwassers für Gesundheit und Leben des Fötus;

d) Leben des Fötus nach mehr oder weniger langer fließendem Fruchtwasser <sup>4)</sup>;

e)

1) Lobstein S. 139.

Monro a. a. D. S. 143 ff.

Van den Bosch a. a. D.

2) Danz S. 59.

3) Van den Bosch. Bei Schlegel S. 458.

4) Van den Bosch. S. 458.

d) von ausgefallnen Seidenhaaren des Fötus im Kindes-  
th;

e) den an Fötus im Schafwasser beobachteten Schling-  
bewegungen, so wie dem Beißen und Saugen desselben wäh-  
rend und nach der Geburt;

f) der, bei Verschließung des Darms an einer Stelle  
ines Verlaufes bloß oberhalb derselben Statt findenden  
Anwesenheit von Kindspech.

5) Für die Ernährung von der Nabelblase aus sprechen:

a) die Analogie derselben mit dem Dotter der übrigen  
Wirbelthiere und das deutliche Eindringen seiner Feuchtigkeit  
in den Darmkanal derselben;

b) die anfängliche Größe und das Schwinden derselben  
mit Veränderung der Beschaffenheit der in ihr enthaltenen  
Lässigkeit.

6) Die Gründe für die Ernährung aus der Allantois-  
flüssigkeit sind schon oben<sup>1)</sup> angeführt.

7) Die Ernährung durch die Wharton'sche Sulze wird  
ahrscheinlich:

a) aus der ernährenden Beschaffenheit derselben;

b) der, mit der Kürze und Dicke des Nabelstranges zusam-  
menfallenden größern Menge derselben in den frühern Em-  
bryoperioden, indem die Dicke des Nabelstranges keinesweges  
loß von der Anwesenheit mehrerer Theile in ihm abhängt;

c) dem von Moortwyk und Rödder, so wie neuer-  
lich von Uttini beobachteten Fortdringen von Flüssigkeiten  
durch ihn;

d) der

---

1) S. 730.



d) der verhältnißmäßig sehr starken Entwicklung des Saugadersystems, sowohl der Gefäße als der Drüsen an der obern Hälfte der vordern Fläche des Körpers vom Nabel aus, namentlich in dem vordern Mittelfelde <sup>1)</sup>, welche ich gleichfalls immer bestätigt gefunden habe.

#### §. 2607.

Die, welche nur einen Weg, namentlich den durch die Nabelblutader, gestatten, fügen sich theils auf die Unzulänglichkeit der für die übrigen, vorzüglich die Ernährung mittelst des Fruchtwassers durch Haut und Schleimhaut angeführten Gründe, theils auf die unumgängliche Nothwendigkeit des Bestehens dieses Weges.

1) Die Ernährung durch das Fruchtwasser überhaupt wird als unwahrscheinlich dargestellt <sup>2)</sup>:

a) weil das Fruchtwasser aus dem Blute des Fötus abgesondert werde;

b) wegen seines geringen Gehalts an nährenden Bestandtheilen <sup>3)</sup>;

c) die Unschädlichkeit einer sehr verdorbenen Beschaffenheit des Fruchtwassers für Gesundheit und Leben des Fötus;

d) Leben des Fötus nach mehr oder weniger lange abgeflossnem Fruchtwasser <sup>4)</sup>;

e) da

1) Lobstein S. 139.

Monro a. a. D. S. 143 ff.

Van den Bosch a. a. D.

2) Danz S. 59.

3) Van den Bosch. Bei Schlegel S. 458.

4) Van den Bosch. S. 458.

e) der Mangel an Genauigkeit der Beobachtungen von Kindern mit Unterbrechung, Verschließung, Trennung des Nabelstranges;

f) die Anwesenheit einer beträchtlichen Menge von Fruchtwasser am Ende der Schwangerschaft<sup>1)</sup>.

2) Gegen die Ernährung durch die Haut insbesondere führt man an<sup>2)</sup>:

a) die Bedeckung derselben durch den Rindschleim;

b) das nothwendige Stagniren des eingedrungenen Fruchtwassers im Schleimgewebe;

c) die Zähigkeit des Fruchtwassers, wodurch es wenig zum Eindringen in die Haut geeignet sey.

3) Gegen die Ernährung durch den Mund insbesondere, wird angegeben:

a) der Mangel an Uebereinstimmung zwischen dem Fruchtwasser und der in dem Magen enthaltenen Flüssigkeit<sup>3)</sup>, selbst zwischen dem Rindspech und dem Fruchtwasser<sup>4)</sup>;

b) die Unmöglichkeit, ohne Athmen zu schlucken<sup>5)</sup>;

c) die gewöhnliche Verschließung des Mundes<sup>6)</sup>;

d) das Nichteindringen von, in das Fruchtwasser eingespritzter Milch in die Mundwege<sup>7)</sup>;

e) der

1) Monro S. 166.

2) Haller Elem. physiol. T. VIII. p. 203.

3) Monro S. 163. Van den Bosch. 460.

4) Danz S. 60.

5) Danz S. 59.

6) Monro S. 173. Van den Bosch 458.—459.

7) Monro S. 175.

e) der Umstand, daß es, falls es durch Druck in den Mund gepreßt würde, eben so gut in die Luftröhre als in die Speiseröhre treten müsse <sup>1)</sup>);

f) das Vorkommen kopf- und mundloser, dennoch wohl genährter Fötus <sup>2)</sup>);

g) die Producte der Verdauung im Darmkanal beweisen nichts, da sie bloß durch die Thätigkeit desselben entstehen konnten <sup>3)</sup>); um so mehr, da! man auch unterhalb der Verschlus-  
 • fungsstelle wahres Kindspech fand <sup>4)</sup>);

h) die Anwesenheit von Kindspech und Haaren im Magen, wird als kein Beweis angesehen, da die Haare sich im Darmkanal bilden konnten, und das Kindspech vom Darmkanal aus zurücktreten konnte <sup>5)</sup>);

i) das Schlucken und Saugen des neugeborenen Kindes kann man gleichfalls als nicht beweisend ansehen, da eine Menge andere Erscheinungen eintreten, ohne daß eine solche Vorbereitung Statt gefunden hätte, und ja doch auch mit dem Schlucken des Fruchtwassers ein Anfang gemacht werden mußte.

k) auf

---

1) Danz. S. 59.

G. J. C. Thiemelli Comment. qua nutritionem foetus in utero per vasa umbilicalia solum fieri, occasione monstri ovilli in ore et faucibus nati ostenditur. Lips. 1751.

Van den Bosch. S. 459.

2) Danz. S. 60.

3) Van den Bosch. S. 461.

4) Brugmans bei Van den Bosch. S. 461.

5) Monro S. 177. 178.

k) auf jeden Fall sey die Anwesenheit von Fruchtwasser im Magen eine regelwidrige Erscheinung und Folge eines starken Druckes<sup>1)</sup>.

4) Die Gründe für die Ernährung durch die Feuchtigkeit des Allantois sind schon oben widerlegt<sup>2)</sup>.

§. 2608.

Es fragt sich nun, wiefern durch diese Bekämpfung der Ernährung durch das Fruchtwasser aufgestellten Gründe die Unrichtigkeit dieser Ansicht erwiesen sey.

Eine genauere Prüfung zeigt, daß sich dies in der That ergibt.

Denn es ist

1) durch nichts erwiesen, vielmehr unwahrscheinlich, daß das Fruchtwasser aus dem Blute des Fötus abgesondert werde, die Gefäße des Amnion nur Ernährungsgefäße zu seyn brauchten, und die Absonderung des Schafwassers durch ein Durchdringen von der Gebärmutter aus vermittelt werden kann.

2) Die geringe Menge von nährenden Bestandtheilen besteht nicht, da theils Ernährung aus noch weniger reichlich mit versehenen Substanzen Statt findet, theils anfangs das Fruchtwasser reicher daran ist, theils endlich die stärkere Thätigkeit des Fötus diesen Mangel selbst ersetzt;

3) der dritte und vierte Grund beweisen höchstens nur, daß diese Flüssigkeit nicht die einzige Nahrungsquelle ist, oder, daß der Fötus eine Zeitlang, ohne zu sterben, ihr Versiegen

Bbb 2

es

1) Danz S. 59. 60.

2) S. 731 ff.

ertragen könnte, und selbst nicht dies, da durch Abfluß des Fruchtwassers die Richterzeugung von neuem, nicht einmal wahrscheinlich gemacht ist.

4) Mehrere Beobachtungen von, mit wirklich verschlossenen Nabel gebornen Kindern, trifft wirklich der ihnen im Allgemeinen gemachte Vorwurf nicht. Es folgt indessen auch hieraus zunächst nur, daß der Fötus die Unterbrechung des Zusammenhangs mit der Gebärmutter durch den Nabelstrang eine Zeitlang ertragen kann.

5) Die Anwesenheit einer Menge von Fruchtwasser am Ende der Schwangerschaft beweist nichts, da im Allgemeinen wirklich selbst die absolute Menge desselben am Ende der Schwangerschaft bedeutend vermindert ist <sup>1)</sup>. Daß sich zu dieser Zeit eine geringere Menge desselben findet, beweist nur, daß das Fruchtwasser jetzt weniger nothwendig ist, und dies läßt sich sehr wohl mit der Ansicht, daß es zur Ernährung diene, durch die Betrachtung vereinigen, daß jetzt die Bildungsproceße weniger energisch sind, und vielleicht eine andre Ernährungsweise stärker entwickelt ist.

Die gegen die Ernährung durch die Haut insbesondere angeführten Gründe lassen sich leicht widerlegen.

1) Der Kinderschleim fehlt in den früheren Perioden, zu einer Zeit also, wo das Fruchtwasser am nährndsten ist, und die Bildungsproceße am raschesten sind. Auch späterhin ist die Haut nicht gleichmäßig und so damit bedeckt, daß dadurch Einsaugung unmöglich gemacht würde;

1) S. oben S. 709.

2 — 3) die Nothwendigkeit des Stagnirens und die Unmöglichkeit des Fruchtwassers, einzudringen, sind durch nichts erwiesen und höchst unwahrscheinlich.

Auch die Gründe gegen die Ernährung durch den Mund sind nicht beweisend, da

1) der Mangel an Uebereinstimmung der im Magen enthaltenen Feuchtigkeit mit dem Fruchtwasser sich leicht aus einer vorgegangenen Veränderung derselben erklärt, und oft wirklich Uebereinstimmung beobachtet wurde;

2) die Unmöglichkeit, ohne Athmen zu schlucken, durch nichts erwiesen und wirklich nicht vorhanden ist, überdies das Fruchtwasser in alle Höhlen, auch ohne Schlingen, dringen kann;

3) die Verschließung des Mundes beweist nichts, da er häufig offen ist, und Öffnen desselben im Schafwasser beobachtet wurde;

4) eben so wenig Nichteindringen von Milch, da bei diesen Versuchen das Thier todt war;

5) Eintreten des Fruchtwassers in die Luftröhre ist theils schädlich, selbst vielleicht nützlich, theils durch die Erfahrung nachgewiesen<sup>1)</sup>;

6) das Vorkommen kopfloser Fötus u. s. w. beweist nur, daß dieser Weg nicht der einzige ist;

7) Entwicklung von Haaren ist eine so seltne Erscheinung, daß das häufige Vorkommen derselben im Darm des Fötus, zumal da sie genau mit den Seidenhaaren desselben übereinkommen, als ein sehr kräftiger Beweisgrund angesehen werden kann, wenn gleich die Anwesenheit von Rindspech an sich für sich nichts beweist;

Abb 3

8) eben

1) S. oben S. 710.

8) eben so ist, auch wenn man mit Recht die Ansicht, das Verschlucken des Fruchtwassers als Vorbereitung für das Saugen und Schlingen anzusehen, verwirft, durch nichts erwiesen, daß das im Magen u. s. w. gefundene eine regelwidrige Erscheinung sey.

§. 2609.

Hiernach bliebe also die Ernährung durch das Fruchtwasser wenigstens als im hohen Grade wahrscheinlich stehen.

Eben so ist die Ernährung durch die Nabelblasenfeuchtigkeit und die Wharton'sche Sulze nach den angeführten Thatsachen schwerlich zu läugnen. Höchst wahrscheinlich gelangt in dem Nabelstrang, von der Nachgeburt aus, fort während die weißliche Feuchtigkeit zum Fötus, welche sich in der Nachgeburt findet.

Dagegen ist es sehr unwahrscheinlich, daß die Feuchtigkeit der Allantois Antheil habe.

§. 2610.

Es fragt sich aber endlich, ob wirklich die Ernährung durch das Nabelvenenblut auf so sichern Gründen ruht, als vorzüglich die annehmen, welche sie als die einzige Quelle betrachten?

In der That ist das Gegentheil wenigstens nicht zu läugnen, indem alle, für diese Ansicht angeführten Thatsachen nur die Nothwendigkeit des Blutlaufes in der Aderhaut und dem Mutterkuchen beweisen, nicht aber das Wesen der Function in diesen Theilen bestimmen.

Da nun überdies die Ernährung auf drei andern Wegen Statt findet, und durch nichts bewiesen ist, daß diese Quellen nicht hinreichen, so ist die Annahme erlaubt, daß der Blutlauf in der Nachgeburt vermittelt der kindlichen Gefäße ge-

nicht

icht die gewöhnlich angenommene Bedeutung habe, sobald  
ch eine andre wahrscheinlich machen läßt.

Dies aber ist möglich, namentlich entspricht diese Func-  
tion dem Athmen, und sowohl ältere als neuere Physiologen  
aben daher den Mutterfuchen mit der Lunge verglichen \*).

Für diese Ansicht sprechen:

1) die Allgemeinheit des Athmungsbedürfnisses, welches  
uf andere Weise nicht befriedigt zu werden scheint;

2) die Aehnlichkeit zwischen dem Blutlauf durch die Lun-  
en und durch die Nachgeburt, sofern zu beiden das Blut  
ritt, aus welchem Absonderung und Ernährung im Körper  
Statt gefunden hatte, und das daher einer Erneuerung be-  
arf;

3) die Aehnlichkeit, welche hierdurch zwischen den mit  
Kiemen athmenden Thieren und dem Fötus der Lungenthiere  
esetzt wird;

4) die Schnelligkeit, womit Unterbrechung des Bluts-  
laufes durch die Nachgeburt tödtet;

Bbb 4

5) die

---

1) Mayow, Duverney, Valisneri, Cheselden, Hé-  
rissant, Boerhaave, Jampert bei Haller. Elem.  
physiol. T. VIII. p. 254.

Eckardt quaestio an duae arteriae umbilicales foetui pul-  
monum loco inserviant. Jenae. 1761.

E. Darwin von der Oxygenation des Blutes in den Lungen  
und dem Mutterfuchen. Zoonomie. Bd. 1. Abth. 2, XXXVIII.

B. N. G. Schreger de functione placentae uterinae. Erlan-  
gae. 1799.

Lobstein a. a. O. S. 122.

Ofen der Athmungsproceß des Fötus. Lucina Bd. 3. S. 294.



sich an mit dem allgemeinen Organismus in unmittelbarer Beziehung und Wechselwirkung, indem er jetzt im Stande ist, selbstständig zu leben.

Doch erfolgt regelmäßig diese Trennung als Frühgeburt (Abortus) nicht selten vor dem normalen Ende der Schwangerschaft, während weit seltener der Zusammenhang sich über die gewöhnliche Zeit hinaus erhält, und durch eine Spätgeburt (Partus tardivus L. serotinus) beendet wird<sup>1)</sup>.

Nur vom sechsten Monate des Fötuslebens an ist allerdings, und auch dies nur in seltenen Fällen, Entwicklung des selbstständigen Lebens möglich<sup>2)</sup>.

In wiefern die Schwangerschaft um eine etwas bedeutende Zeit über die normale hinaus verlängert werden könne, ist längst Gegenstand eines noch unentschiedenen Streites. Die Möglichkeit läßt sich nicht abläugnen, und mehrere glaubwürdige Thatsachen sprechen dafür; doch verdanken viele Angaben ihre Entstehung freilich dem Bedürfnis der Mutter, eine unregelmäßige, nach dem Tode des Vaters erfolgte Empfängnis in eine rechtmäßige umzuwandeln.

#### §. 2612.

Die Geburt wird durch die, von den gemeinschaftlich wirkenden Unterleibsmuskeln unterstützten Zusammenziehungen der Gebärmutter, welche von dem Grunde anfangen, während die schwächeren Fasern des Halses allmählich zu wirken aufhören, hervorgebracht. Hierdurch entsteht Verkürzung so wohl

1) Ueber früh- und spätreife Geburten, Mannheim 1807.

2) In einem neuern Falle lebte sogar ein, angeblich im fünften Schwangerschaftsmonate gebornes Kind noch im neunten Monate nach der Geburt.

E. Rodman im Edinb. med. and surg. Journal. Vol. XI. 455. und XII. 251.

Blutaderblutes unbedeutend ist, keinesweges das Nabelpulsaderblut als reines Pulsaderblut angesehen werden kann, da es größtentheils schon in der obern Körperhälfte gekreist hatte \*), endlich im Ei des Vogels das Blut der Nabelpulsader dunkel, der Blutader hell ist.

Die Nachgeburt ist daher durch den Kreislauf der Nabelgefäße vorzugsweise Athmungsorgan.

In dieser Function wird sie höchst wahrscheinlich durch die Leber unterstützt, da die Nabelblutader sich in diesem Organ größtentheils verzweigt, ehe sie ihr Blut in die untere Hohlader führt.

Die gröbere Nahrungssubstanz wird dagegen auf den vorher angegebenen Wegen zugeführt.

Von diesen aber bestehen nicht alle während des ganzen Fötuslebens.

Am frühesten, schon im zweiten Monate, hört die Thätigkeit der Nabelblase auf, nach Ablauf der ersten Hälfte der Schwangerschaft mindert sich auch die Ernährung durch das Fruchtwasser bedeutend, sofern es weniger reichlich, ärmer an ernährenden Bestandtheilen wird, und der sich bildende Kindsschleim wenigstens die Einsaugung durch die Haut mindert, so daß zuletzt vorzugsweise nur die Zufuhr durch die Wharton'sche Sulze übrig bleibt.

#### 6. Dauer des Fötuszustandes und Geburt.

##### §. 2611.

Der Fötuszustand dauert gewöhnlich zehn Monatsmonate. Am Ende dieser Periode wird der Fötus durch die Geburt (Partus) von dem mütterlichen Körper getrennt, und tritt von

Bbb 5

nun

\*) S. Bd. 3. S. 47. 48.

als die Gebärmutter, indem sie sich vergrößern, gefäßreicher, weicher werden, auflodern, ihre Adernchen sich deutlicher von einander unterscheiden, offenbar also auf die Stufe erheben, welche die übrigen, immer absondernden Thiere dauernd einnehmen, gerade wie die schwangere Gebärmutter sich den immer thätigen Muskeln verähnlicht.

Die Absonderung der Milch nimmt schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft ihren Anfang, ist aber jetzt noch nicht vollkommen.

Die Frauenmilch scheidet sich, wie die Milch aller Säugethiere, bloß durch Ruhe in zwei Bestandtheile, einen fettigen, gelblichen, die Sahne, und einen wässerigen. Die Sahne selbst zerlegt sich wieder in Butter und Buttermilch. Sowohl in der Sahne als in der ausgefahnten Milch findet sich eine eiweißähnliche Substanz, der Käsestoff, der beim Weibe in sehr geringer Menge vorhanden, und viel weicher, weniger gerinnbar als der Käsestoff der übrigen Thiere ist, und sowohl durch die Siedehitze, als durch Säuren zum Gerinnen gebracht, und dadurch ganz ausgeschieden werden kann. Der, des Käsestoffes ganz beraubte wässerige Theil der Milch sind die Molken, die einen süßlichen Geschmack haben, den ihnen der darin, vorzüglich beim menschlichen Weibe in Menge enthaltne Milchzucker mittheilt. In dem Käsestoff finden sich besonders viel phosphorsaure Erden. Wegen der geringen Menge und Weichheit des Käsestoffes gerinnt die Frauenmilch nicht, oder wenigstens nur schwach. Ihre Sahne soll keine Butter geben, indessen findet sich diese in der That gewöhnlich.

wohl als Verengung der Höhle der Gebärmutter, mithin wird von allen Seiten mit Ausnahme der untern Gegend, ein beträchtlicher Druck auf den Fötus ausgeübt, und dieser nach der Stelle wo er den geringsten Widerstand findet, also durch den sich erweiternden Muttermund, in die Scheide und durch die äußere Geschlechtsöffnung hervorgetrieben.

Unter den gewöhnlichen Bedingungen, ungefähr in dem Verhältniß wie 1000:1, zerreißen, ehe der Fötus aus der Gebärmutter getreten ist, die vor ihm hervorgebrungenen Eihäute, und das Fruchtwasser fließt größtentheils aus. Erst nachdem der Fötus geboren ist, wird das Ei ausgestoßen, indem durch die Zusammenziehung der Gebärmutter, welche unter normalen Bedingungen nach der Geburt des Fötus fortbauert, die Berührungsfläche zwischen ihm, namentlich dem Mutterkuchen und dem Ei, bedeutend verkleinert, und die Verbindungsgefäße zerrissen werden. Die fortdauernden Zusammenziehungen treiben dann auch das Ei hervor.

Nur sehr selten, vermuthlich bei etwas verlängerter Schwangerschaft, wird schon durch die ersten Zusammenziehungen der Gebärmutter der Zusammenhang zwischen ihr und dem Ei aufgehoben, und der Fötus nach Art der Säugthiere in den unverlegten Hüllen geboren.

Dagegen findet dieser Hergang der Geburt in den frühern Schwangerschaftsperioden wirklich Statt.

#### §. 2613.

Auch nach der Geburt aber findet noch längere oder kürzere Zeit ein körperlicher Zusammenhang zwischen dem mütterlichen und kindlichen Organismus durch die Milch Statt.

Während der Schwangerschaft erleiden, Behufs dieser Absonderung, die Brustdrüsen ganz ähnliche Umwandlungen,

als

Fläche der breiten Mutterbänder oder der Gebärmutter selbst, oder der Blase, oder dem Mastdarm, oder den Eierstöcken, oder Verichließung ihrer Unterleibsmündungen, Folgen der Begattung, Zustände, die vorzüglich bei Fremdenmädchen<sup>1)</sup>, vermuthlich in Folge häufiger und übermäßiger Reizung der Zeugungstheile, vorkommen, auch bei unfruchtbaren Weibern gefunden werden, und wahrscheinlich die häufigste Ursache der Unfruchtbarkeit sind, sofern sie die Begattungsbewegungen der Trompeten und den Eintritt der Eiflüssigkeit verhindern.

## II. Neuentstehender Organismus.

§. 2616.

Von den regelwidrigen Bedingungen, welche die Empfängniß und Ausbildung des neuen Organismus darbieten, werden hier vorzüglich nur die betrachtet, welche den ganzen neuen Organismus und das Ei insbesondere betreffen, abgehandelt, da die Bildungsabweichungen des Fötus schon sowohl im Allgemeinen, als insbesondere an mehreren Stellen des Werkes angegeben worden sind.

Das Ei weicht am frühesten

a) durch Regelwidrigkeit der Stelle, an welcher es sich bildet, vom Normal ab. Der am meisten regelwidrige Zustand dieser Art, wo es sich nicht innerhalb der Gebärmutter entwickelt, führt den Namen der Empfängniß oder Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (Conceptio l. graviditas extrauterina)<sup>2)</sup>. Unter dieser Bedingung entwickelt

1) Walter über die Krankh. des Bauchfelles S. 13.

Langstaff in med. chir. Transact. Vol. VIII. p. 505.

2) S. mein Handb. der pathol. Anat. Bd. 2. Abtheil. 1. S. 160 — 180.

## Zweiter Abschnitt.

Regelwidrige Bedingungen <sup>1)</sup>.

§. 2614.

Die mit der Begattung, Schwangerschaft und Geburt in Beziehung stehenden regelwidrigen Bedingungen der Zeugungstheile sind weit weniger vielfach und merkwürdig als die, welche der neuentstehende Organismus darbietet.

## I. Zeugungstheile.

§. 2615.

1) Eine, in den Begattungstheilen vorkommende regelwidrige Erscheinung ist das Beharren der Scheidenklappe nach dem Beischlaffe, bisweilen selbst nach der Geburt <sup>2)</sup>, welches insofern merkwürdig ist, als sich daraus ergibt, daß die Anwesenheit dieses Theiles kein sicheres Zeichen der Jungfräulichkeit ist, und die Geburt dadurch, vorzüglich, wenn es ungewöhnlich fest ist, erschwert wird.

2) Von den, oben (S. 615 ff.) erwähnten regelwidrigen Bedingungen der weiblichen Zeugungstheile sind vorzüglich Verwachsung der Unterleibsenden der Trompeten mit den benachbarten Theilen, namentlich der vordern oder hintern Fläche

1) Wrisberg de secundinarum humanarum varietate. Gotting. 1778. Rec. in sylloge eorum. T. 1.

Schaefer de placenta uterinae morbis. Lips. 1709.

Michaelis de placenta humana anatomice, physiol. et pathologiae confid. Erford. 1782.

Hebenstreit de funiculi umbilicalis pathologia. Lips. 1747. Rec. in Halleri coll. disp. anat. T. V.

2) S. oben S. 683.

Noch weniger unacanthisch sind die hieher gehörigen Untersuchungen des Nabelstrangs.

b) Sofern sie sich auf den ganzen neuen Organismus beziehen, die gleichzeitige Bildung mehrerer Eier und Fötus.

Folgendes sind die allgemeinsten Bedingungen hieron:

a) In dieser Vermehrung der Zahl findet sich gewöhnlich eine Anlage, indem dieselben Kellern, namentlich dieselbe Mutter, gewöhnlich mehrere Zwillinge u. s. w. hervorbringen.

β) Die höchste Zahl ist hier fünf. Im Durchschnitt läßt sich annehmen, daß Zwillingsgeburten sich zu einfachen wie 1:100; Drillingsgeburten wie 1:1000; Vierlingsgeburt wie 1:50,000 bis 60,000 verhalten.

c) Gewöhnlich sind bei Zwillingen: und Drillingseien die Mutterkuchen zu einem verbunden, es findet sich aber eine doppelte Ader: und Kindshaut und zwei oder drei Nabelschnüre, so daß beide Fötus völlig von einander getrennt sind. Wo beide nur in einer gemeinschaftlichen Höhle enthalten sind, wird wahrscheinlich die Eizellwand zerstört, welche durch die einander berührenden Theile der innern Haut gebildet wird.

Die Nabelgefäße fließen gewöhnlich an der innern Fläche des Mutterkuchens durch einen starken, queren Verbindungsast zusammen, welcher an der Wurzel des Nabelstranges entspringt. Seltener fehlt diese Anastomose. Fälschlich wird sie als dritter Nabelstrang angegeben<sup>1)</sup>.

Wie sich die Nabelblase bei mehreren Eiern verhalte, ist noch unbestimmt.

d) Von den Fötus ist, schon wenn Zwillinge vorhanden sind, der eine, bisweilen beide, gewöhnlich kleiner, unentwickelter.

1) Szalp. van der Wiel. Cent. I. O. 75.

Otto path. Anat. S. 386.

wickelt es sich vorzüglich entweder in dem Eierstock, oder der Unterleibshöhle, oder der Trompete. Allgemeine Bedingung ist, daß die Gebärmutter auf ähnliche Weise als bei der Schwangerschaft innerhalb ihrer Höhle verändert, vergrößert, auflockert, und eine hinfallige Haut gebildet wird. Wo diese als fehlend angegeben wird, war sie wahrscheinlich entweder schon verschwunden, oder nur unvollkommen ausgebildet<sup>1)</sup>. Daher fehlt sie an dem Eie.

Der Fötus wird entweder 1) regelmäßig ausgebildet, die seltenste Bedingung, welche vorzüglich bei Unterleibsschwangerschaft eintritt, oder 2) die häufigste, er stirbt ab, veranlaßt ein Geschwür in den benachbarten Theilen, vorzüglich dem Mastdarm, den allgemeinen Bedeckungen, oder der Scheide, seltner der Harnblase, durch welches er gewöhnlich in einzelnen Stücken, oder seltner, im Ganzen abgeht; oder 3) lange vor Ablauf der ersten Schwangerschaftsmonate, schon in dem ersten Fünftheil derselben, zerreißt die, nicht hinlänglich ausdehnbare Stelle, in welcher sich der Fötus bildet, und der Tod der Mutter erfolgt an innerer Verblutung, ein Ausgang, welcher vorzüglich bei der Trompetenschwangerschaft eintritt; oder 4) ein, etwas weniger seltner Ausgang, er und die Hüllen verwachsen unter einander und verknöchern mehr oder weniger vollständig, und bleiben dann, ohne Nachtheil für die Mutter, oft mehrere Jahre zurück.

Häufiger weicht die Lage des Mutterkuchens in der Gebärmutter, besonders bei Mehrgebärenden, durch Bildung am untern Theile des Eies, im Umfange des Muttermundes (Placenta praevia s. oblata) von der Regel ab.

Noch

---

1) Letzteres z. B. in einem Falle von Langstaff. (Med. chir. Transact. Vol. VII. p. 441.



giebt sich theils aus der Anwesenheit verschiedentlich gefärbter Kinder mit dem Geständniß der Mutter, daß sie sich mit mehreren verschiedner Racen begattete; theils, wenn gleich weniger gewiß, aus der Thatsache, daß reife Fötus mehrere Wochen selbst Monate nach einander geboren wurden.

§. 2617.

Man erklärt die Ueberfruchtung 1) aus der Anwesenheit mehr oder weniger getheilten Gebärmutter <sup>1)</sup>, 2) einer frühen Begattung, welche schnell nach einer ersten, noch ehe durch diese erzeugte Ei in die Höhle der Gebärmutter gelang erfolgt <sup>2)</sup>, 3) einer stellenweisen Abtrennung der hintern Haut von der Gebärmutter, wodurch dem Samen ein Weg zu den Trompeten gebahnt wird <sup>3)</sup>, also aus ganz mechanischen Gründen. Unstreitig haben auch diese ihren Werth, indessen es mir wahrscheinlicher, daß die Ueberfruchtung vorzüglich durch entsteht, daß bisweilen durch eine Begattung mehr Bläschen in Zeugungsthätigkeit gesetzt werden, die aber nicht in allen zugleich auf den höchsten Grad gesteigert wird, wie bei den Vögeln eine einzige Begattung hinreicht, um eine beträchtliche Menge von, in Hinsicht auf Entwicklung außerordentlich von einander verschiedene Dottern zu befruchten. Außerdem kann auch in seltenen Fällen, ohne eine mechanische Veranlassung

---

M. Tydeman de superfoetatione. Traj. ad Rhen. 1785.

Th. Roose de superfoetatione nonnulla. Breae 1801.

J. C. Varrentrapp comm. in Th. Roose de superfoetatione etc. Francof. 1805.

1) Gravel und Roose.

2) Varrentrapp.

3) Tydeman.

Kommer, bisweilen äußerst unvollkommen, sofern die meisten, durch bedeutenden Mangel von der Regel abweichenden Mißgeburten meistens Zwillinge sind <sup>1)</sup>. Noch mehr gilt dies für noch stärker vermehrte Zahl, wo gewöhnlich alle weit kleiner und unvollkommener genährt sind als gewöhnlich. Bisweilen ist auch die Gegenwart mehrerer Fötus die Veranlassung des Todes des einen in einer frühern oder spätern Periode.

e) Selbst Zwillinge, noch weit mehr Drillinge u. s. w. werden gewöhnlich vor Ablauf der regelmäßigen Schwangerschaftszeit geboren. Im Allgemeinen erfolgt die Geburt aller, selbst der abgestorbenen, zu derselben Zeit, bisweilen aber die des einen früher, und dennoch reift der zweite und wird zur regelmäßigen Zeit geboren <sup>2)</sup>. Weniger merkwürdig ist es, daß bisweilen unter diesen Bedingungen früh abgestorbene Fötus einige Tage nach der Geburt eines völlig reifen geboren werden <sup>3)</sup>.

Gewöhnlich werden die gleichzeitig vorhandnen Fötus durch denselben Zeugungsakt hervorgebracht; in weit seltneren Fällen durch verschiedene, was das Wesen der Ueberfruchtung (Superfoetatio) <sup>4)</sup> ist. Die Möglichkeit derselben erzeugt

1) E. Meckel's pathol. Anat. Bd. 1. S. 55.

2) J. Chapman singular case of Expulsion of a blighted Foetus and Placenta at seven Months, a living Child still remaining the full period of Uterogestation. Medic. chir. Transact. Vol. IX. p. 194 ff.

3) Clarke in med. and phys. Journal. Vol. 16. p. 53.

4) J. P. Gravel de superfoetatione conjecturae. Argent. 1738. Rec. in Halleri coll. disp. anat. T. V. p. 535. u. in Sehlegelii sylloge opp. min. ad artem obstetr. I. p. 325.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States. This group includes people who are not citizens of the United States and who are not citizens of any other country. This group is not allowed to enter the country because they are not citizens of the United States.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

fung, die Ueberfruchtung dadurch bewirkt werden, daß die erste Schwängerung nicht, wie gewöhnlich, die Empfänglichkeit der weiblichen Zeugungstheile und des ganzen Organismus für eine zweite, während der ersten, aufhebt, unfähig, wie zwar im Allgemeinen die Empfänglichkeit für mehrere Ansteckungskrankheiten, mit denen die Zeugung so viele Ähnlichkeit hat, durch die erste Ansteckung aufgehoben wird, in seltenen Fällen aber dennoch die zweite Statt findet, und wie zwar im Allgemeinen, aber nicht immer, eine exanthematische Krankheit durch die andre unterbrochen wird.

§. 2618.

Auf entgegengesetzte Weise fehlen bisweilen Theile des neuen Organismus. Am häufigsten ist Mangel des Fötus, der unstreitig dann gewöhnlich in einer frühern oder spätern Periode abgestorben war, indem das Ei gewöhnlich aus allen Theilen, welche zu seiner normalen Zusammensetzung gehören, besteht, und sich mehr oder weniger deutliche Spuren früherer Anwesenheit eines Fötus finden.

Seltner fehlt der Mutterkuchen. In einem kürzlich beschriebnen Falle <sup>1)</sup> war angeblich statt desselben der Nabelstrang knopfartig an die Gebärmutter geheftet.

Mangel des Nabelstranges ist gleichfalls eine sehr seltne Erscheinung. Die Folge davon ist unmittelbares Aufsitzen des Fötus auf der innern Fläche des Eies.

Häufiger fehlt nur ein Gefäß, namentlich eine Nabelpulsader.

CCC 2

Seltz

1) Conby in der Salz. med. chir. Zeitung 1819. No. 43. S. 289. Merkw. Fall des gänzlichen Fehlens der Nachgeburt, zum Beweise, daß die Placenta für den Fötus das Geschäft der Lungenfunction angiebt.

Seltner ist auf entgegengesetzte Weise die Nabelblutader nach der Analogie der meisten Säugethiere doppelt.

§. 2619.

f) Abweichungen der Form des Eies beziehen sich vorzüglich auf den Mutterkuchen und die Nabelschnur.

1) Der Mutterkuchen ist bisweilen, aber verhältnißmäßig sehr selten, in mehrere, gewöhnlich nur in zwei, bisweilen aber selbst in sieben Lappen, Nebenmutterkuchen (*Placenta succenturiata*), zerfallen, von denen gewöhnlich der eine mehr oder weniger bedeutend größer als die übrigen sind. Ich habe diese, in einer Hemmung begründete Abweichung vorzüglich bei Zwillingenachgeburtten gefunden, und immer die Unrichtigkeit der Angabe, daß sich dann zugleich die Nabelgefäße früher als gewöhnlich theilen, bestätigt gefunden.

2) Auch diese frühere Theilung der Nabelgefäße, noch innerhalb der Eihäute, ist selten, noch ungewöhnlicher weichen die Nabelgefäße schon außerhalb des Fötuskörpers aus einander.

3) Hieher gehören auch Knoten der Nabelschnur, die den Namen von wahren erhalten, wenn sie gewöhnliche geschürzte Knoten darstellen <sup>1)</sup>, von falschen, wenn sie bloß mehr oder weniger vielfache und enge Windungen der Nabelgefäße sind.

§. 2602.

g) In Hinsicht auf die Größe weicht vorzüglich der Nabelstrang ab, indem er häufiger zu kurz, z. B. nur vier Zoll, seltner weit länger als gewöhnlich, bis auf funfzig lang, gefunden wurde. So ist er auch durch Mangel an

1) *Delins de modis veris in funiculo umbilicali.* Gott. 1805.  
Wahrer Knoten des Nabelstranges u. s. w. in *Schlegels neuen Materialien für die Staatsarzneiw.* Bd. 1, S. 1.

an Wharton'scher Sulze, bisweilen sehr dünn, mager, auf entgegengesetzte Weise dicker als gewöhnlich.

Der Mutterkuchen ist bei der Unterleibsschwangerschaft gewöhnlich weit größer, aber dünner als gewöhnlich.

Hierher gehört auch die Umwandlung der Gefäße des Mutterkuchens in größere oder kleinere, durch eingeschnürte Stellen verbundene, ganz verschlossene Blasen, welche eine weitere Ausbildung eines anfänglich normalen Zustandes zu seyn scheint<sup>1)</sup>.

§. 2621.

h) Abweichungen des Zusammenhangs beziehen sich entweder auf die Verbindung des Eies mit der Gebärmutter, oder mit dem Fötus. Bisweilen, doch selten, ist die erstere zu fest.

Der Fötus steht bisweilen in keinem Zusammenhange mit dem Ei. Dies ist in frühen Perioden keine seltne Erscheinung, und kann sowohl Folge als Ursache des Todes des Embryo seyn. Außerdem aber findet man Fälle angeführt, wo auch in spätern, unbeschadet der Ernährung und des Lebens des Fötus, eine solche Trennung angegeben wird. Hierher gehören die Beobachtungen von Chatton<sup>2)</sup>, Stalpart van der Wiel<sup>3)</sup>, Kommel<sup>4)</sup>, Mason Good<sup>5)</sup>, Oslander<sup>6)</sup>.

Ecc 3

Freis

1) Gregorini de hydropse uteri etc. Halae 1795.

2) Ephem. Gallic. ann. 1673. Fol. 69. citirt bei Stalpart v. d. Wiel. Obs. rar. Cent. II. p. 1. p. 329.

3) Observat. rar. med. chir. Cent. II. pars pr. O. 32. Foetus humanus absque umbilico editus.

4) Ephem. n. c. Dec. II. ann. VII. Obs. 209.

5) N. d. Engl. in Stark's neuem Archiv Bd. 1. S. 357.

6) Annalen Bd. 1. St. 1. S. 199.

- Breidenstein d. C. 187  
 Brémont d. 430  
 Bremfer d. 331  
 Brendel c. 34. 57. d. 34. 111. 735  
 Brera d. 500. 591. 592  
 Breschet d. 329  
 Briggs d. 57  
 Bring d. 198  
 Brockhausen d. 616  
 Brodie a. 424. 434. 443. 557. 566. 567. c. 601. 607. d. 588.  
 Bruggmans a. 242. d. 710. 743. 747. 754  
 Brugnone a. 531. b. 464. 475. 512. 513. 515. 520. 523. 584. 593. d. 18. 30. 37. 569. 570. 571. 572. 573. 588. 601. 606.  
 Brunnner c. 610. d. 212. 219. 364.  
 Buchanan c. 602. 606.  
 Buchwald d. 519. 653  
 Büttner d. 644  
 Buffon a. 75. 103. d. 588  
 Buble d. 672  
 Buiffon d. 371. 385  
 Buntiva d. 707. 745  
 C. G. Burdach a. 97. c. 586. 618. d. 695. 737  
 D. E. Burdach d. 697  
 Burdin b. 169  
 Burns a. 141. 192. 661. b. 444. c. 57. 58. 63. 88. 89. 90. 91. 147. 152. 175. 180. 246. 248. 249. 253. 257. 266. 268. 271. 273. 290. 374. 375. 376. 746. d. 197. 680. 702.  
 Burrows d. 591. 592  
 Busch d. 284. 368. 379  
 Busmann c. 409.  
 Buzzi d. 94  
 C.  
 Caesalpin c. 746  
 Cailliot c. 71.  
 Caldani a. 292. 307. c. 746. 748. d. 84. 552  
 Calza d. 519  
 Cam d. 591  
 Camper b. 178. d. 75. 643. d. 600  
 Carlisle c. 595  
 Carus a. C. 258. 337. 339. 340. b. 186. c. 434. 567. 569. 570. 571. 770  
 Cassan d. 506  
 Casselbom d. 8. 45. 56. 92. 734  
 Casseri d. 4. 378. 383. 399  
 Le Cat a. 307. 333. 580. b. 22. c. 67. 312. d. 4  
 Cavallo d. 426  
 Celsus b. 21  
 Chapman d. 764  
 Chaptal d. 426. 568  
 Chattron d. 773  
 Chaussier c. 430. 434. 436. 440. 442. 445. 446. 449. 478. 532. 539.  
 de La Chenal b. 290  
 Chefelden a. 354. 356. c. 349. 746. d. 759  
 Chevalier d. 350  
 Cheyne d. 609  
 Chirac a. 594  
 Clarke a. 350. d. 6. 624. 675. 769. 774  
 Claussen d. 271  
 Cleghorn a. 249  
 Le Clere b. 22  
 Cline d. 56. 427  
 Cloquet c. 664. 700. 726. 766. 769. 770. 771. d. 114. 116. 340. 624. 638. 674.  
 Clossius a. 357  
 Coiter a. 375. c. 679. d. 687  
 Coleman c. 27  
 Coli d. 91. 113  
 Colomb a. 535  
 Columbus c. 678  
 Comparetti d. 16. 54  
 Conby d. 770  
 N. Cooper a. 148. 176. 177. 187. b. 440. c. 73. 248. 249. 275. 276. 279  
 W. Cooper a. 181  
 Coopmans d. 429. 635. 637. 664. 769  
 Corvisart a. 141. c. 57. 58. 61. 605. 743. 744  
 Coschwig d. 183. 195. 450. 471  
 Cotunni d. 31. 35. 56  
 Courcelles b. 508  
 Courtial a. 356. 357  
 C. 188

oder in beiden zugleich. Eben so entstehen durch die regelwidrige Geburt mehrere der oben angeführten abweichenden Bedingungen der Zeugungstheile, namentlich vorzüglich Formabweichungen, als:

a) Zerreißen der Gebärmutter, der Scheide, der äußern Zeugungstheile;

b) Umkehrungen der Gebärmutter und der Scheide;

c) in Folge vorangegangner Verletzungen Verwachsungen und Verschliefungen des Muttermundes, der Scheide und der äußern Schamtheile.

---



# Namenregister.

(Die der Seitenzahl vorgesetzten lateinischen Buchstaben a. b. c. d. bezeichnen jedesmal den Theil.)

- A.**
- Abbernethy** a. C. 176. 625. 658.  
c. 14. 63. d. 425
- Abildgaard** d. 7: Q
- Ackermann** a. 9. 61. 97. 278.  
316. 337. 340. 341\* 366. 418.  
b. 14. 23. 190. d. 585. 593.
- Admiral** 745. 748
- Alanson** d. 553
- Albers** a. 408
- Alberti** a. 192  
b. 297
- B. C. Albinus** a. 166. 182. 356.  
375. 584. 585. 586. 588. 589. 591.  
b. 22. 23. 56. 60. 67. 68. 70.  
71. 204. 221. 228. 256. 259. 272.  
392. 395. 417. 418. 493. 503. 505.  
509. 510. 512. 519. 520. 522. 532.  
552. 551. 592. d. 9. 16. 60.  
76. 92. 113. 134. 178. 179. 182.  
184. 185. 212. 224. 228. 270.  
273. 533. 548. 549. 550. 555.  
690. 697. 727. 728. 729  
d. 250
- F. B. Albinus**
- Alexander** a. 354  
c. 19
- Allen** d. 424. 426. 427.
- Amati** d. 162.
- Anderfch** c. 15. 683. 694
- Anderson** d. 133
- Andree** d. 212
- Araldi** a. 196
- Aranzi** d. 678
- Aristoteles** a. 212. d. 383. 747
- Armiger** a. C. 193. 249.
- Arnaud** d. 600
- Arnemann** a. 259. 269. 345. 347.  
349. 350  
d. 236
- Arnold** d. 439
- Aisch** c. 663. 668. d. 439
- Aëman** a. 254
- Affollant** d. 368. 369
- Augustin** a. 416
- Murtoilius** b. 160. d. 136
- Autenrieth** a. 9. 155. 476. c. 572.  
d. 340. 585. 689. 735. 741.
- Azoguidi** d. 519. 679
- B.**
- Baader** d. 586
- Baglini** a. 488
- Bajer** a. 595
- Baillie** a. 2. 141. 148. 176. 181.  
c. 59. 603. 606. d. 252. 255.  
367. 375. 489. 496. 624
- Bamberger** d. 630
- Bang** c. 641. 644
- B. Barba** a. 265
- Barclay** a. 472. c. 3. 75. 79.  
91. 102. 105. 186. d. 216. 288.  
289. 290.
- Barrow** a. 80
- Barthele** a. 104. c. 430. 443.  
449. 684
- Barthez** a. 473. 482. 484.
- C. Bartholin** d. 194. 515.  
516. 518
- E. Bartholin** d. 409. 505
- Bat**

- Barzekotti a. C. 486. 489  
 Bafuel a. 175  
 Baffer a. 375  
 Bademan c. 601. 606. 607  
 Battie a. 286  
 Bauhin c. 363  
 Bayle a. 659  
 Beckers c. 250. 265  
 Beckmann a. 72  
 Beclard c. 591. 592. d. 710.  
 624. 638  
 Beer d. 118. 127. 128. 130. 131.  
 132. 134  
 Behrends c. 15. 16. 17  
 B. Bell a. 470  
 E. Bell d. 252. 406. 407. 426. 470  
 489. 494. 499. 519. 529. 616  
 Bellini d. 459  
 Bergen c. 668. 755  
 Berger d. 198  
 Berlinghieri d. 644.  
 Bernhard d. 743  
 Bernhardi d. 736  
 Bernhold b. 22  
 Bertin a. 356. b. 181. 454. d.  
 262. 342  
 Bertrandi d. 57. 332.  
 Berzelius a. 109. 132. 133. 358.  
 550. 617. d. 91. 96. 102. 104.  
 189. 201. 349  
 Bessler d. 678  
 Beudt d. 458. 505  
 Beyer d. 690  
 Bianchi d. 332  
 Bichat a. VIII. IX. 1. 15. 16. 18.  
 104. 106. 107. 118. 131. 143.  
 152. 154. 155. 156. 177. 181.  
 188. 209. 210. 228. 229. 275.  
 277. 311. 313. 333. 372. 445.  
 450. 463. 465. 473. 479. 491.  
 495. 498. 500. 501. 503. 526.  
 536. 552. 569. 570. 587. 597.  
 604. 609. 610. 613. 614. 615.  
 625. 628. b. 45. 59. 319. 330.  
 533. 341. 355. c. 18. 79. 80.  
 92. 102. 107. 111. 120. 126.  
 127. 136. 172. 176. 201. 248. 266.  
 327. 371. 376. 384. 385. 434.  
 447. 485. 521. 522. 544. 553.  
 563. 627. 628. 657. 656. 685.  
 750. d. 257. 340. 396. 398.  
 402. 506  
 Bicker a. C. 191  
 Bidloo d. 453. 726  
 Bils a. 230  
 Birch d. 570  
 Blake d. 199. 213. 223. 224.  
 228. 231. 234.  
 Blane a. 319. 486. 623.  
 c. 594  
 Blasius a. 259. c. 434. d. 192.  
 252  
 Bleuland d. 247. 254. 273  
 Blumenbach a. 62. 75. 166. 356.  
 b. 23. 178. 179. 185. c. 593.  
 d. 55. 84. 96. 114. 216. 300.  
 570. 698. 748  
 Boel c. 698. 709. 717. 718. 720.  
 723. 725. 728. 734. 736. 743.  
 755. 766. 769. 770.  
 Bökler d. 446. 503.  
 Bödmer a. 406. b. 22. 435.  
 c. 79. 83. 338. 674. d. 470.  
 519. 575. 623. 690. 697. 746  
 Boer d. 623.  
 H. Boerhaave a. 183. 626. d.  
 253. 759.  
 R. Boerhaave a. 235. 307. 579  
 Bohl c. 409  
 Bojanus d. 298  
 Bonaccini d. 158  
 Bonazzoli d. 295  
 Bonn a. 357. 406. 409. 570. 618.  
 b. 2. 204. 205  
 Borden a. 116. 126. 241. 626  
 Bordenave d. 146  
 Borelli a. 473. 487. d. 426  
 Van den Boich a. 191. d. 438.  
 631. 707. 710. 747. 752. 753.  
 754  
 Bösch d. 628  
 Boje a. 598. 591. b. 181. d.  
 735  
 Bostock a. 109. 131. 418. 547. 550.  
 655. d. 268.  
 Bouillon la Grange d. 743  
 Bourdet d. 198  
 Boyer a. 410. c. 81. 102.  
 107. 111. 126. 234. 235. 248.  
 d. 684  
 Brambilla a. 249  
 Brande d. 497  
 Brandis d. 117  
 Breidem

- Jakopia b. C. 21. d. 7. 516. 687  
 Jantoni d. 240. 258. 331. 458.  
 630. 655  
 Jasar d. 127  
 Jarre c. 64. 65. 73. d. 119. 385  
 Jattori b. 104  
 Jauhard d. 147. 198  
 de la Jaze c. 57  
 Jehr d. 631  
 Jeller d. 382. 403. 406  
 Jerrein d. 92. 332. 340. 398.  
 400. 401. 403. 459  
 Fiorati c. 71  
 Fischer d. 621  
 Fiquau c. 732  
 Fleischmann a. 409. 535. 656.  
 b. 393. 472. 486. 515. d. 223.  
 295. 313. 315. 318. 321  
 Fleuri c. 58  
 Flormann d. 198  
 Fobers b. 190  
 Folius d. 16  
 Fontana a. 269. 299. 347. 472.  
 478. 557. c. 19. 51. 52. 770.  
 d. 84. 426  
 Ford d. 162  
 Forsten d. 736  
 Fourcroy a. 262. 358. 557. 567.  
 617. d. 197. 361. 497. 508.  
 Fournier c. 62  
 Fowler a. 492  
 Fox d. 199. 202. 203. 213. 231.  
 234. 238. 239.  
 Fracassati d. 174  
 Franc d. 706  
 Franke d. 332  
 Frankenau a. 591  
 Fribault d. 125  
 Froriep a. 495. 496. d. 220. 488  
 653  
 Froticher a. 259. c. 613  
 Gudel d. 707. 711  
 G.  
 Gagliardi a. 356. 361  
 Galeati d. 155. 262. 263. 273  
 276. 279. 292. 348. 362  
 Galenus a. 292. 333. b. 21.  
 766. d. 378. 399. 403. 747  
 Gall a. C. 258. 278. 282. 283.  
 284. 290. 296. 308. 311. 315.  
 334. c. 434. 440. 443. 444. 451.  
 458. 593. 685. 699. 707. 711. 791  
 Gallereux d. 135  
 Gallini a. 8.  
 Le Gallois a. 314. 316. 320. 341.  
 492. c. 18. 28. 46. 57. d. 396.  
 397  
 Ganser a. 531. b. 459. 466. 472.  
 503. 519. 527. 531. 551. 563.  
 574. 579. 587  
 Garengeot b. 392. d. 148.  
 Gartshore d. 674  
 Gaultier a. 580. 585. 604  
 Gantier a. 472  
 Gavarb b. 393  
 Gazelles d. 134  
 Van Geaus d. 378  
 Gehlen a. 358. d. 201. 202  
 Geoffroy d. 8  
 Georgi d. 74  
 Gerlach a. 557  
 Gibson a. 398. d. 219  
 Gilibert d. 748  
 Girardi c. 685. 755. 770. d. 221.  
 575. 600  
 Giulio a. 191. 495. c. 18  
 Clifton a. 484. d. 153. 258. 332.  
 342. 344  
 Gmelin d. 90  
 Goddard a. 484  
 Göllicke d. 675  
 Götting d. 533  
 Gök a. 468  
 Good (Mason) d. 773  
 Goodlad a. 176  
 Goodwyn d. 426. 447  
 Gordon c. 27. 28. 49. 434. 442.  
 446. 447. 468. 499. 511. 521.  
 525. 555. 563. 664  
 a. 333  
 Gortter  
 de Graaf d. 364. 540. 570. 572.  
 574. 687. 696. 726. 748  
 Graham a. 177. c. 73  
 Gravel d. 769. 770  
 Grebing b. 181. 189. c. 500.  
 586. 587. 588. 593. 594. 595.  
 596. 597. 598. 601. 604. 605  
 Gregorini d. 778  
 Greinés d. 48  
 Gren d. 100  
 Grv

Barzokotti	a. G. 486. 489	Bicker	a. G. 191
Bassuel	a. 175	Bidloo	d. 453. 726
Baßer	a. 375	Bilb	a. 230
Bakeman	c. 601. 606. 607	Birch	d. 570.
Battie	a. 286	Blake d. 199. 213. 223. 224.	
Baubin	c. 363		228. 231. 234.
Banle	a. 659	Blane	a. 319. 486. 623.
Beckers	c. 250. 265		c. 594.
Beckmann	a. 72	Blasius a. 259. c. 434 d. 192.	
Beclard c. 591. 592. d. 710.			252.
	624. 638	Blensland d. 247. 254. 273.	
Beer d. 118. 127. 128. 130. 131.		Blumenbach a. 62. 75. 166. 356.	
	132. 134	b. 23. 178. 179. 185. c. 593.	
Behrends	c. 15. 16. 17	d. 55. 84. 96. 114. 216. 300.	
B. Bell	a. 470		570. 698. 748
E. Bell d. 252. 406. 407. 426. 470		Boel c. 698. 709. 717. 718. 720.	
489. 494. 499. 519. 529. 616		723. 725. 728. 734. 736. 743.	
Bellini	d. 459	755. 766. 769. 770.	
Bergen	c. 668. 755	Böckler d. 446. 503.	
Berger	d. 198	Böhmmer a. 406. b. 22. 435.	
Berlinghieri	d. 644.	c. 79. 83. 338. 674. d. 470.	
Bernhard	d. 743	519. 575. 623. 690. 697. 746	
Bernhardi	d. 736	Boer	d. 623.
Bernhold	b. 22	H. Boerhaave a. 183. 626. d.	
Bertin a. 356. b. 181. 454. d.			253. 759.
	262. 342	F. Boerhaave a. 235. 307. 579	
Bertrandi	d. 57. 332.	Bohl	c. 409
Bergelius a. 109. 132. 133. 358.		Bojanus	d. 298
550. 617. d. 91. 96. 102. 104.		Bonaccini	d. 158
	189. 201. 339	Bonazzoli	d. 295
Becker	d. 678	Bonn a. 357. 406. 409. 570. 618.	
Beudt	d. 458. 505		b. 2. 204. 205
Beyer	d. 690	Borden a. 116. 126. 241. 626	
Bianchi	d. 332	Bordenave	d. 146
Bichat a. VIII. IX. I. 15. 16. 18.		Borelli a. 473. 487. d. 426	
104. 106. 107. 118. 131. 143.		Van den Boich a. 191. d. 438.	
152. 154. 155. 156. 177. 181.		631. 707. 710. 747. 752. 753.	
188. 209. 210. 228. 229. 275.			754
277. 311. 313. 333. 372. 445.		Boischa	d. 628
450. 463. 465. 473. 479. 491.		Boje a. 598. 591. b. 181. d.	
495. 498. 500. 501. 503. 526.			735
536. 552. 569. 570. 587. 597.		Bostedt a. 109. 131. 418. 547. 550.	
604. 609. 610. 613. 614. 615.			655. d. 268.
625. 628. b. 45. 59. 319. 330.		Bouillon la Grange	d. 743
533. 341. 355. c. 18. 79. 80.		Bourdet	d. 198
92. 102. 107. 111. 120. 126.		Bover a. 410. c. 81. 102.	
127. 136. 172. 176. 201. 248. 266.		107. 111. 126. 234. 235. 248.	
327. 371. 376. 384. 385. 434.			d. 684
417. 485. 521. 522. 544. 553.		Brambilla	a. 249
563. 627. 628. 657. 656. 685.		Brande	d. 497
750. d. 257. 340. 396. 398.		Brandis	d. 117
	402. 506	Ecc 5	Breidem

- Horkel** d. C. 202. 203  
**Van Horne** d. 193. 571. 568. 569  
**Horrebow** d. 57  
**Houffet** a. 191  
**Hovius** d. 82  
**Howship** d. 407. 408. 489. 499. 616  
**Huber** a. 259. b. 459. 563. c. 152. 359. 363. 613. 664. 668. 679. 755. d. 518. 533  
**Hudson** d. 231  
**Hufeland** d. 506  
**Hugo** a. 626. d. 453  
**Huhn** a. 530  
**Humboldt** a. 588. c. 18  
**Humpage** a. 230  
**Hünauld** b. 47  
**Hundertmark** a. 416  
**Huntermüller** d. 622  
**J. Hunter** a. 6. 176. 189. 193. 241. 255. 604. d. 142. 198. 213. 221. 223. 231. 558. 568. 569. 570. 600. 690. 701.  
**W. Hunter** a. 116. 135. 166. 213. 218. 234. 249. 424. 587. b. 354. 361. 280. 281. 718. 726. d. 103. 296. 488. 548. 600. 623. 679. 680. 686. 692. 694. 697. 701. 702. 706. 724. 727. 728. 746  
**Hutchinson** d. 605. 606. 607  
**Huth** d. 631
- J.
- Jacobson** a. 66. 68. d. 22. 141. 420  
**Jacopi** d. 481  
**Jäger** a. 418. d. 307  
**Jampert** d. 759  
**Jandé** b. 552. d. 212  
**Janin** d. 118  
**Jansen** a. 131  
**Janua** d. 746  
**Jestray** a. 407  
**Jento** d. 679  
**Jones** b. 23. 392. 393  
**Joannides** d. 575  
**Jördens** d. 632
- Jörg** d. C. 685. 714. 727. 728. 732. 74  
**John** a. 26  
**Johnstone** a. 311. 314. 33  
**Johrenius** d. 36  
**Jones** a. 187. 253. 254  
**Jourdain** d. 112  
**Jensflamm** a. 395. d. 95. 134. 175. 222  
**Järin** d. 425. 426. 429  
**Justi** d. 615  
**Jwanoff** d. 756
- K.
- Kaltschmied** d. 436  
**Kelch** b. 59. 60. 402. 430. 434. 454. 466. 503. 555. 563. 574. c. 368. 592. 594. 600. d. 174. 179. 177  
**Kemper** a. 25  
**Kertring** a. 375. b. 104. 145. 275. d. 68  
**Keuffel** a. 259. b. C. XII.  
**Keutich** d. 45  
**Kiefer** d. 285  
**King** d. 579  
**Kite** d. 426. 429  
**Kleemann** a. 530  
**Klinkofsch** a. 56  
**Klint** c. 613  
**Knaffedt** b. 22  
**Knivhof** a. 595  
**Knoblauch** d. 674  
**Knor** d. 604  
**Koberwein** c. 79. 84  
**Koch** a. 537  
**Köbler** a. 409. d. 5  
**Köbler** a. 411  
**Kölpin** d. 573. 75  
**König** d. 707  
**Kolk** d. 674  
**Korscheff** d. 613  
**Krafft** a. 397  
**Krausenstein** a. 231. 479  
**Krüger** d. 615. 657  
**Krummacher** d. 694  
**Kuhlemann** d. 606  
**Kuhn** d. 541  
**Kulmus** d. 553  
**Kunze** d. 441

- Courtois** d. 6. 198  
**Courvée** d. 748  
**Cowper** a. 488. d. 561  
**Crell** c. 34  
**Creve** b. 240. 249. c. 52  
**Croone** d. 570  
**Cromther** a. 411. 470  
**Cruikshank** a. 213. 226. 347. 580. 585. c. 371. 381. 385. 414. d. 696. 728  
**Crusius** d. 575  
**Cruveilhier** c. 610. d. 323  
**Cubolo** d. 575  
**Cumme** d. 198. 202  
**Curtis** d. 198  
**Curtius** b. 180  
**F. Cuvier** d. 594  
**G. Cuvier** a. 66. 68. 70. 313. 316. 338. b. 127. 137. 138. 178. 220. 405. 454. 455. 464. 478. 486. 493. 499. 503. 504. 510. 513. 520. 532. 551. 559. 584. 597. 604. c. 147. 215. 349. 368. 443. 447. 511. d. 296. 298. 307. 351. 457. 527. 558. 602. 698. 727.  
**Eupper** d. 623  
**D.**  
**Danz** a. 44. c. 44. d. 696. 727. 747. 748. 752. 753. 754. 755  
**Darwin** a. 231. 298. d. 479. 481. 748. 739  
**Daubenton** a. 68  
**David** a. 411  
**Davy** a. 358. 382. 385. 411. 418. 429. 560. c. 53. d. 425. 429. 483  
**Delafone** a. 179. 356. 424  
**Demours** d. 76. 119. 120. 123. 131. 132. 134. 135  
**Denman** d. 624. 668  
**Default** c. 73  
**Desbas** d. 676  
**Descemet** d. 76  
**Deschamps** e. 56. 279. 281. d. 145  
**Desgranges** d. 744  
**Dief** d. 736  
**Diez** d. 735  
**Dioboldt** d. 6. 34  
**Dobart** d. 399  
**Döllinger** a. 337. d. 70. 78. 87  
**Dömmeling** d. 84  
**Dörner** a. 424  
**Ban Deverer** a. 189. 404. 409. b. 60. 182. d. 254. 673. 708  
**Douglas** b. 392. d. 644  
**Drelincourt** b. 454. d. 88. 368. 519  
**Drosfen** d. 459  
**Dubbell** d. 76  
**Duille** d. 177. 179  
**Dumas** a. 1. 15. 535. 657.  
**Duncan** a. 94. d. 493  
**Dundas** c. 57. 58  
**Dupuis** d. 636  
**Dupuytren** c. 279. d. 368. 405. 509  
**Dürer** d. 716  
**Dütrochet** d. 307. 678. 698. 727  
**Duval** d. 212. 239. 240. 241  
**Duverney** a. 372. 398. b. 392. 393. d. 7. 52. 155. 759  
**Duvernoi** b. 151. d. 183. 368. 447. 448. 450. 433. 503. 510. 558  
**E.**  
**Earle** d. 605. 606. 607  
**Edwards** d. 114  
**Egeling** d. 701  
**Elsäffer** d. 90  
**Emmert** a. 313. d. 295. 296. 298. 1269. 318. 701. 708. 709. 727. 745. 746. 748.  
**Erdmann** c. 152  
**Erhardt** d. 481  
**Erman** a. 487  
**Eustachi** b. 21. c. 344. d. 7. 198. 459. 679. 766  
**Ewerke** d. 447  
**Ewardt** d. 759  
**Eisenhardt** d. 459. 468  
**Eybold** a. 557  
**Eysson** a. 375. b. 147  
**F.**  
**Fabricius ab Aquapendente** b. 580. d. 240. 258. 318. 378. 399  
**Fabricius von Hilden** a. 408.  
**Falguerolles** a. 25  
**Gab**

- Reil a. C. 259. 268. 278. 281.  
 284. 286. 503. 310. 311. 333.  
 c. 373. 466. 489. 500. 502. 519.  
 523. 534. 557. 588. 605. 606.  
 607. 689. 711. 786. d. 94. 95.  
 100. 122. 297. 316  
 Reimarus a. 470  
 Reichen d. 409  
 Reus d. 707. 745  
 Reverbort d. 174  
 Rhodius d. 503  
 Ribes c. 717. 770. d. 98. 122.  
 558  
 Rible d. 519  
 Richard d. 736  
 Richerand a. 512. d. 405. 426.  
 440. 458  
 Ridley e. 429  
 Riede d. 716  
 Riegels a. 135. 503. 509  
 Riet a. 579  
 Rinder d. 174. 181  
 Ring c. 359  
 Rioba c. 610  
 Riolauns b. 22. c. 746  
 Ripping b. 240  
 Ritter a. 513  
 Robert a. 411  
 Röderer b. 244. c. 54. 593.  
 d. 53. 54. 113. 282. 406. 488.  
 519. 540. 679. 718. 729. 735.  
 746. 751  
 Röglein d. 590. 735  
 Rodman d. 762  
 Roger a. 482  
 Rolin b. 332. d. 511  
 Rolof d. 368  
 Rooie d. 574. 585. 684. 770  
 Rosenberger d. 519. 529  
 Rosenmüller a. 404. 531. 557.  
 b. 58. 60. 291. 402. 405. 435.  
 466. 499. 519. 522. 563. 587.  
 c. 634. 694. d. 58. 95. 202.  
 587. 590  
 Rosenthal c. 430. 442. 458  
 Rossi a. 191. c. 18  
 Rossium d. 631  
 Rothe c. 359  
 Rouhaust d. 726  
 Rous c. 721. 257  
 Rowland a. 410  
 Rowley d. 118
- Royen d. 6  
 Rubbel  
 Rudolphi a. 81. 663.  
 503. c. 527. d. 70. 22.  
 331  
 Rumelin  
 Runge d. 146. 147  
 Ruffell a. 411. 444  
 Runich a. 503. 590. 626.  
 d. 76. 88. 141. 519. 554.  
 674. 697.  
 Ryan  
 S.  
 Sabatier b. 456. c. 14. 25.  
 78. 80. 93. 94. 102. 111.  
 220. 234. 235. 248. 409.  
 510. 511. 539. 563. 603. 654.  
 Salter c. 606.  
 Salzmann b. 220.  
 Samuel d. 1  
 Van Sanden d. 1  
 E. Sandifort I. a. 141. 319. 324.  
 404. b. 22. 137. 148. 182.  
 253. 361. 466. 515. a. 2  
 d. 56. 136. 161. 361. 369. 371.  
 679. d. I. 259. 271. 315. 4.  
 497. 680. 697. 6  
 Sandifort II. d. 25  
 Santorini a. 590. b. 455. c. 1  
 25. 443. 451. 508. 610. 660.  
 685. 709. 710. 746. 747. 766.  
 793. d. 8. 12. 19. 136. 138.  
 139. 242. 243. 304. 378. 38  
 408. 447. 514. 517. 540. 54  
 600. 604  
 Sasse  
 Sattig d. 99. 100  
 Saucerotte d. 69  
 Saumarez b. 179  
 Saunders d. 8. 52. 56. 57  
 Sauvages d. 40  
 Sauvé d. 10  
 Scarpa a. 153. 245. 273. 275. 28  
 314. 332. 356. c. 15. 644. 69  
 680. 682. 683. 696. 721. 72  
 d. 20. 30. 37. 38. 40. 118. 12  
 123. 127. 130. 131  
 Schäffer d. 7  
 Schallhammer d. 15  
 Scheel d. 433. 707. 710. 71  
 Schuele d. 64

- Grimaud a. 6. 103  
 Grosse d. 745. 747. 749  
 Grunmachter a. 371. 595  
 Guersant c. 610  
 Gunther c. 429  
 Guuz c. 500. 510. 511. 575.  
 595. d. 332. 340. 390. 447.  
 514  
 Gysler d. 254  
 H.  
 H. A. Haase a. 626. 628  
 J. G. Haase a. 274. 295. 332.  
 333. 534. 336. 424. c. 15. 428.  
 527. 683. 686. d. 561. 591  
 De Haen d. 674  
 Hanel d. 616  
 Haighton a. 347. 348. d. 55. 56.  
 682  
 Halder d. 675  
 Hale d. 726  
 Hales d. 426  
 Haller a. 1. 14. 141. 148. 165.  
 177. 178. 188. 207. 278. 288.  
 301. 305. 307. 310. 406. 472.  
 481. 489. 495. 500. b. 2. 456.  
 c. 3. 13. 27. 34. 53. 73. 79. 81.  
 83. 126. 129. 135. 136. 207. 210.  
 215. 235. 248. 309. 409. 447. 585.  
 616. 678. 745. 751. d. 4. 92.  
 113. 183. 232. 256. 340. 402.  
 403. 426. 429. 452. 548. 552.  
 573. 583. 599. 609. 616. 653.  
 678. 686. 687. 691. 696. 699.  
 726. 727. 736. 747. 748. 753.  
 759. 769.  
 Hamberger a. 486. c. 28.  
 Du Hamel a. 368. 378. 379  
 Harber d. 510. 592  
 Harles a. 245  
 Hartmann d. 481. 639. 696. 697  
 Harven a. 59. 141. 143. c. 572.  
 678. d. 727. 730. 731. 748  
 Haunenschild d. 519  
 Havers a. 360. 558  
 Hebenstreit a. 184. d. 79. 735.  
 765  
 Heckeren a. 422  
 Hedwig d. 276  
 Heer d. 489. 495  
 Heiland a. 24. 43  
 Hein c. 6. 64  
 Heister d. 76. 131. 174. 282.  
 644. 727  
 Held d. 114  
 Helvetius c. 25. 28. d. 270. 273.  
 276. 409  
 Henkel d. 135  
 Henninger d. 409. 656  
 Henriet d. 613  
 Henning d. 644  
 Herder a. 71  
 Herholdt d. 426. 429. 430. 433  
 710  
 Herissant a. 424. d. 217. 759  
 Herrmann a. 416  
 Hertel d. 603  
 Hertod a. 408  
 Hesselbach c. 250. 265. 266. d. 6.  
 51. 670  
 Hettler d. 707  
 Heuermann c. 142. d. 505. 673.  
 678  
 Heusinger d. 368. 375  
 Hewson a. 5. 6. 213. 218. 233. 236.  
 547. d. 184. 264. 276. 291. 453  
 Hey a. 661. d. 671  
 Heymann a. 531. b. 519. 520.  
 584  
 Highmore d. 440  
 Hildebrandt a. 358. 361. b. 186.  
 c. 125. 234. 248. 409  
 Himly a. 497. d. 118. 119. 120.  
 134  
 Hinge a. 583  
 Hippocrates a. 291. b. 21. d. 747  
 Hirsch d. 198. 218  
 Hirschel d. 590  
 Hoboken d. 726  
 Hochketter d. 295. 296. 298.  
 408  
 Honlein d. 362  
 E. T. Hofmann a. 192. 579.  
 b. 22. d. 394  
 E. Home a. 6. 179. 391. 234.  
 242. 306. 378. 409. c. 281.  
 586. 594. 596. 597. 602. 605.  
 d. 18. 94. 95. 186. 264. 268.  
 359. 368. 482. 552. 585. 616.  
 629. 733.  
 Hommel c. 72  
 Van Hoorne a. 346. 407  
 Horch d. 744  
 Horfel



- Horkel d. C. 202. 203  
 Van Horne d. 193. 571. 568. 569  
 Horrebow d. 57  
 Houffet a. 191  
 Hovius d. 82  
 Howship d. 407. 408. 489. 499. 616  
 Huber a. 259. b. 459. 563. c. 152. 359. 363. 613. 664. 668. 679. 755. d. 518. 533  
 Hudion d. 231  
 Hufeland d. 506  
 Hugo a. 626. d. 453  
 Huhn a. 530  
 Humboldt a. 588. c. 18  
 Humpage a. 230  
 Hünault b. 47  
 Hundertmark a. 416  
 Hunkelmüller d. 622  
 J. Hunter a. 6. 176. 189. 193. 241. 255. 604. d. 142. 198. 213. 221. 223. 231. 558. 568. 569. 570. 600. 690. 701.  
 W. Hunter a. 116. 135. 166. 213. 218. 234. 249. 424. 587. b. 354. 361. 280. 281. 718. 726. d. 103. 296. 488. 548. 600. 623. 679. 680. 686. 692. 694. 697. 701. 702. 706. 724. 727. 728. 746  
 Hutchinson d. 605. 606. 607  
 Huth d. 631
- J.
- Jacobson a. 66. 68. d. 22. 141. 420  
 Jacopi d. 481  
 Jäger a. 418. d. 507  
 Jamvert d. 759  
 Jande b. 552. d. 212  
 Janin d. 118  
 Jansen a. 131  
 Janua d. 746  
 Jeffray a. 407  
 Jento d. 679  
 Jones b. 23. 392. 393  
 Joannides d. 575  
 Jördens d. 632
- Jörg d. C. 685. 714. 727. 729. 732. 748  
 John a. 264  
 Johnstone a. 311. 314. 333  
 Johrenius d. 364  
 Jones a. 187. 253. 254  
 Jourdain d. 212  
 Kienflam a. 395. d. 95. 134. 175. 202  
 Jürin d. 425. 426. 429  
 Just d. 615  
 Jwanoff d. 756
- K.
- Kaltschmied d. 436  
 Kelch b. 59. 60. 402. 430. 434. 454. 466. 503. 555. 563. 574. c. 368. 592. 594. 600. d. 178. 179. 187  
 Kemper a. 205  
 Kertring a. 375. b. 104. 145. 275. d. 695  
 Keuffel a. 259. b. C. XXII.  
 Keutsch d. 425  
 Kiefer d. 295  
 King d. 570  
 Kite d. 426. 429  
 Kleemann a. 530  
 Klincksch d. 586  
 Klint o. 643  
 Knakstedt b. 22  
 Kniphof a. 595  
 Knoblauch d. 674  
 Knor d. 608  
 Koberwein c. 79. 84  
 Koch a. 557  
 Köbler a. 409. d. 36  
 Köler a. 411  
 Kölpin d. 575. 735  
 König d. 707  
 Kolt d. 674  
 Korsch d. 623  
 Krafft a. 597  
 Krakenstein a. 231. 479  
 Krüger d. 615. 657  
 Krummacher d. 608  
 Kuhlmann d. 606  
 Kuhn d. 541  
 Kulmus d. 505  
 Kunze d. 441  
 Laen

Laennec a. G. 424. 434. 658.  
659. 661. 662  
Lalouette d. 447. 448. 450  
Lambert a. 254  
Lamure d. 585  
Lancisi a. 333. c. 57  
Langenbeck a. 409. 410. d. 644  
Langriss c. 28  
Langguth a. 595. d. 574. 735  
Langstaff d. 766. 767  
Lardner a. 148  
Larrey a. 249. d. 128. 135  
Lassone d. 368  
Laumonnier d. 721. 732. 766.  
767. 769  
Lauth a. 245. 447. 509  
Lavagna a. 618. d. 219. 594  
Lavoisier d. 425  
Lawrence a. 663. c. 54. 363. 591.  
592. d. 497. 674  
Leal Lealis a. 160. 540.  
Lecluse d. 198  
Leeuwenhoek a. 5. 587. ed. 100. 552  
Leigner c. 34  
Leitersperger d. 409  
Lemaire c. 359. d. 235. 239  
Lémery a. 356.  
Leonhardi d. 616  
Leroux d. 445  
Lefage d. 147  
Leveillé d. 94. 122. 212  
Leveling c. 34. d. 259  
Levet d. 746  
Lieberkühn c. 28. d. 276. 279  
282. 284  
Lieutaud a. 533. b. 130. 137.  
142. c. 2. 25. 363. 527. 539.  
d. 92. 471.  
Zimmer a. 579  
Pinden d. 440  
Lisignolo a. 64  
Lissovius d. 399. 400. 401. 402  
Lisson d. 651  
Littleton d. 84  
Littre a. 590. d. 318. 560.  
726  
Lobstein I. c. 34. 679  
Lobstein II. d. 368.  
445. 508. 509. 519. 539. 601.  
691. 698. 701. 703. 706. 709.

Lobstein d. G. 713. 715. 716. 722.  
723. 724. 725. 730. 744. 746.  
748. 749. 752. 759  
Loder a. 319. b. 91. 223. 228.  
279. c. 83. 152. 519. 606  
Löffle c. 369. d. 56. 459  
Löbel d. 459  
Lorin a. 189. 307. c. 585  
Loshage a. 24. b. 23  
Lottius a. 626  
Louis a. 411. b. 361. c. 607.  
d. 187. 615  
Lover a. 231. c. 2. 15  
Lucé a. 185. 197. 633. d. 453.  
695. 711  
Ludlow d. 252  
Ludwig a. 179. 213. 287. 308.  
325. 586. b. 181. 189. 190.  
c. 381. 430. 586. 587. 593.  
594. 595. 601. 604. 630. 641.  
663. 674. 679. 686. 691. 698.  
709. 721. 745. 756. 792. d. 202  
177.

Macartney a. 411  
Macaulay a. 176  
Macdonald a. 406. 411. 429  
Madai d. 697  
Magenbie d. 132. 383. 397. 403.  
482.  
Maitre Jean d. 118  
Malacarne a. 257. c. 72. 79.  
429. 466. 588. 670. d. 119.  
273  
Malpighi a. 131. 226. 259. 278.  
316. 338. 356. 579. 590. 594.  
d. 174. 332. 348. 368. 409. 459.  
528. 558. 588. 683. 684. 687  
Mappus b. 15. d. 332. 340. 342.  
343. 344.  
Mareet a. 109. 131. 550. 653.  
d. 94. 269. 497. 501. 502. 503.  
Margueron a. 560  
Marrigués a. 406  
Marshall a. 192. c. 597  
Martin a. 160. 289. b. 200.  
c. 428. d. 198  
Mascagni a. 213. 218. 235. 238.  
239. c. 382  
Mauchart b. 314. 319. d. 74.  
253  
Mauvois a. 243. d. 82  
M. G.

- Reil a. E. 259. 268. 278. 281.  
 284. 286. 303. 310. 311. 333.  
 c. 373. 466. 489. 500. 502. 519.  
 523. 536. 557. 588. 605. 606.  
 607. 689. 711. 786. d. 94. 95.  
 100. 122. 297. 316  
 Reimarus a. 470  
 Reipetjen d. 409  
 Reuß d. 707. 745  
 Reyerhorst d. 174  
 Rhodius d. 503  
 Ribes c. 717. 770. d. 98. 122.  
 558  
 Ribbe d. 519  
 Richard d. 736  
 Richerand a. 512. d. 405. 426.  
 440. 458  
 Ridley c. 429  
 Riecke d. 716  
 Riegels a. 135. 503. 509  
 Riet a. 579  
 Rinber d. 174. 181  
 Ring c. 359  
 Riobé c. 610  
 Riolanus b. 22. c. 746  
 Ripping b. 240  
 Ritter a. 513  
 Robert a. 411  
 Röderer b. 244. c. 54. 593.  
 d. 53. 54. 113. 282. 406. 488.  
 519. 540. 679. 718. 729. 735.  
 746. 751  
 Röplein d. 590. 735  
 Rodman d. 762  
 Roger a. 482  
 Rolfinck b. 332. d. 511  
 Rolof d. 368  
 Roose d. 574. 585. 684. 770  
 Rosenberger d. 519. 529  
 Rosenmüller a. 404. 531. 557.  
 b. 58. 60. 291. 402. 405. 435.  
 466. 499. 519. 522. 563. 587.  
 c. 634. 694. d. 58. 95. 202.  
 587. 590  
 Rosenthal c. 430. 442. 458  
 Roiff a. 191. c. 18  
 Rossum d. 631  
 Rothe c. 359  
 Roubault d. 726  
 Roux c. 721. 257  
 Rowland a. 410  
 Rowley d. 118  
 Royen d. E. 174  
 Rubbel a. 212  
 Rudolphi a. 81. 663. b. 264  
 503. c. 527. d. 70. 223. 276.  
 331. 429  
 Rumelin b. 314  
 Runge d. 146. 147. 379  
 Russell a. 411. 414. 470  
 Runsch a. 303. 590. 626. c. 20.  
 d. 76. 88. 141. 519. 554. 555.  
 674. 697. 727  
 Ryan c. 79  
 S.  
 Sabatier b. 456. c. 14. 25. 26.  
 78. 80. 93. 94. 102. 111. 126.  
 220. 234. 235. 248. 409. 505.  
 510. 511. 539. 563. 603. 637. 663  
 Salter c. 606. 607  
 Salzmann b. 220. 509  
 Samuel d. 608  
 Van Sanden d. 624  
 E. Sandisfort I. a. 141. 319. 357.  
 401. b. 22. 137. 148. 182. 241.  
 253. 361. 466. 515. c. 288.  
 d. 56. 136. 161. 361. 369. 370.  
 679. d. 1. 259. 271. 315. 406.  
 497. 680. 697. 698  
 Sandisfort II. d. 250  
 Santorini a. 590. b. 455. c. 2.  
 25. 443. 451. 508. 610. 668.  
 685. 709. 710. 746. 747. 766.  
 793. d. 8. 12. 19. 136. 138.  
 139. 242. 243. 364. 378. 382.  
 408. 447. 514. 517. 540. 588.  
 600. 691  
 Sasse a. 255  
 Sattig d. 99. 100  
 Sauerotte d. 673  
 Saumarez b. 179  
 Saunders d. 8. 52. 56. 332  
 Sauvages d. 426  
 Sauré d. 147  
 Scarpa a. 153. 245. 273. 275. 295  
 314. 332. 356. c. 15. 614. 679.  
 680. 682. 683. 696. 721. 726.  
 d. 20. 30. 37. 38. 40. 118. 122.  
 123. 127. 130. 142  
 Schäffer d. 736  
 Schallhammer a. 472  
 Scheel d. 433. 707. 710. 748  
 Scheele d. 497  
 Schell

- Schelhammer d. C. 7  
 Schelver a. 62  
 Schlegel d. 698. 752. 769  
 Schlichting c. 585  
 Schmiedel c. 406. 755. 766. 769  
 Schmidt a. 395. c. 623. d. 118. 119. 135. d. 601. 403  
 Schmidt Müller d. 417. 448  
 Schmitt d. 431. 435. 437  
 Schmud a. 255  
 Schnell a. 530  
 Schöbinger a. 116  
 Schönlein c. 561  
 Schreier a. 228. 229. 238. 239. 550. d. 202. 759  
 Schröter a. 580  
 Schürer d. 523  
 Schuler a. 94  
 Schumann d. 574  
 Schumlausk d. 459  
 Schulz d. 745. 746  
 Schulze d. 250. 746  
 Schurig d. 695  
 Schuyt d. 368  
 Schwarz d. 616  
 Schweighäuser d. 601. 760  
 Schwilgus d. 527  
 Sebillot c. 56. d. 452  
 Seguin d. 425. 429  
 Seiler a. 44. d. 601. 618. 628  
 Sella d. 726  
 Sels d. 179  
 Senac c. 2. 29. 380. d. 471  
 Senff a. 376  
 Serres c. 610. d. 199. 203. 220. 225. 228. 229. 231. 234. 240. 241  
 Siebold c. 593. d. 189  
 Simmons c. 592. d. 743  
 Simson d. 519  
 Simpson a. 470  
 Sirtus d. 650  
 S. Th. Schmerring I. a. VII. VIII. I. 177. 189. 226. 227. 278. 280. 311. 333. 590. b. 23. 43. 179. 197. 269. 279. 316. 330. 459. 464. 574. c. 80. 81. 93. 94. 102. 107. 126. 135. 136. 168. 184. 201. 205. 206. 216. 220. 234. 240. 248. 266. 328. 413  
 Schmerring c. C. 429. 430. 439. 447. 492. 498. 500. 522. 533. 565. 589. 591. 603. 619. 636. 637. 668. 679. 684. 711. 716. 740. 745. 747. 78. 792. d. 4. 58. 81. 94. 182. 184. 249. 252. 266. 296. 300. 361. 409. 570. 661. 663. 735. 741. 748. 698  
 Schmerring II. d. 58  
 Solingen d. 735  
 Sommer b. 244  
 Sonnenburg b. 22  
 Spallanzani a. 141  
 Spangenberg a. 255. 354  
 Spix b. 87. 104. 137. 145. 169. 175  
 Sprengel a. 104. 309. 476. 487  
 Sprugheim a. 258  
 Stark a. 659  
 Steding d. 599  
 Steidele c. 73  
 Stein b. 245  
 Steinbuch c. 606. 608  
 Stenfon a. 279. b. 392. d. 67. 189. 192. 429  
 Stephan d. 443  
 Stevens a. 176. 181. 257  
 Stiebel d. 331  
 Stied c. 608  
 Stier d. 82  
 Storer a. 192  
 Ston d. 736  
 Stuart a. 488  
 Stufelen d. 368  
 Styr c. 630  
 Sue a. 356. 375. b. 12. 47. 519. 524  
 Le Sueur a. 80  
 Swammerdam a. 482. 484. 529. 568. 569. 574  
 Van Swieten a. 319  
 Sobel d. 119  
 Sylvius b. 21  
 T.  
 Tacconi c. 58  
 Targioni d. 383. 405  
 Tassin b. 22. 392. c. 506. 518  
 Taurin d. 402  
 Taylor d. 57. 118  
 Teichmeyer d. 23  
 Tenon b. 75. 354. 361. 363. d. 161. 162. 497  
 Ters

## D.

Darm, Pulsader des dünnen.  
(A. intestinales) c. E. 216  
Darmhang, wahrer d. 317-  
falscher 324  
Darmbein b. 231  
Darmblase d. 295- 722  
Darmkanal, seine Häute d. 152  
Darmseine. d. 331  
Dartos d. 522  
Denar der Organe ist nicht die  
selbe a. 790  
Daumenblutader, oberflächliche (V.  
cephalica pollicis) c. 340  
Decidua membrana d. 699  
Depressio b. 191  
Derma a. 574  
Diarthrosis a. 394  
Didymi d. 540  
Diploë d. 389  
Director penis d. 562  
Distoma a. 662  
Divergirende Nervenmasse a. 282  
Diverticulum spurium a. 619  
Dornfortsatz der Wirbel b. 29  
Drehgelenk a. 396  
Dreieckige Leberbänder d. 647. 648  
Drüsen, Pachionische (glandulae  
pachionianae) S. Pirngas  
nulationen.  
Drüsen. Vollkommene und unvoll-  
kommene a. 634. 47. einfache  
634. zusammengesetzte a. 635.  
zusammengedrückte a. 636  
Drüsenäste (A. glandulares) der  
Antlitzpulsader. c. 96  
Drüsenystem a. 626 ff. wesent-  
lichste Merkmale desselben 629 ff.  
Ductus Belliniani f. renales d. 467  
- deferens d. 550  
- excretorii a. 636  
- galactophori d. 578  
- hepaticus d. 335. 345. cy-  
sticus 345. choledochus ebend.  
Ductus seminiferi d. 549  
- Stenonianus d. 191. Whar-  
tonianus 193. Bartholinianus  
194. Riviniani 195  
Ductus Wirfungianus d. 365  
Dünndarmgefäße d. 649  
Durchbohrende Pulsader (A. per-

forans prima) c. 187. Äste  
(A. perf. minores l. inferiores)  
c. 188. 193. obere und hintere  
(A. perf. posteriores l. supe-  
riores) c. E. 194  
Durchbohrte Stelle, mittlere (sub-  
stantia perforata media) c. 481.  
vordere c. 489  
Durchmesser des Beckens b. 241 ff.  
Dyscanthos d. 331

## E.

Echinococcus a. 662  
Edel d. 9  
Effluvia vasa d. 549  
Ei d. 695 ff.  
Eierchen d. 516  
Eisförmiges Loch b. 236  
Eigenthümlichkeiten der menschl.  
chen Gestalt a. 60 ff.  
Eindruck b. 191  
Eingang des Beckens b. 242  
Eingeweide. Allgemeine Bedingun-  
gen derselben d. 1 — 3. Der Ein-  
geweid im engeren Sinn 148 ff.  
Eingeweidwürmer a. 661 ff.  
Einteilung a. 401  
Einsparung a. 401  
Einsaugung ist Lebenserscheinung  
a. 239  
Einsaugung, ob sie bloß durch die  
Eingabern oder auch durch die  
Blutadern geschehe a. 233 ff.  
Eirunde Grube (fossa ovalis) c. 32.  
39. 48  
Eirundes Loch (foramen ovale)  
c. 47  
Eiter a. 242  
Ellenbogenhohlhandast, des Dau-  
men (N. ulnaris volaris pol-  
licis) c. 652  
Ellenbogenknorren b. 207  
Ellenbogennebenpulsader (A. col-  
lateralis ulnaris f. communis  
ulnaris a profunda) c. 171  
Ellenbogenpulsader, zurücklau-  
fende (A. recurrens ulnaris f. cu-  
bitalis) c. 185  
Ellenbogenrand b. 213  
Eminentia capitata b. 208  
- cruciata b. 92  
- pyramidalis d. 21  
Em

[illegible]

- Singerpulsadern (A. digitales) c. 190  
 Fissura cerebri transversa parva (kleine quere Hirnpalte) c. 522  
 magna ibid.  
 Fissura longitudinalis (Längensfurche) c. 479  
 Fissura pterygoidea b. 98. Sphenoides propria f. Spheno-Sphenoides 99. Spheno-maxillaris 105. Glaleri 113  
 Fissurae b. 191  
 Fissurae. medullae spinalis anterior et posterior (vordere und hintere Mittelpalte des Rückenmarkes) c. 334. laterales c. 435  
 Fleckmausfüßel d. 517  
 Fleischgeheimniß a. 654  
 Fleischwurzchen a. 243  
 Flexorius condylus b. 203  
 Flügel, großer und kleiner b. 96  
 Flügelblätter b. 98  
 Flügelzaumennerv (N. pterygo-palatinus) c. 722  
 Flügelmausfußel (A. pterygo palatina) c. oberste Gausmempulsader.  
 Flügelmausfußel (R. pterygoidei) der Antlitzpulsader c. 101. Flügelmausfußel, äußere. c. kleine Hirnhautpulsader.  
 Flügelmaus (N. pterygoideus) c. 724. 735  
 Focile cruris majus b. 257  
 - majus b. 206  
 - minus b. 209  
 Fontanelle a. 391  
 Foramen Monroi (Monroisches Loch) c. 527  
 Foramen obturatorium b. 236  
 Foramen opticum b. 98  
 Foramen ovale b. 99. rotundum b. 99. spinosum ebendas.  
 Foramen quadratum b. 460  
 Foramen stylo - mastoideum b. 109. caroticum inferius et superius b. 110. mastoideum 111. parietale 116. coecum 119. infraorbitale 127. incisivum f. palatinum anterius 131. Spheno-palatium 134. zygomaticum 136. mentale f. maxillare anticum 143. maxillare palatinum E. 124  
 Foramen Winslowii d. 649  
 Foramina Thebesii (Thebesische Löcher) c. 53. F. ovale (maus des) c. 47  
 Form, äußere, entsteht früher als innere a. 48  
 Formabweichungen a. 83 ff. an seräugliche 87 ff.  
 Formabweichungen des Gehirns a. 243 ff.  
 Formabweichungen der Brust a. 331  
 Formbestandtheile, organische a. 4 ff. äußere 10 ff.  
 Fortsätze der harten Hirnhaut, kreuzförmige (processus durae matris cruciatus) c. 559 ff.  
 Fortsätze der Knochen a. 364  
 Fortsätze, schiefe der Wirbel b. 21  
 Fossa medullae oblongatae b. 99  
 Fossa ovalis (Eirunde Grube) c. 32  
 Fossa pterygoidea b. 98  
 - pterygo - palatina b. 134  
 temporalis 137  
 Fossa scaphoidea d. 10. Anonyma, triangularis ovalis ebendas.  
 Fossa superior cerebelli (oberer Furchen des kleinen Gehirns) c. 465. Sylvii c. 479  
 Fossa supraclivata et infraclivata. b. 195  
 - navicularis d. 561  
 Fossae cerebelli et cerebrales b. 98  
 - inguinales d. 651  
 Fovea digitata (Fingerförmige Grube) c. 529  
 Foveae intercondyloideae b. 254  
 Fovea trochlearis b. 118  
 Frenulum pudendi d. 537. glandis d. 516  
 Frontales cellulae b. 122  
 Frontalis musc. b. 479  
 Frontalis, A. (Stirnpulsader) c. 123  
 Frontalis, N. (Stirnerv) c. 719  
 Fruchthalter d. 318  
 Frühgeburt d. 762  
 Fühlwurm d. 442  
 Fuge a. 397  
 Function

Aponeuroses a. 6. 55  
 Aponeurosis cruralis b. 548.  
 plantaris ebendaf.  
 Apparate im Organismus a. 12  
 Appendices epiploicae d. 290.  
 659  
 Aqueductus Fallopii b. 129  
 Aquila labyrinthi d. 37  
 Arachnoidea a. 304  
 Arant, Schle desselben, (Ven-  
 trionulus Arantii) 6. Nauten-  
 grube  
 Arcus cruralis b. 438  
 zygomaticus f. jugalis  
 b. 167  
 Areola d. 577  
 Armband. 6. halbmondförmige  
 Knoten.  
 Armsäcke b. 213  
 Armgesecht (Plexus brachialis)  
 Armilla c. 644  
 Armillare ligamentum b. 489  
 Armpulsader, untere tiefe, (A.  
 profunda infer.) c. 172  
 Arthrodis d. 394  
 Articulare os b. 216  
 Articulatus a. 394  
 Ascaria d. 330. 662  
 Asellii pancreas c. 383  
 Ast, absteigender, des Zungens  
 fleischnerven (R. descendens no-  
 ni) c. 676  
 Ast, zurücklaufender, der vorderen  
 Schienbeinpulsader, (A. recur-  
 rens) c. 289  
 Astragalus b. 265  
 Atlas b. 39  
 Atlanto-occipitalis musc. b. 423  
 Aufrichter der Ruthe d. 562  
 Augenblutader, vordere (Vena  
 ophthalmica anter.) c. 318  
 Augenbrauenpulsader (A. supra-  
 ciliaris) c. 123  
 Augenhöfendach b. 458  
 Augenbogen, oberer, (arcus  
 tarsus superior) c. 122. un-  
 terer ibid.  
 Augenlidnerv, unterer (N. pal-  
 pebralis infer.) c. 730. außer  
 ter 732

Augenlidpulsader (A. palpebra-  
 lis) c. 6. 122  
 Augennuskeln d. 104 ff.  
 Augenwinkel d. 58.  
 Auricula d. 10  
 Auricularis facies b. 233  
 Ausdehnbarkeit der serösen Häute  
 a. 545  
 Ausdehnung der Muskeln a. 481 ff.  
 Ausführungsgänge a. 636  
 Ausführungsgang der Nebennie-  
 ren d. 505  
 Ausgang des Beckens b. 242  
 Ausschnitt, halbmondförmiger b.  
 207. großer und kleiner ebendaf.  
 Axis b. 42

B.

Backenblutader, obere (Vena buc-  
 calis super.) c. 319. untere  
 ibid.  
 Backennerven (N. buccales)  
 c. 704. vom dreigetheilten Ner-  
 ven c. 734  
 Backenpulsader (A. buccalis)  
 c. 113  
 Bänder, faserige a. 460  
 Balg a. 555  
 Balggeschwulst c. 555  
 Balkenmuskeln (trabeculae car-  
 neae) c. 7  
 Balkenpulsader (A. callosa) c. 127  
 Balkensystem a. 282  
 Bandknorpel a. 437  
 Bandringe b. 529  
 Bandwurm d. 330  
 Bartholinischer Gang d. 194  
 Basis Girardi d. 602  
 Basilaris crista b. 89  
 Bau, strahliger im Organismus  
 a. 20. symmetrischer 24  
 Bauchbruch b. 451  
 Bauchdeckenblutader, äußere und  
 innere (V. abdominalis et epi-  
 gastrica) c. 355  
 Bauchdeckepulsader, obere (A.  
 epigastrica super) c. 156. In-  
 nere untere c. 246  
 Bauchfellfortsatz d. 603  
 Bauchring b. 439  
 Bauch,



- Bauchspeichel, Zwölffingerdarm:  
 äste (A. pancreatico - duodena-  
 les) c. 211  
 Bauchspeicheldrüsenpulsader, mitt-  
 lere, linke (A. pancreaticae  
 mediae et sinistrae) c. 214  
 Bauchspeicheldrüsenkeine d. 367  
 Beckenfugen werden in der Schwanz-  
 gerschaft aufgelockert. b. 361  
 Beckengeflecht (Pl. hypogastricus)  
 S. hinterstes Gefäßgeflecht.  
 Bedeckungen, allgemeine a. 569  
 Befestigungsgrundt der Muskeln  
 a. 508  
 Beinhaut a. 367 ff.  
 Bellinische Gänge d. 407  
 Beständigkeit im Verlauf der Blut-  
 adern größer als dem der Puls-  
 adern a. 177  
 Beugemuskeln a. 512 ff.  
 Beutelmuskeln b. 550. 551  
 Bewegungerscheinungen, ihr We-  
 sen a. 112  
 Bewegungsnerveu a. 322  
 Bildungsabweichungen der äußern  
 Form des ganzen Körpers b. 14 ff.  
 Bildungsabweichungen a. 82  
 : ihre Thierähnlichkeit a. 94  
 : qualitative u. quantitative  
 a. 96  
 Bildungen, regelwidrige, neue  
 a. 98 ff.  
 Bildungserscheinungen. Wesen der-  
 selben a. 111  
 Bindehaut d. 59  
 Bläschen, Graaf'sche d. 516  
 Blasen a. 641  
 Blasenbandwürmer a. 662  
 Blasengeflecht (Plexus vesicalis)  
 c. 356  
 Blattform, organische a. 7 ff.  
 Blaue Krankheit a. 252  
 Blendungspulsader d. 79. hintere  
 (A. ciliaris post.) c. 118. obere  
 (post. sup.) c. 119. vordere  
 (anticae) c. 121  
 Blinddarmpulsader (A. coecalis)  
 c. 219  
 Blutadern, Vergleichung derselben  
 mit den Pulsadern a. 198 ff. ihre  
 Verbreitung ist zusammengesetz-  
 ter a. 203. sind ausdehnbarer a. 211  
 Blutschwamm a. 661  
 Bogenlinien b. 233  
 Botallischer Gang (ductus Botal-  
 lianus) S. Pulsaderband.  
 Bothryocephalus d. 330  
 Brachiaeus externus musc. b. 499.  
 internus 504  
 Brand a. 242  
 Bratspieß d. 554  
 Braune Substanz der Negerhaut  
 a. 585  
 Bregmatis ossa b. 114  
 Bronchi d. 412  
 Bronchiae d. 412  
 Bronchius musculus d. 389  
 Bruch (Fractura) a. 405  
 Brüche d. 665 ff. angeborene  
 d. 670. kindliche ebendaf.  
 Bruchigkeit des Gefäßsystems a. 257  
 Bruchigkeit der Knochen a. 419  
 Brunnerische Drüsen d. 279  
 Brustbein b. 63. bedeutende Ver-  
 schiedenheiten seiner Entwicklung  
 67  
 Brustbeinbauchmuskel b. 469  
 Brustbeinmuskel der Thiere b. 465  
 Brustbeinwarzenmuskel b. 472  
 Brustdrüsenarkom a. 659  
 Brusthöhle. Gegenden derselben  
 b. 8  
 Brustkastenmuskel b. 465  
 Brustpulsader, erste äußere, ober-  
 obere, (A. thoracica externa  
 suprema s. prima) c. 161.  
 lange äußere (A. thor. ext.  
 longa s. mammaria externa  
 c. 163  
 Brustwarze d. 577  
 Brustwarze, äußere (A. pectora-  
 les externi) der Brustnerven  
 c. 618  
 Bündel der Nerven a. 267  
 Bulbo-cavernosus m. d. 563  
 Bursae mucosae a. 537  
 Bursae mucosae vaginales  
 vesicales ebendaf. a. 561  
 C.  
 Caerumen d. 12  
 Caduca membrana d. 699  
 Calcaneum b. 265  
 Calcis os b. 267  
 Calices

Calices	d. 470	Commissur, weiche (commisura mollis)	c. 511
Camper's Adhre	d. 602	Complexus parvus mi	b. 415
Canaliculi seminales	d. 549	Conceptio	d. 679
Canales corticales	d. 466	Conceptio extrauterina	d. 766
Canalis opticus	b. 98	Conchae	b. 140
- Vidianus	b. 99	Concha auris	d. 10
- caroticus b. 110. infraorbitalis 126. palatinus anterior		Concha media b. 122. superior	122
f. incisivus 129. pterygo-palatinus 134. zygomaticus b. 136		Concretionen, gichtische	a. 567
Canalis inguinalis	b. 439	Candyloideus canalis b. 90. f. nns	91
- Petiti	d. 97	Configuration, regelwidrige des Herzens	c. 59 ff.
Canina major	b. 206	Conjunctiva tunica oculi	d. 59.
Canthi oculi	d. 58	testis	d. 547
Capitata eminentia	b. 202	Contrahissurae	b. 191
Capula renum	d. 461	Convergirende Nervenmasse	a. 282
Capulae suprarenales	d. 503.	Coraco-brachialis musc.	b. 488
atrabilariae ebendas.		Coracoideus musc.	b. 498
Caput cruciatum	b. 186	- proc.	b. 194
Cardia	d. 239	Coraco-radialis musc.	b. 501
Caries	a. 417	Corium	a. 574
Caroticus canalis	b. 110	Cornua sphenoidalia	b. 95
- sulcus	b. 94	Corona ciliaris	d. 78
Carpi ligamentum volare commune b. 491. proprium ebendas.		Coxae os	b. 231
Carpus	b. 213	Cremaster	d. 543
Cartilaginee falcatae	b. 371	Cribiforme os	d. 120
Cartilago thyreoidea d. 379. cricoidea d. 380. arytaenoidea f. triquetra f. pyramidalis d. 381		Cribrifera membrana	d. 699
Caruncula lacrymalis	d. 65	Crista basilaris	b. 89
Cavernosus textus	a. 251	Crista frontalis b. 118. galli 121. turbinales	133
Cavitas peroneae	b. 257	Crista nasalis. b. 138. mentalis	143
- semilunaris	b. 207	Crista occipitalis externa	b. 92.
Cellulae pulmonales	d. 413	- interna	b. 92
Centralnerven (des Gangliennervens)	c. 757	Crista sphenoidalis	b. 95
Choanae	b. 161	Cruralis arcus	b. 438
Chorion	d. 708	Cryptae	d. 634
Chylopoetica viscera	d. 331	Cabitas	b. 206
Ciliarnerven	d. 86	Cuboideum os	b. 271
Circulus ciliaris	d. 77	Cucullaris musculus	b. 399
Circulus Petiti	d. 97	Cuneiforme os	b. 216
Clavicula	b. 198	Cuneiformia ossa	b. 273
Clavis	b. 198	Cunni constrictor	d. 538
Cleido-mastoidens	b. 473	Cunus	d. 531
Clinoidi processus b. 94. 95. 97		Cutaneus cranii musc.	b. 479
Clitoris	d. 534	Cuticula	a. 586
Coles	d. 534	Cutis	a. 569
Colliculus feminalis	d. 554	Cylindrus Camperi	d. 602
Columnae rugarum	d. 533	Cycticercus	a. 662
Commissur	a. 282		

- Fingerpulsadern (A. digitales) c. 190  
 Fissura cerebri transversa parva (kleine quere Hirnspalte) c. 522  
 magna ihid.  
 Fissura longitudinalis (Längensfurche) c. 479  
 Fissura pterygoidea b. 98. sphenoida propria f. sphenoida 99. sphenomaxillaris 105.  
 Glaseri 113  
 Fissurae b. 191  
 Fissurae, medullae spinalis anterior et posterior (vordere und hintere Mittelspalte des Rückenmarkes) c. 334. laterales c. 435  
 Fledermauskügel d. 517  
 Fleischgeheimniß a. 654  
 Fleischwürschen a. 243  
 Flexorius condylus b. 203  
 Flügel, großer und kleiner b. 96  
 Flügelblätter b. 98  
 Flügelgaumennerv (N. pterygopalatinus) c. 722  
 Flügelgaumenspulsader (A. pterygopalatina) c. oberste Gausmempulsader.  
 Flügelmusfeldste (R. pterygoidei) der Antlispulsader c. 101. Flügelpulsader, äußere. c. kleine Hirnhautpulsader.  
 Flügelnerve (N. pterygoideus) c. 724. 735  
 Focile cruris majus b. 257  
 - majus b. 206  
 - minus b. 209  
 Fontanelle a. 391  
 Foramen Monroi (Monroisches Loch) c. 527  
 Foramen obturatorium b. 236  
 Foramen opticum b. 98  
 Foramen ovale b. 99. rotundum b. 99. spinosum ebendas.  
 Foramen quadratum. b. 460  
 Foramen stylo - mastoideum b. 109. caroticum inferius et superius b. 110. mastoideum 111. parietale 116. coecum 119. infraorbitale 127. incisivum f. palatinum anterius 131. sphenopalatinum 134. zygomaticum 136. mentale f. maxillare anticum 143. maxillare posticum c. 144  
 Foramen Winslowii d. 659  
 Foramina Thebaldii (Thebaldische Löcher) c. 33. F. ovale (cirrus des) c. 47  
 Form, äußere, entsteht früher als innere a. 48  
 Formabweichungen a. 83 ff. an springliche 87 ff.  
 Formabweichungen des Gehirns a. 244 ff.  
 Formabweichungen der Muskeln a. 531  
 Formbestandtheile, organische a. 4 ff. näher 10 ff.  
 Fortsätze der harten Hirnhaut, kreuzförmige (processus durae matris cruciatus) c. 559 ff.  
 Fortsätze der Knochen a. 364  
 Fortsätze, schiefe der Wirbel b. 21  
 Fossa medullae oblongatae b. 99  
 Fossa ovalis (Eirunde Grube) c. 32  
 Fossa pterygoidea b. 98  
 - pterygo - palatina b. 134.  
 temporalis 137  
 Fossa scaphoidea d. 10. Anonyma, triangularis ovalis ebendas.  
 Fossa superior cerebelli (oberer Furchen des kleinen Gehirns) c. 465. Sylvii c. 479  
 Fossa supraspinata et infraspinata b. 198  
 - navicularis d. 561  
 Fossae cerebelli et cerebrales b. 98  
 - inguinales d. 651  
 Fovea digitata (Fingerförmige Grube) c. 529  
 Foveae intercondyloideae b. 254  
 Fovea trochlearis b. 118  
 Frenulum pudendi d. 537. glandis d. 516  
 Frontales cellulae b. 122  
 Frontalis musc. b. 479  
 Frontalis, A. (Stirnpulsader) c. 123  
 Frontalis, N. (Stirnnerve) c. 719  
 Fruchtthaler d. 518  
 Frühgeburt d. 762  
 Fühlwurm d. 442  
 Fuge a. 397  
 Function

- Empfängnis d. S. 679  
 Empfängnis außerhalb der Gebärmutter d. 766  
 Empfindungsnerven a. 322  
 Empyema d. 441  
 Enarthrosis a. 395  
 Endknochen, unbeweglicher b. 49.  
 beweglicher 54  
 Entozoa c. 661  
 Entsprechend. Entwicklungsverschiedenheiten des Menschen und der bleibenden in der Thierreihe a. 51  
 Entwicklungsgefes a. 44 ff.  
 Entwicklung regelwidrige der Knorpel a. 435  
 Entwicklungsverschiedenheiten der äußern Form des ganzen Körpers b. 12 ff.  
 Entwicklungsverschiedenheiten der Muskeln a. 502  
 Entwicklungsverschiedenheiten des Nervensystems a. 337. des Knochenstems 375  
 Entwicklungsverschiedenheiten des Schleimgewebes a. 136. des Gefäßsystems 165 ff. der Pulsadern a. 197  
 Entwicklungsverschiedenheiten der Drüsen a. 647  
 Entwicklungsverschiedenheiten der Wirbel b. 29  
 Entzündung a. 240  
 Entzündung des Gehirns c. 600  
 Epicranium musc. b. 479  
 Epidermis a. 575. 586  
 Epididymis d. 549  
 Epistropheus b. 42  
 Epistropheo - occipitalis musc. b. 423  
 Erector penis d. 562  
 Erhabenheit, dreieckige d. 21  
 Erhabenheiten der Knochen a. 362  
 Ernährungsast, des Oberschenkelknochens (A. nutritia ossis femoris) c. 277. unterer c. 278.  
 des Schienbeins (A. nutrit. tibiae sup.) c. 298  
 Erythroides tunica d. 544  
 Etmoidalis incisura b. 119  
 etmoidales cellulae b. 122.  
 spina 128. iaforamina 159  
 Ethmoidale os d. S. 120  
 Europäische Race a. 75  
 Eustachiana tuba b. 129. ossis  
 ebenbas.  
 Exostosis a. 416  
 Extensorius condylus b. 203  
 S.  
 Facies brachialis b. 213. digitalis  
 ebenbas. lunata b. 237  
 Fäden der Nerven a. 267  
 Färbung. Entwicklung der organischen a. 45  
 Gallopischer Kanal b. 128  
 Gallopischer Band b. 438  
 Falten, halbmondförmige d. 651  
 Falx cerebelli (Sichel des kleinen Gehirns) c. 560. cerebri ibid.  
 Fascia dentata (gezähnte Leiste) c. 488  
 Fasciae aponeuroticae b. 487  
 Fasciae musculares a. 456  
 Fascia lata b. 542  
 Fascia transversalis b. 440  
 Faser, organische a. 7. herrscht vor 9  
 Faserhäute a. 446  
 Faserhaut der Blutadern a. 208  
 Faserhaut der Gefäße a. 153  
 Faserhaut der Pulsadern a. 182  
 Faserige Bänder a. 460  
 Faserkapseln a. 460  
 Faserknorpel a. 436. Ihre Einteilung 437 ff.  
 Faserorgane, bündelförmige a. 446  
 Faserstern a. 444 ff.  
 Fauces d. 157  
 Felsenbein b. 107  
 Felsennerve, oberflächlicher, (N. petrosus superficialis) c. 700.  
 Kleinerer c. 725  
 Fenestra rotunda. d. 20. ovalis  
 f. semiovalis 21  
 Fenster, rundes d. 20. halbeiförmiges, eiförmiges 21  
 Ferreische Rindenlandchen d. 466  
 Fett a. 131 ff.  
 Fettgeschwülste a. 138  
 Fetthaut a. 582  
 Fetthaut der Niere d. 461  
 Fibula b. 260  
 Filaria d. 662  
 Fingerfäden b. 213  
 Fingers

- Fingerpulsadern (A. digitales) c. 8. 190  
 Fissura cerebri transversa parva (kleine quere Hirnpalte) c. 522  
 magna ibid.  
 Fissura longitudinalis (Längensfurche) c. 479  
 Fissura pterygoidea b. 98. sphenoida propria f. sphenoida 99. sphenoida maxillaris 105. Glaleri 113  
 Fissurae b. 191  
 Fissurae, medullae spinalis anterior et posterior (vordere und hintere Mittelspalte des Rückenmarkes) c. 134. laterales c. 435  
 Fledermausfügel d. 517  
 Fleischgeheimniß a. 654  
 Fleischwürschen a. 243  
 Flexorius condylus b. 203  
 Flügel, großer und kleiner b. 96  
 Flügelblätter b. 98  
 Flügelgauennero (N. pterygo-palatina) c. 722  
 Flügelgauenpulsader (A. pterygo-palatina) c. oberste Gauenpulsader.  
 Flügelmuskelfäste (R. pterygoidei) der Antlitzpulsader c. 101. Flügelmuskler, äußere. c. kleine Hirnhautpulsader.  
 Flügelnero (N. pterygoideus) c. 724. 735  
 Focile cruris majus b. 257  
 - majus b. 206  
 - minus b. 209  
 Fontanelle a. 391  
 Foramen Monroi (Monroisches Loch) c. 527  
 Foramen obturatorium b. 236  
 Foramen opticum b. 98  
 Foramen ovale b. 99. rotundum b. 99. spinosum ebendas.  
 Foramen quadratum b. 460  
 Foramen stylo - mastoideum b. 109. caroticum inferius et superius b. 110. mastoideum 111. parietale 116. coecum 119. infraorbitale 127. incisivum f. palatinum anterius 131. sphenoida-palatina 134. zygomaticum 136. mentale f. maxillare anticum 143. maxillare posticum c. 144  
 Foramen Winslowii d. 659  
 Foramina Thebaldii (Thebaldische Löcher) c. 33. F. ovale (Eirundes) c. 47  
 Form, äußere, entsteht früher als innere a. 48  
 Formabweichungen a. 83 ff. an sprüngenliche 87 ff.  
 Formabweichungen des Gehirns stems a. 244 ff.  
 Formabweichungen der Muskeln a. 531  
 Formbestandtheile, organische a. 4 ff. nähere 10 ff.  
 Fortsätze der harten Hirnhaut, kreuzförmige (processus durae matris cruciatus) c. 559 ff.  
 Fortsätze der Knochen a. 364  
 Fortsätze, schiefe der Wirbel b. 21  
 Fossa medullae oblongatae b. 89  
 Fossa ovalis (Eirunde Grube) c. 12  
 Fossa pterygoidea b. 98  
 - pterygo - palatina b. 134. temporalis 137  
 Fossa scaphoidea d. 10. Anonyma, triangularis ovalis ebendas.  
 Fossa superior cerebelli (obere Furche des kleinen Gehirns) c. 465. Sylvii c. 479  
 Fossa supraspinata et infraspinata b. 198  
 - navicularis d. 561  
 Fossae cerebelli et cerebrales b. 93  
 - inguinales d. 651  
 Fovea digitata (Fingerförmige Grube) c. 529  
 Foveae intercondyloideae b. 254  
 Fovea trochlearis b. 118  
 Frenulum pudendi d. 537. glandis d. 516  
 Frontales cellulae b. 123  
 Frontalis musc. b. 479  
 Frontalis, A. (Stirnpulsader) a. 123  
 Frontalis, N. (Stirnnero) c. 719  
 Fruchtthälter d. 518  
 Frühgeburt d. 762  
 Fühlwurm d. 442  
 Fuge a. 397  
 Function

Function der Organe a. C. 103  
 Fungi durae matris (Hirnhaut-  
 schwämme) c. 607  
 Fungus articulorum b. 373  
 Fungus haematodes a. 661  
 Funiculus spermaticus l. testicu-  
 laris d. 541  
 Funiculus umbilicalis d. 714  
 Furche des hintern Felsenblutlei-  
 ters b. 89  
 Furche, große, oder seitliche Ho-  
 rizontalfurche des kleinen Ge-  
 hirns (Sulcus cerebelli magnus  
 l. horizontalis) c. 463. obere  
 c. 456  
 Furche der Grundfläche (sulcus  
 basalis) des Herzens c. 4  
 Furcula b. 198  
 Fußpulsader, (A. pediae) c. 292  
 Fußrückennerv, vorderer (N. dorsii  
 pedis anticus cutaneus) c. 636  
 Fußwurzelnetz (A. tarsus plan-  
 tares) c. 303  
 Fußwurzelpulsader, äußere (A.  
 tarsus externa) c. 293. innere  
 c. 296

G.

Galactophori ductus d. 578  
 Galenische Hirnblutadern, (V.  
 magnae Galeni) c. 328  
 Galeni venae magnae c. 328  
 Galle, über das Blut, aus welchem  
 sie abgesondert wird. d. 350 ff.  
 Gallenblasengang d. 345  
 Gallengang d. 347  
 Gallenpulsader, (A. cystica) c. 213  
 Gallensteine d. 361 ff.  
 Gallinagialis caput d. 554  
 Gang, Widdischer b. 99  
 Ganglion cavernosum (Zellblut-  
 leiterknoten) c. 767  
 Ganglion lenticulare l. ciliare,  
 (Blendungsnervenknoten) c. 717  
 Ganglion maxillare (Unterkiefer-  
 knoten) c. 738  
 Ganglion semilunare (Halbmonds-  
 förmiger Knoten) c. 713  
 Ganglion sphenopalatinum  
 (Baumenbeinknoten) c. 722

Galtrica, A. V. coronaria ventri-  
 culi. A. gastro-epiploica ihid.  
 Gastricae breves c. C. 214  
 Gastro-hepatica sinistra, A. V.  
 coronaria ventriculi c. 214  
 Gaumen, Fächerer b. 166  
 Gaumenbeinknoten (Gangl. sphen-  
 opalatinum) c. 722  
 Gaumenfortsatz b. 128  
 Gaumenanal b. 129  
 Gaumenkeilbeinfurche b. 133  
 Gaumennerven, große und kleine,  
 (N. palatini maj. et min.) c. 726  
 Gaumenpulsader, aufsteigende oder  
 untere (A. palatina ascendens)  
 c. 96. oberste oder absteigende  
 (suprema et descendens) c. 115  
 Gaumenschmelz b. 134  
 Gebärmuttergeflecht (Plexus ute-  
 rinus) c. 356  
 Gefäße, abirrende des Armes (Va-  
 sa aberrantia) c. 175  
 Gefäße der Muskeln a. 477  
 Gefäßbänder b. 530  
 Gefäßblatt (vela choroidea) c. 548  
 Gefäßgewebe a. 576  
 Gefäßgrube, Pulsader der, (A.  
 fossae Sylvii) c. 129  
 Gefäßhaut a. 279  
 Gefäßkranz, Willischer, des Ge-  
 hirns (circulus Willisii) c. 124  
 Gefäßsystem a. 141 ff. äußere Form  
 a. 144 ff. Gewebe 151 ff. Ver-  
 hältniß desselben zu den Orga-  
 nen 161. Thätigkeitsäusserungen  
 164. Entwicklungsverschieden-  
 heiten 165  
 Gefiederte Muskeln a. 515  
 Gegenecke d. 9  
 Gegenleiste d. 9  
 Gegenpalten b. 191  
 Gegenwirkende Muskeln a. 510  
 Gehirn, faseriger Bau a. 277 ff.  
 Gehirn. Verschiedenheiten seines  
 Baues von dem der Nerven a. 284  
 Gehirn. Ist Sitz der geistigen  
 Erscheinungen a. 324 ff.  
 Gehirn, des großen vordere Puls-  
 adern. G. Balkenpulsader, mitt-  
 lere. G. Pulsader d. Gefäßgrube.  
 Gehörgang, Fächerer b. 129  
 Gehör-

- Fingerpulsadern (A. digitales) c. 190  
 Fissura cerebri transversa parva (Kleine quere Hirnpalte) c. 522  
 magna ibid.  
 Fissura longitudinalis (Längensfurche) c. 479  
 Fissura pterygoidea b. 98. Sphenoides propria f. Spheno - Sphenoides 99. Spheno - maxillaris 105. Glaseri 113  
 Fissurae b. 191  
 Fissurae, medullae spinalis anterior et posterior (vordere und hintere Mittelpalte des Rückenmarkes) c. 134. laterales c. 435  
 Flebdermansfügel d. 517  
 Fleischgeschwulst a. 654  
 Fleischwürstchen a. 243  
 Flexorius condylus b. 203  
 Flügel, großer und kleiner b. 96  
 Flügelblätter b. 98  
 Flügelgaumennerve (N. pterygo-palatina) c. 722  
 Flügelgaumenpulsader (A. pterygo-palatina) c. oberste Gauenpulsader.  
 Flügelmuskeläste (R. pterygoidei) der Antlitzpulsader c. 101. Flügelmuskel, äußere. c. kleine Hirnhautpulsader.  
 Flügelnerve (N. pterygoideus) c. 724. 735  
 Focile cruris majus b. 257  
 - majus b. 206  
 - minus b. 209  
 Fontanelle a. 391  
 Foramen Monroi (Monroisches Loch) c. 527  
 F. obturatorium b. 236  
 Foramen opticum b. 98  
 Foramen ovale b. 99. rotundum b. 99. spinosum ebendas.  
 Foramen quadratum b. 460  
 Foramen stylo - mastoideum b. 109. caroticum inferius et superius b. 110. mastoideum 111. parietale 116. coecum 119. infraorbitale 127. incisivum f. palatinum anterius 131. Spheno-palatina 134. zygomaticum 136. mentale f. maxillare anticum 143. maxillare posticum c. 144  
 Foramen Winslowii d. 659  
 Foramina Thebesii (Thebesische Löcher) c. 33. F. ovale (cunabes) c. 47  
 Form, äußere, entsteht früher als innere a. 48  
 Formabweichungen a. 83 ff. an sprüngleiche 87 ff.  
 Formabweichungen des Gehirnstems a. 244 ff.  
 Formabweichungen der Mustern a. 531  
 Formbestandtheile, organische a. 4 ff. nähere 10 ff.  
 Fortsätze der harten Hirnhaut, kreuzförmige (processus durae matris cruciatus) c. 559 ff.  
 Fortsätze der Knochen a. 304  
 Fortsätze, schiefe der Wirbel b. 21  
 Fossa medullae oblongatae b. 99  
 Fossa ovalis (Eirunde Grube) c. 32  
 Fossa pterygoidea b. 98  
 - pterygo - palatina b. 134  
 temporalis 137  
 Fossa scaphoidea d. 10. Anomala, triangularis ovalis ebendas.  
 Fossa superior cerebelli (obere Furche des kleinen Gehirns) c. 465. Sylvii c. 479  
 Fossa supraspinata et infraspinata b. 195  
 - navicularis d. 501  
 Fossae cerebelli et cerebrales b. 93  
 - inguinales d. 651  
 Fovea digitata (Fingerförmige Grube) c. 529  
 Foveae intercondyloideae b. 254  
 Fovea trochlearis b. 118  
 Frenulum pudendi d. 537. glaudis d. 516  
 Frontales cellulae b. 123  
 Frontalis musc. b. 479  
 Frontalis, A. (Stirnpulsader) a. 123  
 Frontalis, N. (Stirnnerve) c. 719  
 Fruchtträger d. 518  
 Frühgeburt d. 702  
 Fühlwurm d. 442  
 Fuge a. 397  
 Functus

- Granulationes cerebri (Hirngranulationen) c. 544  
 Graue Substanz a. 263 ff.  
 Graue Substanz, ihre Function a. 308 ff.  
 Grenznoten (des Gangliennerven) c. 757  
 Griffelfortsatz der Ellenbogenröhre b. 207. Der Speiche b. 210  
 Griffelförmiger Pulsader (A. stylo-mastoidea) c. 106  
 Grimmdarmpulsadern, rechte, (A. colicae dextrae) c. 218. Rechte untere (A. col. dextra infer.) ibid. Rechte mittlere, oder untere (A. col. dextra med. l. infer.) c. 219. Mittlere oder rechte obere c. 221. Linke c. 223  
 Größe der Organe zeigt nicht in allen Lebensperioden dasselbe Verhältnis a. 49  
 Größe, regelmäßige des Herzens c. 56 ff.  
 Grube des verlängerten Markes b. 89  
 Grube, schalenförmige, ungenannte, dreieckige, eiförmige d. 10  
 Grube, Eytvische (fossa Sylvii) c. 479. Ringerförmige (digitata) c. 529  
 Grundbein, ein eigner Knochen b. 87  
 Grundfläche (basis) des Herzens c. 4  
 Gubernaculum d. 602  
 Gustatorius, N. (Geschmacksnerv) c. 738
- 3.
- Haare a. 594. ihre Verschiedenheiten 598 ff.  
 Haargefäße a. 155 ff.  
 Haaripalte b. 191  
 Haarzwiebel a. 595  
 Habenuia d. 606  
 Haemorrhoidalis plexus (venosus) Mastdarmgeflecht c. 356  
 Haemorrhoidae super. A. (obere Mastdarpulsadern) c. 223. 225.  
 inferior. c. 258  
 Hämorrhoiden d. 323
- Haemorrhoidens, N. (Mastdarmnerv) inferior c. 629. medii ibid.  
 Haken (im großen Gehirn) c. 437  
 Hafenspeichenmuskel b. 501  
 Halbgefederte Muskeln a. 515  
 Halbspfigkeit (Hemicephalica) c. 590  
 Halbfugeln des kleinen Gehirns (Hemisphaerae cerebelli) c. 463  
 Halleri vagina d. 602  
 Hallux b. 284  
 Halsanschwellung, des Rückensmarks c. 432  
 Halsbändchen b. 530  
 Halsband der Wadenbeinmuskeln b. 590  
 Halsgeflecht (Plexus cervicalis) c. 658  
 Halswirbel, erster b. 39 ff. zweiter 41. siebenter 42 ff. ihre Entwicklungswiese 44 ff.  
 Hamatum os b. 220  
 Hamularia d. 442  
 Hamularien a. 662  
 Hamulus b. 123  
 Handdrüsenast des Speichennerven (R. superficialis dorsalis) c. 648.  
 des Ellenbogennerven c. 653  
 Handdrüsenbogen, (Rete dorsale manus l. arcus d. m.) c. 650  
 Handdrüsenellenbogenpulsader (A. dorsalis ulnaris) c. 89  
 Handdrüsenveichenpulsader, (A. dorsalis carpoa l. carpi a radialis) c. 181  
 Harmonia a. 398  
 Harnhaut d. 488  
 Harnröhrenenge d. 560  
 Harnröhrenzwiebel d. 560  
 Harnsteine d. 497 ff.  
 Harnstrang d. 472  
 Harnwege, geheime d. 479 ff.  
 Harte Haut a. 304  
 Hauptbaumpulsader (A. princeps l. magna pollicis) c. 183  
 Hauptzeigefingerpulsader (A. princeps indicis) c. 184. 193  
 Hauptzwerchfellsadern (A. diaphragmaticae magnae l. principes l. superiores) c. 270  
 Haut



- Gebörgangsnerven** (N. meatns auditorii externi infer. et super.)  
c. S. 735  
**Seilen** d. 515  
**Sehräde** d. 653  
**Sehrädegeflecht, oberes** (R. mesentericus super.) c. 762. **unteres** 763. **hinteres, unterstes.** ibid.  
**Selbe Körper** d. 588  
**Selbstige Substanz** a. 263  
**Selenf** a. 394  
**Selenf, künstliches** a. 408  
**Selenfortsätze der Wirbel** b. 28  
**Selengrube** b. 91  
**Selenkanal, hinterer** b. 90. **vorderer** 90  
**Selenknochen** a. 424  
**Selenknorpel** a. 426  
**Selenmäuse** a. 424  
**Selenpulsadern, obere** (A. articulares superiores) a. 283. **innere** c. 284. **Mittlere, unpaare** (azyga) c. 285. **untere, c. 286.** **untere unpaare** c. 287  
**Selensteifigkeit** a. 421  
**Selenstheil des Hinterhauptbeines** b. 88  
**Selenwasserfucht** a. 565  
**Gemellae, A. (Badenmuskelfäste)** c. 285  
**Gemelli surae m.** b. 576  
**Genito-cruralis, N. pudendus externus.** c. 626  
**Gerader Brustbeinmuskel** b. 465  
**Gefäßnerv, oberer** (N. glutaeus superior) c. 628  
**Gefäßängelte Gefäße** d. 548  
**Gelecht. Einfluß desselben auf die Bildungsabweichungen** a. 94  
**Gelechtsverschiedenheiten** a. 72  
**Gelechtsverschiedenheiten d. Gefäßsystems** a. 174  
**Gelechtsverschiedenh. der Haare** a. 601  
**Gelechtsverschiedenh. des Hautsystems** a. 577  
**Gelechtsverschiedenh. der Muskeln** a. 503  
**Gelechtsverschiedenh. des Nervensystems** a. 344  
**Geschmacksnerv** (N. gustatorius) S. Zungenerv.  
**Gestreifter Körper, Blutader des selben** c. S. 328  
**Gewebe, faserig knorpeliges des Hengens** c. 11  
**Gewebe der organischen Körper** a. 4  
**Gewebe der Pulsadern** a. 179  
**Gewinde** a. 395  
**Ginglymus** a. 395  
**Glabella** b. 117  
**Glandulae concatenatae** l. jugulares c. 375  
**Glandulae congregatae** Monroi d. 68  
**Glandulae hypogastricae et lacrimales** (innere Darmbeindrüsen) c. 399  
**Glandulae maxillaris inferioris** V. (Unterkieferdrüsenblutader) c. 319  
**Glandulae mesentericae.** c. 383. **mesocolicae** ibid.  
**Glandulae Pachionianae** (Pachionische Drüsen) v. granulationes cerebri c. 544  
**Glandulae simplices** a. 634. **glutinatae** 635. **conglomeratae** 636  
**Glandulae suprarenales** d. 503  
**atrabiliariae** ebendaf.  
**Glandulae Tysonianae** d. 557  
**Glandularis, rami ab A. facialis** (Drüsenäste) c. 66  
**Glandulosum corpus** d. 684  
**Glashaut** d. 66  
**Gleno-radialis m.** b. 503  
**Glied, weibliches** d. 534  
**Gliedmaßen. Abschnitte und Theilen derselben** b. 11  
**Gliedmaßen zerfallen in vier Hauptabtheilungen** b. 192  
**Gliedschwamm** a. 566. b. 373  
**Glistonsche Kapsel** (capsula Glissonii) c. 365  
**Glutaeus superior** N. (oberer Gefäßnerv) c. 628  
**Gomphosis** a. 401  
**Grenzlilien** b. 241  
**Grätenecle** b. 195  
**Grank-**

- Hirnsand** (*acervulus cerebri*) c. E. 485. 498  
**Hirnschenkelssystem** a. 282  
**Hirnspalte, kleine, quere, (fistula cerebri transversa parva)** c. 522. große *ibid.*  
**Hirnzelt** (*tentorium cerebelli*) c. 559  
**Höcker, oberer hinterer** (*Tuberculum posterius superius*) c. 511. mittlerer hinterer, *ibid.* äußerer unterer, *ibid.*  
**Hodensackpulsadern, vordere** (*A. scrotales anteriores*) c. 264  
**Hörloch, inneres** b. 128. äußeres b. 129  
**Hof der Brust** d. 577  
**Höhle des Beckens** b. 242  
**Höhle des Vorhofes** (*linus*) c. 20  
**Höhle der Vorhofscheidewand** (*linus septi*) c. 39  
**Hohlhandband, gemeinschaftliches** b. 491. *eigenthümliches ebendas.*  
**Hohlhandellenbogenpulsader des Daumens** (*A. volaris pollicis ulnaris*) c. 183  
**Hohlhandnerv, langer** (*N. longus palmaris*) c. 653  
**Hohlhandpulsader** (*A. superficialis volae*) c. 179. der Finger 180  
**Hohlhandspeichenpulsader d. Daumens** (*A. volaris pollicis radialis*) c. 183. des Zeigefingers (*A. vol. rad. indicis*) *ibid.*  
**Hohlhandzwischenknochenpulsadern** (*A. interossea volares*) c. 193  
**Hohlvenenloch** b. 460  
**Hüftbeingelecht, (Plexus ischiadicus)** E. Heiligbeingelecht.  
**Hüftbeinloch** b. 236  
**Hüftgrimmdarmpulsader** (*A. ileocolica*) E. Grimmdarmpulsader.  
**Hüftabänder** a. 462  
**Hüllen des Nervensystems.** a. 303  
**Humeri os** b. 201  
**Hydatides** a. 556. 662  
**Hydatis funiculi** d. 722  
**Hydrocephalus** c. 598  
**Hydrorachitis** a. 593  
**Hymen** d. E. 533  
**Hyoides os** b. 148 ff.  
**Hyoidens, ramus a linguale** (*Zungenbeinast*) c. 95  
**Hyperostoma** a. 416
- J.
- Jacobson'sches Organ** d. 141  
**Janitor** d. 259  
**Iliacus externus m.** b. 549. *internus* b. 556  
**Incisivum os** b. 131  
**Incisura auris** d. 10  
**Incisura ethmoidalis** b. 119  
**- semilunaris** b. 232  
**- semilunaris f. sigmoidea** b. 144  
**Inclinatio pelveos** -b. 245  
**Infraorbitalis, A. (Unteraugenpulsader)** c. 114  
**Infraorbitalis, N. (Unteraugenpulsner)** c. 728  
**Infratrochlearis, N. (Unterrollnerv)** c. 713  
**Inguinalis, N. V. pudendus externus.**  
**Innerer Haut der Blutadern** a. 205 ff.  
**Integumenta** a. 569  
**Intercostales anter. A. (vordere Zwischenrippenpulsadern)** c. 155  
**Intercostalis, N. (Zwischenrippennerv)** c. 67  
**Intermaxillare os** b. 131  
**Intermuscularia ligamenta** b. 488  
**Internodia** b. 227  
**Interossea dorsales, A. (Rückenmittelhandpulsadern)** c. 182  
**volares** c. 193  
**Interosseus externus, N. (äußerer Zwischenknochenerv)** c. 650.  
**internus** c. 651  
**Interstitium interosseum** b. 278  
**Intertendines** a. 464  
**Intertrochantericae lineae** b. 253  
**Intestinales, A. (Dünndarmpulsadern)** c. 216  
**Intumescencia ganglio affinis f. semilunaris, V. Ganglion semilunare.**  
**Ecc** Intus.

- Hantak**, oberflächlicher, des Wadenbeinerven, (N. peroneus superficialis) c. 635. äußerer ibid. Äußerer des Fußes vom Schienbeinerven. (N. cutaneus pedis tibialis) c. 638. Eigenthümlicher der Echle (N. cutaneus plantaris proprius) c. 639
- Hautgefäße** a. 582
- Hautbalgnerve**, mittlerer (N. cutaneus colis medius) c. 660.
- Äußerer** c. 661. oberer ibid.
- Obere vom Antlitznerve**, (N. subcutanei colli superiores) c. 705
- Haut**, innere der Pulsader verästelt sehr häufig a. 181
- Haut**, innere des Gefäßsystems kommt am meisten mit dem ersten System überein a. 211
- Hautnerve der Schulter**, (N. cutaneus humeri) c. 648. Oberer äußerer (des Arms) ibid. Oberer innerer. c. 655. Unterer innerer ibid.
- Hautnerve**, oberer, kleiner innerer, (N. laphenus super. l. minor.) c. 632. innerer ibid. hinterer mittlerer (N. cutaneus polster. medius) c. 634. hinterer unterer ibid. (Am Fuß.)
- Hautsystem** a. 569
- Heiligbein** b. 49. Entwicklung aus 21 Knochenkerne b. 52
- Heiligbeingeßicht** (Plexus ilacralis) c. 633
- Heiligbeinlöcher** b. 50
- Heilungsercheinungen verletzter Gefäße** a. 252 ff.
- Helix** d. 9
- Hemiazygos**, V. (halbunpaarige Blutader) c. 349
- Hemicephalia** (Halblöpsigkeit) c. 590
- Hemisphaerae cerebelli** (Halbkugeln des kleinen Gehirns) c. 463.
- cerebri** c. 479
- Hepatica**, A. (Lebervulsader) c. 210. dextra c. 213
- Hernia cerebri** (Hirnbruch) c. 589
- Hernia umbilicalis** b. 451. ventralis ebenb. diaphragmatis b. 462
- Hermias** d. E. 665 ff. congen 670. infantiles ebenb.
- Herophilus**, Presse des, (torus Heropauli) c.
- Herzäde** (R. cardiaci) des geringen Nerven c. 1
- Herznerve**, oberer oder oberflächlicher, (N. cardiacus superficialis f. superior) c. 772. Mittlerer größer c. 775. Unterer kleiner c. 7
- Herzohr** (auricula) c. 20. linl (a. sinistra) c.
- Hiatus aorticus** b. 41
- Hiatus oesophagus** b. 41
- Hinterhauptbein**, kein eigener Knochen b. 8
- Hinterhauptskamm** b. 9
- Hinterhauptsmuskel** b. 43
- Hinterhauptsnerv**, kleiner vorderer (N. occipitalis minor f. anterior) c. 661. hinterer größer c. 662
- Hinterhauptsfirnmuskel** b. 49
- Hinterhauptsfischel**, äußerer b. 9
- Hippicus** m. b. 594
- Hirnbruch** b. 189
- Hirnbruch**, (hernia cerebri) c. 589
- Hirncranialfissur**, hintere, kleiner c. 498
- Hirngranulationen** (granulationes cerebrales) c. 544
- Hirnhautschwämme** (fungi durae matris) c. 607
- Hirnhautpulsader**, hintere (A. menyngea posterior) c. 103.
- vordere** **Hirnhautpulsader** c. 105. kleine (parva) c. 111.
- mittlere** (media) c. 111
- Hirnklappe** (Valvula cerebri) E.
- vorderes Marksegel**.
- Hirnkopfblutader**, (V. encephalis) c. 335
- Hirnkopfblutader**, untere (A. cerebelli infer.) c. 140. oberer (superior) c. 143
- Hirnpulsadern**, hintere oder tiefe (A. cerebri poster. f. profundae) c. 141
- Hirnpulsader**, vordere (A. cerebri ant.) c. 124
- Hirn**

- Knorpel, bleibende und vorübergehende** a. 425. ihre Mischung a. 429  
**Knorpelfuge** a. 398  
**Knorpelhaut** a. 430  
**Knorpelige Lippe** b. 364  
**Knorrenheilighleinband** b. 359  
**Knoten** a. 658  
**Knoten, halbmondförmiger (Ganglion semilunare) des dreigezheilten Nerven** c. 713  
**Körper, bräunlicher oder gelber** d. 684  
**Körper, Eintheilung desselben in verschiedne Gegenden** b. 3 ff.  
**Körperherz (Cor aorticum)** c. 6  
**Körper, rautenförmiger (corpus rhomboideum) der Oliven** c. 453  
**Kopf, Gegenden desselben** b. 8. 9  
**Kopfförmige Erhabenheit** b. 202  
**Kräfte, organische** a. 110  
**Kräfte, todte der Muskeln** a. 499  
**Krankheit, blaue (morbus coeruleus)** c. 68  
**Kranzband der Leber** d. 647  
**Kranzgefäße (Pl. coronarii)** c. 778  
**Kretinismus** b. 190  
**Kreuzbeinigelechte (Plexus sacralis)** c. 356  
**Kreuzförmige Erhabenheit** b. 92  
**Kreuzförmige Ringe** b. 529  
**Kreuzkopf** b. 186  
**Kreuzung der Nerven** a. 290  
**Kreuzung, der Stränge des Rückenmarkes** c. 441  
**Krümmbarmanhang** d. 317 ff.  
**Krümmung** b. 62  
**Kügelchen des Nervensystems** a. 265 ff.  
**Kügelchen, organische** a. 4 ff.
- L.
- Labiales superiores, N. (obere Lippenerven)** c. 731. inferiores c. 737  
**Labialis media, V. (mittlere Lippenblutader)** c. 319. inferior ibid.  
**Labrum cartilagineum** b. 365  
**Labyrinthus** b. 121
- Lachmstiel** b. 471  
**Lacrymales cellulae** b. 122  
**Lacrymale os** b. 139  
**Lacrymalis, A. (Thränenpulsader)** c. 118  
**Lacrymalis, N. (Thränenast)** c. 720  
**Lactei ductus** d. 578  
**Längendimension herrscht im Organismus vor** a. 19  
**Längensfurche des Herzens (sulcus cordis longitudinalis)** c. 5  
**Längenspalte, obere (fissura longitudinalis) des großen Gehirns** c. 479  
**Längestreifen (striae laterales longitudinales)** c. 502  
**Lage, regelwidrige, des Herzens** c. 55 ff.  
**Lamina medullaris (Markblatt)** c. 523  
**Lamina perpendicularis papyracea** b. 121.  
**Lappen, (lobi) des kleinen Gehirns** c. 4. 4. Viereckiger, ibid. halbmondförmiger 465. keilförmiger, zweibäuchiger 466. des verlängerten Markes 467. des Lungenmagennerven ibid. des großen Gehirns c. 479  
**Laryngeus, Ramus a thyroidea sup. (Kehlkopfsast)** c. 92. a thyreoid. inf. c. 151  
**Laryngeus superior, N. (oberer Kehlkopfsnerv)** c. 688. inferior c. 690  
**Larynx** d. 378  
**Leber. Ihre Vergrößerung** b. 356. Verhärtung ebendaj. Auflockerung 357. Knoten ebendaj.  
**Leberband, rundes** d. 335  
**Leberbänder** d. 647. 648  
**Lebergang** d. 335. 345  
**Lebergefäß (Pl. hepaticus)** c. 701  
**Lebermagennpulsader, linke, (A. gastrica hepatica sinistra)** c. obere Magenkrampfpulsader.  
**Leberpulsader (A. hepatica)** c. 210. rechte c. 213. kleinere mittlere ibid.  
**Lebersubstanz, doppelte** d. 339  
**Leberhaut** a. 579  
**Leiste,**

Intus susceptio d. E. 321  
 Invaginatio d. 321  
 Jochfortia b. 130  
 Irritabilitätsäusserungen a. 490.  
 Ihre Verschiedenheiten 494 ff.  
 Isthmus urethrae d. 560  
 Isthmus Vieussenii c. 33  
 Jugale os b. 135  
 Jugulare tuberculum b. 90  
 Jugularis sinus b. 91  
 Juguli os b. 198  
 Jugum b. 137  
 Junctionura a. 394  
 Jungfernhäutchen d. 533

## K.

Kieferknöchel a. 589. d. 745  
 Kieferhöcker b. 271  
 Kieferförmige Grube d. 561  
 Kammförmige Muskeln (musculi pectinati) c. 32  
 Kapsel der Nieren d. 461  
 Kaufische Nase a. 76  
 Kaumuskel (R. masseterici) der Antlitzpulsader c. 101. Arterie, obere (A. masseterica sup.) c. 107. der innern Kieferpulsader c. 113  
 Kaumuskelblutadern (V. massetericae) c. 319  
 Kehlkopfnerve, oberer (N. laryngae superior) c. 688. Unterer oder zurücklaufender c. 690  
 Kehlkopf-pulsader, untere (A. laryngea inferior) c. 151  
 Kehlkopfsast (R. laryngeus) der oberen Schilddrüsenpulsader c. 92  
 Kehlsäge b. 91  
 Keilbein kein eigner Knochen b. 87  
 Keilbeingaumenpulsader (A. sphenopalatina) E. hintere Nasenpulsader.  
 Keilbeinhöhle b. 96  
 Keilbeinschnabel b. 96  
 Keilbeinspalte, eigne b. 98  
 Keilbeinspitzen b. 94. 95. 97  
 Keilbeinsattel b. 95  
 Kelche der Niere d. 470  
 Kieferloch, vorderes b. 143. hinteres b. 144  
 Kiefermuskel b. 482

Kiefermuskelnerve a. E. 333  
 Kindepfech d. 743  
 Kinderschleim d. 745  
 Kindswasser d. 706  
 Kinnast (R. mentalis) des Unterkiefernerven c. 731  
 Kislernerv (N. clitoridis) c. 609  
 Kislerpulsader (A. clitoridis) c. 23  
 Klappe des eirunden Lochs (Valvula foraminis ovalis) E. 6  
 Klappe, dreizackige (Valvula tricuspidalis) c. 37  
 Klappe, Eustachische (Valvula Eustachii) c. 33 sq. c. 34  
 Klappe, -mügensförmige (Valvula mitralis) c. 40  
 Klappe, Thebesische (Valvula Thebesii) c. 35  
 Klappen der Blutadern a. 205  
 Klappen der Gefäße a. 19  
 Klappen der Schleimhäute a. 61  
 Knie (im Gehirn) c. 32  
 Knieförmiger Körper (corpus p. niculatum internum) - E. 6  
 Knie hinterer Höcker.  
 Kniekehldrüsen, (glandulae popliteae) c. 35  
 Kniekehlnerv (N. popliteus) c. 65  
 Knochen, lange a. 386. platte 387  
 kurze 391. gemischte 391  
 Knochen, Zahl derselben im menschlichen Körper b. 225  
 Knochenentwickl., zufällige a. 42  
 Knochenverweichung a. 40  
 Knochenlehre, topographische a. 2  
 Knochenmark a. 371  
 Knochenpestgeschwulst a. 47  
 Knochenstern a. 355  
 Knochelpulsader, äußere (A. maxillaris externa) c. 291. hintere c. 292. hintere 292  
 Knötchen des Malacarne (malac. M.) c. 2  
 Knötchen, Morgagnische (Morgagnii) c. 38. Knötchen (N. Arantii) c. 3  
 Knollen, des Gemüths (bulbi) c. 37  
 Knollen

- Magenfranzgeflecht, kleines c. 761.  
großes ibid.
- Magenfranzpulsader, obere, (A. coronaria ventriculi superior) c. 209. rechte, untere c. 211. rechte kleine obere c. 212. linke untere c. 214
- Magenmundpulsadern obere, hintere (A. cardiacae posteriores) c. 209
- Magenneßpulsader, rechte (A. gastropiploica dextra) c. Magenfranzpulsader, rechte untere, kleinere, ibid.
- Magenpulsader, linke, obere, größere (A. gastrica super. major, sinistra) c. obere Magenfranzpulsader. Rechte untere. c. Magenfranzpulsader. Rechte obere ibid. Linke untere, ibid.
- Malare os b. 135
- Malayische Race a. 76
- Malleolaris, A. (Knöchelpulsader) c. 201. interna posterior c. 209
- Mamilla d. 577
- Mammae d. 575
- Margo mammillaris b. 91
- Margo radialis et ulnaris b. 213
- Margo sagittalis. b. 114. frontalis 115. coronalis ebendaf. squamosus ebendaf. occipitalis ebendaf. superciliaris f. supraorbitalis 118
- Markblatt (lamina medullaris) c. 523
- Markcommissur, des Rückenmarkes c. 440
- Markkarkom a. 659
- Marksegel, hinteres (Velum medullare posterius) c. 467. Vorderes c. 468
- Marksubstanz, ihre Function a. 308 ff.
- Marfupialis m. b. 550. internus ebendaf. externi b. 551
- Masseterica super., A. (Raumseßpulsader) c. 107. ramus a. facialis c. 101
- Massetericae, V. (Raumseßpulsadern) c. 319
- Maßdarmstiel d. 327
- Maßdarmgeflecht (Plexus haemorrhoidalis) c. c. 356
- Maßdarminnerv, unterer (N. haemorrhoides infer.) c. 629.
- Mittlerer ibid.
- Maßdarmpulsadern, obere (A. haemorrhoides super.) c. 225. Äußere ober untere c. 258. mittlere c. 262
- Maßtoideus lateralis musculus b. 415
- Mater pia a. 303. dura a. 304
- Matrix d. 518
- Maxillare os b. 126. antrum b. 128
- Maxillaris infer. A. (Unterkieferpulsader) c. 112. superior c. 114
- Maxillaris inferior, N. (Unterkiefernerv) c. 736
- Meatus auditorii interni, N. (Gehörsgangsnerv) c. 735
- Meatus narium c. 163
- Meatus feminarii d. 516
- Meconium d. 743
- Mediastina d. 422
- Mediastinales posteriores, A. (hintere Mittelseßpulsadern) c. 197
- Meibomische Drüsen d. 61
- Melanosen a. 659
- Membrana media d. 727
- Membrana pupillaris d. 113
- Membrana tympani b. 112
- Meningea posterior, A. (hintere Hinterhauptpulsader) c. 103. ab occipitali c. 105. parva c. 111. media f. spinosa ibid.
- Mensuration d. 505
- Mentalis, N. (Kinnerv) c. 737
- Mesenterium d. 649. 653
- Mesocolon d. 655
- Mesothenar b. 538
- Metacarpus b. 221
- Metatarsica, A. (Mittelfußpulsader) c. 294
- Metatarsus b. 264. 277
- Milch d. 764
- Milchcysterne (receptaculum l. cysterne chyli) c. 411
- Milchgänge d. 578
- Milchgefäße (Vasa lactea f. chyli-fera) c. 403
- Milchhaare a. 600
- Milchgeflecht (Pl. splenicus) c. 762
- etc 3 Milch

- Leiste, gezahnte (fascia dentata) c. E. 488. 533  
 Leistenrube d. 651  
 Leistenkanal b. 439  
 Leistennerve (N. inguinalis) E.  
 Schamnerve. Lenden- und Hei-  
 ligkeitsnerve (N. lumbo-lacralis) c. 628  
 Leitband d. 602  
 Lendenschwellung des Rückens  
 markes c. 433  
 Lendendrüse, des Schenkelgesehts  
 (R. lumbales) E. Rückendrüse.  
 Lendenast (R. lumbalis) der Lenden-  
 nerpulsader c. 235  
 Lendenrückensmarkspulsader (A.  
 spinalis lumbalis) c. 235  
 Leper (lyra f. plalterium) c. 507  
 Lien d. 368. accessorius d. 375  
 Lienculi d. 375  
 Leutandisches Dreieck d. 474  
 Ligamenta accessoria a. 462  
 Ligamenta intermuscularia a. 456.  
 b. 488  
 Ligamenta lateralia a. 462  
 Ligamenta vaginalia b. 528  
 Ligamentum arteriosum (Puls-  
 aderband) c. 366  
 Ligamentum carpi dorsale f. ar-  
 millare b. 489  
 Ligamentum ciliare d. 77  
 Ligamentum hepatico-duodenale  
 d. 659. duodeno-renale ebenda.  
 Ligamentum hepatis d. 647. 648  
 Ligamentum phrenico-gastricum  
 d. 648  
 Ligamentum spinoso-sacrum  
 b. 370  
 Ligamentum tuberoso-sacrum  
 b. 359  
 Ligula b. 198  
 Linea arcuata b. 233. innomina-  
 ta b. 223. 241. terminalis 241  
 L. aspera b. 254  
 Lineae obliquae b. 143  
 Lingualis, N. V. gustatorius.  
 Linie, obere und untere halbmonds-  
 förmige b. 92  
 Linsenkapfel d. 99  
 Lippenbändchen d. 537  
 Lippenblutader, mittlere (V. la-  
 bialis media) c. 319  
 Lippenfranzpulsader, untere (A.  
 coronaria labii inferioris) c. 91  
 obere (A. cor. lab. sup.) ibid.  
 Leqq.  
 Lippenmuskeln d. 16  
 Lippennerve, obere, (N. labiale  
 super.) c. 731. Untere c. 731.  
 Lipoma a. 13  
 Liquor prostaticus d. 571  
 Lobi renales d. 461  
 Lobus quadrangularis (viertheiliger  
 Lappen) c. 464. semilunaris 465  
 cuneiformis f. biventris 466  
 medullae oblongatae 467. nervi  
 pneumogastrici, ibid.  
 Lobus quadratus d. 337. Sup-  
 pli f. caudatus ebenda.  
 Loch, rundes b. 99. circahe-  
 keilbein b. 9  
 Luftröhrenpulsader (A. bronchiales)  
 c. 149. von der Luftröhre  
 Brustpulsader c. 155. untere  
 (A. bronch. inferiores) c. 171  
 Luftröhrenzweige (R. tracheales)  
 des Lungenmagennerven, oberer  
 c. 690. Untere c. 691  
 Lumbaris musc. b. 533  
 Lumbosacralis, N. (Lendenkei-  
 beinners) c. 624  
 Lunatum os b. 215  
 Zungenbänder d. 422  
 Zungengeflecht (Pl. pulmonalis)  
 c. 494  
 Zungenherz (Cor pulmonale) c. 5  
 Zungenproben d. 434. 435  
 Zungenzellehen d. 413  
 Lunula a. 42  
 Lutea corpora d. 538. 641  
 Lymphatica vasa intercostalia pe-  
 steriora. (hintere lymph.  
 scheurippenstämme c. 394. a-  
 tica ibid.  
 Lyra f. plalterium (Leper) c. 507

Magenast (R. stomachicus) b.  
 linken obern Magenpulsader  
 c. 217  
 Magenrundpulsader, kurze (A.  
 gastricae breves f. fundi ve-  
 tric.) c. 214  
 Magen-

- superior) c. 317. untere *ibid.*  
 hintere c. 318  
 Nasenaugennerv (N. naso-ocula-  
 ris) c. 716  
 Nasenfortsatz b. 128  
 Nasengänge b. 163  
 Nasenhöhle b. 160  
 Nasenmuskeln d. 139 ff.  
 Nasennerven, obere vordere (N.  
 nasales super. anter.) c. 724.  
 obere hintere *ibid.* Hintere,  
 mittlere und untere c. 727.  
 oberflächliche c. 730  
 Nasenöffnungen b. 161  
 Nasenpulsader (A. nasalis) c. 123  
 Nasenpulsader, gemeinschaftliche  
 äußere, (A. nasalis externa com-  
 munis) c. 100. hintere (poste-  
 rior) c. 115  
 Nasenrücken, obere Blutader des-  
 selben (Vena dorsi nasi supe-  
 rior) c. 316. kleine untere  
 c. 317  
 Nasenscheidewand b. 160  
 Nasenscheidewandast (R. septi na-  
 salis) c. 99. Nasenflügelast  
 (R. pinnalis) c. 99. 100. Nas-  
 senstempelpulsader c. 100  
 Nasenscheidewandnerv (N. septi-  
 narium) c. 726  
 Nasenscheidewandpulsader, hintere,  
 (A. septi narium posterior)  
 c. 115  
 b. 161  
 Nasenstachel b. 161  
 Nasi dorsi super., V. (obere Blut-  
 ader des Nasenrückens) c. 316.  
 inferior c. 317  
 Naso ocularis f. ciliaris, N. (Nas-  
 senaugenast) c. 716  
 Nasopalatinus, N. (Nasengannens-  
 nerv) c. 726. Ganglion (Nas-  
 senganglenknoten) *ibid.*  
 Nates cerebri c. 496  
 Nath a. 398 ff.  
 Nath (im großen Gehirn) (Raph-  
 e f. futura externa corporis cal-  
 losi) c. 501  
 Nath, doppelte b. 187  
 Nathknorpel a. 426  
 Nauticus m. b. 580  
 Naviculars os b. 214
- Nebenerhabenheit (eminentia col-  
 lateralis Meckelii) c. 532  
 Nebenhöhlen der Nase b. 164  
 Nebennieren b. 373  
 Nebennierenpulsadern, mittlere,  
 (A. suprarenales mediae) c. 207.  
 226. obere (superiores) c. 208.  
 untere (inferior) c. 231  
 Negerhaut, braune Substanz ders-  
 selben a. 585. Oberhaut ders-  
 selben a. 590  
 Neigung des Beckens b. 245  
 Nekrose a. 417  
 Nerven der Muskeln a. 479  
 Nerven der Pulsadern a. 184  
 Nerven. Ihre Function a. 319  
 Nerven. Ihr Ortsverhältniß zu  
 den Gefäßen a. 297. Ihre Ein-  
 digungen 298. Blutmenge 301  
 Nerven, weiche (N. molles) c. 772  
 Nervengeflecht a. 273 ff.  
 Nervenknoten a. 273 ff.  
 Nervenknoten. Ihre Vertheilung  
 a. 333  
 Nervensaum (Taenia nervosa) c.  
 halbmondförmiger Knoten.  
 Nervenschlinge a. 273  
 Nervensystem. Beziehung seiner  
 Theile unter einander a. 311 ff.  
 Nervensystem, divergirendes a. 282.  
 convergirendes ebendas.  
 Nervensystem a. 258 ff. Symme-  
 trie und Beständigkeit seines  
 Baues a. 260 ff. Mischung  
 a. 262  
 Nervensystem ist lebenserhaltend  
 a. 329  
 Nesselartige Anhang d. 290  
 Netzhauptpulsader (A. centralis re-  
 tinae) c. 120  
 Netzpulsadern, rechte und mitt-  
 lere (A. epiploicas dextrae et  
 mediae) c. 212  
 Neurilem a. 268  
 Neurilem leitet nicht die Ein-  
 drücke auf Bewegung a. 324  
 Niebergieher der Ruthe d. 562  
 Nieren d. 464  
 Nierenbecken d. 470  
 Nierendrüsen d. 503  
 Nierengeflecht (Pl. renalis) c. 762  
 Nierenwarze d. 463  
 Moduli



- Milzpulsader (A. lienalis f. splo-  
 nica) c. 213  
 Mischungsbestandtheile, organische  
 a. 108  
 Mittelfle d. 422  
 Mittelflehrsader, hintere (A.  
 mediastinales posteriores) c. 197  
 Mittelflehrsader (A. perinac.  
 f. transversa perinac.) c. 258  
 Mittelfußpulsader (A. metatar-  
 sa) c. 294  
 Mittelfalte (fissura centralis)  
 c. 520  
 Mittelfalte, vordere und hintere,  
 des Rückenmarks (fissurae me-  
 dullae spinalis anter. et poste-  
 rior) c. 433  
 Mund des Nagels a. 592  
 Mundartige Fläche b. 237  
 Mundliche Narbe a. 76  
 Monticulus cerebelli (Verg)  
 c. 469  
 Morgagnische Flüssigkeit d. 100  
 Morillas a. 111  
 Mündung der großen Kranzvene  
 des Herzens (orificium venae  
 coronariae cordis maguae) c. 35  
 Multangulum majus os b. 217  
 Multangulum minus os b. 218  
 Muschelleiten b. 133  
 Muscularis infer. A. (Untere  
 Musfelpulsader) c. 120. supe-  
 rior c. 121  
 Musculi papillares (Wargemus-  
 kel) c. 24  
 Musculophrenica, A. (Zwerch-  
 fellsmusfelpulsader) c. 156  
 Musculus Ruyshianus d. 530  
 Muskel der Schilddrüse d. 449  
 Muskel, kleiner durchflochtener  
 b. 415  
 Muskelfast des Speichennerven (R.  
 muscularis) c. 648  
 Muskelbauch a. 508  
 Muskelbinden a. 456  
 Muskelfäden a. 473  
 Muskelfasern a. 473  
 Muskelfortsätze der Wirbel b. 28  
 Muskelhaut a. 448  
 Muskelfopf a. 508  
 Muskeln des vegetativen Lebens  
 a. 520 ff.  
 Muskeln des thierischen L.  
 a. E. 4  
 Muskeln des Kehlkopfs d.  
 Muskeln. Ihre Zahl b.  
 Musfelpulsader, untere (A.  
 cularis inferior) c. 120.  
 (A. muscul. sup.) c.  
 Muskelheide a.  
 Muskelhant a.  
 Muskelsubstanz, zufällige Ent-  
 lung a.  
 Muskelsystem a. 47  
 Muskel: Zwerchfells-  
 musculo-phrenica) c.  
 Myriiformes carunculae d.

## 27.

- Nabel d. 4  
 Nabelblase ist keine krankhafte  
 Schwinung a. 16  
 Nabelbruch b. 4  
 Nabelgefäßpulsader (A. omph.  
 lomefaraica) c. 22  
 Nabelring b. 4  
 Nachgeburst d. 4  
 Nackenpulsader, aufsteigende  
 (cervicalis ascend.) c. 100  
 Nackenpulsader.  
 Nadel a. 39  
 Nagelwurzel a. 3  
 Narben der Knorpel a. 4  
 Nares internae b. 1  
 Nafales superiores anteriores  
 (obere vordere Nasen-  
 c. 724. posteriores ibid.  
 dii et inferiores c. 727. in  
 f.iales c.  
 Nafalis anter. super., V. (v.  
 vordere Blutader der  
 c. 317. inferior ibid.  
 rior c.  
 Nafalis septi, A. (Nasensep-  
 wand) c. 99. Nafalis  
 na communis, (gemein-  
 liche äußere) c. 100. d.  
 ibid. posterior c. 115.  
 posterior ibid. nalis a  
 thalmica  
 Nase, Knöcherne  
 Nase, vordere obere Blut-  
 fessel (Vena nalis a

- Palpebralis inferior, N. (unterer Augenlidnerve) c. 730  
 Pancreas d. 364  
 Pancreas Asellii c. 383  
 Pancreaticae A. mediae et sinistrae (Bauchspeicheldrüsenzulsader) c. 214  
 Pancreatico-duodenalis, A. V. coronaria ventriculi.  
 Panniculus adiposus a. 582  
 Parastatae d. 552  
 Parietalia ossa b. 114  
 Partes dissimilares et similes. a. 11  
 Patella b. 262  
 Patientiae musculus b. 404  
 Paukenpulsader (A. tympanica) c. 110  
 Paukensaite (chorda tympani) c. 700  
 Pectorales externi, N. (äußere Brustnerven) c. 618  
 Pedalis anticus, N. (vorderer Fußrückennerve) c. 636  
 Pediaeus, A. (Fußpulsader) c. 292  
 Pediaeus externus m. b. 596. internus 599  
 Peitschenwurm d. 330  
 Pelvis b. 240  
 Penis, A. (Ruthenpulsader) c. 258  
 Pennati musculi a. 515  
 Perforans prima, A. (oberste durchbohrende Pulsader) c. 187. minores c. 188. inferiores. c. 193 superiores c. 194  
 Perforatus Casterii' musc. b. 498  
 Perichondrium a. 430  
 Periglottis d. 185  
 Perimysium a. 448  
 Perinaea, A. (Mittelfleischpulsader) c. 258  
 Periodische Verschiebenheiten der Haare a. 600  
 Peritoneaei processus d. 603  
 Perone b. 260  
 Peronea cavitas b. 257  
 Pes Hippocampi minor (kleiner Seeperdsfuß) c. 530. major c. 532  
 Petrosus superficialis, N. (oberflächlicher Felsennerve) c. 700. minor c. 725  
 Petersche Drüsen d. 279  
 Pfanne b. 234  
 Pfannenauschnitt b. 237  
 Pfannenpulsader (A. acetabuli) c. 273  
 Pfortnerhöhle d. 261  
 Pfortnerpulsadern (A. pyloricae inferiores) c. 212. obere c. Magenfranzpulsader.  
 Pforte d. 335  
 Pfiemenschwanz d. 330  
 Phalanges b. 227  
 Pharyngea crista b. 89  
 - ascendens, A. (Schlundkopfpulsader) c. 96. descendens c. 115  
 Pharyngeus superior s. primus, N. (oberer erster Schlundkopfs-nerve) c. 686. minor s. inferior. c. 687. Plexus ibid:  
 Philtrum d. 163  
 Pinnales dorsales, A. (Nasenschnägelpulsadern) c. 100  
 Piliforme os b. 216  
 Placenta d. 705. praevia 767. oblata ebend. lucenturiata 772  
 Plantaris internus et externus, N. (innerer und äußerer Sohlens-nerve) c. 639  
 Plantaris peroneus s. externus hallucis, N. (Wadenbeinners-der großen Zehe) c. 639  
 Planum os b. 122  
 Planum semicirculare b. 115  
 Platysma myodes b. 470  
 Pleura d. 721  
 Plexus brachialis (Armgeflecht) c. 644  
 Plexus choroidei (Adernege) c. 545  
 Plexus ciliaris d. 77  
 Plexus coronarii (cordis) (Kranz-geflechte) c. 778  
 Plexus coronarius s. inferior ven-triculi (Magengeflecht) c. 761  
 Plexus femoralis (Schenkelge-flecht) c. 623  
 Plexus ganglioformis s. retiformis. V. Ganglion semilunare.  
 Plexus hepaticus (Lebergeflecht) c. 761  
 Plexus hypogastricus (Bedenge-geflecht) c. 763  
 Plexus

Noduli Morgagni (Morgagnische.  
Knötchen) c. E. 38  
Nussgeleut a. 395  
Nympha d. 534  
Nymphae d. 536

## O.

Oberaugenhöhlenpulsader (A. su-  
pra orbitalis) c. obere Nuss-  
pulsader.  
Obergärtengrube b. 195  
Oberhaut a. 575  
Oberkieferblutader (V. alveolaris  
super) c. 318  
Oberkieferbeinpalte b. 105  
Oberkieferpulsader (A. maxillaris  
sup.) c. 114  
Oberlippenblutader, untere äußere  
(Vena labii superioris inf. f. ex-  
ter.) c. 319  
Obernieren d. 503  
Oberollnerv (N. supratrochlea-  
ris) c. 719  
Oberlippenfalte b. 542  
Oberlippenfaltennerv (N. supra-  
labiales) c. 659  
Occipit. l. minor f. anterior, N.  
(Kleiner vorderer Hinterhaupts-  
nerv) c. 66. maximus c. 662  
Occipitalis musc. b. 479  
Occipito-frontalis musc. b. 479  
Öffnung, Monroische (foramen  
Monroi) c. 527  
Öffnungen des Herzens, venöse  
c. 1. arteriöse ibid.  
Öffnungen, Thebesische, (Fora-  
mina Thebesii) c. 33  
Oesophageae, A. (Speiseröhren-  
pulsadern) c. 139. ab interco-  
stali prima c. 158. a thoracica  
aorta. c. 197. a coronaria ven-  
triculi sup. c. 209  
Ohrdrüsengeflecht (plexus paro-  
tidens) c. 702  
Ohr. Eintheilung desselben d. 8  
Ohrschneitt d. 10  
Ohrschneittfläche b. 233  
Ohrschneitt d. 10  
Ohrschneitt d. 9  
Ohrschneitt d. 10

Ohrners, großer (N. auricularis  
magnus, f. cervicalis) c. 64.  
tiefer hinterer unterer c. E. 71  
Ohrpulsader, hintere vordere (A.  
auriculares anter. infer.) c. 109.  
obere vordere (A. auric. ant.  
sup.) ibid. tiefe (A. auric. pro-  
funda) c. 110. innere (A. au-  
ditivae intern.) c. 14  
Ohrspeicheldrüsende (R. paroti-  
dei) der Antlitzpulsader c. 17  
Ohrtrumpete, Knöchel b. 14  
d. 22. knöchelige  
Oclecranon b. 27  
Cila capitis b. 13  
Omenta d. 657. 69  
Omoplate b. 199  
Omphalo-mesaraica, A. (Nabel-  
gefäßpulsader) c. 21  
Omphalo-mesaraica, V. (Nabel-  
gefäßblutader) c. 24  
Ophthalmica anterior, V. (Augen-  
blutader) c. 34  
Opticum foramen b. 9  
Opticus canalis b. 9  
Orbicularis ciliaris d. 77  
Orbita b. 157 ff. e. lacrima b. 13  
Orbitariae cellulae b. 12  
Organe, nicht alle entfallen  
gleich a. 2  
Organismus a. 11  
Osteomalacia c. 14  
Osteosteoma a. 21  
Ovaria d. 55  
Ovula Graafiana d. 57  
Oxyuris d. 58

## P.

Palati os b. 13  
Palatina adscendens, A. (Nabel-  
pulsader) c. 96.  
dens c. 15  
Palatinae cellulae b. 12  
Palatini, N. major et minor  
(Größere und kleinere Gaumen-  
nerven) c. 7  
Palatum osseum f. stabile b. 12  
Palliasadenwurm d. 1  
Palma b. 12  
Palmaris brevis b. 22  
Palpebrales, A. (Augenblut-  
adern) c. 12  
b. 12

Q.

- Quere Binde b. 6. 440  
 Querfortſätze der Wirbel b. 29  
 Querzweige, gewundene (circelli  
 venoli) der Blutleiter der Wir-  
 belsäule c. 345

R.

- Racenverſchiedenheiten a. 75  
 Rachen d. 157  
 Radialis recurrens, A. (zurücklau-  
 fende Ecchidenpulsader) c. 179  
 Radialis et ulnaris volaris polli-  
 cis, N. (Speichen- und Ellen-  
 bogenhohlhandast des Daumen)  
 c. 652  
 Radius b. 209  
 Ramus perpendicularis b. 143.  
 horizontalis ebendaſ.  
 Randhörn (N. marginalis) c. 705  
 Ramina, A. (Seitenzungenpuls-  
 ader) c. 95  
 Ranula d. 196  
 Raphe d. 542  
 Raphe ſ. futura externa corpo-  
 ris calloſi (Naht) c. 501  
 Raue Linie des Oberſchenkelbeis  
 nes b. 254  
 Rautengrube (Sinus rhomboi-  
 deus) c. 454  
 Receptaculum ſ. cysterma chyli  
 (Milchſtern) c. 411  
 Rectus internus m. b. 563  
 Rectus ſternalis muſc. b. 465  
 Recurrens ulnaris, A. (zurücklau-  
 fende Ellenbogenpulsader) c. 185.  
 A. recurrens interossea c. 187  
 Recurrens, A. a tibiali antica.  
 (zurücklaufende Pulsader) c. 289  
 Regeneration des Faſergewebes  
 a. 469  
 Regeneration der Nerven a. 346 ff.  
 Regenerationsfähigkeit der Knor-  
 pel iſt unbedeutend a. 432  
 Renes lucentiariati d. 503  
 Rete Malpighii a. 575  
 Retinaculum peroneorum b. 590  
 Rhomboides os b. 217  
 Richtungslinei des Beckens b. 244  
 Riechbeinhöcker (Proceſſus ſ. ca-  
 runcula mammillaris) c. 490

- Riechbeinhöcker b. 6. 159  
 Riechbeinhörn (N. ethmoidalis)  
 c. 717  
 Riechbeinpulsader, mittlere (A.  
 ethmoidalis poſt. ſ. media)  
 c. 119, vordere (anterior) c. 121  
 Riechnervknollen (Palpus nervi  
 olfactorii) c. 754  
 Riemchen d. 606  
 Rieſen. Bedingungen ihrer Form  
 b. 2. 3  
 Rückencommiſſur, des Rückenmar-  
 kes c. 449  
 Ring, Vieſſenſcher (Annulus  
 Vieſſenii) c. 33  
 Ringe der Blendung d. 85  
 Rippen b. 73 ff. Allgemeine Ver-  
 bindungen ebendaſ. ff., ſind  
 nichts als vergrößerte vordere  
 Wurzeln der Wirbelquerfortſätze  
 b. 74, wahre und falſche b. 78.  
 Art ihres Mehrfachwerdens 81  
 Rippenknorpel a. 426  
 Risorius musculus b. 471  
 Riviniſche Gänge d. 195  
 Rollhügel b. 253  
 Rollhügelleiſte b. 253  
 Rollhügelzweig, oberer und unter-  
 er, (R. trochantericus ſup. et  
 inf.) c. 274  
 Roſtrum ſphenoidale b. 96  
 Rotatio a. 396  
 Rückenäfte, des Leidendengeſichts (R.  
 poſtici ſ. dorsales) c. 625  
 Rückenäfte, der Sehen (A. digita-  
 les dorsales) c. 296  
 Rückenband der Handwurzel b. 489  
 Rückenbogen der Fußwurzel (Ar-  
 cus dorsalis tarſus) c. 295  
 Rückenbogen der Handwurzel (Ar-  
 cus dorsalis carpi) c. 182. 188  
 Rückenmark a. 279  
 Rückenmark iſt der zuerſt entſte-  
 hende Theil des Nervenſystems  
 a. 342  
 Rückenmarkſkanal b. 28  
 Rückenmarkſloch b. 28  
 Rückenmarkspulsader, hintere (A.  
 ſpinalis poſter.) c. 139. vori-  
 dere (anterior) c. 141  
 Rückenmarkſchwindſucht (tabes  
 dorsalis) c. 590  
 Rücken.

- Plexus mesentericus superior** (oberes Mesentericgeflecht) c. 762. inferior c. 765  
**Plexus parotideus** (Speicheldrüsengeflecht) c. 702  
**Plexus pulmonalis** (Lungengeflecht) c. 692  
**renalis** (Nierengeflecht) c. 762  
**Plexus sacralis** f. ischiadicus (Hemischbein- oder Hüftgeflecht) c. 633  
**Plexus spermaticus** (Samengeflecht) c. 763  
**Plexus splenicus** (Milzgeflecht) c. 762  
**Plica semilunaris** d. 524  
**Plicae semilunares** d. 651  
**Polystoma** a. 662  
**Popliteus, N.** (Kniekehlnerv) c. 635  
**Poren der Oberhaut** a. 587  
**Porus acusticus internus** b. 128  
**Porta** d. 335  
**Poupart'sches Band** b. 438  
**Princeps pollicis, A.** (Hauptbau-  
 menpulsader) c. 183. indicis, c. 184  
**Processus clinoidi posteriores** b. 94. medii 95. anteriores 97  
**Processus coronoideus** b. 207  
**Processus durae m. cruciatus** (kreuzförmiger Fortsatz der harten Harnhaut) c. 559  
**Processus infundibuliformis** d. 722  
**Processus pterygoidei** b. 96. vaginalis 98  
**Processus styloideus** b. 111. zygomaticus 111. minor 123. major 123. unciformis 123. ascendens f. nasalis 128. palatinus 128. alveolaris 129. malaris f. zygomaticus 130. pyramidalis 133. pterygoideus 133. nasalis 133. orbitalis 133. sphenoidalis 133. coronoideus 143. condyloideus 143. coracoides 193  
**Pr. styloideus ulnae** b. 207. radii 210  
**Productivitas** a. 111  
**Profunda inferior, A.** (untere tiefe Armpulsader) c. 172  
**Promineae vertebrae** b. 44  
**Promontorium** d. 20  
**Pronatio** b. 212  
**Prostata** d. 553  
**Prostata Bartholiniana** d. 557  
**Pterygoideae Laminae** b. 98. f. illa ebend. f. illa ebend.  
**Pterygoideus, N.** (Flügelnerv) c. 735  
**Pterygoideus processus** b. 96. Hamulus f. uncus b. 98  
**Pterygopalatina, A.** (Flügelgangespulsader) c. 115  
**Pterygopalatinus, N.** (Flügelgangesnerv) c. 722  
**Pubo-urethralis musculus** d. 563  
**Pudendae externae, A.** (äußere Schampulsader) c. 271  
**Pudendalis externus et internus plexus (venarum)** (Schamgeflecht) c. 356  
**Pudendo-haemorrhoidalis communis externus, N.** (gemeinschaftlicher äußerer Scham- und Mastdarmnerv) c. 628  
**Pudendus externus, N.** (äußere Schamnerv) c. 626. inferior c. 629  
**Pulpus dentis** d. 203  
**Puls** a. 194 ff.  
**Pulsaderband (ligamentum arteriosum)** c. 366  
**Pulsadergeschwulst** a. 245 ff.  
**Pulsadern, ihre Kräfte** a. 186  
**Pulsadern sind irritabel** a. 192  
**Pulsadern. Verschiedenheiten von den Blutadern** a. 175 ff.  
**Pulsadertheil des Herzens (P. cordis arteriosa)** c. 5  
**Pupillarmembran** d. 113  
**Pyloricae inferiores (untere Pyloruspulsadern)** c. 212. superior ibid.  
**Pylori antrum** d. 261  
**Pylorus** d. 259  
**Pyramidale os** b. 218  
**Pyramide, seitliche (eminencia pyramidalis lateralis)** c. 453. des Malacarne (Pyramis Malacarnii) 471  
**Pyramides Malpighianae** d. 463. Ferreinianae d. 468  
**Pyrisformis apertura** b. 161  
 Q.

- Schienbeindrüse**, vordere (glan-  
dula tibialis antica) c. 385
- Schilddrüsenpulsader**, unterste (A.  
thyreoidea ima) c. 147. **Ast**  
von der aufsteigenden Nacken-  
pulsader c. 151
- Schläfenerv**, äußerer tiefer (N.  
temporalis profundus externus)  
c. 734. Innerer, *ibid.* ober-  
flächlicher 735
- Schlafackennerv** (N. crotaphiti-  
co-buccinatorius) c. 715
- Schlafgrube** b. 167
- Schlafpulsader**, mittlere (A. tem-  
poralis media) c. 108. vordere  
(A. tempor. anterior.) *ibid.*  
hintere (A. tempor. posterior-  
es) c. 109. tiefe (A. tempor.  
profundae) c. 113
- Schleimhaut** d. 521
- Schleimbälge** a. 561
- Schleimbeutel** a. 537. 557
- Schleimdrüsen** a. 576
- Schleimhäute** a. 569
- Schleimhautsystem** a. 609. Ver-  
schiedenheiten desselben 612 ff.
- Schleimnetz** a. 575. 585
- Schleimscheiden** a. 561
- Schleimsystem**. Sein Bau a. 116 ff.  
Besonderes u. allgemeines 122 ff.  
enthält weder Gefäße noch Ner-  
ven 129
- Schließmuskel** der Harnblase  
d. 473
- Schlüsselbein** b. 198
- Schlüsselbeinwarzenmuskel** b. 473
- Schlundast**, des dreigetheilten Ner-  
ven (R. pharyngeus) c. 724
- Schlundkopfsast** (R. pharyngeus)  
der aufsteigenden Schlundkopf-  
pulsader c. 103. oberste, ab-  
steigende (pharyngea suprema  
f. descendens) c. 115
- Schlundkopfgeflecht** (Pl. pharyn-  
geus) a. 687
- Schlundkopfnerv**, oberer, erster  
(N. pharyngeus f. superior f.  
f. primus) c. 686. Kleiner,  
unterer c. 687
- Schlundkopfschürer** d. 243
- Schnabel** (im Gehirn) c. 502
- Schneidezahnkanal** b. 129
- Schnepfenkopf** d. 554
- Schulterblatt** b. 193
- Schulterblatts, umgeschlagene Puls-**  
**ader des**, (A. circumflexa sca-  
pulae) c. 16. **Rückenpulsader**  
desselben (A. dorsalis scapulae)  
c. 165
- Schulterhaken** b. 194
- Schulterhöhenpulsader** (A. acro-  
mialis f. thoracica humeraria)  
c. 162
- Schuppe** des Hinterhauptbeines  
c. 88
- Schwamm** a. 658
- Schwammige Entzündung** a. 661
- Schwarze Substanz** a. 263
- Schwimmmuskel** b. 589
- Schwinden des Gehirns** c. 593
- Scirrhus** a. 658
- Scerotales et labiales anteriores**,  
A. (vordere Hodensack, und  
Schamlippenpulsadern) c. 271
- Serotum** d. 541
- Secundae f. secundinae** d. 697
- Seelenkräfte**, verschiedene haben  
wahrscheinlich verschiedene Orga-  
ne im Gehirn a. 328
- Seepferd Fuß**, kleiner (pes hippo-  
campi minor.) c. 530. größer  
c. 332
- Sehlochhaut** d. 113
- Sehloch** b. 98
- Sehnenausbreitungen** a. 455
- Sehnenuornel** a. 467
- Sehnenscheiden** a. 458
- Sehstreifen** (Tractus optici)  
c. 749
- Sehnensfrieme** b. 449
- Seitenbänder** a. 462
- Seitenbeine** des Beckens b. 231
- Seiten** des Körpers in Bezug auf  
Bildungsabweichungen a. 88
- Seitenfurche**, vordere und hintere,  
des Rückenmarkes (sulci latera-  
les anter. et poster.) c. 436
- Seitenpalten** (fissura laterales)  
des Rückenmarkes c. 435
- Seitenzungenpulsader** (A. ramina  
linguae) c. 95
- Sella turcica** b. 95
- Semilunare os** b. 215
- Semipennati musculi** a. 515
- Sem-**

- Senilitas** a. 5. 111  
**Septum cordis** (Scheidewand) c. 5.  
**atriorum** (des Vorhofs) ibid.  
**ventriculorum** (der Kammern)  
 ibid.  
**Septum Narium** b. 160  
**Seröses System** a. 536 ff.  
**Serratus anticus minor** muscu-  
 lus b. 466  
**Sichel, des kleinen Gehirns** (falx  
 cerebelli) c. 560. große ibid.  
**Sichelförmige Zwischenknorpel.**  
 b. 371  
**Siebplatte** (im Gehirn) (lamina  
 cribrosa) S. vordere durchbohrte  
 Stelle.  
**Sinnwerkzeuge.** Allgemeine Ver-  
 bindungen derselben d. 4 ff.  
**Sinus atrii** (Höhle des Vorhofs)  
 a. 20. venarum pulmonalium  
 c. 39. septi ibid.  
**Sinus frontalis** b. 117  
**Sinus rhomboidens** f. bulbi rachi-  
 dici (Rautengrube) c. 454  
**Sinus sigmoideus** f. lunatus major  
 b. 207  
**Sinus sphenoidalis** b. 96  
**Sinus tympani** d. 21  
**Sohlenbogen, oberflächlicher** (A.  
 plantaris superficialis) c. 308  
**Sohlenmuskel** b. 577  
**Sohlennerv, innerer** (N. planta-  
 ris internus) c. 639. äußerer  
 640. Innerer der großen Zehe  
 (N. tibialis hallucis) c. 639  
**Solens m.** b. 577  
**Spätgeburt** d. 762  
**Spalten** b. 191  
**Speicherschluff** a. 654  
**Speichenhöcker** b. 210  
**Speichenhohlhandast des Daumen**  
 (N. radialis volaris pollicis)  
 c. 652  
**Speichenpulsader, zurücklaufende,**  
 (A. radialis recurrens) c. 173.  
 178. des Zeigefingers (A. dor-  
 salis radialis indicis) c. 182  
**Speichenrand** b. 203  
**Speichenröhrenpulsader** (A. oeso-  
 phageae f. broncho oesophageae)  
 c. 149. von der obersten Zwischen-  
 rippenpulsader c. 158. von der  
**Brustsorte** c. 197. unter-  
 riore) c.  
**Speiseröhrenschling**  
**Spermaticus externus**, N.  
 densus externus.  
**Sphenoideum antrum**  
**Sphenoidea propria** fissura  
**Spheno-sphenoidea** fissura  
**Sphincter vesicae**  
**Spina nasalis**  
**Spina occipitalis externa**  
 interna  
**Spina palatina posterior,**  
 nasalis  
**Spina trochlearis** b. 118.  
 lis 119. turbinalis inferi-  
 ethmoidalis  
**Spinalis lumbalis**, A. (I.  
 Rückenmarkspulsader)  
**Spinalis posterior**, A. (I.  
 Rückenmarkspulsader)  
 anterior  
**Spindel der Schnecke**  
**Spinnewebhaut**  
**Spiralblatt**  
**Epige (apex) des Herzens**  
**Splen**  
**Splenica**, A. (Milzpulsader)  
**Splenii musculi** b  
**Spongiosum os** b  
**Evora**, S. Seeperdesfuß.  
**Spulwurm** d  
**Spur des eirunden Loches** (I.  
 gium foraminis ovalis) c  
 runde Grube.  
**Squamma** a.  
**Stabfranz, Keilscher** c.  
**Stachelfortsatz der Wirbel** d  
**Stachelheiligsbeinband** b  
**Stachelloch** b  
**Stachelpulsader** (A. spinola  
 mittlere Hirnhautpulsader.  
**Stamm**  
**Stamm, gemeinschaftlicher,**  
 ungenannter (truncus com-  
 nis f. innominatus) c  
**Steine** a.  
**Steißbeine** b. 1  
**Stenionscher Gang** d.  
**Sternalis brutorum** musc. b  
**Sterno - abdominalis** musc.  
 b.  
 Su

Sterno - cleido - mastoideus m.  
b. 472. *versüßt häufig* C. 474  
Sterno - mastoideus b. 472  
Sternum b. 63  
Stimme d. 398 ff.  
Stirnmuskel b. 479  
Stirnnerve (N. frontalis) c. 719  
Stirnpulsader (A. frontalis)  
c. 123. oberflächliche (subcutanea) ibid. tiefe (profunda) ibid.  
Stränge der Nerven a. 267  
Strahlenband d. 77  
Strahlenform im Organismus a. 20. Gewundue d. 97  
Strahlenplättchen a. 512 ff.  
Streckmuskeln a. 512 ff.  
Striae laterales longitudinales (der seitlichen Längstreifen) c. 502  
Strongylus a. 662. 663  
Stüge Girardi's d. 602  
Stylohyoideus, N. (Zungenbein-  
nerv) c. 701  
Styloideus processus b. 111  
Stylomastoidea, A. (Griffelstige-  
pulsader) c. 106  
Subcutaneus colli profundus me-  
dius, N. (mittlerer Haut Hals-  
nerv) c. 661. superiores ibid.  
superiores a faciat c. 705  
Subcutaneus malae, N. (Wangen-  
hautnerv) c. 721  
Sublingualis, A. (Unterzung-  
pulsader) c. 95  
Submental A. (Unterfinnpul-  
sader) c. 97  
Submental, V. (Unterfinnblut-  
ader) c. 319  
Subrotundum os b. 216  
Substantia perforata media (mitt-  
lere durchbohrte Stelle) c. 481.  
antica c. 489  
Eudaptische Race a. 75  
Sulci medullae spinalis (Furchen  
des Rückenmarks) c. 436  
Sulcus basalis, f. attrio - ventri-  
cularis f. circularis (Kreisfurch-  
e des Herzens) c. 4. longitudi-  
nalis (Längsfurch-  
e) c. 5  
Sulcus caroticus b. 94

Sulcus cerebelli magnus f. hori-  
zontalis (große Furch-  
e des klei-  
nen Gehirns) c. C. 463  
Sulcus nasalis b. 139  
Sulcus petrosus superficialis  
b. 110. finus transversus ebend.  
115. meningeus 115. longitu-  
dinalis 116. frontalis 118.  
lacrymalis 127. pterygo - pala-  
tinus 183. mylo - hyoideus 144  
Sulcus finus transversus b. 90  
Sulcus transversus b. 92  
Superficialis volae, A. (oberfläch-  
liche Hohlhandpulsader) c. 179  
Superfoetatio d. 770  
Supinatio b. 212  
Supraciliaris, A. (Augenbrauen-  
pulsader) b. 123  
Supraclaviculares, N. (Schlüssel-  
beinnerven) c. 639  
Suprarenales mediae, A. (mittlere  
Nebennierenpulsadern) c. 207.  
superiores c. 208. inferior  
c. 231  
Supraspinales musculi b. 421  
Supratrochlearis, N. (Oberroll-  
nerv) c. 719  
Sustentaculum tali b. 268  
Sutura a. 398  
Sutura squamulo - pyramidalis  
b. 113. squamula 114. coronalis  
116. 119. sagittalis 116. fronta-  
lis 119. intermaxillaris 129  
Suturæ duplices b. 187  
Sylviana, A. (Gefäßgrubenpul-  
sader) C. cerebialis media.  
Symmetrischer Bau des Organis-  
mus a. 25 ff.  
Symptomie a. 331  
Symphyis a. 397  
Synarthrosis a. 397  
Synchondrosis a. 398  
Synovialhäute a. 557  
Synovialkapseln a. 557  
Systeme, einige sind häufigern Bil-  
dungsabweichungen unterworfen  
als andre a. 89  
Systeme, organische a. 11 ff.

T.

Tabea dorsalis (Rückenmarks-  
schwindelsucht) c. 590  
Tabula



- Tabula vitrea a. 389  
 Taenia a. 662. d. 530  
 Taenia nervosa, V. Ganglion semilunare.  
 Taenia f. fimbria (der Saum) c. 487  
 Talgdrüsen a. 576. 583  
 Talus b. 265  
 Tarsea, A. (Fußwurzelpulsader) c. 293. interna c. 296  
 Tarsus b. 264. d. 61  
 Tartarische Race a. 75  
 Tela choroidea (Gefäßblatt) c. 548  
 Temporalis, media, A. (mittlere Schläfepulsader) c. 108. anterior. ibid. posteriores c. 109. profundi c. 113  
 Temporalis profundus externus, N. (äußerer tiefer Schläfennerv) c. 734. internus ibid.  
 Tendines intermedii a. 464  
 Tentorium cerebelli (Hirnzelt) c. 559  
 Tesseræ os b. 265  
 Testes cerebri c. 496  
 Testes muliebres d. 515  
 Tetragonus genæ musc. b. 470  
 Textur, bestimmte fehlt anfanglich a. 46  
 Texturabweichungen der Muskeln a. 593  
 Texturveränderungen a. 82. 98 ff.  
 Texturverschiedenheiten der Nerven a. 271  
 Textus papillaris a. 574  
 Thätigkeitsbedingungen der Muskeln a. 490  
 Thenar b. 537  
 Thoracicus musculus b. 465  
 Thoracicus, ramus arteriarum intercost. aortic. c. 203  
 Thränendrüsenerv (N. lacrymalis) c. 720  
 Thränenfurche b. 128  
 Thränenkarunkel d. 65  
 Thränenpulsader (A. lacrymalis) c. 118  
 Thymus glandula d. 453  
 Thyroidea glandula d. 447  
 Thyroideus, ramus a thyroidea sup. (Schilddrüsenast) c. 93. ab inferiori a. 151  
 Tibia b. 3. 257  
 Tibialis exterior, N. (äußerer Schienbeinnerv) c. 639  
 Tinnæ os d. 522  
 Torcular Herophili (Presse des Herophilus) c. 325  
 Trabeculae carnea (Gallenmusfeln) c. 7  
 Tracheales superiores, N. (obere Luftröhrendäste) c. 690. inferiores c. 691  
 Trachelomastoidæus musc. b. 415  
 Tractus optici (Sehstreifen) c. 749  
 Tridger b. 39  
 Tragus d. 9  
 Transversa faciei, A. (Quere Linspulsader) c. 107  
 Trapezium os b. 217  
 Trapezinus musculus b. 399  
 Traubenhaut d. 83  
 Treppen der Schnecke d. 34  
 Triangulare os b. 216  
 Trichocephalus a. 662. d. 330  
 Trigonum Lieutaudii d. 474  
 Triquetra ossa b. 101. 181  
 Triquetrum os b. 216  
 Trochanteres b. 253  
 Trochantericus ramus (Hofhügelsweig) c. 274  
 Trochlea ossis humeri b. 203  
 Truncus b. 3  
 Truncus innominatus f. communis (ungenannter Stamm) c. 77  
 Tubæ Fallopiæ d. 516  
 Tuber articulare b. 111. parietale b. 115. frontale 117. superciliare f. supraorbitale 117. jugale 118. maxillare 127  
 Tuberculum anonymum f. jugulare. b. 90  
 Tuberculum ganglii postici posterioris (hinterer Höcker) c. 511  
 Tuberkel a. 659  
 Tubuli Belliniani d. 407  
 Tüpfelsattel b. 94  
 Tunica Ruyschiana d. 82. villosa - glandulosa ebend. supra-chorioidea ebendaf. hyaloidea 96  
 Turbinatum os b. 140  
 Tuten b. 95  
 Tympani

Tympani membrana b. S. 112  
Tympanica, A. (Paukenpulsader) c. 110

II.

Ueberbeine a. 568  
Ueberfruchtung d. 769  
Uebergang, unmittelbarer aus den  
Pulsadern in die Blutadern fins  
der Statt a. 159  
Ulna b. 206  
Ulnaris longus palmaris, N. (lang-  
ger Hohlhandnerv) c. 653; dor-  
salis ibid.  
Umbilicus d. 662  
Umfangsfaserknorpel a. 440  
Umriffe der organischen Körper  
a. 19  
Unciforme os b. 220  
Ungenannter Hocker b. 90  
Ungenannte Knochen b. 231  
Ungenannte Linie b. 233  
Unguis os b. 139  
Unteraugenhöhlenkanal b. 159  
Unteraugenhöhlennerv (N. infra-  
orbitalis) c. 728  
Unteraugenhöhlenpulsader (A. in-  
fraorbitalis) c. 114  
Unteraugensibblutader, innere (Ve-  
na palpebralis infer. inter.) c. 318  
Untergrätengrube b. 195  
Unterkieferdrüsenblutader (V. glandu-  
lae maxill. infer.) c. 319  
Unterkieferknoten (Gangl. maxil-  
lare) c. 738  
Unterkiefernerv (N. maxillaris in-  
ferior) c. 736  
Unterkieferpulsader, untere (A. maxil-  
laris infer.) c. 112  
Unterkieferwinkel b. 144  
Unterlapp (R. submental) der  
Zufuhrpulsader c. 97  
Unterlappblutader (V. submenta-  
lis) c. 319  
Unterleib. Gegenden desselben  
b. 6 ff.  
Unterleibsäste, des Schenkelge-  
flechts (R. abdominales l. an-  
tici) c. 625  
Unterlippenblutader (V. labialis  
infer.) c. 319  
Wiedell's Anat. 4. Th.

Unterripenast (N. subcostalis) der  
Brustnerven. S. Zwischenrip-  
penast.

Unterrollnerv (N. infratrochlea-  
ris) c. 718

Unterscheidungsmerkmale der Or-  
gane des animalischen und vege-  
tativen Lebens a. 104. sind  
nicht ganz gütig 105 ff.

Unterschenkelbinde b. 543

Unterzungpulsader (A. sublin-  
gualis) c. 95

Urachus d. 472

Ureter d. 470

Urethrae bulbos d. 560. Isthmus  
ebendaf.

Ursprungsverschiebenheiten d. Hirn-  
und Rückenmarksnerven a. 293 ff.

Uterinus plexus (venarum) (Ge-  
bärmuttergeflecht) c. 356

Uterus d. 518

Uvea d. 83

Uvula d. 170

V.

Vagina d. 531

Vagina Halleri d. 602

Vagina muscularis a. 474

Vaginae processus scyloidei b. 111

Vaginae tendinum fibrosae a. 458

Vaginalia ligamenta b. 528

Vaginalis plexus (venarum) (Ge-  
bärgeflecht) c. 356

Vaginalis processus b. 98

Vaginalis tunica d. 545. 546

Valvula Eustachii (Eustachische  
Klappe) c. 33. Thebesii c. 35.

triglochi (Dreijochige) c. 37.

mitralis (mügensförmige) c. 40.

foraminis ovalis (des eirunden  
Loches) c. 48

Varix a. 250. aneurysmaticus 239

Vasa aberrantia (abirrende Gefäße)  
c. 175

Vasa coronaria cordis (Kranzge-  
fäße) c. 13

Vasa efferentia d. 549

Vasa lactea l. chylofera (Milchge-  
fäße) c. 403

Vasa subcutanea a. 582

Vasa valvorum a. 154

Vasa  
8ff

- Vasa vorticosa** d. 81  
**Vascula serpentina** d. 59  
**Vegetatives Leben** a. 103  
**Velum medullare posterius** (hin-  
 teres Marksiegel) c. 467  
**Vene**, halbunpaarige (V. hemia-  
 zygos) c. 352  
**Ventriker Theil** (pars cordis veno-  
 sa) des Herzens c. 4  
**Ventriculus Arantii**, V. sinu-  
 rhomboideus.  
**Ventriculus septi** (Höhle der  
 Scheidewand) c. 505  
**Verbindung**, bewegliche a. 394  
**Verbindungsast**, großer oberer  
 (des Arms) E. untere tiefe  
 Armpulsader.  
**Verbindungsast** (hinterer) des Ge-  
 hirns (A. communicans poster.)  
 c. 124. **vorderer** (A. communi-  
 cans anterior) c. 127  
**Verbindungsgründarmarterie**,  
 (A. anatomica dextra) E.  
**Gründarmarterie**, rechte  
 obere.  
**Verknöcherungen des Gefäßsystems**  
 a. 255 ff.  
**Verknöcherung der vorübergehenden**  
**Knorpel** a. 431  
**Verknöcherung des serbischen Systems**  
 ist häufig a. 553  
**Vermis cerebelli** (Wurm) c. 468  
**Vernix caseosa** a. 589. d. 745  
**Verrenkung** a. 420  
**Vertebris ossa** b. 114  
**Vertiefungen der Knochen** a. 363  
**Vern montanum** d. 554  
**Vesiculäre Drüsen** (Glandulae Ve-  
 salianae) c. 379  
**Vesicae** a. 641  
**Vesica vitellaria** d. 722. **inte-**  
**stinalis** ebendas.  
**Vesicalis plexus** (venarum) (Blas-  
 sengeflecht) c. 356  
**Vesiculae Graafianae** d. 516  
**Vesiculae seminales** d. 552  
**Vesicula umbilicalis** d. 722  
**Vidianus canalis** b. 99  
**Vidianus**, N. l. recurrens (Wid-  
 scher Nerv) c. 724  
**Widischer Nerv** (N. Vidianus)  
 E. Flägelner.  
**Wierediges Esch** b.  
**Vincula tendinum**  
**Vogelflaue**. E. **Scrofen**  
**Vola**  
**Volaris pollicis radialis**  
**ria**, A. (Hohlhandpulsad-  
 er) Ellenbogenpulsader d.  
 men)  
**Volaris radialis indicis**, d.  
 handpulsader d.  
 fingers)  
**Vomer**  
**Vorgebürge**  
**Verhautschmiere**  
**Vorhofshöhle** (sinus veno-  
 monialium)  
**Vorsteherdrüse**, **Var-**  
**ter**  
**Vorwärtsdrückung**  
 w.  
**Wadenbeinhöhle**  
**Wadenbeinarterie**  
**nen Zehe** (A. digitalis  
 taris digiti quinti)  
**Wadenmuskelfaser** (A. ge-  
 n.  
**Wangenfortsatz**  
**Wangenhautnerve** (N. sub-  
 malae)  
**Warzen**, myrtensförmige  
**Warzengebe** a. 5  
**Warzenmuskeln** (musculi  
 lares)  
**Wasserkopf**  
**Wasserleitung der Schnecke**  
**des Vorhofes**  
**Wasserleitung, Sylvische** (d-  
 ductus Sylvii)  
**Wasserleucht des Gehirns**  
**drorachitis et hydroce-**  
**c. 598. der Hirnhöhlen** (l-  
 cerebri)  
**Weichheit**, anfängliche d.  
**ganismus**  
**Weisse Haut**, erste und zw-  
 Haut  
**Weisse Substanz** a.  
**Whartoniana gelatina**

- Wharton'scher Gang. d. 6. 193  
 Wharton'sche Sulze d. 714  
 Wiedererzeugung der Knochen a. 410  
 Winddorn a. 416  
 Winkelow'sches Loch a. 658  
 Wirbelausschnitt b. 29  
 Wirbelbein b. 265  
 Wirbelbogen b. 28  
 Wirbel entstehen aus acht Stücken b. 30  
 Wirbelgefäße d. 81  
 Wirbelkörper b. 28. entsteht aus drei Knochenstücken 30  
 Wirbelsäule b. 26 ff. Abtheilungen derselben b. 27  
 Wirbel sind ringsförmig b. 27.  
 wahre und falsche 31  
 Wormiana ossa b. 101. 181  
 Wormische Knochen b. 101. 181  
 Wulst, halbmondförmiger (Intumescencia semilunaris) & halbmondförmiger Knoten.  
 Wurm, des kleinen Gehirns (vermis cerebelli) c. 468  
 Wurmfortsatzpulsader (A. appendicæ) c. 219
- 3.
- Zähne sind den Haaren analog. a. 618  
 Zahl, regelwidrige des Herzens c. 54  
 Zahnfach b. 129  
 Zahnhöhle b. 129  
 Zahnhöhlenfortsatz b. 129  
 Zahnhöhlenpulsader (A. dentalis) c. Ober- und Unterkieferpulsader.  
 Zahnkeim d. 203  
 Zahnknorpel d. 220  
 Zahnnerve, hinterer des Oberkiefers (N. alveolaris poster. sup.) c. 728. vorderer c. 729. Unterer c. Unterkiefernerve.  
 Zapfen d. 170  
 Zapfentheil des Hinterhauptbeins b. 88  
 Zellblutleiterknoten (Ganglion cavernosum) c. 767  
 Zellen, organische a. 9
- Zellgewebe enthält keine Zellen a. 116 ff. ist durchdringlich c. 120  
 Zellhaut der Gefäße a. 153  
 Zellhaut der Pulsadern a. 184  
 der Blutadern a. 211  
 Zellkörper d. 535. 557. Ihre Scheidewand d. 559  
 Zersplitterung a. 406  
 Zigenloch b. 111  
 Zigenrand b. 91  
 Zigenzheil b. 107  
 Zonula Zinnii d. 97  
 Zotten der Schleimhäute a. 615  
 Zungenbeinast (R. hyoideus) der Zungenpulsader c. 95  
 Zungenbeinkiefernerve (N. mylohyoideus) c. 736  
 Zungenbeinernerv (N. stylohyoideus) c. 701.  
 Zungenmuskeln d. 175  
 Zungennerve (N. lingualis) c. 738  
 Zungenrückenfäste (R. dorsales linguae) der Zungenpulsader c. 95  
 Zusammenmündung. Gefäße derselben im Organismus a. 21  
 Zusammenziehung der Muskeln a. 481 ff.  
 Zweckmäßigkeit der organischen Form a. 102  
 Zweibäuchige Muskeln a. 509  
 Zwerchfellsbruch b. 463  
 Zwerchfell: Magenbänder d. 648  
 Zwerchfells-pulsader, obere (A. diaphragmatica sup.) c. 155  
 Zwerge, Bedingungen ihrer Form b. 3  
 Zwillingenabdomenmuskeln b. 576  
 Zwischenbänder b. 530  
 Zwischenkieferrath b. 129  
 Zwischenknochennerve, äußerer (N. interosseus extern.) c. 650.  
 Innerer c. 651  
 Zwischenknochenpulsader, zurücklaufende (A. recurrens interossea) c. 187  
 Zwischenknorpel a. 438  
 Zwischenknorpelgrube b. 254  
 Zwischenmuskulbänder a. 456  
 b. 488  
 Zwischenrippenast, der Brustnerve (N. intercostalis) c. 617  
 Zwischen

Zwischenrippenpulsader, vordere (A. intercostal. anter.) c. E. 155	Zwischenribschen a. E. 2
Zwischenrippenpulsadern, untere hintere (A. intercostales infer. poster. l. aorticae) c. 199	Zwölffingerdarm : Epitrichis pulsader (A. pancreatico-c- denalis) E. Magenfranz;
Zwischenrippengänge, hintere (Va- sa lymphatica intercostalia po- steriora) c. 294. vordere ibid.	aber, rechte untere. Zygoma b. 6 Zygomaticum os b. 6 Zygomaticus procellus b. 11

## D r u c k f e h l e r.

- E. 128 in der letzten Zeile der Note lese man statt „dagegen“ betr.  
 — 409 Zeile 9 statt et lies l.  
 — 420 — 9 ff. Luftröhrendrüse l. Luftröhrengefäße.  
 — 522 — 14 ff. Muttermundes l. Ruttermundes.  
 — 550 — 9 ff. „vielfacher“ l. vielfach gewundner.  
 — 757 in der vorletzten Zeile setze man hinter „Kindespech“ „in  
 Magen.“

